



Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página <http://books.google.com>

3 2044 106 327 745

FL
43
W.
179.

121A
7




HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Received 13 July, 1911.



176. *Dollfusia* Sandberger

JOANNIS DANIELIS LEERS
FLORA^A
HERBORNENSIS.

EXHIBENS

P L A N T A S

CIRCA

HERBORNAM NASSOVIORVM

C R E S C E N T E S ,

S E C V N D V M

S Y S T E M A S E X V A L E L I N N A E A N V M

D I S T R I B U T A S ,

C V M D E S C R I P T I O N I B V S R A R I O R V M I N

P R I M I S G R A M I N V M ,

P R O P R I I S Q V E O B S E R V A T I O N I B V S

E T N O M E N C L A T O R E .

A C C E S S E R V N T

G R A M I N V M O M N I V M I N D I G E N O R V M

E O R V M Q V E A D F I N I V M

I C O N E S C I V .

A V C T O R I S M A N V A D V I V V M D E L I N E A T A E

A E R I Q V E I N C I S A E .



CC

H E R B O R N A E N A S S O V I O R V M

S V M P T I B V S A V C T O R I S

M D C C L X X V .

July 13, 1911
Gray Herbarium
Harvard University

SERENISSIMO. AC
CELSISSIMO. PRINCIPI. DOMINO
DOMINO
GVILIELMO. V.
PRINCIPI. ARAUS. ET. NASSAVIAE
FOEDERATARUM. BELGII
PROVINCiarum. Gvbernatori. HEREDITARIO
ET. IMPERATORI. TERRA. MARIQUE. SUPREMO
REFLIQVA.
ACADEMIAE. HERBORNENSIS
RECTORI. MAGNIFICENTISSIMO
PRINCIPI. AC. DOMINO. LONGE
CLEMENTISSIMO.

SERENISSIME
P R I N C E P S
CLEMENTISSIME
P R I N C E P S
AC DOMINE!



haec opella, quam ad
CELSITUDINIS
TUAE pedes humil-
lime & summa cum
reverentia, tanquam patriae Florae pri-
mitias, in meae erga TE pietatis signum
deponere audeo, enumerationem Plan-

a 3 tarum

tarum Vegetabiliumque continet, quae
in plantis abundante tractu urbis TUAE
Herbariae, sub TUO illustri glorio-
soque regimine felicissimae, sponte
nascuntur.

Hunc quem multorum annorum
intervallo tandem ad finem perduxí
laborem, quique mihi multum negotii
ac molestiae facessivit, votum meum
ardentissimum effecit: ut nempe ad
elaborationem cultumque historiae nat.
Nassoviae, & in primis Botanices, par-
tis in hoc quo vivimus seculo, tam in
Medicina, quam Oeconomia, quo-
vis respectu maximi momenti, quid-
quam conferrem.

Feli-

Felicissimum me praedicabo , si
quem mihi proposui finem , etiam quo-
dammodo tantum adsecutus fvero.
Quodsi TUA CELSITUDO huic
meo labore calculum Suum adjicere ,
eo SE oblectare , & hoc leve opu-
sculum SUA summa gratia & patro-
cilio dignum judicare non dedita-
tur; hoc & maximum , quo affici pos-
sum , laboris mei quem huic operi im-
pendi , praemium erit , & stimulum ad-
det ad historiae nat. studium , si mihi
vita contigerit , amplius excolendum.

Ceterum ad Summum Numen sup-
plices mitto preces , ut TIBI longissi-
mam det lucis usuram , & universam
regiam domum salvam ac incolunem

ad ultima usque tempora conservare
velit, quo TE diutius, & quamdiu
in mortalium numero futurus sum, ve-
nerari & summa cum observantia per-
sequi possit

**TUAE CELSITUDINIS
MEI CLEMENTISSIMI PRINCIPIS
AC DOMINI**

SUBIECTISSIMVS CIVIS AC

SERVUS

JOANNES DAN. LEERS.

PRAE-



PRAEFATIO.

Lectori B. S.

Amor studii Botanici, quo jam a teneris annis captus sui, ansam mihi dedit, ut tam arduum laborem suscipiens, stirpes in hac plantarum ditissima urbis nostrae regione sponte provenientes, per octodecim annos colligerem, ad quem etiam magna ex hoc studio semper percepta voluptas accedebat, hunc meum ardorem magis magisque incendens. Ascendi eum in finem adjacentes montes, visitavi prata, campos, silvas, meque demisi in nemora umbrosa, paludes cert. Quam collectionem stirpium rite examinatarum & in ordinem redactarum Tibi B. L. offerre non dubitavi, sperans fore, ut hanc a me susceptam operam grato animo accipias, minimeque supervacaneam esse putas.

Numerus quidem plantarum, quae in hoc opusculo recensentur, respectu aliorum haud ita magnus est, cryptogamicis exceptis; ve-

PRAEFATIO.

rum haec collectio, si ad spatium vix semimiliare ab urbe distans, in quo plerasque harum stirpium collegi, respicias, alias hujusmodi enumerationes copia, ut mea fert opinio, multum superare videtur.

Me plures stirpes quoque colligere potuisse credo nisi negotia muneris, quibus domi interesse coactus, matutinas vespertinasque horas tantum ambulatiunculis meis Botanicis dicare potui, me ab excursionibus in loca ab urbe remotiora detinuisse.

Novae cives etiam quas, in centies perquisitis locis, in hunc usque diem adhuc reperio, meam confirmant opinionem, Plantarum divitias a benignissimo Creatore in hac regione dispersas, a me nondum exhaustas esse.

Omnes stirpes in hac enumeratione recensitas, sine ullo adjutore socioque a me ipso collectas, solus, omnique vivo auxilio, librorumque plurimorum ad hanc rem necessariorum suppellectili destitutus, argutissime examinavi, maiores figura diminuta, minores naturali magnitudine depinxi, descripsi, & denique exsiccavi. Fateor vero harum inquisitionem, determinationemque mihi multum negotii fecisse:

PRAEFATIO.

cisse: Perill. Equitis a Linné Systema sexuale tantum, mihi omnem, quam desiderabam, utilitatem attulit, ac semper de stirpe quadam dubium certum reddidit; meque ut unam quamque repertam plantam cognoscere, ejusque genus ac speciem certitudine physicali, determinare potuerim, docuit.

In stirpium Herbornensium enumeratione celeberrimum Dr. Rosenbach in hac Academia olim Medicinae Professorem Antecessorem quidem habui, verum opus illius, quod mihi sine dubio multum utilitatis attulisset, ac certe laborem meum paululum sublevasset, vetustatis iujuria, quod dolendum, periit, nec in celeberrimis totius Germaniae Bibliothecis, quamvis multa ad hunc librum inveniendum adhibita fuerit opera, reperiri potuit. Caspar Bauhinus tantum in suo Pinace hujus opusculi mentionem facit.

Stirpes meas secundum Perill. Linnaei Syst. Nat. edit. XII. Holmiae 1767. enumeravi; nomina generica secundum Ejusdem Gener. Plantar. Viennae 1767. Nomina specifica vero, secundum Species Plantar. Viennae 1764. notavi. Unicuique speciei autem, nomen Genericum

FRAEFATIO.

cum cum Numero Speciei Perill. Halleri Hist.
Stirp. Helvet. edit. nov. adjunxi.

Loca natalia diligenter adposui, ut illi instrucionem quandam habeant, qui mea vestigiat premere vellent.

Observationes paucas, plures vero descriptiones addidi; in primis Graminum eorumque ad finium quae ut ad curate describerem, minutissima quaeque perscrutatus sum, ac necessaria brevissimis, ut potui, exhibui, imo unumquodque Gramen per plures annos, ad minimum examinavi, eorumque habitum, ac fructificationis partes ad curate descripsi. Attamen fatendum est mihi, habitum, figuramque partium adeo saepe variare, ut aliquoties has descriptiones, post aliquot tempus elapsum, mutare expolireque me oportuerit: nihilominus tamen secundum Characteres quosdam quarundam specierum partes, primo intuitu, aliter se visui offerent, ac eas descripsi, operae autem pretium erit in collatione Characterum meorum non individuum tantum, sed plura in diversis locis collecta, secundum hos examinare. Illas vero fructificationis partes, a generico Charaktere Linnacano non discedentes, brevitati studens, in plurimis descri-

PRAEFATIO.

descriptionibus , non vero in Iconibus , omisi.

Plantas omnes, quarum partes Officinas ingrediuntur, summo cum studio annotavi, quo verae species, non autem ex ignorantia, ut saepe fieri solet, falsae colligantur: nec in urbibus nostrae tractu sponte provenientes, sumptibus ab exteris adferantur.

Quasdam paucas cum cruce (†) signatas, quarum investigatio, ob defectum seu mutilationem partium, mihi sufficientem certitudinem praebere non poterat, in civium dubiorum numero habeo.

Et quia Graminum cognitio hisce omni luce perfusis temporibus, ob eximum, quem ad fert Oeconomiae usum magni momenti, Tironibusque difficillima est, operam dedi, ut omnia grama indigena, eorumque adfinia, ad vivum depingerem, & praecipuarum partium Icones adcuratas propria manu aeri incisas, in majorum usum adjungerem.

Et quum ad requisita Botanici proprie pertineat, ut & sic pictor ac sculptor; exemplum magni Dillenii imitatione dignissimum imitari mihi proponebam. Omnem itaque adhibui operam,

ut

P R A E F A T I O.

ut figuras summa cum adcuratione depingere, easque depictas, quas aliena manus forte deformasset, cum Chalcographi manuductione destituerer ipse aeri inciderem, caelique usum discerem, cuius ope omissa aliaque aqua forti defigurata, emendare expolireque possem.

Quantum laboris & negotii vero hujus Artis primaria Experimenta mihi fecerint, vix exprimere possum. Quae cum ita sint L. B. non a me ut autodidacto in arte Chalcographica, artificiosa specimina multaque arte exornata expectabis, sed hisce iconibus simplicissimam naturam repraesentantibus, ut spero, contentus eris.

Animus mihi erat Vegetabilia Cryptogamica, Muscos nimirum & Algas, hasce umbrorum incolas, quibus ob structuram mirabilem eximiamque pulchritudinem semper amicissimus fui, tanquam secundam hujus floriae partem, non multo post hanc primam in lucem edere; sed tam multa se mihi opposuerunt impedimenta, quae nullo modo superari poterant, meque ab hoc opere perficiendo detinuerunt. Propterea hanc partem cum Cryptogamia, quam sine ea mutilatam ac imperfectam publi-

PRAEFATIO.

publico tradere malui. Si vires corporis longo & ad hucdum me premente malo admodum debilitate mihi potestatem facient, ac si Deo T. O. M. sic visum fuerit, ut hac vice ex incommoda hac valetudine emergam; Muscos Algasque sub tit. *Vegetabilia Cryptogamica Iconibus illustrata*, cum accuratis a me ipso ad vivum depictis & autographa manu aeri incisis figuris, emittere, animum induxi. Etcum mihi Perill. Hallerus, pro sua benignitate omni laude dignissima, suos plurimos rarosque Muscos & Algas mecum humanissime communicare pollicitus sit, haec mea collectio hoc additamento eo numerosior, illustrior, ac utilior evadet.

Ipsò opere Dilleniano quo Muscorum indagator carere non potest, destitutus sum; nam Celeberr. Doct. Boehme Bibliothecar. & Prof. Giessae mihi quidem istud per literas enixe roganti, humanissime misit, quia mihi autem non nisi per aliquot hebdomadas concedebatur, non multum in usum meum convertere potui. Natura igitur, quam tantum imitabor, ipsa mihi sufficiens erit, ad meas icones, cum arte Chalcographicam diligentius nunc quam antea excoluerim eiusque plurima arcana de-
texe.

P R A E F A T I O.


texerim, adeo naturae similes aeri incidendas, ut nisi figuræ Dillenianas, Michelianasque superent, iis tamen in re nulla, quæ certe ad accurationem attinet, cedant.

Haec mea collectio multa alia Vegetabilia Cryptogamica rariora continebit. Non unaquaque flora enim Anthocerote, Buxbaumia, Blasia, Marchantia conica & hemisphaerica, quibusdam Ricciae ac multis Jungermanniae speciebus &c. gaudet. Quae tamen omnia in locis a nullo adhuc perscrutatis ipse primo reperi, pluraque eorum adpositis nominibus cum Amicis communicavi.

In ceteris fruere hoc meo labore B. L. qualiscunque etiam sit, eumque serena excipe fronte, ac finis quem mihi in hoc tam arduo labore suscipiendo proposui, non immemor esto. Qui nisi rei herbariae peritorum applausum captem, me aliquid tamen ad Botanophilorum tironum usum contulisse mihi gratulari possum. Dabam Herbornae Mense Novembri MDCCCLXXIV.

JOANNES DAN. LEERS.

VITA



VITA
JOANNIS DANIELIS LEERS,
SCRIPTA.

AB

HENRICO PAULO LEERS, FILIO.



I dem cum aliis, maxima cum indignatione; diu multumque observavi, homines plerosque in hoc mundi theatro versari, absque ut sentiant, pulchritudinem, ordinem ac sapientiam ex naturæ operibus elucentem: cum tamen, Cl. LINNÆO (a) judece, *rerum creatorum indagatio ab hominibus sibi relictis semper aestimata*; vere eruditis ac sapientibus semper exculta; male doctis & barbaris semper inimica fuerit; cumque eruditissimus quisque inficias ire non potuerit, hanc scientiam mirificam & utilitatem & voluptatem adferre cultori. Ego quidem

b

a prima

(a) LINN. Syst. Nat. edit. Holm. XII. Tom. I. p. 14.

VITA AUCTORIS.

a prima statim æstatula, amorem quasi a natura insitum percepi doctrinæ naturalis, simulque in hunc usque diem ea, mirum in modum, delector, mihi que hac plus semel in optatis fuit, ut historiæ naturalis scientia pateret latius, ita ut non tantum esset disciplina medicorum propria, sed & Theologorum atque Jurisconsultorum fora occuparet. Non quidem opus est, ut multis verbis hujus scientiæ ostendam utilitatem. Res ipsa, & ii, qui vel primoribus tantum labris hocce studium attigerunt, loquantur. Pauca tamen hac de re ~~in~~ dicere, animus est.

Cum omnes in eo convenient, ut sapiens nihil frustra faciat ; quare, quæso, Deus mihi oculos dedit, & quare rationem ? Nonne ad sua opera in hocce mundo consideranda ? Si itaque Dei opificium, vel contemtui habeam, vel plane negligam, & non dignum judicem, quod a me videatur, huic fini, quem Deus libi in hoc mundo creando proposuit, penitus repugno. Quod si vero negaveris, prodesse harum rerum cognitionem : magno te hercle temeritatis criminе obligaveris ; cum de Deo ignominiosum sit dicere, quædam ab ipso esse effecta, quæ plane nullum habeant usum (b).

Por.

(b) Sic e. g. usum, quo gaudeant Insecta, hæcce animalcula a vul-

VITA AUCTORIS.

Porro cum omnes res creatæ ab opifice optimo maximo originem trahant, atque ex iis diuinæ perfectiones eluceant; hominis ratione prædicti esse puto, virtutis divinæ cognitionem, ex sacris literis haustam, ope contemplationis rerum creatarum, luce pleniore collustrare. Ex rebus namque creatis perfectiones Dei patere, cuvis extra dubium positum est. Nimirum supremi Numinis potentia ex creatione, gubernatione, ac omnium rerum conservatione evincitur. Etenim pulcerrimus nexus, qui in rebus, quas benignissimus creator in hocce mundo produxit, deprehenditur, evidensissimum divinæ sapientiæ indicium est. Bonitas deinde creatoris in eo cernitur, quod, experientia teste, omnia in hominum usum sint condita cet. Nam Sicuti e. g. in artificio quodam opere, artificis solertiam admiror, sic & ex rebus, in hac rerum universitate a Deo productis, Ejus perfectiones colligo. In rebus creatis divinæ artis ac sapientiæ sunt vestigia: Hæc adeat ille, qui Dei existentiam in dubium vocare non erubescit. (c)

b 2

Dein-

a vulgo plerumque susque deque habita, ostendit Cel. de
G E R R,

(c) Videatur Clar. NIVENTYT L'existence de Dieu démontrée dans les merveilles de la Nature.

VITA AUCTORIS.

Deinde hominem obligatum esse ad divina opera contemplanda, ex eo quoque recte judicatur, quod eum Deus, haud temere aut fortuito, miro varietatis ac pulchritudinis sensu, instruxit, ut & magna cupiditate res creatas contemplandi per se feratur. Hanc iraque sciendi cupiditatem naturalem esse video, & cum haec naturæ dos, quam Deus humano cordi insevit, non sine ratione eidem indita videatur, & huic obtemperare meum esse, plane video.

Quantam non adfert tandem historiæ Naturæ notitia cultoribus voluptatem? (d) Etenim Animus hominis ita est comparatus, ut ex varietate & pulcritudine non possit non incredibilem voluptatem capere. Et ubi quæso major rerum varietas (e) ac venustas reperitur, quam in regno naturæ? Item quot inveniantur animalia? Quantus numerus vegetabilium, lapidum, cet., & quanta pulcritudine singula sunt exornata? Ratio, ob quam quarundam naturalium pulcritudo non statim perspi-

(d) *Hac contemplatio Natura evadit voluptatis cœlestis vestibus, tunc particeps Animus in luce obambulat, & tanquam in terrestri cœlo vitam degit.* Act. Holm.

(e) *Non ad unam, inquit SENECA, Natura formam opus sumit, præstat, sed in ipsa varietate se jactat.*

VITA AUCTORIS.

perspiciatur, saepe quærenda est in minutissima ac subtilissima ipsarum structura & partium coagmentatione, quæ non statim in sensum cadit, sed, quando microscopiiis subjecta fuerit, earum pulchritudo animadverti facile potest. Si v.g. non nullæ cives civitatis Cryptogamicæ tali essent magnitudine, quali Aloe indica gaudet, certe, ut mea fert opinio, plurium oculos in se traherent, & viridiorum Regiorum decora essent eximia. Qualis pulchritudo non conjuncta deprehenditur in minuta quavis bestiola, quæ saepe pedibus calcatur, & a communi hominum turba sperni solet? Quis enim, quæso, si structuram plurium insectorum contemplatur, oculos satis pascere, animumque exsaturare satis poterit? Hinc ipsi Magnates ac Reges hujus amore ducti, scientiæ naturali operam dare omni tempore consueverunt, nec hoc suae dignitati dedecori esse putarunt, adeoque hoc modo novum illi splendorem conciliare voluerunt (f) Primum humanitatis patrem etiam, si quid video, hi-

b 3

ftoria

(f) Quantos fecerit Rex ille *Salomon* in Hist. nat. progressus, patet.
ex Reg. 4: 33. ubi traditur, eum locutum fuisse de arboribus,
de cedro Libani usque ad hyssopum ex pariete nascentem, de qua-
drupedibus, avibus, reptilibus, ac piscibus.

VITA AUCTORIS.

istoria naturali delectaturi esse, sacrae literæ testantur. (g)

Postremo cum omnia opera Divinam gloriam prædicent per hominem (b), ille itaque Auctoris sui majestatem ex fine creationis contemplari debet, ut hoc modo, ut par est & æquum, evadat, summi Numinis præco.

Verum enimvero infinita foret oratio, si omnia vellem explicare argumenta, quæ pro dignitate ac præstantia naturalis studii adferri possent, sed vereor ne actum agam, cum id iam pridem a multis eruditis hominibus præstitum sit egregie. Hæc ergo sufficient, ad declarandam utilitatem hujus studii. Rem ipsam attigi: nunc vero ad hujus opusculi auctorem progrediendum videtur.

• Antequam vero de Ejus vita exponam, in antecessum moneo, eum non criminis illius esse accusandum,

(g) Nam legimus de primo homine Deum ad eum omnia animalia duxisse, ut ipsis nomina imponeret. Hinc certas notas noverit necesse est, quibus species a se invicem distinguantur. Opus propterea erat horum animalium cognitione.

(b) Psalm. 118.

VITA AUCTORIS.

sandum, cuius se, ut supra dixi, plurimi hominum
reos facere solent, nimirum ignorationis naturæ.
Beatus videlicet auctor vitæ suæ pretium metiri
sciebat, atque adeo, quamdiu vixit, quanturaque
potuit, tempus bene impendebat, ad opera creatoris
contemplanda ac perscrutanda, sæpe dicere solitus :
omnia alia oblectamenta (scilicet quæ tantum talia esse
videntur, non autem re vera sunt) crassiora,
quæ v. g. a lusibus, confabulationibus & com-
positionibus penderent, minime comparanda esse
cum hisce, quarum nos, contemplatione operum
divinorum, participes fieremus. Hisce namque
nos omni tempore, loco & in quacumque demum
humanæ vitæ ætate, ac habitu, frui posse. Omnia
autem ea in deliciis habebat, quae continent tria
regna naturæ. Nec minus delectabatur vermicu-
lo, pulverem inhabitante, quam altissima, exquisi-
tissimisque coloribus exornata, planta. Nulli adeo
pepercit labori, tam in colendo Botanices studio,
cui in primis operam dabat, quam in colligendis
plantis. Hujus rei stimulum ipsi indiderat, sicuti de
se ipso in præfatione monuit, cupido quædam
insatiabilis, eique quasi innata, quam a tenera sta-
tim juventute persenserat, opera Naturæ colligen-
di, eaque cum attentione contemplandi. A primis
vero annis plantas collegit, aliaque naturalia, iisque
admodum delectatus est, & quidem semper

VITA AUCTORIS.

in gloriam ac honorem creatoris, optimi, maximi.

Quod vero ad originem Ejus attinet, hanc lucem
adspexit d. XXIII. Februar. 1727. *Wonsideliæ*, Baruthi
urbe, ubi pater ejus *Sebastus* oriundus, IOANNES
PAULUS BENIGNUS LEERS, mercaturam magnariam
exercebat. Propter præclaras ingenii atque animi
dores, quæ jam in prima juventute sese exer-
ebant, a parentibus ad studia destinatus, & hunc
in finem iis scientiis instructus fuit, quibus
solida doctrina, tanquam fundamento, inniti debet.
Sed providentia aliud plane moliebatur, nonnulla
quippe intercedebant, quo minus scientiis operam
dare posset. His ita se habentibus, apud animum
statuit, studiis relictis, arti *medicamentariae*, seu *phar-*
maceuticae, operam navare, cum in primis incredibi-
lili flagraret rerum naturalium amore, eaque li-
benter tractaret. A patre itaque cum fere annos
tredecim esset natus, Norimbergam in pharmaco-
polium missus est, ad prima hujus artis principia
addiscenda. Positis feliciter hac in urbe rudimen-
tis, Norimberga reducta, alias quoque multasque
urbes

VITA AUCTORIS.

urbes invisit , quas hoc loco non attinet commemorare , in multisque officinis seryivit . In primis vero Strasburgi aliquamdiu commoratus est , ubi Ipsi occasio fuit addiscendæ Anatomiae , aliarumque scientiarum , quæ ad rem medicam pertineant .

Tandem a Deo A. 1755. præter spem atque opinionem Herbornam delatus est , ut ibi præfecti officinæ Academicæ officio fungeretur . Hoc in loco subsidere , ac vitam finire statutum erat . Non ita multa post adventum suum a Pharmacopola *Magerstædt* , relictam viduam (quæ filia erat Pharmacopolæ *Friderici* , olim Dillenburgi versantis) in matrimonium duxit , ex qua tres filios , unamque filiam , genuit : ex quibus filii adhuc hac luce fruuntur , filia vero aliquantis per tantum in hac vita versata , paulo post animam efflavit . Verum ambo non longo tempore fruebantur , quæ ex hoc jucundo conjugio fluebat iucunditate , sed mors funesta mox hocce vinculum , quo arte conjuncti erant , dissolvit , siquidem uxor ejus dilectissima morbo , in puerperio ultimo , correpta , A. 1764. diem obiit .

VITA AUCTORIS.

Quo facto, cum res ejus familiares non paterentur; ut diu vitam ageret cælibem, altera vice, cum virgine C. M. e gente *Textoria*, oriunda *Giffa*, con-nubium, iniit, ex quo ipsi filius natus est, qui autem, non multo postquam in lucem editus fuerat, morti occubuit.

Ab eodem Anno 1764., quo hanc virginem domum duxerat, cœpit infirma uti valetudine, morboque affligi gravi, & quidem sic dicto hypo-chondriago. Hujus morbi sedes in alvo erat, hinc diris capitis doloribus excruciatatur, & defectu virium admodum laborabat. Vis hujus mali erat tanta, ut nulla spes salutis reliqua esse videretur. Sed Deus T. O. M., qui ipsum adhuc aliquandiu in hac vita, versari voluit, donicum liberi sui, usque huc impuberes, ephebis exce-derent. Ergo remedia salutaria esse jussit; adeo quidem, ut denuo sanitatem recuperaret.

A. 1770. iterum periculo affectus est morbo, quem artis salutaris periti Anginam appellare so-lent. Etiam maximum aderat periculum, omnes-que vitæ suæ finem appropinquare credebant. Sed Deus, apud quem possibilia sunt, quæ, apud homi-nes limitata ratione præditos impossibilia esse vi-dentur, omnibus de redintegranda valetudine de-speran-

VITA AUCTORIS.

sperantibus, se interposuit, eumque ab hoc quoque morbo liberatum, sanitati restituit.

A. 1772. in febrem incidit putrescentem, cuius morbi vis tum temporis in nostræ urbis regione late vagabatur, ipsique mortem minari visa est, sed Deus cuius bonitas immensa est, effecit, ut & hoc morbo explicaretur.

Sed morbus ultimus hic corpus suum usque adeo debilitarat, ut usque in Septembrem A. 1774. continuo levi esset valetudine. Membra ejus tali semper languore laborabant, ut levem quandam deambulationem statim ejusmodi sequeretur lassitudo & virium prostratio, quæ vix exprimi potest, aliaque sese exerebant morbi imminentis indicia, sicuti & hujus mensis initio, morbo quodam pertinaci ac admodum acerbo, corripiebatur. Initium morbi erat Colica spasmodica, quæ cum febre, ut vocari solet, tabida, conjuncta erat, singulis noctibus ipsi magnum sudorem exprimente. Quo siebat, ut optimis & ad vitam sustentandam necessariis viribus privaretur, quod non nisi mortem ipsi adferre poterat. Denique successu temporis magis magisque, viribus frangebatur, ut maxime lectulo affixus sedereret, ita ut tandem proprio Marte ire non posset, sed duci oporteret. Omnibus autem admirabile visum est, eum, licet diris conficeretur dolori.

VITA AUCTORIS.

loribus & præ lassitudine pedem vix movere posset, miram tamen animi præsentiam ac æquabilitatem retinuisse, ita quidem, ut semper pias preces effunderet, quibus, tanquam antidoto contra morbi cruciatus, usus, est. Nullis parcitum est remediis ad eum hocce morbo levandum. Cel. Dr. & Prof. *Hoffmannus* t. t. Acad. Herbornensis Prorector, & Clar. Dr. *Ebertz*, advocați ipsum inviserunt, multaque curarunt: quin imo Ipse nonnunquam sibi quædam ex officina sua præscripsit. Sed nihil horum exoptatum effectum habuit, omniaque irrita fuerunt: Ipsemet enim sentiebat vitæ suæ finem appropinquare, sibique ex hac vita discedendum esse.

Omnibus itaque exacte dispositis, quæ ad rem domesticam attinerent, ut Christianus constans, quem nec mortis terror concutere potest, mira animi tranquillitate mortem exspectabat, qui suis doloribus finem imponeret. Neque etiam sibi longiorrem exoptavit vitam, sed libenter mori voluit & quavis hora optavit. Tandem & voti sui fuit damnatus!

nam

VITA AUCTORIS.

nam 7mo die Decembris, hora post meridiem fere tertia, interna viscerum inflammatio, doloribus & vitae finem fecit.

Talem exitum habuit vita viri, qui propter multa sua, eximiaque merita, quamdiu in hac vita versabatur, ab omnibus, qui eum aestimare poterant, eximio amore colebatur. Urbs ejus obitu rerum naturalium peritissimum & in multis artibus ac scientiis versatissimum amisit Virum: Liberi vero ejus patrem, cuius obitum numquam satis elugere poterunt.

Considerato itaque vitae cursu exituque, describenda erit, partim Parentis beati cognitio rerum naturalium, partim character Eius moralis.

Quod quidem ad cognitionem ejus attinet in rebus naturalibus, (i) Regno in primis Vegetabili operam

(i) Deplorandum est, quod hujus opusculi autor, nunc inter cœlites triumphans, in etatis suæ flore debitum naturæ persolverit, siquidem ipsi animus erat, post editam
banc

VITA AUCTORIS.

operam dederat, ductu Botanicorum facile principis & Sueciæ immortalis decoris Cl. LINNÆI; quem semper magni fecit, cujusque non sine intima quadam veneratione mentionem injectit, saepius dicens: multa ipsi in Botanicis esse accepta referenda. Ratio, de qua hunc præ ceteris Botanices peritis, eximio quodam amore, prosecutus est, hæc fuit, quia omnia solidissime tractasset. In urbe Herborna autem primum, intentis viribus, Botanicæ operam dedit, multaque illam diligentia trætare cœpit, ad quam ipsi quoque plantarum ditissima circa Herbornam regio aasam dedit. Plantas colligere incepit, & nulli propterea pepercit labore, visitans omnes circa Herbornam locos, ita quidem, ut nullus fuerit circa urbem locus, cui non vestigia sua impressit: vereque de eo dici potest, quod Perill. HALLERUS in præfatione ad Floram Jenensem de Ruppio ait: eum omnes agro-
rum

hanc, circa Herbornam ercentium plantarum collectionem, atque plantarum trygamicaram temploram historiam, etiam imperium animale intrare & b. c. d. Fanum Herbornensem conscribere, de qua sibi in antecassum multum voluptratis promittebat. Sed providentia semper sapiens ac benigna, in qua acquiescere nostrum est, ipsum præmaturam mortem obire jussit.

VITA AUCTORIS.

rum silvarumque angulos perreptasse. Octodecim namque annorum spatio collegit plantas, quas hæc opella continet: & tandem, licet magno cum labore ad finem perduxit.

Optimum vero erat, quod Deus ipsi tamdiu lucis usuram concederat, donec hoc opus, exceptis nonnullis adhuc plagulis, impressum, & reliquum ipsimet ante obitum jam scriptis consignatum esset. (k) Promiserat quidem in fine Muscorum & Algarum, se yelle, si vitæ usura ipsi concederetur longius, completam plantarum Cryptogamicarum circa Herbornam nascentium historiam tradere; (l) sed morte præventus, promissis stare non potuit.

Si

(k) Ea, quæ ego post obitum suum typis excudenda curavi, sunt Præfat, Dedicat, ac Nomencl.

(l) Cum in primis beatus Parens plantas Cryptogamicas in deliciis haberet, quarum insigni copia regio nostra dirata est, cumque præterea perillistris HALLERUS plurimos de suis rarioresque muscos Patri roganti promisisset, quos ego demum post obitum Eius, a Viro humanissimo, cui propter ea tantas, equantas mens mea capere potest, gratias Iubens

VITA AUCTORIS.

Si denique ad religiosos sensus Eius moresque respiciamus, ut fervidus doctrinæ Christianæ confessor vixit, ac per totam vitam in id incubuit, ut, quantum fieri poterat, Christi servatoris præcepta observaret, & officiis suis, quæ ipsi erga Deum & proximum præstanda erant, pro viribus satisfaceret. Hinc quoque in vitæ fine mira animi tranquillitate, animam efflare, & spiritum suum immortalem Servatoris manibus tradere poterat. Sancte ergo non tantum vixit, sed & moribundus exemplum præbuit adstantibus, quanta hilaritate ac pace Christianus ex hac vita discedere posset. Ita ut votum meum tandem aliquando sit hoc, ut moriar morte bujus Iusti, & finis meus sit, sicut finis Illius.

Iubens meritoque persolvo, traditas accepi, profecto aliquid Parens in hac Botanices parte, adhucdum maxime relicta ac inculta, præstare potuisset, quod reipublicæ Botanicæ amplificandæ & illustrandæ utile & fructuosum fuisset, si id modo fata voluissent.

NOMEN.

**NOMENCLATOR
LINNAEANUS
SEU
EXPLICATIO
TERMINORUM
TECHNICORUM
IN HOC OPUSCULO
OCCURRENTIUM
ORDINE ALPHABETICO
EXHIBITA.**

Nota ad B. L.

Licet Cl. LINNAEUS, in *Horto Cliffortiano*, *Philosophia Botanica*, *Fundamentis Botanicis*, & in Libello, cui tit. est : *Termini Botanici explicati*, quoad maximam partem terminos botanicos exposuerit, maxime tamen sparsi sunt, hinc inde colligendi, ac ordine alphabetico non exhibiti. Me propterea haud parvam apud Tirones gratiam initurum putavi, si hosce collectos & ordine alphabetico dispositos, in Tironum usum exhiberem.

A.

1. *Abbreviatum* Perianthium, (572) longitudinem Tubi (857) Corollae (193) non attingens.
2. *Abortivum* Pericarpium, (573) quod ante maturitatem decidit.
3. *Abrupte pinnatum*, Pinnatum (193) terminatum neque Cirrho (142) neque Foliolo. (323) id. ac *Pinn. sine impari*. (195)
4. *Acaulis* Planta, Caule carens. *Carduus acaulis*.
5. *Acerosa* Folia; Linearia, (458) Subulata, (807) persistentia, (577) plerumque basi articulatione ramo inserta. *Pinus. Juniperus*.
6. *Acinaciforme* Folium, Compressum, (166) Carnosum, (122) altero margine convexo · angusto, altero rectiore, crassiore.
7. *Acinaciforme* Pericarpium, (573) cum fructus instar cultelli compressus, altero angulo longitudinali obtuso, altero rectiore crassiore.
8. *Acotyledones* Vegetabilia, ubi nulli omnino extant *Cotyledones* (199) sub seminis Germinatione (352) *Cryptogamia*.
9. *Aculeatum* Folium, cum Aculei pungentes rigidi occupant Discum. (217)
10. *Aculeatus* Caulis, (132) Aculeis (11) Sparsis, s. confertis armatus. *Rosa. Berberis. Rubus*.
11. *Aculeus*, Mucro pungens Plantae (600) Corticitantum adfixus. (non Ligno.) 730. 657. 404. 668 354.
12. *Acutum* Folium, quod terminatur Angulo acuto. (*)
13. *Adnatum* Folium, Pagina (534) superiore basi rami adnexum.
14. *Ascendens* Caulis, Fol. Pedunc. Coroll. 4. arcuatim sursum versus.

(*) Si super linearis ductam perpendiculari erigo, anguli qui inde utrinque orientur, *recti* dicuntur. Anguli *rectis* maiores aut minores sunt *obliqui*. Et maiores quidem *rectis* appellantur *obtusi*, minores vero, *acuti*. *Geometr.*

IV NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

15. *Adversum* Folium, cum Pagina (534) superior non Coelum sed horizontem spectat.
16. *Aequalia* Filamenta (303) eandem servantia longitudinem.
17. *Aequalis*, Corolla (193) ubi partes figura, magnitudine, & proportione aequales sunt.
18. *Aestivatio*, Corollae (193) Complicatio ante explicationem Floris.
 - a. *Convoluta* (186)
 - b. *Conduplicata*, (171)
 - c. *Imbricata* (391)
 - d. *Valvata*.
 - e. *Inaequivalvis*.
19. *Aggregatus* Flos. Compositus (162) Receptaculo (661) dilatato; flosculis subpedunculatis *rafione*.
20. *Ala*, membrana adfixa semini. (712) (24)
21. *Ala*, denotat Angulum, quem cum Caule facit Petiolus (481) & vicissim. (72)
22. *Alae*, (Caulis,) membranae foliaceae, quae secundum Caulium longitudinem decurrent, (25)
23. *Alae*, Corollae Papilionaceae (545) Petala duo quae Carinae (125) lateribus utrinque adstant solitariae.
24. *Alatum* Semen (712) lateribus membrana auctum, qua volitante disseminatur *Acer*. *Fraxinus*. *Ulmus*.
25. *Alatus* Caulis, qui secundum longitudinem est foliatus. (22) *Scrophularia*. V. *Thapsus*.
26. *Alatus* Petiolus (585) latere utrinque membrana auctus. *Citrus*. *Aurant*.
27. *Alterna* Folia, cum unum post alterum, tanquam per gradus circa Ramum exoritur.
28. *Alternatim* pinnatum Folium. Pinnatum (593) foliolis alternis minoribus.
29. *Amentam* Calycis (183) Species, a Receptaculo communi (152) filiformi, squamis paleaceo-gemmaceis distinctum.
30. *Amplexicaule* Folium, si basis Folii utrinque ambiat latera Caulis transversim, (713)
31. *Anceps* Caulis, angulis duobus oppositis acutiusculis.

32.

32. *Androgyna* Pianta. (484)
33. *Angyospermus* Fructus. Semina Pericarpio (573) tecta.
34. *Angulatum* Folium. Angulis (36) pluribus prominentibus. (834) (634)
35. *Angulatus* Caulis, pluribus quam duobus angulis cavis longitudinaliter exaratus. Unde obtusangulus acutangulus (120 in not.)
36. *Anguli* foliorum, sunt partes prominentes Foli horizontalis.
37. *Annulus* (Fungi) membrana s. pars Volvae (907) stipitem (778) supra medium cingens.
38. *Annulus* (Musci) dicitur Antherae (41) margo exterior Orae elasticus, orificium coarctans in quibusdam Muscis. estque nudus s. ciliatus.
39. *Annua* Radix, (648) intra annum emoritura.
40. *Anomala* Corolla. (430)
41. *Antbera*, Plantarum Genitale masculinum, (475) Pollen (607) (veram Genituram) ducens, quod matura demittit. (264) (179)
42. *Antbera* (Muscorum) Capitulum s. pars pericarpiformis glabra, membranacea, sessilis, (*Phascum*) vel pedunculo (565) instrueta, (*Hypna*) constat Calyptra (112) operculo (523) Ciliis, Polline, & rarius Apophysi (47) differt, Figura, ovata, conica &c. Subulata in *Anthocerote*, Multifida, (*Marchantia*) quadrifida. (*Fungermannia*)
43. *Antberis* in Florescentia (313) peragitur, dum Antherae (41) ruptae spargunt suum Pollen (607) vesiculare supra Stigma. (775) Nuptiae Plantarum
44. *Apetalus* Flos. Petalis (581) carens, non Petrianthio. (572)
45. *Apex* Foli simplicis (734) respicit extremitatem in quam definit.
46. *Apbyllus* Caulis, Foliis destitutus.
47. *Apophysis* (in muscis) Pars inferior Antherae

VI NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

- (41) cartilaginea incrassata, qua Pedunculo (565) adfigitur. *Polyerichum.*
48. *Appendiculatus* Petiolus (585) ramentis foliacis ad basin instructus.
49. *Appressum* Folium, cum Discus (257), foliis approximatur Cauli.
50. *Approximata* Folia, ad se invicem proxime accendentia.
51. *Approximata* Volva (907) fungi Pilorum (586) accedens.
52. *Arborescens* Caulis, Perennis Caudice (127) simplici gemmifero.
53. *Arillus*, Tunica propria exterior seminis sponte secedens, estque Cartilagineus (*Cynoglossum*) vel succulentus. (*Evonimus.*)
54. *Arista*, Mucro subulatus Glumae (364) insidens graminibus. estque *Recta* (664) *Tortilis* (831) &c.
55. *Arma*, Mucrones arcentes animalia, ne laedant Plantam.
- a. Aculei (11) b. Furcae (341) c. Spinae (761)
 - d. Stimuli (776)
56. *Articulata* Radix (648) geniculis (349) intercepta.
57. *Articulata* Siliqua (729) geniculis coarctatis intercepta. *Raphanus.*
58. *Articulata* Spica (759) Internodiis (419) geniculata. *Carex pulicaris.*
59. *Articulata* dehiscens Pericarpium (573) secundum articulos monospermous transversim. R *Raphanistrum.*
60. *Articulatum* pinnatum Folium, Petiolo communis (885) articulato.
61. *Articulatum* Folium, cum unum ex alterius apice excrescit.
62. *Articulatus* Bulbus (106) constans lamellis catenulatis. *Adoxa.*
63. *Articulatus* Caulis s. Culmus (205) Internodii (419) geniculatus.
- 64.

64. *Articulatus* Pedunculus (564) Geniculo (349)
plerumque unico instructus. *Rumex*.
65. *Articulus*; Culmi (205) pars geniculis duobus interjecta. Internodium (419)
66. *Asperum* Folium, idem ac scabrum. (702)
67. *Affurgens*, Caulis. Folium, arcuatim erectum, priimum declinatum (215. 216) deinde apice erectum.
68. *Attenuatus* Pedunculus (564) versus apicem sensim crassitatem perdens.
69. *Auctum*. Perianthium. (111)
70. *Auriculata* Folia, lobo laterali minore prope Basin aucta. *Jungemannia*.
71. *Avenia* Folia, Venis destituta. Opposita Venosis (388)
72. *Axilla*; *Axillaris*, est denominatio quae spatium comprehendit inter Caulem Ramum et Forum. Ala (21)
73. *Axillare* Folium (subalare) quod ad rami extum infertur.
74. *Axillaris* Pedunculus, ex ala (21) scilicet inter folium et ramum &c. ortus. *Dulcamara*.

B.

75. *Bacca*, Pericarpium (573) fæctum evalve; non dehiscens, semina nuda nidulantia (499) continens, estque mono - di - tri , tetra - pentæ polysperma.
76. *Barba* Corollæ Ringentis (693) Labium (433) inferius.
77. *Barba* Species Pubis (628) Pili (591) paralleli. unde :
78. *Barbatum* Folium, pilis parallelis obsitum.
79. *Bicapsulare* Pericarpium (573) tri multicapsulare, a numero Capsularum. *Asclepias*. *Aconitum*. *Aquilegia*.
80. *Bicornes*, dicuntur Plantæ, quarum Corollæ antheris cornutis instructæ sunt. *Erica*, *Vaccinium*.

VIII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

81. *Biennis* Radix. altero anno florens, & deinde emoritura. *Cynoglossum*.
82. *Bifaria* Folia, ad latera rami opposita, tantum enata.
83. *Bifidum* Folium, tri - quinque - Multifidum Folium a numero Fissurarum. Species Fissi. (306)
84. *Biflora* Gluma (364) duos tantum Flores amplectens. *Aira*.
85. *Bigemminum* Folium, cum Petiolus dichotomus (238) apicibus adnectit foliola (323) quatuor.
86. *Bijugum* Folium *trijuga*, *quadrijuga*, *quinquejuga*, *sejuga* &c. Pinnatum (593) sed foliolis (323) tantum quatuor, sex, octo, decem, duodecim &c.
87. *Bilobum trilobum* &c. Folium, a numero lobarum. *Lobati* (462) Species.
88. *Bilocularis tri- quadri- quinque- decem* locularis Capsula (119) a numero Loculamentorum (463)
89. *Bina* Folia-prout Terna, Quaterna, &c. Species verticillatorum (895)
90. *Binatum* Folium, ternatum, quinatum, est digitatum (247) foliolis tantum duobus, tribus, quinis.
91. *Bipartitum tri- quinque multipartitum* Folium, a numero Laciniarum (438) Partiti (557) species.
92. *Bipinnatum* Folium, f. Duplicato pinnatum, cum Petiolus (585) lateribus adfigit foliola pinnata. (593)
93. *Biternatum* Folium, f. Duplicato ternatum, cum Petiolus (185) adfigit tria foliola ternata (822)
94. *Bivalvis* Capsula, *tri- quadri, quinque sex* &c. valvis a numero valvarum (885) in quas dehiscit.
95. *Bivalvis* Gluma (364) duabus constans squamis
96. *Brachiae*, arborum Rami crassiores.

TERMINORUM TECHNICORUM CET. IX

97. *Brachiatus* Caulis, Ramos decussatim (224) oppositos habet.
98. *Brachium*, *Brachialis*, Mensura, ab axilla ad apicem Digitii intermedii. *Pedes duo*.
99. *Bractea*, Folium florale (311) Colore & Figura a ceteris foliis recedens. *Tilia*. *Fumaria bulbosa*.
100. *Bracteatus* Pedunculus, *Bracteis* (99) instructus.
101. *Brevis* Petiolus, longitudinem Folii non attingens.
102. *Brevissima* Filamenta (303) Corolla breviora.
103. *Brevissimus* Petiolus. (885) Folio multoties brevior.
104. *Bulbiferus* Caulis, Bulbos (106) gerens in axillis (72) Foliorum.
105. *Bulbosa* Radix, Bulbo (106) instructa.
106. *Bulbus*, Hybernaculum (387) Plantae (600) ex rudimentis foliorum praeteritorum.
107. *Bullatum* Folium, ex Rugofo (698) fit, rugis contractis, ab altera parte concavis.

C.

108. *Caduca* Corolla, Perianthium, ad explicacionem Corollae mox decidens. *Thalystrum*; *Alcea*; *Chelidonium*; *Papaver*.
109. *Cadueum* Folium, brevi decidens, nec per integrum aestatem permanens.
110. *Calcar*. Nectarium (496) ex Corolla pone in Conum extensa. *Antirrhin*. *Linar*. *Orchides* unde *calcarata* Corolla.
111. *Calyculatum* Perianthium, s. auctum, quasi alio minore Calyce exterius ad basin cinctum. *Crepis* *Dianthus*.
112. *Calyptra* Calyx (113) Musci Cucullatus, antherae (41) superimpositus. (665) (513) (900)
113. *Calyx*, Cortex Plantae in fructificatione (331) praesens. Species septem numerantur. I. *Perian-*

c §.

*tbiu*m

X NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

- thium (572) II. *Involucrum* (427) III. *Gluma* (364) IV. *Amentum* (29) V. *Spatha* (756) VI. *Calyptra* (112) VII. *Volva*. (907)
114. *Campanulata* Corolla, Ventricosa (890) absque Tubo (857) Limbo (486) dilatato. *Campanula*
115. *Canaliculatum* Folium, supra longitudinaliter sulco profundo excavatum.
116. *Capillaris* Pappus (548) radiis seu pilis indivisis. *Crepis*.
117. *Capillus*, Mensura, est diameter Crinis. *Lineae pars duodecima*.
118. *Capitulum* constat Floribus pluribus in Globum ferme congestis. (249)(361)(804)(503) (324) (295)
119. *Capsula*, Pericarpium (573) membranaceum cavum, determinate Valvis (884) dehiscens. Constat *Valvis* (884) *Loculamentis* (463) *Dissepiamento*, (259) *Seminibus* (712). *Proprio Receptaculo* (626) & *Columella* (149)
120. *Carina* Corollæ Papilionaceæ (545) constat duobus Petalis coadunatis, excipit & includit Stamina (771) Pistillaque (598)
121. *Carinatum* Folium si pars prona s. inferior Disci (257) prominet longitudinaliter. unde *Carina acuta, obtusa ciliata*, in foliolis Calycis, & valvis (95) Glumæ. (364)
122. *Carnosum* Folium, interne pulpa solidiuscula succulenta repletum. *Sedum*.
123. *Cartilagineum* Folium, cuius margo Cartilagine a substantia folii diversissima firmatur.
124. *Castrata* Stamina (771) Antheris (41) destituta. *Geranium. Herniaria*.
125. *Cauda* Filum nudum (*Geum urban.*) s. plumosum (*Clematis vitalba*) Semen terminans. unde :
126. *Caudata* Semina dicuntur.

127. *Caudex* dicitur Arborum Truncus. (850) estque adscendens, s. descendens, (Raix)
128. *Caulescens* Planta, Caule instructa. Opposita Acaulis (4)
129. *Caulinum* Folium, Cauli (132) non Ramo insertum.
130. *Caulinus* Bulbus (130) Cauli insidens. Axillis, *Dentaria*. *Lilium*, apice *Allium*.
131. *Caulinus* Pedunculus, e Caule, non ex ramo ortus.
132. *Caulis*, Truncus (850) proprius Herbae (375) elevat folia, fructificationemque. (331)
133. *Cernuus* Pedunculis, cum apice incurvatur, (402) ut Flos versus latus vel Terram nugeat. *Bidens cernua*.
134. *Cespitosa* Planta, cum multi caules ex eadem Radice simul prodeunt.
135. *Ciliatum* Folium, cuius margo (473) setis parallelis longitudinaliter obvallatur. Basi ciliata folia *Thymus*. *Serpillum*.
136. *Circinalia* Folia, *Vernatio*, s. *Spiralia*, quum Folia deorsum spiraliter involvuntur. *Filices*.
137. *Circumscissa* Capsula, (119) quae maturo fructu horizontaliter discedit. *Anagallis*. *Lysimachia*. *Plantago*.
138. *Circumscrip^{tio}* Folii, considerat Peripheriam Fol. simplicis, absque sinibus (745) & angulis. (119) idem ac Figura. (805) (533) (527) §29 §16. &c.
139. *Circumsepiens* somnus, (752) cum Folia (alias horizontaliter posita) noctu eriguntur in formam Infundibuli (412)
140. *Cirrhosum* Folium, quod terminatur Cirrho (142)
141. *Cirrhosum pinnatum* Folium, est Pinnatum (693) terminatum Cirrho (142)
142. *Cirrus*, est Vinculum filiforme spirale, quo Planta alio Corpori alligatur.

XII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

143. *Clavatus* Pedunculus, Clavaeformis s. versus apicem sensim incrassatus. (400)
144. *Coadunata* Folia, quae invicem annectuntur, ut plura inter se basi concrecant.
145. *Coalitae* antherae (41) idem ac connatae. (179)
146. *Coarctata* Panicula (543.) s. *contrafacta*, cum Pedicelli (561) culmo approximantur.
147. *Coarctati* Rami, (650) versus summitatem ferre incumbentes.
148. *Colorata* Folia, & omnes partes Plantae (excepta Corolla) dicuntur, quae alium colorem quam viridem induunt.
149. *Columella*, Capsulae (119) pars, connectens parietes (259) internos cum feminibus.
150. *Coma* constat Bracteis (99) quae Caulem terminant magnitudine insignes *Fritillar. Coron. Imper.*
151. *Commune* Perianthium (572) plures flores congregatos continens cingensque.
152. *Commune* Receptaculum (661) plures flores eorumque fructus connectens.
153. *Communis* Gemma (344) flores & folia includens.
154. *Communis* { Pedunculus, pluribus floribus communis.
Petiolus plura quam unum adnectens folia.
155. *Compactum* Folium, substantia solida constans.
156. *Composita* Corolla, pluribus constatis flosculis intra commune Perianthium (151) supra Receptaculum commune. (152)
157. *Composita* Fructificatio, (331) pluribus flosculis confluentibus.
158. *Composita* Spica (759) pluribus spiculis (760) pedunculo insidentibus.
159. *Composita* Umbella (862) omnibus pedunculis apice Umbellulas (863) gerentibus
160. *Compositum* Folium, Petiolo (154) plura quam unum proferente folia, secundum Gradus (367) compositionis.
a. *compo-*

TERMINORUM TECHNICORUM CET. XIII

- a. *composita* (61. 180. 247. 90. 160. 593. 86.)
- b. *decomposita* (218)
- c. *supradecomposita* (814)

161. *Compositus Caulis*, in ramulos subdivisus, deliquescens adscendendo.
162. *Compositus Flos*, (156) Receptaculo (152) dilatato integro flosculis sessilibus antheris connatis. *Syngenesia*. Estque 1. *Ligulatus* (455) 2. *Tubulosus*. (855) 3. *Radiatus*. (638)
163. *Compositus Pappus* (548) Radiis s. pilis ramosis. (659) (605) instructas.
164. *Compositus Racemus*, (635) ramosus s. divisus in plures.
165. *Compressa Siliqua* (729) lateribus oppositis proxime ad se invicem accendentibus.
166. *Compressum Folium*, est Pulposum (630) lateribus magis quam disco (257) complanatis.
176. *Compressus Caulis*, duobus lateribus oppositis fere planis.
168. *Concavum Folium*, Margine Disco. (257) arctiore, ut deprimatur Discus.
169. *Conceptaculum*, Folliculus. (316)
170. *Conduplicans Somnus*. (752) quando foliola sibi invicem ut libri folia approximantur, superiorem paginam regentia
171. *Conduplicata* a) *Vernatio* (891) b) *Folia*, cum folii latera parallela (*) sibi invicem approximantur. *Quercus*; *Corylus*; *Carpinus*; *Fagus* &c.
172. *Conferta Folia*, cum ita copiosa, ut ramos occupent totos, vix relicto spatio
173. *Confertus verticillus*, (897) pedunculis approximatis.
174. *Confluentia Folia*, ad basin inter se cohacentia.
175. *Conglomerati Flores* s. Pedunculi, cuin Pedunculus ramosus flores ferat brevissimis pedicellis, absque ordine arcte congestos & compactos.
Dactyl. glomer.
- 176.

(*) Lineae parallelas sunt rectae, aequali ubique spatio se-junctae. *Geometr.*

XIV NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

176. *Conicum* Receptaculum (661) teres (816) versus apicem attenuatum.
177. *Connata* filimenta (303) in unum corpus coacta *Monadelphia*.
178. *Connata* folia, si opposita (524) paria basi utrinque inter se coadunantur.
179. *Connatae* Antherae, (41) in unum Corpus concretae *Syngenesia*.
180. *Conjugatum* Folium, Pinnatum (593) foliolis binis lateralibus, nec pluribus.
181. *Connivens* Corolla, cuius Limbi (456) lobi apicibus convergunt.
182. *Connivens* Somaus (752) quando duo folia opposita, pagina (534) superiore tam arte ad se mutuo applicantur; quasi unicum esset Folium.
183. *Contorsio*. v. *Torsio* (830)
184. *Contortum* Pericarpium (573) cum Spiraliter contorquetur. *Medicago*. *Spirea*. *Ulmaria*.
185. *Convexum* Folium, Margine Disco (257) arctiore instratum, ut elevetur discus.
186. *Convoluta* Folia, Vernatio. (891) cum unius lateris margo ambit alterum ejusdem folii marginem instar cuculli. (204)
187. *Convolutus* Cirrus, (142) in annulos contortus.
188. *Corculum*, novae Plantae primordium intra semen, constat Plumula (606) & Rostello. (695)
189. *Cordato-oblongum* folium, oblongum (516) angulis posticis obtusissimis, basi excavatum.
190. *Cordato-lanceolatum*, lanceolatum (447) angulis posticis obtusis, basi excavatum.
191. *Cordato-sagittatum*, sagittatum (700) marginibus versus angulos convexis.
192. *Cordatum* Folium, Ovatum (533) basi sinu (745) excavatum, angulis posticis destitutum.
193. *Corolla* Liber (alburnum) Plantae (606) in flore (316) praesens, estque Monopetala (485) Tubo (857) & Limbo, (456) vel Polypetala (611) Ungue (868) & Lamina (443) constans.

194. *Corollula* est Compositi floris (162) Corolla partialis.
195. *Corona*, *Coronula* Seminis, Calyculus supra adhaerens, quo volitat. *Scabiosa*. *Dipsacus*.
196. *Coronata* Semina, quae 1) Pappum (548) (*Hieracium*. *Crepis*. *Picris*) vel 2) Perianthium parvum, (195) (*Scabiosa*) vel 3) Setas hispidas (*Bidens*) supra adfixa habent.
197. *Corticalis* Gemma (344) e corticis ramentis confecta.
198. *Corymbus* fit ex Spica, (759) dum singuli flores pedunculis propriis instruuntur, situ elevatio proportionali. *Tetradynamia*.
199. *Cotyledon*, Corpus laterale semenis (712) bivalve Caducum, unde *Acotyledones* (8) *Mono-cotyledones*, (482) & *Dicotyledones*, (241).
200. *Crenatum* Folium, margine incisuris sine respectu extremitatis secto. unde *acute* - *obtuse crenatum* *duplicato crenatum*, crenis iterum crenatis.
201. *Crispum* Folium, margine luxuriante, ut *Discus* (287) evadat major. sua Rachi (637. b) omnia folia crispa sunt monstrosa. *Malva crispa*. *Lepid. nasturt.*
202. *Cruciformis* f. *Cruciata* Corolla, Petalis (581) quatuor aequalibus patens. *Tetradynamia*.
203. *Cubitus*, *Cubitalis*, Mensura, a flexura Cubiti ad extimum apicem Digihi intermedii. *Unciae septendecim*.
204. *Cucullatum* Folium, lateribus ad basin conniventibus, apice vero dilatatis.
205. *Culmus*, Truncus (850) Graminibus proprius, elevat Folia fructificationemque, plerumque geniculatus (348) Articulis inanibus. Europaei annui (39) omnes.
206. *Cuneiforme* f. *cuneatum* Folium, sensim versus basin angulatum.
207. *Cuneiforme emarginatum* Folium, (206) apice siccum excavatum.
- 208.

XVI NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

208. *Cuspidatum* Folium, terminatum apice setaceo rigidiusculo.
209. *Cyathiformis* Corolla, cum ex cylindro (*) superne parum dilatata est.
210. *Cylindrica* Spica (719) cylindriformis f. tenuiscula, secunda vero diuiniata.
211. *Cyma*, Receptaculum omnes pedunculos primarios ex Centro eodem universali educens, partiales vero vagos spargens. V. *Ophrys*.

D.

212. *Daedaleum* Folium, una flexuosum lacerumque (435)
213. *Decidua* Corolla, cum floris casu. *Pleraeque*.
214. *Deciduum* Folium, peracta unica aestate casurum.
215. *Declinatum* Folium, deorsum flexum instar Carinae Naviculae.
216. *Declinatus* Caulis, arcuatim descendens.
217. *Decomposita* Umbella (862) f. *Prolifera*, si ex umbellula (863) simplici, aliae enascuntur umbellulae. Gradu iterum aucto dicitur *supradecomposita*.
218. *Decompositum* Folium, cum Petiolus semel divisus adnectit foliola (323) plura. (85. 93. 92)
219. *Decompositus* Flos, compositus (162) ex compositis, continet intra Calycem communem (151) minores Calices, communes multis floribus. *Spaeranthus*.
220. *Decumbens* Caulis, procumbens (618) altiore basi.
221. *Decurrens* Folium, basi folii deorsum per caulem extensa. *Carduus* V. *Thapsus*.
222. *Decurrens* Petiolus, lateribus deorsum per caulem vel Ramum extensis
223. *Decursive pinnatum* Folium, Pinnatum (593) foliolis (323) decurrentibus (221) per petiolum.
224. *Decussata* Folia, ita opposite (524) disposita, ut rami apice inspesto, quatuor ordines referant.
- 225.

(*) *Cylindrus* oritur, circulo ad lineam rectam, meru parallelo, descendente *Geometra*.

TERMINORUM TECHNICORUM CET. XVII

225. *Deflexi Rami*, arcuatim deorsum inclinati.
 226. *Defoliatio*, Tempus autumnale, quo Arbores folia dejiciunt.
 227. *Dehiscentia*, Tempus quo fructus maturus semina dispergit; fitque apice (*Cerasium*) basi (*Triglochin*) angulis (*Oxalis*) Poro, (*Campanula*) horizontaliter (137) vel articulate. (59)
 228. *Deltoides Folium*, Rhombeum (694) ex quatuor angulis, quorum laterales minus a basi distant, quam reliqui.
 229. *Demersum Folium*, quod intra aquae superficiem absconditur.
 230. *Dentata Radix*, moniliformis, ex articulis concatenatis.
 231. *Dentato Sinuatum*, *Dentatum* (232) Sinibus que excavatum.
 232. *Dentatum Folium*, quod acutina horizontalia, folii consistentia, spatio remota habet.
 233. *Dependens Folium*, quod recta terram spectat.
 234. *Dependens Somnus* (752) foliolis demissis.
 235. *Depressum Folium*, Pulpitum (630) Disco (257) magis quam lateribus complanato.
 236. *Determinatio Foliorum* (317) non a propria Structura, sed a loco (465) Situ (746) Insertione (413) & Directione (255) &c. Expansione, desumitur.
 237. *Dextrorsum* (743)
 238. *Dichotomus Caulis*, bifarium semper divisus.
 239. *Diclinia*, Flores masculi (476) & feminini (300) in eadem specie, sed distinctis Thalamis, gaudentes. Comprehendit a. *Monoeciam* b. *Dioeciam* & c. *Polygamiam*.
 240. *Dicocca Capsula* (242)
 241. *Dicotyledones*, foliis seminalibus duobus sub seminis germinatione *Plantae*. (600)
 242. *Didyma* f. *Dicocca Capsula*, duobus nodis extus gibba. *Didyma* Anthera, duobus globulis distinctis, latere connatis. *Mercurialis*.

XVIII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

243. *Difformia* Folia, si in eadem planta variant figura. *Ranuncul.* *Rudbeck lacin.*
244. *Difformis* Corolla, Irregularis (430)
245. *Diffusa* Panicula (543) cum laxe divaricantur pedicelli (561) angulis rectis s. obtusis (12. in not.)
246. *Diffusus* Caulis, Ramis absque ordine patentibus.
247. *Digitatum* Folium, cum Petiolus simplex, seu indivisus, adnectit foliola (323) plura.
248. *Dimidiata* Spatha (756) latere tantum interiore fructificationem (331) obvestiens.
249. *Dimidiatum* Capitulum (118) ab altero latere rotundum, ab altero planum.
250. *Dimidiatum* Involucellum (425) extrorsum situm, estque patens vel dependens. *Aethusa.*
251. *Dioica* Planta, quae flores masculos (476) & femineos (300) in distinto. individuo profert. *Dioecia.*
252. *Diphyllus* Pedunculus, foliolis duobus oppositis instructus.
253. *Diphyllum* Perianthium (486)
254. *Dipetala* Corolla (485)
255. *Directio*, fol. (236) est expansio, quam Folia a basi ad apicem adquirunt. (288. 791. 49. 385. 558. 410. 662. 514. 682. 667. 688. 233. &c.)
256. *Discus* Floris, in composito radiato, (638) pars media, ex corollulis (194) minoribus regularibus (671) constat.
257. *Discus* Folii s. Pagina (534) dicitur folii superficies, (811) superior, plerumque coelum spectans.
258. *Dissectum* Folium, Laciniatum (438) Incisum (398)
259. *Dissepimentum*, Paries quo Fructus (119. 573. 729) interne distinguitur in concamerationes (463) plures.
Parallelum (887) *contrarium* (886)
260. *Distans* Verticillus (897) pedunculis remotis.

TERMINORUM TECHNICORUM CET. XIX

261. *Disticha* Folia, duo latera rami tantum respicientia, licet undique inserta.
262. *Disticha* Spica (759) floribus ad utrumque latus spectantibus, unde tetrasticha, hexasticha, a numero ordinum.
263. *Distichus* Caulis, Ramos situ horizontali, nec decussatim (224) sitos, exserit.
264. *Distinctae* Antherae (41) inter se non cohaerentes.
265. *Divaricata* Panicula (543) cum striete divaricantur pedicelli ad angulum obtusum s. rectum. (12. in not.)
266. *Divaricati* Rami, a trunco ad angulum obtusum discedentes.
267. *Divergens* Somnus, (752) si foliola basi approximantur, apicibus vero patent.
268. *Divergentes* Rami, a trunco ad angulum rectum discedentes.
269. *Dodrans*, *dodrantalis* (Mensura) est spatium inter apicem Pollicis & Indicis extensum. *Unciae septem*.
270. *Dolabrine* Folium, Compressum (166) subrotundum (805) extrorsum gibbum (353) acie acuta, inferne teretiuscula.
271. *Dorsalis* Arista (54) lateri exteriori Glumas (364) adfixa.
272. *Drupa*, Pericarpium (573) farctum evalve, continens Nucem (511) estque *Sicca* (727) vel *Succulenta* (808)
273. *Duplicato crenatum* Folium, (200)
274. *Duplicato pinnatum* Fol. (92)
275. *Duplicato serratum* Fol. (720)
276. *Duplicato ternatum* Fol. (93)
277. *Duratio* Foliorum, respicit Tempus a frondescientia (328) usque ad casum eorum. (214. 109. 577-569. 718.)

E.

278. *Ebraeatus* Pedunculus. Bracteis (99) destitutus,

d 2

279.

XX. NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

279. *Echinatum* Pericarpium, (573) cum aculeis (11) seu Spinis (761) undique adspersum.
Datura Stramon.
280. *Efflorescentia* est Tempus Mensis, quo singulae species Plantarum primos Flores ostendunt.
281. *Ellipticum* Folium, Lanceolatum (447) latitudine Ovati (533) folij.
282. *Emarginatum* Folium, quod terminatur Crema. Unde acute, obtuse emarginatum.
283. *Enerve* Folium; Nervis destitutum. Nervofo (497.) oppositum.
284. *Enodis* Culmus, qui continuus est, nec articulis (65) interceptus.
285. *Ensiforme* Folium, anceps (31) a basi ad apicem sensim attenuatum.
286. *Equitantia* Folia. Vernatio. Marginibus conniventia (182) situ opposito, ut alterum includat alterum. *Acorus. Carex. Iris.*
287. *Erecta* anthera (41) quae basi adfigitur filamento (303).
288. *Erectum* Folium, s. caulis fere ad perpendicularum constitutus.
289. *Erectus* Culmus, situ subperpendiculari, articulis infimis saepe obliquis.
290. *Erosum* Folium, sinuatum (744) sinibus minimis obtusis laciniisque inaequalibus instructum.
291. *Extrafoliacei* Pedunculi, s. Stipulae (781) infra folium collocatae.

F.

292. *Fasciatum* Folium, medulla fasciatum, non tubulosum (856)
293. *Fascicularis* Radix, e partibus carnosis basi sessili connexis.
294. *Fasciculata* Folia, plura ex eodem puncto prodeuntia. *P. Larix.*
295. *Fasciculus*, Capitulum (118) colligens flores erectos parallelos fastigiato - approximatos. *Dianth. barb.*
- 296.

296. *Fastigiati* Flores, .Fasciculus (295) floribus omnibus aequalis altitudinis.
297. *Fastigiatus* Caulis, Ramis omnibus aequali altitudine.
298. *Faux.* Corollae, hiatus inter lacinias (437) Corollae Ringentis, (693) ubi tubus (857) terminatur.
299. *Femina* Planta (600) quae flores tantum femineos (900) profert.
300. *Femineus* Flos, qui Pistillum (198) absque staminibus (771) haberet.
301. *Feminina* Genitalia (350) sunt Stigmata (775) germinibus (951) ubique adnexa.
302. *Fibrosa* Radix, tota constans filamentis simplicibus vel Ramosis.
303. *Filamentum*, pars Floris (316) elevans adnectensque antheram. (41)
304. *Filiforme* Folium, longissimum latitudine & crassitie aequali.
305. *Filiformis* pedunculus, aequabili ubique crassitie.
306. *Fissum* Fodium, divisum sinubus (745) linearibus, marginibus rectis. bi-tri. quinque multifidum. (83)
307. *Fistulosus* Caulis, interne tubulosus non fatus. (292)
308. *Flaccidus* Pedunculus, debilis, ut a proprio floris pondere dependeat.
309. *Flexuosus* Caulis, a Gemma (344) ad Gemmam horsum versus actus.
310. *Flexuosus* Pedunculus, a flore ad florem flexus. *Aira flexuosa.*
311. *Florale* Folium, Flori proximum: differt numero & figura.
312. *Floralis* Gemma (344) flores non folia continens.
313. *Florescentia* est Generatio, sistens Plantarum sponsalia in flore, & Nuptias in Anthesi (43)

XXII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO.

314. *Floris*. Perianthium s. Calyx, Stamina continet absque Germine.
315. *Floris* Receptaculum, basis, ubi floris partes absque Germine adfiguntur.
316. *Flos*, Constat Galyce, Corolla (193) Stamine (771) & Pistillo (398) antecedit omnem fructum, ut Generatio Partum.
317. *Folia*, Organa motus Plantae (600) considerantur secundum a) Simplicitatem, (734) b.) Compositionem, (160) c) Determinationem, (296) & Durationem (277).
318. *Foliacea* Spica (759) foliis interstincta.
319. *Foliaris* Cirrus, (142) folio insidens.
320. *Foliaris*. Gemma (344) Folia continens, non flores.
321. *Foliatio*, Vernatio. (891)
322. *Foliatus* Caulis, foliis instructus.
323. *Foliolum*, partiale est Folii compositi. (160)
324. *Foliosum* Capitulum, (118) foliis intermixtis floribus.
325. *Folium* (325) expandens per aëra superficiem: attrahit præparatque humores, volatile, a casu nunquam renasciturum.
326. *Folliculus*, (169) Pericarpium, (573) membranaceum univalve, altero latere longitudinaliter dehiscens, proprio Receptaculo (nec futurae) Semina adfigens. *Asclepias*.
327. *Fornicata* Corolla, dicitur si labium superius Ringentis (693) fornicis in modum arcuatum. *Galeopsis. Lamium*.
328. *Frondescentia*, est Tempus aestatis, quo species singulae plantarum prima folia explicant.
329. *Frons*, ex Stipite (777) in folium transeunte facta, fructificationes in aversa folii parte, gerens. *Filices*.
330. *Fruentescentia*, comprehendit tempus, quo Semina matura dispergunt Plantae.

331. *Fructificatio*, Vegetabilium pars temporaria, generationi dicata, estque simplex (735) vel composita (157)
332. *Fructificationis* partes, septem numerantur : 1) Calyx (113) s. Perianth. 2) Corolla (193) 3) Stamen (771) 4) Pistillum, (598) 5) Pericarpium (573) 6) Semen (712) & 7) Receptaculum, (661)
333. *Fructificationis* Calyx s. Perianth. Germen (351.) Staminaque includens.
- 334 *Fructifications* Receptaculum, (661) pro flore & fructu commune.
335. *Fructus* Perianthium, (572) s. Calyx, Germen absque Staminibus (771) continens.
336. *Frutex*, Caudex perennis supra terram adscendens absque Gemmis (344)
337. *Fruticosus* (336) Caulis, perennis, cum caudicibus pluribus.
338. *Fulcra*, adminicula Plantae (600) pro commodiore sustentatione. Septem numerantur species : 1) Stipulae (781) 2) Bractea (99) 3) Pubes (628) 4) Glandula (356) 5) Spina (761) 6) Aculeus (11) 7) Cirrhus. (142)
339. *Fulcrati* Rami fulcris instruti.
340. *Furcatae* Setae (726) Ramosae s. subdivise quasi in ramulos. *Leontodon hispid.* *Arabis* *thal.*
341. *Furcae*, aculei (11) ramosi s. triplices. *Berberis*, *Ribes*. *uvacr.*
342. *Fusiformis* Radix, (648) Simpliciuscula, oblonga, crassa, versus basin sensim attenuata. *Daucus.*

G.

343. *Galea*, Corollae ringentis (699) labium superius.
344. *Gemma*, Hybernaculum (387) Plantae, (600) ex rudimentis foliorum futurorum.

XXIV NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

345. *Gemmatio*, est Gemmae (344) constructio, ex Foliis, Stipulis (781) Petiolis (585) aut Squamis.
346. *Gemmina Folia*, Trina, quaterna, &c. duo, tria, quadraria &c. ex eodem punto prodeuntia.
347. *Geniculata Arista* (54) articulazione instructa. *Agrost. canina*.
348. *Geniculatus Culmus*, geniculis (349) interceptus
349. *Genicula Nodi*, in culmo (203) Articulis (61) interjecti.
350. *Genitalia Plantarum*, Organa sexualia, Stamina (-71) & Pistilla (598. 301. 471)
351. *Germen*, Rudimentum Fructus immatuti in flore; estque inferum (407) vel superum (812)
352. *Germinatio* est Tempus quo Semina Terrae mandata, eadem excludunt; in Cotyledonum (199) proventum.
353. *Gibbum Folium*, utrabue superficie (811) convexa, (185) mediante copiosiori pulpa.
354. *Glaber Caulis*, superficie laevi & lubrica.
355. *Glabrum Folium*, Disco (257) laevi & lubrico, absque omni inegalitate.
356. *Glandula*, Papilla humorem excernens, estque sessilis vel stipitata.
357. *Glandulatio*, Vasa secretoria offert, Glandulae (356) & Utriculi (879)
358. *Glandulosum Folium*, quod Glandulas (356) insidentes gerit. vel in dorso, vel in ferraturis. *Salix*.
359. *Globosa Corolla*, Sphaerica, Globum refrens. Vaccin. *Myrsillus*. *R. Convallar*.
360. *Globosa Radix*, subrotunda, carnosa, radiculis lateralibus. *Bunium*.
361. *Globosum Capitulum* (118) ab omni parte rotundatum. *Echineps*.
362. *Glochides*, mucrones apice retrorsum multi-dentati.

363.

363. *Glomerata* Spica (759) Spicillis (760) varie congesta.
364. *Gluma*, Calyx (143) Graminis, valvis amplexantibus.
365. *Glutinositas*, est qualitas humoris lubrici.
366. *Glutinosum* Fodium, humore lubrico (365) illitum.
367. *Gradus* foliorum, in Compositis (160) considerant subdivisionem Petoli communis (154) in Compositis (160) Decompositis (218) & Supradecompositis (814).
368. *Graminea* Folia, linearia (458) sensim versus apicem angustata. Constant folio, vagina (880) & ligula (453).
369. *Granulata* Radix, particulis sphaericis carnosis adspersa. *Saxifraga*.
370. *Gymnosperma* Planta, Semina nuda, nec Pericarpio (573) tecta. Gymno monodi-tri-tetrasperma. *Didynamia Gymnosp.*

H.

371. *Habitationes* Plantarum, ex loco ubi sponte prognascuntur, respiciunt solum s. Telluris naturam.
372. *Habitus*, est conformitas Vegetabilium, affinum & congenerum, in Placentatione, Foliacione &c.
373. *Hani*, mucrones acuminati, curvati, quibus quasdam Plantarum partes adhaerent animalibus praeterereuntibus. *Artium*.
374. *Hastatum* Folium, Sagittatum (700) angulis posticis acutis sinu divisum, ad latera prominentibus, patulis. *Rumex acetosella*.
375. *Herba* est, cuius caulis singulis annis perit: estque a) annua, b) bieta s. biennis seu c) semipervirens. Constat Hybernaculo (387) Trunco, (850) Folio, (329) & Fulcro. (938)

XXVI NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

376. *Herbarium*, Collectio Plantarum intra chartas fccatarum asservatarumque , omni Botanico necessarium.
377. *Herbaceus Caulis*, etiamnum annuus, non lignosus.
378. *Hermapbrodita* Planta, quae flores tantum Hermaproditos [381] gerit.
379. *Hermapbrodita* [polygamiae] Flos, quorum antherae non dehiscunt, sed decidunt, & Pistillum mox in fructum, ab antheris alterius floris [380] foecundatum , excrescit. A parte masculina sterilis dicitur. *Acer*.
380. *Hermapbroditus* [Polyganiac] Flos, quorum antherae pollen pluunt, Pistilla vero ob labem Stigmatis non accrescunt , sed decidunt, a parte feminea sterilis dicitur. *Acer*.
381. *Hermapbroditus* Flos , Pistillo [598] Stigmate 775] & Antheris [41] instructus.
382. *Heteromalla* Panicula, Secunda. [710]
383. *Hilum*, cicatrix externa Seminis , ab ejusdem adfixione in fructu.
384. *Hispidum* Folium , setis rigidis adspersum.
385. *Horizontale* Folium , quod ad Angulum retum (12. in not.) a Caule discedit.
386. *Horizontalis* Radix, quae sub terra transversim extenditur. *Iris*.
387. *Hybernaculum*, Compendium Herbae [375] totius , squamosum. Estque Bulbus [106] vel Gemma. [344]
388. *Hybrida* Planta. Polygama. [610]
389. *Hypocrateriformis* Corolla. Limbus Limbus [456] planus tubo [857] impositus.

I.

390. *Imbricans* Somnus , [752] foliolis imbricatis [391] complicatis.
391. *Imbricata* Folia , quando parallele superficie recta sibi invicem incumbunt , & se quo ad partem

TERMINORUM TECHNICORUM CET. XXVII

- tem tegunt. *Vernatio* (872) imbricata. *Syringa*,
Ligustrum. *Daphne*.
392. *Imbricatum* *Perianthium* [572] squamis va-
 riis imbricatum [391] superimpositis. *Hieracium*.
393. *Imbricatus* *Caulis*, squamis tectus, ut super-
 ficies non appareat.
394. *Inanis* *Caulis*, interne medulla Spongiosus.
395. *Inaequalia* Filamenta, [303] aliquot majori-
 bus vel minoribus. *Daphne*. *Didymum*.
396. *Inaequalis* Corolla, ubi partes non magnitu-
 dine, sed proportione respondent, ut Regularis
 flos evadat. *Butomus*.
397. *Incana* Folia, Tomengosa, [827] colore glau-
 co, s. fere argenteo.
398. *Incisum* Folium, Laciniatum. [438]
399. *Includens* Somnus, [752] cum folia alterna
 [27] noctu se cauli approximant.
400. *Incrassatus* Pedunculus, apice semsim majo-
 rem molem adquirens.
401. *Incubens* Anthera, s. *Versatilis*, quae latere
 filamento [303] adfigitur.
402. *Incurvati* Rami, introrsum nutantes.
403. *Incurvum* Folium [410].
404. *Incurvus* Aculeus, [11] introrsum flexus.
405. *Indivisum* Folium, integrum [416] Sinibus
 (745) destitutum.
406. *Inerme* Folium, Spinis [761] aculeis [11]
 & Stimulis [776] destitutum.
407. *Inferum* Germen [351] infra Corollam posi-
 tum.
408. *Inferus* Flos, s. Calyx, cui Germen [351]
 supra Receptaculum, [661] s. cuius Pistillum abit
 in fructum. Tourn.
409. *Inflatum* Perianthium, instar Vesicae cavum.
Cucub. *Beben*.
410. *Inflexum* Folium, s. *incurvum*, dum sursum
 arcuatur versus caulem.

XXVIII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

411. *Inflorescentia*, est modus, quo Flores Pedunculo Plantae adnectuntur: 1.) Verticillus [897] 2.) Capitulum [118] 3.) Spica, [759] 4.) Corymbus (198) 5.) Thyrus (846) 6.) Racemus (635) 7.) Panícula. (543)
412. *Infundibuliformis* Corolla, si limbus (456) conicus tubo (897) impositus.
413. *Insertio Foliorum*, respicit modum, quo folia Plantae adnectuntur. (584. 567. 721. 33. 144. 30. 171. 178. 882.)
414. *Insertus* Periolus, perpendiculariter ramo insidens.
415. *Integer Caulis*, simplicissimus (742) rami angustatis.
416. *Integrum* Folium, indivisum (405) omnique sinu (745) destitutum.
417. *Integerrimum* Folium, margine continuo nec minimum secto.
418. *Interfoliacei* Pedunculi, inter Folia opposita, sed alternatim collocati. *Aflepias*.
419. *Internodium* (65) quod inter artus vel Genacula (349) medium intercedit. Estque conve xum, concavum, vel planum.
420. *Interrupta* Spica (759) Spicis minoribus alternis distantibus.
421. *Interrupte Pinnatum* Folium, seu *Folioles rupestres*, Pinnatum (593) foliolis alternis minoribus.
422. *Intorsio v. Torsio*. (830)
423. *Intrafoliaceae* Stipulae (781) supra folium s. petiolum collocatae.
424. *Invertens* Somnus (751) foliolis demissis & simul inversis.
425. *Involucellum*, est partiale Involucrum (427) umbellulae (863) subjectum. (260)
426. *Involucratus* Verticillus (897) s. umbella (862) involucro (427) instructus. Oppositus Nudo.
427. *Involucrum*, Calyx (113) umbellae (862) a flore remotus. Este mono. di - tri - penta - polyphyllum, vel nullum.

4:8.

428. *Involuta* Vernatio, (891) Folia, quorum
margines laterales utrinque introsum spiraliter
involvuntur. *Pyrus. Malus. Populus.*
429. *Involvens* Somnus (752) quando foliola ere-
cta apice connivent, & cavitatem inter se for-
mant.
430. *Irregularis* Corolla. (Difformis, Anomala.)
Limbi (456) partibus, figura, magnitudine,
& proportione diversis. *Aconitum.*
431. *Isthmis interceptum* Legumen (452) interne
transversim in varia loculamenta (463) divisum.

L.

432. *Labiata* Corolla, Ringens (693) bilabiata.
Labium super. & inferius.
433. *Labium* f. Barba (76) Corollae, pro ringen-
tis (693) labio inferiore saepe sumitur.
434. *Lacera* Corolla, cuius limbus (456) tenuissi-
me dissectus est.
435. *Laceram* Folium, margine varie divisum: Seg-
mentis difformibus.
436. *Laciniae* Calycis f. Perianthii, numerantur
praesertim in monophyllo. (486)
437. *Laciniae* Corollae, numerus in Monopetala
(486) a medio limbi (456) in Polypetala (611)
laminae (443) desumitur.
438. *Laciniatum* Folium, varie & indeterminate
in partes sectum.
439. *Lactescencia* est copia Liquoris, qui effluit lae-
sa planta, estque alba (*Euphorbia*) lutea (*Cheli-
don.*) vel rubra. (*Rumex Sangu.*)
440. *Lacunosum* Folium, Disco (257) depresso
(235) inter venas interjectas. *Lich. pulmon.*
441. *Laevis* Caulis, folium, superficie aequali.
442. *Lamellae*, membranae transversae fructifican-
tes, Pileo (586) Fungorum subtus adnatae.
443. *Lamina*, Corollae Polypetalae (611) pars
superior patula.

XXX NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

444. *Lana* Species Pubis, (628) Pili (591) curvi denſi, ſervat plantam ab aēſtu nimio. *Stachis german.*
445. *Lanatum* Folium, pilis incurvatis imbricatis, quasi rela araneae indutum. *Salvia.*
446. *Lanceolato* - ovatum Folium, Lanceolatum (447) ad ovatam (533) figuram ſubacedens.
447. *Lanceolatum* Folium, oblongum (586) ab utraque Extremitate attenuatum.
448. *Laterales* Stipulae, (781) Lateribus Petioli ſeu foliorum inserti.
449. *Laterifolii* Pedunculi, ad latus baseos folii inserti. *Solanum.*
450. *Laxa* Panicula (543) Pedicelli debiles, libere & laxe ſine ordine Sparſi.
451. *Laxi* Rami, libere in arcum flexiles.
452. *Legumen*, Pericarpium (573) membranaceum bivalve, adfigens ſemina ſecundum futuram alteram tantum, eſtque 1) uni - 2) biloculare 3) vel Isthmis interceptum. (431) 1) *Vicia. Pisum.* 2) *Astragalus.*
453. *Ligula*, membrana tenuis Oris foliorum, in graminibus, eſtque truncata, lanceolata. bifida. fifta &c.
454. *Ligulata* Corolla, simplex, tubo brevi, limbo (456) plano extrorſum vero, apice acuto, vel truncato triſ. quinquedentato.
455. *Ligulatus* Flos, compositus (162) Corollulis floſculorum omnibus planis imbricatis versus exterius latus expansis. (454)
456. *Limbus* Corollae monopetalae (485) pars ſuperior dilatata.
457. *Linea* Linearis mensura, eſt Lunulae longitudo, ab unguis radice versus unguem extensa. (non vero in Pollice.) *Linea una.*
458. *Lineare* Folium, aequali ubique latitudine, interdum utraque extremitate auguſtatur.

TERMINORUM TECHNICORUM CET. XXXI

459. *Lineari-lanceolatum* Folium, Lineac (457) ad lanceolatam (447) figuram accedens.
460. *Lineatum* Folium, nervis depressis excavatum.
Euphrasia.
461. *Lingulatum* L. *Linguiforme* Folium, lineare (458) Carnosum (122) subtrus convexum. (185)
462. *Lobatum* Folium, usque ad medium in partes stistantes divisum, unde biloba - triloba - &c. a numero Loborum.
463. *Loculamentum* Capsulae (119) Concameratio lava, pro seminum loco.
464. *Loculare* (88) Peticarpium, uni - bi - tri - quadri - quinque &c. loculare, a numero loculamentorum.
465. *Locus*, in Determinatione (236) Folii, respicit partem plantae, qua folia adnectuntur. (716. 640 129. 73. 311)
466. *Longus* Petiolus, longitudinem folii superans.
467. *Longissimus* Petiolus, aliquoties folii longitudinem superans.
468. *Lucidum* Folium, quasi illuminatum.
469. *Lunatum*, *Lunulatum* Folium, subrotundum (805) basi sinu excavatum, angulis posticis acutis.
470. *Lyratum* Folium, transversim divisum in lacinias (438) quarum inferiores minores remotoresve, terminalis maxima.

M.

471. *Maculatum* Folium, Colorati (148) Species, Albo maculata, (*Trifol. repens*) nigro - maculata, (*Aram Orchides*) rubro-maculatae. (*Ranunc. acris.*)
472. *Marcescens* Corolla, contabescens, nec decidens. *Campánula. Orchis.*
473. *Margo*, est extrema ora folii ad latera, intacto disco Folii. (763. 720. 677. 232. 200. 123. 135. 290. 435. 416)

XXXII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

474. *Mas* Planta, quae flores tantum masculos (476) profert.
475. *Masculina* Genitalia (350) sunt Antherae (41) Polline (607) repleteae.
476. *Masculus* Flos, Si stamina (771) sine Stigmitibus (775) continet.
477. *Mediocris* Petiolus, longitudine folii.
478. *Membranaceum* Folium, quod inter utramque superficiem nulla evidenti pulpa scatet.
479. *Membranatus* Caulis, Complanatus more folii.
480. *Mensura*, qua in Dimensione partium Plantae utimur: Capillus (117) Linea (457) Unguis Pollex (608) Palmus (541) Dodrans (269) Spithama (767) Pes (579) Cubitus (203) Brachium (98) Orgya (528).
481. *Monoclinia*, Flores omnes Hermaphroditi (381) s. Stamina (771) cum Pistillis (598) in eodem flore. Comprehendit Classes Plantarum a Monandria usque ad Polyadelphiam, inclusive.
482. *Monocotyledones*, unico Cotyledone (715) germinantes. Fruges. s. *Palmae*. *Graminae*. *Lilia*.
483. *Monogymnia*, *Digynia*, *Trigynia* &c. id est Pistillo unico, duobus, tribus, &c. instructi flores. Numerus desumitur a basi Styli (796) si Stylus autem deficiat, (*Myriophyllum*) a numero Stigmatum calculus fit.
484. *Monoica* Planta, (*Androgyna*) quae flores masculos (476) & femineos (300) distinctos in eademi planta gerit. *Monoecia*.
485. *Monopetala* Corolla, s. Petalo unico constans. Stamnibus (771) Semper Petalo insertis, exceptis Bicornibus. (80)
486. *Monophyllus* Calyx s. Perianth. unico foliolo absolutum, quoties monopetala (485) Corolla est, unde di - tri - tetra - penta - hexaphyllus, &c. a numero foliorum.
487. *Monoherma*, di - tri - tetra - penta - hexa polysperma capsula, a numero seminum quae includit.

488.

TERMINORUM TECHNICORUM CET. XXXIII

488. *Monostachius* Culmus, unicam Spicam gerens,
Lolium.
489. *Mucronatum* Folium, terminatum mucrone
existante.
490. *Multiflora* Gluma, (364) plures flores in-
cludens.
491. *Multivalvis* Gluma. (364) pluribus quam
duabus Squamis constans.
492. *Muniens* Somnus, (752) dum Folia (an-
tea horizontaliter patentibus petiolis) circum-
circa dependent, & quasi forniciem formant.
493. *Muricatus* Caulis, punctis subulatis mollibus
adspersus.
494. *Mutica* Gluma, (364) Mucrone & Arista de-
stituta.

N.

495. *Natans* Folium, superficie aquae incumbens,
& innatans. *Potamogeton*.
496. *Nectarium*, Pars mellifera flori propria, est
que proprium (625) vel Petalinum. (580)
497. *Nervosum* Folium, venis simplicissimis emi-
nentibus a basi ad apicem extensus.
498. *Neuter* Flos, qui neque Stamina (771) ne-
que Stylum (796) vel Stigma habet. *Coreopsis*.
Rudbeckia. (Radius)
499. *Nidulantia* Semina, per pulpam absque or-
dine Sparsa, in Baccis. (75)
500. *Nitidum* Folium, Glabritie lucente.
501. *Nodi* . . *Nodosus*, (349)
502. *Nucleus*, Pars edulis Fructuum, in ossea
Capsula, Nuce (511) recondita
503. *Nudum* Capitulum, (118) foliis & setis de-
stitutum.
504. *Nudum* Folium, Setis & Pilis (591) desti-
tutum.

XXXIV NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

- § 505. *Nudum Receptaculum*, (661) superficie nec villis nec paleis (536) tectum.
- § 506. *Nudus Caulis*, Foliis destitutus. *Cuscuta*. Op-
positus Foliato (322.) & imbricato. (393)
- § 507. *Nudus Flos*, caret Calyce, non Corolla.
- § 508. *Nudus Verticillus*, (897) nec bracteis (99)
nec Involucro (427) instructus.
- § 509. *Nutans Caulis*, apice extrorsum reflexus.
- § 510. *Nutans Flos*, non proprio Pondere, sed pe-
culiari structura Pedunculi, extrorsum reflexus.
Carduus Nutans.
- § 511. *Nux*, semen rectum epidermate ossa; uni
bilocularis. *Nucleum* (502) condens.

O.

- § 512. *Ocordatum*, Obverse cordatum. (521) (192)
- § 513. *Obliqua Calyptra*, (112) ad aliquod Latus flexa.
- § 514. *Obliquum Folium*, basi coelum, apice hori-
zontem spectans.
- § 515. *Obliquus Caulis*, a perpendiculari aut hori-
zontali Linea discedens.
- § 516. *Oblongum Folium*, Diametro (*) longitudinali
aliquoties superante transversalem.
- § 517. *Obovatum Folium*, obverse Ovatum. (533)
(521)
- § 518. *Obtuse Crenatum Folium* (200)
- § 519. *Obtusum Folium*, intra segmentum (**) circuli terminatum.
- § 520. *Obtusum acumine*, Obtusum (519) nervo
medio apice prominulo.
- § 521. *Obversa Folia*, quorum basis angustior evadit
regione Apicis. Unde *Obverse Cordata* s. *Ocorda-*
ta (512) *Obverse Ovata* s. *Obovata*. (517.)

522.

(*) Linea, quae ab uno extremis puncto ad aliud in cir-
culi ambitu, per centrum vadit, *Diametrum* dicitur. *Geometr.*

(**) Si circulum & ejus chordas duco pars ejus tenui uno
& chorda comprehensa, sub *Segmenti* nomine venit. *Geometr.*

TERMINORUM TECHNICORUM CETER. XXXV

- §22. *Obvoluta Foliatio*, (891) cum margines alterni comprehendunt oppositi folii marginem rectum. *Lycnis. Saponaria. Scabiosa.*
- §23. *Operculum* (Muscis) *Membrana Antherae* (41) Orificio supra ciliis claudens, calyptre (112) tota aut semitecta. Varias assumit figuras: obtusum, conicum, subulatum, arcuatum, rectum & obliquum.
- §24. *Opposita Folia*, duo per paria decussatim e regione collocata.
- §25. *Opposite-pinnatum Folium*, *Pinnatum* (193) foliolis oppositis. (§24)
- §26. *Oppositi-foliae Stipulae*, (781) in latere folii opposito collocatae.
- §27. *Orbiculatum Folium*, *Peripheria*^(*) circinata, (Diameter (§16) longitudinalis aequalis transversali.)
- §28. *Orgya*, *Orgyalis Mensura*, hexapoda s. humana altitudo, est Mensura inter manus expansas.
Pedes Sex.
- §29. *Ovale Folium*, ex orbiculato (§27) oblongum, (§16) utraque extremitate rotundata aequaliter.
- §30. *Ovato-lanceolatum Folium*, *Ovatum* (§33) ad lanceolatam (447) figuram accedens.
- §31. *Ovato-oblongum Folium*, *Ovatum* (§33) ad oblongam (§16) figuram accedens.
- §32. *Ovato-rhombum Folium*, ovatum (§33) simulque rhomboideum. (694)
- §33. *Ovatum Folium*, cuius diameter longitudinalis superat transversalem, basi segmento circuli circumscripta, apice angustiore.
- P.
- §34. *Pagina* dicitur folii superficies (§11) utraque, unde pagina superior & inferior.

e 2

§§§:

(*) Linea illa in se rediens, quae circulum constituit, quod niam radio in orbem circa se eunte describitur, *peripheria* appellari solet,

XXXVI NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

- §35. *Palatum* Corollae, Gibbositas prominens in Fauce (298) Corollae. *Antirrhinum.*
- §36. *Paleae*, Lamellae Receptaculo (661) innatae fiosculos & tandem semina distinguens, in floribus Compositis (162) *Anthemis*. *Bidens*. *Hypochaeris*.
- §37. *Paleaceum* Receptaculum. Paleis (§36) instru-
ctum.
- §38. *Paleaceus* Pappus, (548.) membrana inaequa-
lis tenuis apici seminis adfixa.
- §39. *Palmata* Radix, Carnosa, lobata. *Orchis*.
- §40. *Palmatum* Folium, divisum ultra medium in Lobos subaequales basi cohaerentes.
- §41. *Palmus*, *Palmaris* Mensura, Diameter qua-
tuor digitorum transversorum parallelorum, demto Pollice. *Unciae tres*.
- §42. *Panduræforme* Folium, Oblongum (§16) in-
ferne latius, lateribus coarctatum.
- §43. *Panicula*, Flores sparsi (755) in pedunculis diverse divisæ & subdivisiæ. Estque aequalis, vel secunda. (710)
- §44. *Paniculatus* Caulis, ramis varie subdivisiæ, flo-
ribus numerosis. *Eriger. canadense*.
- §45. *Papilionacea* Corella, Irregularis (430) Pe-
talo inferiore cymbiformi, (Carina (120) supe-
riore adscendente, (Vexillum (898) lateralibus solitariis. (Alae (23))
- §46. *Papillosum* Folium, tectum punctis carno-
sis.
- §47. *Papposum* Semen, Pappo tenuissimo inaequali-
mstructum. *Populus Salix*.
- §48. *Pappus*, Corona (195) seminis pennacea pi-
losave, volitans. Estque simplex vel compo-
situs.
- §49. *Papulosum* Folium, quod tegitur punctis ve-
sicularibus.

550.

- § 50. *Parabolicum* Folium , cuius diameter longitudinalis superat transversalem , versus apicem sensim angustius rotundatum.
- § 51. *Parallelum* Dissepimentum. (887)
- § 52. *Parasiticus* Caulis , alteri Plantae nec terrae innatus. *Viscum*.
- § 53. *Partiale* , Involucrum , Involucellum. (425)
- § 54. *Parallelepipedo* (*) Anthera (41) idem ac quadrangularis. *Polytrichum*.
- § 55. *Partialis* Pedunculus , aliquot flores pedunculi communis (154) proferens.
- § 56. *Partialis* Umbella (862) Umbellula. (863)
- § 57. *Partitum* Folium , ad basin fere divisum, unde bi - tri - multipartitum , (91) a numero partium,
- § 58. *Patens* Folium , ad angulum acutum (12 . in not.) cauli insidens.
- § 59. *Patula* Panicula , (543) Pedunculis pedicellisque undique dispersis , floribus remotis. Opposit. *Coarctatae*. (146)
- § 60. *Pedatum* Folium , Petiolo bifido , latere tantum inferiore adnecente foliola plura. *Helleborus*.
- § 61. *Pedicellus* , Pedunculus (564) partialis (555) seu proprius floribus in Pedunculo communi , (154)
- § 62. *Peduncularis* Cirrus , (142) pedunculo insidens.
- § 63. *Pedunculatus* Verticillus , (897) pedunculis flores elevantibus.
- § 64. *Pedunculus* , Fulcrum (338) sustinens Fructificationem (331) nec folia.
- § 65. *Pedunculus* (Muscis) Seta (725) plerumque Colorata , antheram (41) superne sustinens , basi tuberculata (852) nuda (*Bryum*) vel Perichaetio (574) vestita (*Hypnum* .)

(*) *Parallelepipedum* dicunt oriri , parallelogramino ad perpendiculum , in motu parallelo , demissu . *Geometr.*

XXXVIII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

- §66. *Pelta* (Lichepibus) Fructificatio plana s. revoluta, margini vel apici folii verticaliter adglutinata. *Lich. Canin. Apbrof. &c.*
- §67. *Peltatum* Folium. Petiolo Disco Folii non basi inserto.
- §68. *Pennatus* Surculus (819) in Muscis, quum Folia ad rachis utrinque latus annexa, alternata vel opposita sunt.
- §69. *Perenne* Folium, per aliquot annos virens.
- §70. *Perennis* Radix, per plurimos annos regenerans.
- §71. *Perfoliatum* Folium, basi transversim cingente, (nec antice dehiscente) Caulem. *Bupleurum.*
- §72. *Perianthium* Calyx (113) Fructificationi contiguus.
- §73. *Pericarpium* Viscus Plantae, gravidum seminibus, quae matura demittit. Capsula, (119) Siliqua, (729) Legumen, (452) Folliculus (326) Drupa (273) Pomum (684) Bacca (75) Strobilus. (795)
- §74. *Perichaetium* (Muscis) Congregatio foliorum angustorum, tuberculum (852) setarum (726) cingentium.
- §75. *Perpendicularis* Radix, quae recta descendit.
- §76. *Persistens* Corolla, Perianth. ad maturitatem Fructus. *Nymphaea.*
- §77. *Persistens* Folium, peracta aestate, non casuum.
- §78. *Personata* Corolla, Ringens (693) sed inter labia (433) Palato (535) Claufa.
- §79. *Pes*, *Pedalis* Mensura, mensuratur a flexura Cubiti, ad basin Pollicis. *Unciae duodecim.*
- §80. *Petalinum* Nectarium (496) Petalis insertum. Porus (*Ranunculus*) Rima, *Hydrophyllum.*
- §81. *Petalum* Corollae, Pars Corollae in plures divisae.

§82.

TERMINORUM TECHNICORUM CET. XXXIX

582. *Petiolaris* Cirrus, (142) Petiolo inserrus.
583. *Petiolaris* Gemma, (344) o foliorum rudimentis confecta.
584. *Petiolum* Folium, Petiolo ad basin inserto. Sessili (721) oppositum.
585. *Petiolus*, Fulcrum (338) sustinens Folium, nec Fructificationem.
586. *Pileus* (Fungi) Orbiculus horizontaliter expansus, subruss fructificationes in lamellis (442) gerens.
587. *Piliferum* Folium, apice in pilum desinens. *Bryum.*
588. *Pilosum* Folium, quum Pili distincti elongati tegunt superficiem.
589. *Pilosum* Receptaculum, pilis erectis rectum.
590. *Pilosus* Caulis, Pilis distinctis elongatis testus.
591. *Pilus*, Ductus excretorius Plantae setaceus: Species Pubis. (628)
592. *Pinnatifidum* Folium, transversim divisum in lacinias horizontales oblongas. *Bipinnatifidum* quum bis laciiniis lateralibus divisum.
593. *Pinnatum* Folium, Petiolo simplici lateribus adnectente Foliola plura.
- Abrupte.* (3) *Alternatim* (28) *Articulate* (60)
Cirriforme (141) *Decursive* (223) *Duplicato.* (274) *Interrupte* (421) *Opposite* (525)
Triplacato. (843) *pinnatum.*
594. *Pinnatum cum impari*, Folium, *Pinnatum* (593) foliolo unico (impari) terminatum.
595. *Pinnatum sine impari*, Folium (3)
596. *Pinnatus* furculus (815) oppositos alternatosve admittit Ramos.
597. *Pinnae* vocantur Foliola conjugata. *Pinnae pinnatae* quando foliola conjugata profundis incisuris minores *Pinnulas* repraesentant.

XL NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

598. *Pistillum* Organum genitale femineum, constat Germine (351) Stylo (796) & Stigmate. (775)
599. *Placentatio*, est Cotyledonum (199) Dispositio sub ipsa seminis Germinatione. Mono- (483) Di- (241) Acotyledones. (8)
600. *Plantae* dicuntur Dicotyledones (241) Herbae (375) & Arbores.
601. *Planum* Folium, superficie ubique aequali.
602. *Plicata* Vernatio, (891) in plicas varias coarctata longitudinaliter. *Betula*. *Crataegus*. &c.
603. *Plicatum* Folium, Disco (257) plicis acutis alternatim flexo, angulis dependentibus, & ascendenteribus. *Alchemilla*.
604. *Plumosae* Setae (726) villosae, compositae.
605. *Plumosus* Pappus. (548) pilis pennatis constans.
606. *Plumula*, Pars Corculi (188) squamosa ascendens.
607. *Pollen* Pulvis Floris anthera (41) inclusa, humore rampendus, atomosque elasticos ejaculans. (Genitura Plantarum.)
608. *Pollex*, Pollicaris mensura, est longitudo aut Diameter extimi Articuli Pollicis, *Uncia una*.
609. *Polyanthos* Caulis, qui plures quam unum sustinet florem.
610. *Polygama* Planta, (Hybrida) quae flores hermaphroditos necessario, dein alios flores alterius sexus, femineos vel masculos, in eadem specie profert.
611. *Polypetala* Corolla, Petalis pluribus. Numerus ab ordinibus Insertionum determinatur. *Anemone*. *Hepatica*.
612. *Polyphyllum* Perianthium. Foliolis pluribus constans
613. *Polystachius* Culmus, plures quam unam Spicam gerens.

614.

614. *Pomum* Pericarpium (573) farctum evalve, capsulam (119) continens.
615. *Praemorsa* Radix, deorsum truncata, Radiculas (645) laterales emittens. *Sc. Succisa. Plantago.*
- 616 *Praemorsum* Folium, Obtusissimum, terminatum incisuris inaequalibus.
617. *Prismaticum* (*) Pericarpium, lineare polyedrum, lateribus planis.
618. *Procumbens* Caulis, debilis horizontaliter terrae innitens.
619. *Prolifera* Umbella, (862)
620. *Prolifer* Flos, cum ex uno Flore alias enscitetur. *Scabiosa. Geum rivale. Bellis hortens.*
621. *Prolifer* Caulis, ex apricis centro emittens tantum ramos. *Pinus.*
622. *Propagines*, Muscorum semina nuda s. Tunica coryledonibusque destituta.
623. *Proprium* Involucrum, cui liber Flori subiectum.
624. *Proprium* Perianthium, quemlibet florem respiciens.
625. *Proprium* Nectarium, a petalis & ceteris partibus distinctum. *Aconitum.*
626. *Proprium* Receptaculum, quod partes unius tantum Fructificationis respicit.
627. *Prostratus* Caulis, basi decumbente erectus.
628. *Pubes*, Hirsuties omnis in Planta, Pili (591)
Lana (444) Barba (77) Tomentum (828)
Strigae (793) Setae (726) Hami (373) Glan-
dulae (356) Viscositas (905) Glutinositas. (365)
629. *Pubescens* Folium, Caulis, rectum pilis (591)
raris brevibus sibi incumbentibus.
630. *Putposum* Folium, materia tenaci farctum.
631. *Punctatum* Folium, punctis excavatis adspersum.

(*) Prima effici, ajunt, cum figura rectilinea ad rectam descendat. motu parallelo. *Geometr.*

XLII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

632. *Pungens* Folium Aculeis (11) s. Spinis (761)
Armatum.

Q.

633. *Quinatum* Folium, Digitatum (247) foliolis
quinis.

634. *Quinquangulare* Folium, angulis quinis pro-
minentibus. Spec. Angulati. (34)

R.

635. *Racemus*. Pedunculo communi, pedicellis-
que lateralibus, instructo. *Ribes*.

636. *Racbis*, Receptaculum filiforme flosculos lon-
gitudinaliter adnectens, in Spicam. (759)

637. *Racbis* s. *Costa*, Productio Petiali f. Nervus
intermedius, foliorum medium longitudinaliter
percurrens.

638. *Radiatus* Flos. Corollulis Disci (256) Tubu-
latis (854) Ambitus (527) vero Ligulatis (454)
difformibus, compositus. (162)

639. *Radiata* Umbella (861) petalis florum mar-
ginalium, reliquis majoribus *Tordyl. Caucalis*.

640. *Radicale* Folium, quod ex radice immediate
exit.

641. *Radicans* Caulis, aliis se adfigens Radiculis
lateralibus. *Hedera. Cuscuta*.

642. *Radicans* Folium, si radices agat. unde.

643. *Radicata* Folia, quae radiculas demittunt ex
substantia ipsius folii.

644. *Radicatio*, est Radicis dispositio Caudice ad-
scendente (127) Descendente (648) & Radicu-
culis (645)

645. *Radicula*, Pars Radicis (648) fibrosa,

646.

646. *Radius*, Floris Compositi (638) ambitus ex Corollulis ligulatis. (454)
647. *Radii* (*) dicuntur etiam Pedunculi Umbellae (862) & Setae rigidiores Pappi. (548)
- 648 *Radix* Organum nutrienda Plantam (600) Constat Caudice descendente & Radiculis. (645)
649. *Rameum* Folium , quod Ramo (non Cauli) insidet.
650. *Rami* Partes caulis. Situs notetur.
651. *Ramificatio*, manifestatur in situ Ramorum, quæ folia sequuntur. (147. 268. 266. 263. 896. 225. 669. 683. &c.)
652. *Ramosa* Radix, in fibras (645) subdivisa.
653. *Ramosa Spica* (759) varie in Spicas partiales divisa.
654. *Ramosa Spina* (761) divisa, apice partita.
655. *Ramosae Setae* , (726) s. *Furcatæ*, subdivise quasi in Ramulos. *Leontodon hispid. Arabis baliana.*
656. *Ramosum* Folium, Pedatum. (560)
657. *Ramosus Aculeus* , (11) *Furcæ*. (341)
658. *Ramosus* Caulis, Ramis lateralibus pluribus instructus.
659. *Ramosus Pappus* , (548) Radiis (647.b.) subdivisis. *Carlina.*
660. *Romofissimus* Caulis, Ramis numerosis absque ordine cumulatis.
661. *Receptaculum*, Basis qua partes Fructificationis (331) connectuntur. Estque Commune (152) vel Proprium. (626)
662. *Reclinatum* Folium, deorsum versus perimum flexum, ut arcus sit basi inferior , apice ascendente.
663. *Reclinatus* Caulis, arcuatim versus terram. *Ficus.*
664. *Recta* Arista , perpendiculariter exiens. *Agrestis. Spica Ventri.*

665

(*) Lineæ pares , quæ ex medio puncto , quod *Centrum* dicunt, ad puncta peripheriae ducuntur , *radii* appellantur. *Geometr.*

XLIV NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

665. *Recta Calyptra*, (112) undique aequalis.
666. *Rectus aculeus*, flexuris destitutus.
667. *Recurvatum Folium*, deorsum, ut Convexitas Arcus superiora spectet.
668 *Recurvi Aculei*, (11) extrorsum reflexi.
Rosa.
669. *Reflexi Rami*, (650) perpendiculariter dependentes.
670. *Reflexum Folium*, deorsum curvatum, ut apex basi inferior evadat.
671. *Reflexum Perianthium*, partibus retrorsum flexis.
672. *Regularis Corolla*, aequalis, (17) figura, magnitudine & proportione partium.
673. *Remota Corolla*, a Calyce interjecto Germino, (351) *Sangisorba. Poterium.*
674. *Remota Folia*, Spatio e se invicem distantia.
675. *Remota Volva*, (907) a Capitulo (118) Spatio recedens.
676. *Reniforme Folium*, subrotundum, (805) basi sinu excavatum, angulis posticis destitutum.
677. *Repandum Folium*, cuius margo angulis, eiusque interjectis sinubus circuli segmento inscriptis, terminatur.
678. *Repens Caulis*, Terrae imcumbens, radiculasque agens.
679. *Repens Radix*, longe sub terra excurrens, hinc inde germinans, & Radiculas demittens.
680. *Restantes Pedunculi*, post Casum fructificationis.
681. *Resupinata Corolla*, Tubo contorto, ut Labium superius Terram, inferius coelum spectet.
Viola. Scrophularia.
682. *Resupinatum Folium*, Pagina (534) superiore inferiore, & inferiore superiore facta.

TERMINORUM TECHNICORUM CET. XLV

683. *Retroflexi* Rami, horsum versus divaricati. (266)
684. *Retrofractus* Pedunculus, vi quasi ad dependentum redactus.
685. *Retrorsum* Sinuatum, Fol. Runcinat. (699)
686. *Retusum* Folium, quod terminatur sinu obtuso.
687. *Revoluta* Vernatio, (891) lateribus versus Paginam inferiorem utrinque spiraliter contortis.
Primula Tussilago.
688. *Revolutum* Folium, quod deorsum in Spiram revolvitur.
689. *Revolutus* Cirrus, Spira dimidio itinere retorta. *Bryonia. Leguminosae.*
690. *Rictus* Corollae, hiatus inter duo Labia Corollae Ringentis. (693)
691. *Rigidus* Caulis, flexurae impatiens.
692. *Rimosus* Caulis, Cortice exteriore fissuras sponte agens *Acer.*
693. *Ringens* Corolla, Limbo (456) irregulari in duo Labia hians. (343. 433.)
694. *Rhombeum* Folium, Figura Rhombi. (*)
695. *Rostellum.* Pars Coruli (188) in semine, simplex descendens.
696. *Potata* Corolla, Monopetalae, Limbus (456) planus, partitus, nullo tubo. (857) impositus.
697. *Rotundum* Folium, s. *Rotundatum*, angulis orbum.
698. *Rugosum* Folium, Rugis confertum. *Salvia.*
699. *Runcinatum* Folium, (685) Pinnatifidum, (592) ita ut lobi antice convexi, portice transversi sint. *Leontod. Taraxac.*

S.

700. *Sagittatum* Folium, Triangulare (834) basi sinu excavatum, angulis posticis acutis.

701.

(*) Cujus figurae quadratae latera aequalia quidem, non autem recti sunt anguli, *Rombus*; cuius neque recti anguli, neque omnia latera sed opposita tantum, aequalia sunt, *rhombiformis* dicitur. *Geometr.*

XLVI NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO.

701. *Sarmentosus* Caulis, filiformis subnudus, geniculis radicantibus.
702. *Scaber* Caulis, Punctis eminentibus rigidius sculis exasperatus.
703. *Scandens* Caulis, alta petens, aliisque corporibus sustinendus.
704. *Scapus* Pedunculus, Radicatus, caulis faciem induens. *Viola odorata*.
705. *Scapus* Trunci (850) Species, fructificationem sustinens, absque foliis. *Narcissus*.
706. *Scariosum* Folium, substantia sicca arida, tactu sonora.
707. *Scariosum* Perianthium, imbricatum (392) squamis margine s. apice membrana auctis, arida sonora. *Chrysanthem*.
708. *Scutellum*, Fructificatio orbiculata, concava: margine undique elevato. *Lichenes*.
709. *Scyphus*, in Lichenibus pyxidatis, constat stipite basi attenuato, superne dilatato excavato, fructificationes sessiles, seu pedunculatas scutelliformes, proferens.
710. *Secunda* Panicula, (382) Pedunculis floribusque omnibus versus unum idemque latus flexis. *Festuca*. *Dactyl. glom.*
711. *Secunda* Spica, floribus omnibus ad unum latius versis.
712. *Semen Vegetabilis* Pars decidua, novi rudimentum, pollinis (607) irrigatione vivificatum, vesica tunicatumque. Partes: Hilum (383) Colyledon (199) Corculum. (188)
713. *Semiamplexicaule* Folium, gradu minore differt a fol. amplexicauli. (30)
714. *Semicylindricum* Folium, Teres (817) sed altero latere longitudinaliter planum.
715. *Seminale* Folium, quod antea Cotyledon (199) fuit, & primum in Planta est.

716.

TERMINORUM TECHNICORUM CET. XLVII

716. *Seminum* Receptaculum , Basis , qua semina intra Pericarpium adfiguntur.
- 717 *Semiteres* Caulis , hinc planus , inde teretiusculus.
718. *Sempervirens* Folium , per omnia tempora anni virens.
719. *Sericeum* Folium , tectum pilis appressis , molissimis nitidis.
720. *Serratum* Folium , margine inciso : omnibus incisuris extremitatem respicientibus . *Duplicato serratum* (275) incisuris iterum incisis.
721. *Seffile* Folium , immediate Cauli vel Ramo , absque petiolo insidens.
722. *Seffilis Pappus* , (548) Semine absque Stipite (779) adhaerens.
723. *Seffilis Umbellula* , (863) plures Pedunculos simplices ex eodem centro , ambitu aequali , prodeuntes.
724. *Seffilis Verticillus* , (297) absque pedicellis manifestis.
725. *Seta* dicitur Pedunculus (565) in Muscis.
726. *Setae* , Pili rigidusculi teretiusculi , Spec. Pubis . (628)
727. *Sicca Drupa* , (273) non succulenta . (808)
728. *Silicula* , Siliqua (729) subrotunda , oblonga , obcordata stylo instructa . *Lepidium* . *Draba* . *Thlaspi*.
729. *Siliqua* , Pericarpium (575) membranaceum bivalve , adfigens semina secundum utramque suturam : constar valvis (884) & Dissepmimento.
730. *Simplex Aculeus* , (11) non divisus . (666) (404) (668)
731. *Simplex Caulis* , continua serie versus apicem extensus .
732. *Simplex Cirrus* , indivisus.
733. *Simplex Flos* , intra Perianthium aut Corollam unicum receptaculum constituit.

734.

XLVIII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO.

734. *Simplex* Folium, cum Petiolus gerit unicum
Folium, differt : 1) Circumscriptione (138)
2) Angulis (36) 3) Sinubus (745) 4) Apice
(45) 5) Margine (473) 7) Superficie (811)
8) Substantia (806) 9) Duratione. (277)
735. *Simplex* Fructificatio, (331) Paucis floribus
constans.
736. *Simplex* Pappus, (548) radiis pluribus indi-
visis in orbem positis. *Hieracium*.
737. *Simplex* Perianthium; compositum dum se-
ries unica squamarum ambit flosculos. T. *Far-
fara*.
738. *Simplex* Radix, quae non subdividitur.
739. *Simplex* Seta (725) continuo extensa longi-
tudinaliter.
740. *Simplex* Spica, Rachi (637) indivisa.
741. *Simplex* Umbella (862) Pedunculis non ra-
mosis omnibus ex uno eodemque Receptaculo
ortis.
742. *Simplicissimus* Caulis, idem ac Integer. (415)
743. *Sinistrorum*, hoc est: quod respicit sinistrum,
si ponas te ipsum in centro constitutum, meri-
diem adspicere; *Dextrorum* itaque contrarium.
(908 909.)
744. *Sinuatum* Folium, a lateribus sinubus dila-
tatis.
745. *Sinus*, Discum Folii in partes secant. (676.
192. 374. 700. 306. 540 592. 470. 699. &c.)
746. *Situs* Foliorum. Insertio. (413)
747. *Solidus* Bulbus (106) Carnosus, intus indi-
visus. *Tulipa*.
748. *Solidus* Caulis, interne faretus (292) non tu-
bulosus. (856)
749. *Solitariae* Stipulae, simplices, sparsae.
750. *Solitarius* Pedunculus, qui unicus est in loco.
751. *Soluta* Stipulae, Folia, basi productae, cras-
situdinem perdentes.

752. *Somnus*, nocturna Foliorum mutatio in Planta. Connivens, (182) Includens, (399) Circumsepiens, (139) Muniens, (492) Conduplicans, (170) Involvens, (429) Divergens, (267) Dependens, (234) Invertens, (424) imbricans. (390)
753. *Spadix*, Receptaculum (661) Palmae, enatum intra Spatham, in ramulos fructificantes difusum.
754. *Sparsa Folia*, absque certo ordine constituta.
755. *Sparsi Pedunculi*, ubi plures absque ordine prognoscuntur.
756. *Spatha Calyx* (113) membranaceus, longitudinaliter ruptus. *Narcissus*.
757. *Spatulatum Folium*, subrotundum (805) basi angustiore linearis. (458)
758. *Sphaerophyllum*, Fructificatio feminea, sessilis vel pedunculata, constans minutissimis foliis congregatis imbricato-patulis. *Mnium pellucidum*. *Androgynum*. &c. *Fissum*.
759. *Spica Floribus sessilibus alternis*, pedunculo communi simplici (Rachi) adfixis.
760. *Spicula*, *Spicilla*, partialis spica, compositae (158) Locusta dicta.
761. *Spica*, Mucro durus, pungens, ex ligno, (non ex cortice) protrusus. A cultura saepe evanescens. *Pyrus*. *Prunus*. *Rhamnus*.
762. *Spinescens Petiolus*, indurescens et pungens.
763. *Spinosum Folium*, quod margine exit in acumina rigida subulata & pungentia. *Carduus*. *Ilex*.
764. *Spinosum Perianthium*, Squarrosum, (770) Squamis in mucrones pungentes terminatis. *Oenopordon*.
765. *Spinosus Caulis*. Spinis (781) armatus.

L NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

766. *Spiralia Vernatio* (136)
767. *Spithama*, Spithamalis, Mensura, Spatium inter Apicem Pollicis & Indicis extensum. *Unciae septem.*
768. *Squamosus Bulbus*, (106) Lamellis s. squamis imbricatus. *Lilium.*
769. *Squamosus Gaulis*, squamis adspersus.
770. *Squarrosum Perianth.* Imbricatum (392), squamis undique divaricatis patentissimis. *Onopordon. Conyza.*
771. *Stamen*, Viscus pro Pollinis (607) praeparatione, (Organum Genitale masculinum.) Constat 1) Filamento, (303) Anthera (41) & Polline, (607)
772. *Stella* s. *Stellula*, Fruetificatio in Muscis: Surculi terminalis expansio pluribus foliis patentibus conflata cuius medio (in quibusdam) minuta folia compactissima, in aliis distinctiora corpora cylindrica (209. in nos.) imbricata, insident. *Polytrichum. Minium.*
773. *Stellata Folia*, Verticillata. (895)
774. *Stellatae Setae*, (726) decussatim dispositae.
775. *Stigma*, Summitas Pistilli (198) madida humore, pro Pollinis receptione. Numerus & Figura notetur.
776. *Stimuli*, Mucrones puncturas inflammatorias efficientes, unde pruriginosae evadunt. Partes. *Urtica.*
777. *Stipes Frondis* (329) Trunci (850) Species, in Folium transiens. *Filices.*
778. *Stipes Fungi*, Truncus s. Pes fungi, estque farctus, vel fistulosus; nudus vel annulatus. (37)
779. *Stipes Pappi* (548) Filum elevans connectensque Pappum & Semen. Unde.

780. *Stipitatus* Pappus. Stipite (779) instructus,
non sessilis. (722)
781. *Stipula*, Foliorum s. Squamula, basi petiolo-
rum enascentium ubique adstans. Fulcri (351)
Species.
782. *Stipulares* Glandulae (356) Stipulis insertae.
783. *Stipularis* Gemma, (344) ex Stipulis (781)
confecta.
784. *Stipulatio*, Stipularum (781) situs & stru-
ctura ad Basin Foliorum.
785. *Stipulatus* Caulis, Stipulis (781) notatus.
786. *Stolones*, (786) nova Plantarum Sobiles,
e Radicibus fructificantes, per quas Plantae
quoque multiplicantur. *Ajuga. Viola* ed.
787. *Stoloniferus* Caulis, Turones (861) ad radi-
cem emittens.
788. *Striatum* Folium, Lineis superficialibus ex-
cavatis parallelis inscriptum.
789. *Striatus* Caulis, Lineis tenuissimis excavatis
longitudinalibus.
790. *Stricta* Panicula (543) pedunculis pedicellis-
que rigidiusculis. Opposit. Laxae. (450)
791. *Strictum* Folium, omnino perpendicularē
absque flexura.
792. *Strictus* Caulis rectus, perpendicularis, non-
flexuosus.
793. *Strigae*, Pili rigidiusculi planiusculi.
794. *Strigosum* Folium, aculeis lanceolatis rigidis
in superficie.
795. *Strobilus*, Pericarpium (573) imbricatum,
ex Amento (29) coarctato factum, squamis in-
duratis. *Pinus*.
796. *Stylus*, Pars Pistilli (598) intermedia, ele-
vans Stigma (775) a Germine. (351) Situ,
Divisione, & figura differt.
797. *Subalare* Folium, Axillare (73)

LII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

798. *Subcordatum* Folium, ad hanc figuram, (192) fere accedens.
799. *Subdivisus* Caulis, in ramos absque ordine.
800. *Suberosus* Caulis, Cortice exteriore molliore, sed elasticō indutus.
801. *Submersum* Folium, intra aquae superficiem absconditum.
802. *Subovatum* Folium, ad ovatam figuram (533) subaccedens.
803. *Subramosus* Caulis, ramis paucissimis laterali-bus.
804. *Subrotundum* Capitulum. (118) fere globo-sum.
805. *Subrotundum* Folium, cuius figura Orbicu-lato (527) proxime accedit.
806. *Substantia* Folii, consideratur secundum la-tera. (478. 706. 353. 235. 166. 155. 630. 122. 6. 270. &c.)
807. *Subulatum* Folium, ad basin lineare (458) versus apicem sensim attenuatum.
808. *Succulenta* Drupa (272) humorem conti-nens. *Prunus*.
809. *Suffruticosus* Caulis, basi permanens, ramis quotannis marcescens.
810. *Sulcatum* Folium, Disco (257) lineis pro-fundis excavatum.
811. *Superficies* Folii, Paginam (534) Supinam (superiorem) vel pronam (inferiorem) tegit. Communiter prima coelum, secunda terram spectat. (504 500. 355. 148. 497. 840. 839. 845.)
812. *Superum* Germen, (351) Corolla inclu-sum.
813. *Superus* Flos, Calyx. Cui Germen sub rece-ptaculo s. cuius Calyx abit in Fructum. *Tourne-*

814. *Supradecompositum* Folium, cum Petiolus aliquoties (bis-ter) divisus, adnectit plurima Foliola. (818. 848. 841.)

815. *Surculus*, Caulis species in Muscis, reptans, procumbens vel erigens; expansione continue multiplicatur. (568. 596. 393.)

T.

816. *Teres* Caulis, cylindricus (209. in not.) s. angulis destitutus,

817. *Teres* Folium, quod maxima ex parte cylindricum.

818. *Tergemminum* Folium, (842) Petiolus bifidus utroque apice foliola duo ferens, & insuper foliola dico ad divaricationem petioli communis.

819. *Terminalis* Arista. (54) apici Glumae affixa.

820. *Terminalis* Pedunculus, s. Flos. ad apicem Caulis s. Rami positus.

821. *Terna* Folia (89)

822. *Ternatum* Folium, est Digitatum (247) foliolis tantum tribus. Estque foliolis sessilibus vel petiolatis.

823. *Tesselata* Folia, Colorat. Species, (848) maculis quadrangularibus discoloribus picta.

824. *Tetragonus* Caulis, (837)

825. *Thalamus*, Receptaculum. (661)

826. *Thrysus*, Panicula (543) coarctata in formam ovatam. *Syringa*. T. *Petasites*.

827. *Tomentosum* Folium, villis intertextis (828) obductum.

828. *Tomentum*, Spec. Pubis, (628) villi intertexti vix conspicui.

LIV NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

829. *Torosa Siliqua* (729) *Torulosum Pericarpium.*
Prominentiis hinc inde Gibba.
830. *Torsio, Intorsio, Contorsio* (183) *Flexio Partium Plantæ, versus alterum latus.* (681. 682.
910. 908. 909. 186.)
831. *Tortilis Arista* (54) *funis instar flexa. A-
vena.*
832. *Transversum Dissepimentum.* (886)
833. *Trapeziforme Folium, Quadrangulare, late-
ribus inter se inaequalibus.*
834. *Triangulare Folium, angulis tribus promi-
nentibus. Angulati Spec.* (34)
835. *Triangularis Caulis, Quadrangularis &c. a
numero angulorum longitudinaliter prominenti-
tum.*
836. *Tricocca Capsula,* (119) *tribus nodis protu-
berans, intusque in tria Loculamenta* (463) *di-
visa. Euphorbia.*
837. *Trigonus Caulis, tetragonus, pentagonus,
hexagonus. Angulis tribus, quatuor, quinque,
sex, prominentibus. Ancipitis Spec.* (31)
838. *Trilobum Folium,* (462)
839. *Trinervatum Folium, Nervosum* (497) *tri-
bus nervis, pone Basin Folii concurrentibus.*
840. *Trinerve Folium, Nervosum* (497) *tribus
nervis in Basi Folii concurrentibus.*
841. *Tripinnatum Folium,* (843) *cum Petiolus
communis adfigit plura foliola bipinnata.* (92)
842. *Triplicato-gemminatum,* (818)
843. *Triplicato-pinnatum.* (841)
844. *Triplicato-ternatum.* (848)
845. *Triplinerve Folium, nervosum* (497) *tribus
nervis, supra Basin concurrentibus.*
846. *Triquetter Culmus, lateribus tribus exacte pla-
nis.*
847. *Triquetrum Folium, Tribus lateribus longi-
tudinaliter planis, in folio subulato.* (807)
- 848.

848. *Triteratum* Folium, (844) cum petiolus adfigit tria foliola biternata. (93)
849. *Truncatum* Folium, quod transversali terminatur.
850. *Truncus*, Organum multiplicans Plantam, quatuor numerantur Species: 1) *Caulis* (132) 2) *Culmus* (205) 3) *Scapus* (705) 4) *Stipes*. (777) Rami partes sunt Trunci.
851. *Tuberculum* (*Licben.*) Fructificatio, constans punctis scabris, ex pulvere quasi congestis.
852. *Tuberculum* (*Musci*) basis Pedunculi (565) Ovata, seu conica; nuda vel Perichaetio (574) vestita, qua surculo (815) adfigitur.
853. *Tuberosa* Radix, e partibus carnofis filo quasi connexis. *Filipendula. Paeonia.*
854. *Tubulata* Corolla, Monopetala (485) Tubo (857) Cylindrico, (209. in not.) Limbo Campaulato, 4 f. 5 fido.
855. *Tubulosus* Flos, Compositus, (162) Corollulis floscularum omnibus tubulatis (854) subaequalibus.
856. *Tubulosum* Folium, quod interne si detruncatur cavitatem habet.
857. *Tubus* Corollæ, Monopetalæ (485) pars inferior cylindracea.
858. *Tunicatus* Bulbus, (106) Tunicis numerosis vestitus. *Cepa.*
859. *Tunicatus* Caulis, membranis vestitus.
860. *Turbinatum* Perianthium, obverse Conicum. (176)
861. *Turiones*, Tenellæ plantarum siboles, verno tempore cum foliis e terra erumpentes. (786) *Asparagus. Humulus.*

U.

LVI NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

U.

862. *Umbella*, Receptaculum ex eodem centro elongatum pedunculos filiformes proportionatos.
863. *Umbellula* est partialis *Umbella*. (556)
864. *Umbilicatum* Folium, Peltatum. (567)
865. *Umbo*, Discus (256)
866. *Undatum*, Disco (257) plicis obtusis alternatim flexo.
867. *Undulatum* Folium, Margine plicis alternatim flexo.
868. *Unguis* Corollae Polypetalae (611) pars inferior angustata, qua Receptaculo adfigitur.
869. *Unguis*, Unguicularis Mensura, est longitudo *Unguis*. *Lineas Sex.*
870. *Uniflora* Gluma (364) unicum Florem amplectens. *Agrostis.*
871. *Uniflorus* Pedunculus, bi - tri - multiflorus, pro numero florum quos profert.
872. *Unilateralis* Racemus, (635) Flores omnes ad alterum latus inserti.
873. *Univalvis* Gluma (364) unica constans squama.
874. *Univalvis* Spatha (756) uno latere dehiscens. *Leucojum.*
875. *Universale* Involucrum, (427) Umbellae universalis subjectum.
876. *Universalis* Umbella (862) quae alias *Umbellulas*. (887) Apicibus gignit.
877. *Urceolata* Corolla, quae Urceoli s. Pelvis instar inflata, & undique gibba est.
878. *Urens* Caulis, Stimulis (776) adspersus.
879. *Utriculi*, Vascula liquore secreto repleta.

TERMINORUM TECHNICORUM CET. LVII

880. *Vaginae Foliorum*, *Vaginantis* (882) *Foli*,
Tubus cylindricus Culmum vel Caulem ve-
stiens.
881. *Vagina* (Muscis) Membrana pervia tubulo-
sa, surculo intidens, & tuberculum (852) Pe-
dunculi (565) arcte vestiens. *Polytrichum*.
882. *Vaginans* Folium, basi formante tubum, cul-
mum vesticentem. (880)
883. *Vaginatus* Culmus, Foliorum Vaginis (880)
cinctus.
884. *Valvæ*, *Valvulae*, Paries quo tegitur fructus
externe.
885. *Valvis* dehiscit Capsula, (119) unde tri - qua-
tri - quinque - sex - valvis, a numero segmen-
torum.
886. *Valvis contrarium*, f. *Transversum* Dissep-
imentum, (259) angustius, ubi Valvulae (884)
coarctatae evadunt concavae. *Tibespi*.
887. *Valvis Parallelum* Dissepmimentum (259) la-
titudine & Diametro transversali ad Valvulas
(884) accedens. *Alyssum*. *Turritis*.
888. *Venosum* Folium, Vasis discurrentibus multi-
fariam divisum.
889. *Ventricosa* Spica, (759) lateribus gibba.
890. *Ventricosa* Corolla, Perianth. in ventrem in-
tumescens.
891. *Vernatio*, (321) Foliorum Dispositio intra-
gemma, (344) Conduplicata, (171) Convo-
gata,

LVIII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

luta, (186) Involuta, (428) Revoluta (687)
Obvoluta, (122) Equitantia, (286) Imbricata,
(391) Plicata, (602) Reclinata, (662) Circinalia, (136)

892. *Versatilis* Anthera (41) incumbens. (892)

893. *Versus* Florum, est eorum certam versus Plagam quaedam dispositio.

894. *Verticale* Folium, paginam superiorem medianie (non coelo) obvertens.

895. *Verticillata* Folia, s. *Stellata*, plura quam duo folia caulem ambientia. (821)

896. *Verticillati* Rami, plures truncum (850) ad genicula (362) circumdantes.

897. *Verticillus*, Floribus pluribus Caulem annulatim ambientibus. *Didynamia*.

898. *Vexillum*, Superius Petalum Corollae Papilionaceae, (545) Alis (23) & Carinae (140) incumbens.

899. *Vigiliae* Plantarum, absolvuntur determinatis horis Dici, quibus Plantae Flores quotidie apriunt, expandunt, & claudunt. *Tragopogon*. *Histerix*. &c.

900. *Villofa* Calyptra, sursum vel deorsum pilosa. *Bryum Striat*. *Polytrichum*.

901. *Villosum* Folium, Tectum pilis molibus.

902. *Villosus* Caulis, Pilis molibus pubescens. *Rhus*.

903.

903. *Virgatus Caulis*, ramusculis debilibus numerosis inaequalibus.
904. *Viscidum Folium*, oblitum tenaci humore.
905. *Viscoitas*, Qualitas humoris tenacis.
906. *Vivipara Gramina* fiunt, dum glumae Corollae ex crescunt in folia, tumque abortiunt, & Stamina cum Pistillis plane evanescunt.
907. *Volva*, Calyx Fungi membranaceus, undique lacerus.
908. *Volubilis Caulis*, spiraliter adscendens per ramum alienum.
909. *Volubilis dextrorsum*, (743) ♂ contra motum Solis. *Convolvul.*
910. *Volubilis Sinistrorsum* (743) ♀ Secundum sollem. *Humulus. Polyg. Convolvul.*
911. *Vulgaris Planta*, f. *Frequens*, quae in solo apto sponte & copiose provenit.



Emendanda.

In Præf.

- Pag. 3. lin. 14. iujaria lege *injurias*.
p. 4. l. 5. vestigiat l. *vestigia*.
p. 5. l. 21. majorum l. *majorem*,

In Nomencl.

- p. XL. Nro. 607. inclusa lege *incisus*.

CLASSIS I.

CLASSIS I.

M O N A N D R I A
A. MONOGYNIA.
HIPPURIS.

LINN. Gen. Plant. no. 11.

Cal. o. Petala o. Stigma simplex. Semen 1.

LINN. SYST. NAT. T. II. pag. 52.

1. HIPPURIS, vulgaris. Linn. Spec. Plant. pag. 6.
(*Limnopeuce*. Hall. Hist. Stirp. Helv. no. 1572.)

Habitat in fossis & piscinis ad Driedorff, Beilstein, alibique.
Floret Majo.

B. D I G Y N I A.

CALLITRICHE. G. P. 13.

Cal. o. Petala 2. Caps. 2 - locularis, 4 - sper-
ma. S. N. 52.

2. CALLITRICHE, verna, foliis superioribus ovalibus,
floribus androgynis. Linn. Spec. 6. (*Stellaria*.
Hall. 553.)

β. *Stellaria* foliis imis linearibus, supremis subrotundis.
Hall. 554.

H. α. in aquis stagnantibus passim; β. similibus locis im
Fischbreyer. Grund; bey der untern Wackmühle. Floret α. Majo,
β. Junio.

Var. β. Flores superiores masculi, inferiores feminini, uti in
α; Folia caulina linearia, apice bifida, uti in sequente.

3. CALLITRICHE, autumnalis, foliis omnibus linear-
ibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. Linn.
Spec. 6. (Hall. 555.)

H. in fossis aquosis, & aquis quietis, bey der Papiermühle; &
alibi rarius. Floret Augusto, & sequ.

A

CLAS-

CLASSIS II.

DIANDRIA

A. MONOGYNIA.

* *Flores inferi, monopetali, regulares.*

LIGUSTRUM. G. P. 18.

Cor. 4-fida. Bacca 4-sperma. S. N. 55.

4. LIGUSTRUM, *vulgare. Linn. Spec. 10. (Hall. 530.)*

H. ad sepes pastrum. Floret Junio.

Pharm. LIGVSTRI Flores.

SYRINGA. G. P. 22.

Cor. 4-fida. Caps. 2-locularis. S. N. 56.

5. SYRINGA, *vulgaris, foliis ovato-cordatis. Linn. Spec. 11. (Hall. 531.)*

H. Ad sepes frequens, frutex persicæ originis; Var. Floribus albis in Hertis *auf dem Berg.* Floret Majo.

** *Flores inferi, monopetali, irregulares.*

Fructus capsularis.

VERONICA. G. P. 25.

Cor. Limbo 4-partito: lacinia infima angustiore. Caps. 2-locularis. S. N. 57.

a. *Spicata.*

6. VERONICA, *spicata, spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis, caule adscendente simplicissimo. Linn. Spec. 14. (Hall. 542.)*

H. in sterilibus sylvaticis, *in der Hörre,* rarius; Floret Julio. *

7. VERONICA, *officinalis, spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. Linn. Spec. 14. (Hall. 540.)*

H. in sylvis pastrum. Floret Junio & sequ.

Pharm. VERONICA E Herba.

b. *Corymbo-racemosa.*

8. VERONICA, *serpillifolia, racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis. Linn. Spec. 15. (Hall. 546.)*

H. in pastruis, riguis, ad vias, ubique. Floret Majo & seq.

Corol-

*Cerolla, pallide carulea, infima lacinia angustissima alba. Tota
Planta glabra.*

9. VERONICA, *Beccabunga*, racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. Linn. Spec. 16. (Hall. 534.)

H. in fossis aquotis, stagnis, rivulis, abunde. Floret Junio. Pharm. BECCABUNGA E Herba.

Folia primo vere in acetaria recipiuntur.

Radix perennis. Caulis procumbens, basi repens. Folia subpetiolata, obtusa. Corollæ saturate caruleæ. Capsulae subrotundæ, gibbæ.

10. VERONICA, *Anagallis aquatica*, racemis lateralibus, foliis lanceolatis ferratis, caule erecto. Linn. Spec. 16. (Hall. 533.)

H. in fossis, & aquis flagnantibus, bey der oberen Papier-Mühle frequens; bey der untern Walzmühle, rarius. Floret Junio, Julio.

Radix annua. Caulis erectus. Folia amplexicaulia, acutæ. Corollæ carneaæ. Capsulae obovatae.

11. VERONICA, *scutellata*, racemis lateralibus, pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. Linn. Spec. 16. (Hall. 532.)

H. in pratis paludosis, circa pagum Sinn, frequens. Floret Julio.

Radix subrepens. Caulis pedalis, simplicissimus, suberectus, teres, levis. Folia opposita, linearis lanceolata; inferiora integerrima, superiora longiora serrata: ferraturis oppositis remotis, incisura inaequali bifidis retrorsum versis. Pedunculi ex aliis superioribus, foliis longiores, pauci (5-7) flori, alterni: pedicellis anthesi peracta secundis, pendulis. Calyx equalis, Corolla brevior. Corolla dilutissime carulea, demum iætea, Lacinia superiore venis sanguineis lineata. Capsula cordata, profunde emarginata, acute marginata, ottosperma. Semina planiuscula.

12. VERONICA, *Teucrium*, racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis dentatis obtusifusculis, caulis procumbentibus. Linn. S. N. 58. Spec. 17. (Hall. 537.)

H. unico in loco sterili, montoso, umbroso, in dumetis oben im Fischbaweyer Grund. Floret Junio, Julio.

In meis Speciminibus Caules quam V E R. Chamedr. duriores, villosiores, basi ramosi, procumbentes; Folia solidiora; omnia subpetiolata, supra fere levia, subtus nervosa, obtusiora, obtusa-

sususque dentata. Racemi ex axillis superioribus & inferioribus prodeunt longissimi, strictiores, densioresque. Flores numerosiores, subspicati. Bracteæ minores. Calycina foliola subinæqualia, trinervia. Corolla lacinia superior saturatus & pulchritus carulea. Capsula non dissimiles.

TEVCRIVM hoc est VERVM BEROLINENSIVM, ad usum diæticum, Theæ chinensis præstantissimum succedaneum. a TEVCRIO SPVRIO (VER. Chamadr.) his notis facile distinguendum.

13. *VERONICA*, *montana*, racemis lateralibus paucifloris, calycibus hirsutis, foliis ovatis rugosis crenatis petiolatis, caule debili. *Linn. Spec.*

17. (Hall. 539.)

H. in sylvis umbrosis, im Hirschberg frequens. Floret Julio. Caulis ultrapedalis, procumbens basi repens, teres, distiche pilosus. Folia magna, omnia opposita petiolata; terra incumbens subrufa rubra, nitida. Pedunculi longissimi, ex foliorum aliis intermedii. Pedicellis 5-9. remotus. Calycina Foliola subæqualia, imprimis basi hirsuta. Corolla magnitudine fere sequentia, dilatius carulea. Capsula magna, suborbicularia, compressa, acute marginata, ciliata. Semina sex seu octo, planiuscula, striata.

14. *VERONICA*, *Chamædrys*, racemis lateralibus, foliis ovatis rugosis dentatis sessilibus, caule debili. *Linn. Spec. 17. (Hall. 536.)*

H. in pomariis, ad sepes passim. Floret Majo, Junio. Radix repens. Caules erecti, infirmi, simplices. Folia amplexicaulia, inferiore minora ovato-subrotunda, superiora majora ovato-oblonga subacuta. Racemi laxi ex axillis superioribus tantum foliorum. Bracteæ lanceolatae obsusa. Calycina foliola lanceolata inæqualia. Corolla speciosa, carulea. Capsula exalte obcordata, polyperma.

c. *Pedunculis unifloris.*

15. *VERONICA*, *agrestis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo brevioribus. *Linn. Spec. 18. (Hall. 549.)*

H. in agris (sæpe flore albo) arvis, & cultis, passim. Floret Aprili & seq.

16. *VERONICA*, *arvensis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus. *Linn. Spec. 18. (Hall. 548.)*

H. in cultis passim; am Siegbauß, frequens. Floret Julio & seq.

17. VE-

17. **VERONICA**, *bederifolia*, floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *Linn. Spec. 19.*
(*Hall. 550.*)

H. in agris & cultis, vulgatissima. Floret Majo & seq.
Folia inferiora triloba. Calycis foliola cordata, ciliata, aquila.
Corolla exigua, carneus. Capsula didyma. Semina 4, magna, hinc convexa rugosa, inde excavata.

18. **VERONICA**, *triphylos*, floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus. *Linn. S.N. 58. Spec. 19.* (*Hall. 551.*)

H. in agris & arvis am *Dollberg*. Floret Martio, Aprili.

19. **VERONICA**, *verna*, floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce brevioribus! *Linn. S.N. 58. Spec. 19.* (*Hall. 552.*)

H. cum precedente rarius; in arvis am *Rehberg* infrequens.
Floret Aprili.

20. **VERONICA**, *acinifolia*, floribus solitariis pedunculatis, foliis ovatis glabris crenatis, caule eretto subpiloso. *Linn. Spec. 19.* (*Hall. 574.*)

H. in cultis oleraceis in der unteren Pütze, rarissima, jam dum lecta. Floret Majo.

UTRICULARIA. G. P. 31.

Cor. ringens, calcarata. Cal. 2 - phyllus, æqualis. Caps. 1 - locularis. S.N. 61.

21. **UTRICULARIA**, *vulgaris*,nectario conico, scapo paucifloro. *Linn. Spec. 26.* (*Hall. 290.*)

H. in paludibus infra pagum *Sinn*. Floret Julio.
*** *Flores inferi, monopetali, irregulares.*

Fructus gymnospermii.

VERBENA. G. P. 32.

Cal. 5 - dentatus, unico dente truncato. Cor. infundibuliformis, subæqualis, curva.
Sem. 2 - f. 4, nuda. (Stam. 2 - f. 4.) S.N. 62.

22. **VERBENA**, *officinalis*, tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciiniatis, caule solitario. *Linn. Spec. 29.* (*Hall. 219.*)

H. in sterilibus, ruderatis, ad vias prope *Burck*, & *Offenbach*; in Horto meo vitium pervulgare. Floret Julio, Augusto.

Pharm. VERBENA Herba.

LYCOPUS G. P. 33.

Cor. 4 - fida : lacinia unica emarginata. **Stamina** distantia. **Semina** 4, retusa. S. N. 63.

23. Lycopus, europeus, foliis sinuato-serratis. **Linn.** Spec. 30. (Hall. 220.)

H. ad fossas; ad ripas Dilla; an der Mühlbach, passim. Floret Julio, Augusto.

Semel hanc plantam legi: Caule quadripedali. Floribus omnibus femeinis, s. staminibus substitutis.

**** Flores superi.

CIRCAEA G. P. 24.

Cal. diphyllus, superius. **Cor.** dipetala. **Sem.** 1. biloculare. S. N. 56.

24. CIRCAEA, lutetiana, caule erecto, racemis pluribus, foliis ovatis. **Linn.** S. N. 56. Spec. 12. (Hall. 813.)

H. in nemorosis in der Hörre, versus Bicken, copiose. Floret Julio, Augusto.

Fructus siliculosus, obovatus, exsiccatus leví pressione bast dehisces, bivalvis. Semina duo, oblonga, dissidente proprio, plano affixa.

B. DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM G. P. 42.

Cal. Gluma 2 - valvis, 1 - flora. **Cor.** Gluma 2 - valvis, acuminata. **Semen** 1. S. N. 67.

25. ANTHOXANTHVM, odoratum, spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis arista longioribus. **Linn.** Spec. 40. (Avena-Hall. 1491.)

H. in pratis, pomariis, inque sylvis, abunde. Floret Aprili & sequent.

T. II. f. I. Gramen odoratum, foeni aroma. **Bobus**, **Ovibus** & **Equis gratum** prabet pabulum. **Radix** fibrosa, **odorata**, **perennis**. **Culni** 1 - 2 - pedales, erecti, binodes, foliati, laves. **Folia** radicalia **subangusta**, supra pubescentia. **Folia** cuhnnea **lanceolata**, utrinque **subscabra**. **Ligula** obtusa, crenulata. **Vagina** striata, laves, inferiores subvillosa, rufescentes. **Panicula** spicata. **Pedunculi** fasciulari, brevissimi, subramosi, erecti, ante & post florescentiam coarctati, inferiores remotiores. **Corolla** valvulae **dua** **aequales**, parallelæ, basi **coalta**, pilosa, serrula-

*ferrulata, semibifida; longitudine Valvulae calycinæ (a. A. *) minoris, (nec majoris G. P. l. c.) V. exterioris Arista ex dorso medio prodit, recta, (X *) calyce brevior. V. interioris Arista juxta basin inserta, geniculata, (X) calyce paulo longior, demum reflexa tortilis. (a. f. f. c.) Nectarii Valvula exterior trinervia, obtusissima: interiorem duplo minorem, uninerviam, amplectens, Germen, Filamentaque includens, tenebrem figuram acquirit. (L. l.)*

Variat. α) Spica dupli f. ramosa; β) Glumis calycinis pubescentibus.

CLASSIS III.

TRIANDRIA A. MONOGYNIA.

* *Flores superi.*

VALERIANA. G. P. 44.

Cal. o. Cor. 1 - petala, basi hinc gibba, supera. Semen 1. S. N. 72.

26. **VALERIANA**, *dioica*, floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerimis. *Linn. Spec. 44.* (*Hall. 208.*)

H. in pratis uliginosis, in der Callenbach, & alibi frequens. Floret Majo.

Maris Corolla Pistillo imperfecto sterili, Feminæ triple minor, rudimentis staininum in fundo corolla instructa.

Radix odoratu sequente gratior.

27. **VALERIANA**, *officinalis*, floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Linn. Spec. 45.* (*Hall. 210.*)

H. in pratis sylvaticis, dumetis, am Rehberg; alibique. Floret Julio.

Pharm. VALERIANAE MINORIS Radix.

28. **VALERIANA**, *Locusta olitoria*, floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Linn. Spec. 47.* (*Hall. 214.*)

H. in agris inter segetes; in cultis ubique vulgaris. Floret Majo.

Hujus folia primaria hyberno tempore in acetaria recipiuntur, vulgo Korn-Lattig dicta.

Corolla cærulea. Semina nuda, bipartibilia.

- 29. VALERIANA, Locusta dentata**, caule dichotomo, floribus triandris, foliis oblongis subserratis, seminis corona tridentata. *Linn. Spec. 48. var. præc. d. (Hall. 215.)*

H. inter segetes, auf dem Reuterberg frequens. Floret Julio.

Corolla carnea. Semina hinc convexa enervia, inde angulata, binervia, non bipartibilia. Corona tri-sepe 5-dentata, dense intermedio triplo majore.

IRIS. G. P. 59.

Cor. 6 - partita: Petalis alternis reflexis. Stigmata petaliformia. S. N. 77.

- 30. IRIS, Pseud-Acorus**, corollis imberbibus, petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus. *Linn. Spec. 56. (Hall. 1269.)*

H. in fossis, ad ripas Dilla; an der Möhlbach, frequens. Floret Majo.

*Pharm. ACORI PALUSTRIS, f. ADULTERINI (male) Radix.
** Flores inferi.*

POLYCNEUM.

Cal. 3 - phyllus. Petala 5, calyciformia. Sem. 1, subnudum. S. N. 74.

- 31. POLYCNEVM, urvense**, *Linn. Spec. 50. (Hall. 1570.)*

H. in arvis & agris arenosis am Dollberg, inter Solanum tuberosum, lecta 1771, nunc rarissima. Floret Julio Augusto. Radix annua. Caulis brevis, jam basi in ramos divisus. Rami procumbentes, simplices s. subdivisi, striati, subpilosæ, basi interiore callo nodosi, prostrati, unde Nomen. Folia numerosa, subulata, carinata, mucronata. Flores axillares, sessiles, solitarii. Folia calycium constantem duo in nostrate lanceolata. aristata, corolla duplo longiora. Petala 5. ovata, acuminata. Stamina tria corolla breviora. Germinen intra tunicato filo, ex latere non basi prodeunse affixum. Stylus bifidus, ex latere opposito adscendit membrana apicem perforans, uti in nonnullis Chenopodiis; Stigmata globosa. Seinen reniforme punctatum. Capsula tenui membranacea (Herniaris) inclusum, levissima pressione basi demittitur.

*** *Flores Graminei, valvulis Glumaæ calycinæ.*

SCLOE.

SCHOENUS G. P. 65.

Glumæ paleaceæ, univalves, congestæ.
Cor. o. Sem. 1, subrotundum, inter glu-
mas. S. N. 80.

32. SCHOENUS, *compressus*, culmo subtriquetro nudo, spica disticha, involucro monophyllo.
Linn. Spec. 65. (Scirpus Hall. 1342.)

H. in pratis uliginosis hinter dem Homberg. Floret Majo.

T. I f. I. Radix horizontalis, teres, articulata, Geniculis setosis. Culmi spithameis s. pedales, erecti, inferne squamati, subfoliati, ultra medium nudis, compresso - teres, laves, infra spicam triquetri, scabri. Folia vaginantia, canaliculata, laevia, apice scabra, superiora culmo fiorenti longiora. Involucri Folium base latiuscula amplectente, setaceum, triquetrum, scabrum, spica rure longius. (b) Spicæ Rachis flexuosa, compressa. Spiculæ 9-11-13, alterna, disticha, ovato - oblonga. (a. c.) ferruginea, 7-9-flora: Singula Calyx proprius univalvis, convexus, subtrinervius, acutus. (a) Corollæ univalves, (c) sublanceolata, planiuscula, uninervia, angustiores, calycis longitudine: (a. c.) Receptaculo brevi, tereti, absque ordine adfixa. Singula Filamenta 3, supra Antheras in mucronem producta. (M*) Germen Receptaculo proprio, truncato adnatum. (n.) Stylus longitudine corolla. Stigma bifidum, cirrhosum, pubescens. (o) Semen triquetrum, (f.) sotis sex scabris (○) obvallatum.

CYPERUS. G. P. 66.

Glumæ paleaceæ, distiche imbricatae. Cor. o.
Sem. 1, nudum. S. N. 81.

33. CYPERUS, *fusca*, culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis linearibus. *Linn. Spec. 69. (Hall. 1349.)*

H. in fossis, & pratis uliginosis, infra pagum Sinn, rarius. Flor. Jul. T. I. f. 2. Radix fibrosa, annua? Culini spithameis, foliis 2. f. 3. vaginantibus ad basim vestiti, subnudi, triquetri, laves. Folia radicalia carinata, laevia, longitudine culni. Folium involucri infimum, culmo rure longius, duo reliqua umbellam superantia, sape quartum brevissimum. Pedunculi triquetri, basi vaginati; (*) intermedius brevissimus, spiculis obrectus. Spiculæ lanceolato-lineares, compressa, e fuco nigricantes, 9-11-13-flora. Glumæ carinata, acuta. (c) Stylus bi f. trifidus. Semen nudum (f)

A 5.

SCIR-

SCIRPUS. G. P. 67.

*Glumæ paleaceæ, undique imbricatæ. Cor. o.
Semen I, imberbe. S.N. 82.*

34. SCIRPUS, *palustris*, culmo tereti nudo, spica subovata terminali. Linn. Spec. 70. (Hall. 1336.)

H. in fossis, paludibus, ad ripas Dilla frequens. Floret Ma-
jo & sequ.

T. I. f. 3. Radix obliqua, teres, articulata, subrepens, squamata. Culni 1-2-pedales, erecti, stricti, teretes, laves, nudi, far-
bi: Vaginis ad basin vestiti obtusis, aphyllis, summa longio-
re truncata. Folia radicalia culmo semillima breviora, acu-
ta. Spica ovato-oblonga, acuta, magnitudine varia, Squa-
mis imbricata acutis: (c) quarum infime duo opposita,
laiores, obtusiores, (b) fructificatione destituta Ger-
men apice productum, gibbum. (N.) Stylus semper bi-
(nec 3-) fidus. (o) Semen setis quatuor, calyce brevioribus,
cinctum. (S.) Suibus recens gratissimum pabulum.

35. SCIRPUS, *setaceus*, culmo nudo setaceo, spicis
lateralibus subsolitariis sessilibus. Linn. Spec. 73.
(*Mariscus Hall. 1345.*)

H. in rivulis pratorum hinter dem Homberg; locis inundatis bey-
der untern Walckmühle; & alibi frequens. Floret Julio.

T. I. f. 6. Radix horizontalis, fibrosa. Culni palmares, spithamei,
erecti, ad basin squamati, subfoliati, dein nudi, teretes, laves,
acuti. Folia subvaginaria, setacea, canaliculata, levia.
Spicule 1 s. 2, rarius 3, ovata, exigua, pauciflora: ex cul-
mi fissura laterali, infra apicem rectum erumpentes; florentes
sessiles, (○) inferior (fidus) maturo semine pedunculata, Pe-
dunculo brevi horizontali. (⊕) Glumæ subpurpurea, nervo
viridi. (c) Semen hinc convexum. striatum, inde planum,
nudum s. villis substitutum (f. S.)

36. SCIRPVS, *sylvaticus*, culmo triquetro folioso,
umbella foliacea, pedunculis nudis suprade-
compositis, spicis confertis. Linn. Spec. 75.
(*Hall. 1340.*)

H. in pratis uidis, secus riuulos passim. Floret Junio, Julio.

T. I. f. 4. (Umbellæ pedunculus.) Radix lignosa, teres, descendens.
Culmus 1-2-pedalis, erectus, foliatus, subtrigonus. Lewis. Folia
larissima, carinata, apice producto obtusiusculo, colorato: marginibus
carinaque hispida. Folia umbella subjecta alterna, consimilia.
Umbella suprae-composita, maxime multifida. Pedunculi
numerosi, inaequales, subtrigoni, ad basin vaginati, bracteati.
Spicu-

Spiculae exiguae, ovatae, solitariae, & confertae, sessiles & pedicellatae, e fusco-nigricantes. Seinen villis. 4 f. 6, brevibus cinctum. (1. S.)

ERIOPHORUM. G. P. 68.

*Glumae paleaceæ, undique imbricatæ.
Cor. o. Semen I, Lana longissima cinctum.
S. N. 84.*

37. ERIOPHORUM, *polystachion*, culnis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis. Linn. Spec. 76. (Hall. 1331.)

* H. in pratis uliginosis, hinter dem Homberg, im Gildner Grund; alibique. Floret Majo.

T. I. f. 5. Radix lignosa, teres. Culmus ultrapedalis, eretus, foliatus, subtrigonus, levis, subtrinodis. Folia culni 3, f. 4, vaginantis, lanceolato-acuminata, latiuscula, plana, levia. Involucrum monophyllum, persistens, (b) subulatum, subcarinatum, anterius obliquum; demum erectum: basi ventricosa, striata, spicas amplectens. Bractæ tota quot pedunculi, involucro similes, gradatim minores, decidua. (b*) Pedunculi alterni, inaequales, basi vaginatis, breves, dein longiores. Spica florentes ovata, erectiuscula, subnuda, maturo senzine oblonga, pendula, villis occultata. Glumæ ovata, acuta, nervo nullo, (c) dein majores. (c*) Seinen villis decupto longioribus, albis, (per tenorem) linearibus, planis, simplicibus, cinctum. (S. c.)

NARDUS G. P. 69.

Cal o. Cor. 2 - valvis. S. N. 84.

38. NARDUS, stricta, spica fetacea recta secunda. Linn. S. N. 84. Spec. 77. (Hall. 1410.)

H. in pratis sterilibus, ad pagos Mademühlen & Rehe; iudis infra sinn. frequens. Floret Julio.

T. I. f. 7. Radix densa, fibrosa, perennis. Culni spithamei, pedales, erecti, stricti, nudi, subangulati, subpubescentes, scabriuscui; unico Geniculo prope basin, & uno Foliolo brevi, fetaceo, supra basin instructi. Folia radicalia numerosa, longa, filiformia, subsca-

subscabra, erecta, inferiora ad angulum obtusum discedentia. Ligula ovata, prominula. Vaginae foliorum membranacea, albida, inferiores aphylla. Spicae Rachis hinc convexa, inde excavata, marginibus alternatim dentatis, scabris, pro floscularum insertione; (y) apice supra flosculos in mucronem setaceum, brevem, producta. (+) Flosculi subviolacei, pubescentes alterni, per paria magis approximati, secundi, eretti, subflorescentia discedentes. (c. C.).

B. D I G Y N I A.

* Flores uniflori, vagi.

PANICUM. G. P. 76.

Cal. 3 - valvis: valvula tertia minima.
S.N. 86.

39. *PANICUM, glaucum, spica tereti, involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus undulato-rugosis. Linn. S. N. 86. Spec. 83.*

H. in arvis am Dollberg; jam dudum repertum, nunc rarissimum Gramen. Floret Julio.

T. II. f. 2. ♀. Radix fibrosa, annua. Culmi pedales, eretti, foliatis, (†) quadrinodes, apice sulcati, laves. Folia latiuscula, (††) plana, levia: (†††) summo spi-

ca

† CULMUS:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Nudus - - - si basi tantum | } Foliorum Vaginis
vestitus. |
| 2. Subnudus - - si quarta pars inferior | |
| 3. Subfoliatus - ad medium usque | |
| 4. Foliatus - - si magna ex parte | |

†† LATITUDINEM Foliorum graminum determinavi:

1. Capillaria; Filiformia; Setacea; angustissima, lateribus involuis l. conduplicatis, supra sulco exarata.

2. Augustissima, Lineam dimidiam

3. Angusta - , Lineam unam

4. Subangusta - , Lineas duas

5. Latiuscula - , Lineas tres

6. Lata - - , Lineas quatuor

7. Latissima - , Semipollucem & ultra

†† Folia levia, omni scabritie pagina superiore & inferiore (nec marginibus) destituta.

*ca sape longiore. Ligulæ loco, Pili conferti, albidi, longi, in primis ex infimis vaginis longius prominentes. Vaginæ striata, leves. Spica sequentis: Flosculis in series dispositis, triplo majoribus, sub sessilibus, solitariis, geminisque, ♂ Setis demum flavis brevioribus, (b) quam in *P. viridi composita*. Calyx nervosus pubescens. (A. *.*.*.) Corolla *Calyce minor*. (c. C.) Petalum tertium ovatum, acutum, planum, (‡) inter Cal. valvulam planiorem, ♂ Corollæ valvulam interiorem; secundi flosculi forte rudimentum. Semen striis transversis, undulatis rugosum. (f. S.)*

40. PANICVM, *viride*, spica tereti, involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. Linn. Spec. 83. (Hall. 1542.)

H. in agris & arvis am Dollberg & Homberg frequens; in cultis am Sieghaus, rarius. Floret Julio, Augusto.

T. II. f. 2. Radix annua. Culmi 1 - 1 $\frac{1}{2}$ pedales, obliqui, foliati, trinodes, apice striati, scabri. Folia latifuscula, pagina superiore scabra. Ligulæ loco, series pilorum brevium, decurrentes. Vaginæ subcomprese, la-
ves. Spica ovato-cylindracea, in aequali crassitate, vi-
ridiss., uno latere sape subviolacea. Pedunculi brevis-
simi, Pedicellis vix conspicuis, nodoso-truncatis,
flosculos per paria (3 f. 4.) adfigentes. (y. b.) Sin-
gulum par Setis pluribus albidis f. violaceis, Floscu-
lis quadruplo longioribus involucratum. (b) Calyx
lævis. Valvula minor 3 - nervia; (*) huic oppo-
sita triplo major, margine tertiam amplectens, con-
vexa, 7-nervia. (**) tertia plana, 5-nervia.
(***) Semen nervosum nitidum. (f.) Petalum
Corollæ tertium in precedente, sequente, & *P. mi-*
lliaceo semper præsens, in hoc nullum.

41. PANICVM, *Crus Galli*, spicis alternis conju-
gatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis
hispidis, rachi quinquangulari. Linn. Spec. 83.
(Hall. 1544.)

β. Gramen paniceum spica divisa, aristis longis armata. Bauh. Pin. 8.

H. a., Flosculis vix aristatis, in cultis auf dem hinteren Land; **B.**, Aristis longissimis, humentibus locis an der Mühlbach, bey dem Sieghaus - Brückgen, frequens. Floret Julio, Augusto.

T. II. f. 3. Radix annua. Culmi 1 - 2 pedales, crassi, obliqui, suberecti, ramosi, Ramis floriferis, foliatis, apice nudi, laves: Articulis 3, s. 4, inferioribus divaricatis; Geniculis incrassatis, cylindraceis, fuscis. Culmi Folia latissima, plana, utrinque levia, marginibus hispida. Ligulæ loco, membrana brevis, triangularis, adnata, fusca. Vaginae laxæ, subcompressæ, fissæ, laves; inferiores acuta, aphylla. Rachis universalis linearis, planiuscula, scabra: subtus angulo unico vix eminente, duobus lateralibus acutioribus, & supra unico, sulco diviso, eminenteriori, pro ramorum insertione, instructa. Spicæ alterna, rarius conjugata, subsecunda, subdivisa, terminali simpliciore. Rachis. partialis trigona, subflexuosa, subdivisa: ad basin pilis fasciculatis, albidis, involucrata. Flosculi conferti, secundi: Pedunculis brevissimis, subdivisis, ad basin fasciculato-pilosis, (in var. B., manifestius.) (y. b.) adfixi. Calyx nervosus, pubescens, scaber; Valv. minor (*) & convexa (**) mucronata; Tertia plana aristata: (***) Arista terminali, scabra, recta, in var. a, brevi, (a. ***) X) in B., gluma decuplo longiore. (a. f. +) Petalum corollæ tertium membranaceum, planum, acuminatum, (c *) inter calycis valv. planiorem & cor. V. interiorem. (A. C *)

42. *PANICUM, sanguinale*, spicis digitatis basi interiore nodo his, flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. Linn. Spec. 84. (*Digitaria Hall.* 1526.)

H. in arvis arenosis hinter dem schloß; am Dollberg & Homburg, frequens. Floret Julio, Augusto.

T. II. f. 6. Radix annua. Culmi foliati, laves, Articulis tribus: inferioribus duobus procumbentibus, supremo obliquo longissimo. Ex Geniculis Rami floriferi. Folia latiuscula, brevia, sublanceolata, levia.

Ligu-

Ligula crenulata. Vaginæ subcompressæ, sanguineæ, laves, punctatae: punctis eminentibus, solitariis confertisque, setiferis, vix conspicuis. Spicæ 3-4 f. 5, lineares, alternae, brevissime pedunculate, Culmo inter spicas linearis-trigono, flexuoso, mediante callo axillari, pilifero, (*) inserta: ex vaginis erumpentes erectæ, parallelae; (†) florentes horizontales, terminali erecta. Rachis (y) linearis, subflexuosa, plana, scabra, supra nervo eminenti, pro Floscularum insertione instructa. Flosculi latere convexo Rachi adpresso, (y.) gemini, saepe ternæ in singulo dente, pedunculati: Pedunculo infimo, Flosculo breviore, secundo ejusdem longitudinis, tertio (si adest,) longiore. Calyx muticus, pubescens. (a A) Valv. minima (vix lente dignoscenda, sapissime omnino nulla,) triangularis, trinervia. (A*) Secunda huic opposita, obtusa, tertiam margine amplectens, subconvexa 5-nervia; Tertia plana, trinervia, acuta, subviolacea. Corolla calyce minor. (c. C) Stigmata purpurea. (o) Semen, rufum nitidum. (f. S.)

ALOPECURUS. G. P. 78.

Cal. 2 - valvis. Cor. univalvis. S. N. 89.

43. ALOPECURUS, pratensis, culmo spicato erecto, glumis villosis, corollis muticis. Linn. S. N. 89. Spec. 88. (Hall. 1559.)

H. in pratis ubique copiosissime. Floret Majo &c sequ.

T. II. f. 4. Radix multiplex, fibrosa, perennis. Culmi 1-2-pedales, erecti, trinodes, foliati, laves. Folia lata, levia. Ligula ovata, obtusa. Vaginæ laves, suprema longissima, ventricosa. Spica ovato-cylindrica. Flosculi imbricati. Rachis glabra. Pedunculi brevissimi, congesti, subramosi, tri-quadriflori. (†) Calycis Valvulae basi connate, hinc convexa, inde depressa, trinervia, pubescentes, acuta; carina pilis albidis, planis, flexuosis, patulis, ciliata. (A.) Cor. Valvula compressa, 5. nervia acuta, nuda, vix calyce brevior: Aristam juxta basin exserens

serens geniculatam, duplo longiorem (X c. C.)
Antheræ cerulescentes, flavæ, dein cinereæ. Robus
bonum prabet pabulum.

Variat: Culmo orgyali; Spica 4-5-pollicari, crassa,
 subinterrupta, Glumis majoribus, villosioribus; Pe-
 dunculis longioribus, multifloris. Ad ripas Dilla
 frequens. Floret serius Julio, Augusto.

44. ALOPECURUS, agrestis, culmo spicato erecto,
 glumis lœvibus. Linn. S. N. 89. Spec. 89. (Hall.
 1540.)

H. in agris inter Hordeum, am Galgenberg., rarius. Floret
 Junio.

T. II. f. 5. Radix annua. Culmus 1-1½ pedalis, ere-
 Etus, subtrinodis, foliatus, apice nudus, subscaber.
 Folia subangusta, supra scabra. Ligula obtusa. Va-
 ginæ carinali nervo scabra, superior subventricosa.
 Spica teres, gracilis, longa, lavis. Flosculi laxe
 imbricati, brevissime pedunculati, solitarii, gemini,
 terni. Pedunculi simplices s. indivisi. Calycis Val-
 vulæ nudæ, ultra medium basi connate, superne la-
 tiores, acuta, subviolacea, (a A.) carina setis bre-
 vissimis, erectis, ciliata. Cor. Valvula obtusa.
 (c. C.) Arista ex basi prodit duplo longior, geniculata,
 divaricata. Filamenta brevissima, basi lanceolata,
 (m*) sub florescentia calyce longiora, aequalia. (m)

45. ALOPECURUS, geniculatus, culmo spicato infracto,
 corollis muticis. Linn. S. N. 89. (Hall. 1541.)

H. in pratis udis, stagnis, & fossis aqua repletis, passim.
 Floret Junio & sequ.

T. II. f. 7. Radix fibrofissima, perennis. Culmi pedales,
 obliqui, adscendentes, foliati: Articulis 5-6, di-
 varicatis; in fossis & aquis quietis, tri-quadripe-
 tales, ramosissimi, Articulis, foliisque numerosiori-
 bus, natantes. Folia latiuscula, plana, pagina supe-
 riore scabra. Ligula oblonga, obtusa. Vaginæ subcom-
 pressa, laxa, laves, suprema spicam. saepe attingens,
 ventricosa. Spica cylindrica, florens ex viridi-vio-
 lacea. Flosculi densius imbricati, A. pratensis duplo
 mino-

minores. Pedunculi exigui, subramosi, 3 - 5 - florisi. (+) Calyx magis bians. Valvulae vix supra basin connatae, pubescentes, carina ciliata, marginibus repandis. (A) Cor. Valvula trinervia, nuda, obtusissima, crenulata. (c. C.) Arista geniculata, calyce sesquilongior. Antheræ violacea, exigue. (m) Styli basi connati. (N)

PHLEUM. G. P. 77.

Cal. 2 - valvis, sessilis, linearis, truncatus, apice bicuspidato. Cor. inclusa. S. N. 88.

46. PHLEUM, pratense, spica cylindrica longissima ciliata, culmo erecto. Linn. S. N. 88. Spec. 87. (Hall. 1528.)

H. in pratis humentibus frequens; Spica semipedali unter der neuen Brücke rarius, Floret Julio.

T. III. f. 1. Radix ramosa, perennis. Culmus 3 - f. 4 - pedalis, basi bulbosa, eretus, strictus, quadridnis, foliatus, laevis. Folia lata, patentia, pagina superiorē carinaque scabra. Ligula oblonga, obtusa, fissa. Vaginae striatae, levae, nervo carinali scabra. Spica saepe semipedalis exalte cylindrica, obtusissima. Flosculi densissime conferti, florentes divergentes. Pedunculi brevissimi, (per lentem) subramosi: Pedicellis vix conspicuis, basi confluentibus, bifloris. (+) Cal. Valvulae punctata, punctis setiferis, trinervia, compressa, cuspidata, Carina ciliata: setis albidis, patulis, flexuosis, alternis brevioribus, superioribus furcatis. (a A) Cor. Valvula exterior 5 - nervia, nuda, acutiuscula, crenulata. (C.) Nectaria duo, ovata, acuminata. (l. L.) Gerimen (n) basi ambientia. (L.) Antheræ violacea, dein cinerea. Equis gratissimum pabulum.

47. PHLEUM, nodosum, spica cylindrica, culmo ascendente, foliis obliquis, radice bulbosa. Linn. S. N. 88. Spec. 88. (Hall. 1530.)

H. ad versuras, auf dem Schlüssel; in campis sterilissimis, auf dem Homberg, & alibi frequens. Floret Julio:

T. III. f. 2. Radix ex Bulbis constat pluribus, concatenatis, tunicatis, fuscis, basi fibrosis. Singuli Bulbi Culinus solitarius, semi- & pedalis, vaginis foliorum obtectus, articulus infinitis 5 f. 6, divaricatis obliquis, reliquis 2 f. 3 longioribus, erectis. Folia bijaria, obliqua, angusta, utrinque scabra. Ligula truncata, semimultifida. Vaginae subcompressæ, subscabra, suprema spicam fere attingens subventricosa: Foliolæ brevi (saepe) ova-

*to - acuto, instruēta. Spica praecedentis, magis scabra, 1-1 $\frac{1}{2}$.
pollicaris; Solo sicciori ovalis, vix semipollicaris. (+). Floscu-
li duplo minores, (a A) infimi semper emarcidi steriles. Caly-
cis cuspides maturo tēmine magis incurva. (a. f.) Antheræ
albida, erumpentes rufa.
Graimen hoc solo cespitoso tinguiori transplantatum, subsequenti an-
no in P. pratenie transit.*

PHALARIS. G. P. 74.

*Cal. 2 - valvis; carinatus, longitudine æqua-
lis; corollam includens. S. N. 85.*

48. PHALARIS, *canariensis*, panicula subovata spi-
ciformi, glumis carinatis. *Linn. Spec. 79.*

*H. in cultis auf dem Schießplatz rarius, incerta civis exoticæ
originis. Floret Julio.*

T. VII. f. 3. +. *Calyx exterior membrana carinali auditus, cordo-
la major. (+. a.) Cal. interior etiam bivalvis, basin corolla
vestiens, minor, (a *). cum corolla pubescens. (c)*

49. PHALARIS, *arundinacea*, panicula oblonga ven-
tricosa ampla. *Linn. S. N. 86. Spec. 80.*

(Arundo. Hall. 1524.)

H. ad ripas Dille frequens. Floret Junio, Julio.

T. VII. f. 3. *Radix crassa, lignosa, fibrosa. Culinus orgyalis,
erectus, firmus, foliatus, 5-6 nodis, levius. Folia bifaria,
laevissima, plana, levia, superne verus apicem scabra; ad basim
utrinque aucta membrana cartilaginea, albida, acutiuscula. Li-
gula crenulata. Vagine striata levies. Panicula in spica for-
mam coarctata, semipedalis: florens ventricosa, mutica, va-
rie colorata. Pedunculi depresso-gemini s. terni: inferiores basi
coaliti, squamula acuta bracteati. Flosculi imbricati, secundi,
sub florescentia pedicellis brevissimis divergentes. Cal. Valvula
exterior paulo minor. (a A) Corolla basi pilosa. (c. C.) An-
theræ rubra. Styli basi connati. (N. O.) Nectaria 2, lan-
ceolato-acuminata, (l. L.) margine exteriore unidentata. Gra-
men nostratum fere maximum, ter metendum, ut gratius
evadat pecorisibus. Var. vivipara: Panicula spicata, Peta-
lis in foliola excrescentibus, saepe legi an der Dille.*

MILIUM. G. P. 79.

*Cal. 2 - valvis, uniflorus. Cor. brevissima.
Stigmata penicilliformia. S. N. 89.*

50. MILIUM, *effusum*, floribus paniculatis dispersis
muticis. *Linn. Spec. 90. (Hall. 1525.)*

H in sylvis, in der Hörre frequens. Floret Junio.

- T. VIII. f. 7. Radix fibrosa. Culmus 2 f. 3-pedalis, erectus, binodis, subsiliatus, latus. Folia latiuscula, plana, utrinque scabra. Ligula oblonga, truncata. Vaginae striatae, laves. Panicula semipedalis, laxa, patens. Pedunculi capillares, subramosi, flexuosi, ad basin nodosi. exiguis squamulis bracteatis, horizontales demum reflexi. Calycis valv. exterior ventricosior, latior: utraque trinervia, glabra. (a. A.)

AGROSTIS. G. P. 80.

Cal. 2-valvis, uniflorus, corolla paulo minor. Stigmata longitudinaliter hispida. S. N. 90.

a. Aristata.

51. AGROSTIS, spica venti, petalo exteriore arista recta stricta longissima, panicula pâtula. Linn. S. N. 90. Spec. 91. (Avena, Hall. 1480.)

H. inter segetes in der Aue, alibique copiose. Floret Julio.

- T. III. f. 1. Radix annua. Culmus 3 f. 4-pedalis, foliatus, quadrinodis, levis. Folia lata, paucula, pagina superiore pubescens, inferiore scabra. Ligula longa, truncata, fissa. Vaginae striatae, subscabrae. Panicula ampla, pedalis, patens, colorata, demum subnutans. Pedunculi verticillati, numerosi, patent, compressi, scabri. Calyx levis, apice scaber: (a A) Valv. exterior paulo brevior. Corolla V. exterior figura & magnitudine V. Cal. interioris: (C.) Aristam paulo infra apicem exferens rectam, quadruplo longiorem. (X) Nectaria ovata, acuta. (l. L.)

52. AGROSTIS, canina; calycibus elongatis, petalorum arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis. Linn. S. N. 90. Spec. 92. (Avena, Hall. 1479.)

H. in poinariis & pratis siccioribus hinter dem Schloß; in humidiorebus im Gieldners-Grund; & alibi frequens. Floret Julio.

- T. III. f. 2. Radix subrepens. Culmi 1-2 pedales, erecti, foliati, laves, infimis articulis procumbentibus, divaricatis; Geniculis 4 f. 5: ex inferioribus fasciatis, foliorum breves, saepe Rami floriferi. Folia radicata angustissima, longa, plana, levia: Culmea latiora, utrinque scabra. Ligula oblonga, fissa, prominens. Vagine levata, suprema longissima, scabra. Panicula elongata, coarctata; florens diffusa, e violaceo-purpureo, rascens, splendensque, demum pallescens. Pedunculi numerosi, capillares. Calycis V. exterior apicem versus hispidiuscula.

B 2

(a A)

(a A) Corolla calyce minor, dorso hispida, apice trifida. Ari-
sta ex dorso medio prodis, alba, recta, demum geniculo fuscō
reflexa, tortilis, (C.S.A.) Corolla duplo longior. Cor. V. in-
terior sapissime omnino nulla: Si adest, minutissima, apice retu-
sa; (C*) si deficit: Germen basi interiori adnatum, Ne-
ctariis 2, triangularibus antice cinctum. Antheræ caruleæ.

b. Mutica.

53. AGROSTIS, stolonifera, paniculæ ramulis paten-
tibus muticis, culmo repente, calycibus æqua-
libus. Linn. S. N. 90? Spec. 93? (Poa. Hall.
1473?)

H. in sylvis, locis umbrosis muscosis, im Beilstein; am Hom-
berg, frequens. Floret Julio.

T. III. f. 6. Culmi plures, erecti, tenues, infirmi, pedales: Arti-
culis inferiорibus divaricatis repentibus basi subbulbosa coha-
rentes, ramosi. Folia culmea angusta, plana, debilia, laxa,
plerumque emarginata. Ligula brevis, obtusa. Vagine laxa,
laves Panicula 2-3-pollucaris, laxa, divaricata, pauciflo-
ra, mutica. Pedunculi capillo fere tenuiores, horizontales,
recti. Pedicelli breves, undulato-divaricati. Floscui omnium
nostratium minimi, albidi. Calyx subequalis: V. exter dorso,
interior basi scabra. (A.) Cor. V. exterior calyce paulo bre-
vior, basi subpilosa, apice trifida. (C) V. interior $\frac{1}{3}$ bre-
vior. (C*) Totum gramen albescit. An Var. A. albæ?
an sequentis?

54. AGROSTIS, capillaris, panicula capillari patente,
calycibus subulatis æqualibus hispidiusculis co-
loratis, flosculis muticis. Linn. Spec. 93. (Poa.
Hall. 1475.)

H. in pomariis, pratis, & ad versuras passim. Floret Julio.

T. III. f. 3. Radix subrepens. Culmi obliqui, florentes erecti, fo-
liati, 3f. 4-nodes, 1f. 2 pedales. Folia latiuscula, utrinque
scabra. Ligula brevis, truncata. Vagine laves, plerumque
purpurea. Panicula 3-4-5-pollucaris, patens, e spadiceo-
purpurascens, demum pallidescens. Pedunculi verticillati, ca-
pillares, ramosissimi, patentes. Calyx equalis, mucronatus,
e violaceo-purpureo, albido-marginatus, nervis viridibus:
V. exterior dorso aenticulato toro, interior apice tantum hi-
spida. (A) Corolla calyce paulo minor, apice trifida, laxis.
(C) Antheræ albida. Hujus Varietatem viviparam annua-
tum legi; in montosis sterilibus am Homberg: Calycibus du-
plo majoribus; Corollis in foliola subulata excrescentibus. (+)

55. AGRO-

55. AGROSTIS, *alba*, panicula laxa, calycibus multicis æqualibus. Linn. Spec. 93? (Poa, Hall. 1475? Var. *major praecedentis*.)

H. in fossis, & locis fabulosis inundatis, auf der Bürgermeister Wiese; unter der neuen Brücke. Floret Julio.

T. III. f. V. Culmi 2-3 pedales, erecti, foliati, articulis pluribus, infimis repentebus, cohaerentes, ramosi. Folia latiuscula, utrinque scabra. Ligula oblonga, obtusa, prominens. Vaginæ levæ, internodia vix semitegentes. Panicula semipedalis, coarctato-parsula, mutica. Verticilli densi, subremoti. Pedunculi numerosi, suberecti, flexuosi, mutici: Pedicellis brevissimis, dicaricatis, copiosissimisque flosculis, ad basin confertioribus, unadique obrecti. Flosculi albidi, dein flavescentes. Calycis Vallucae sub anthesi horizontaliter discedentes. (A) Corolla erecta, subventricosa, apice trifida, Calyx brevior. (C.) Varietas Agr. *capillaris*.

56. AGROSTIS, *dubia*, calycibus æqualibus lœvibus, corollis infra apicem mucronatis, foliis setaceis. (Poa. Hall. 1476?)

H. in montosis apricis am Homberg. Semel jam dudum lectum. Floret Julio.

T. III. f. 4. Radix subrepens. Culmi pedales, adscendentes, erecti, subfoliati, binodes. Folia radicalia angustissima, setacea, apice scabra. F. culmea brevia, setacea, scabra, Vaginis levibus, Ligula obtusa. Panicula 1-2-pollicaris, angusta, subcoarctata. Pedunculi breves, solitarii, inferiores terni. Calyx spadiceo-virens, levus. (A) Corolla dorso scabra, apice bifida, mucrone brevi extante infra apicem instructa. (C) V. interior $\frac{1}{2}$ brevior, retusa. Var. Ag. canina?

DACTYLIS. G. P. 86.

Cal. 2 - valvis, compressus: altera valvula majore, carinata. S. N. 95.

57. DACTYLIS, *glomerata*, panicula secunda glomerata. Linn. Spec. 105. (Bromus. Hall. 1512.)

H. in pratis, & ad versuras passim. Floret Junio & seq.

T. III. f. 3. Radix multiplex, fibrosa, perennis. Culmi 2-3-pedales, erecti, foliati, quadridnodes, superne nudi scabri. Folia lata, patentia, subglauca, utrinque scaberrima. Ligula oblonga, obtusa, fissa. Vaginæ subcompressa, acute carinata, scabra. Panicula subspicata, coarctata, florens secunda, sepe colorata.

colorata. Pedunculi solitarii, alterni, angulati, firmi, subpubescentes, scabri, basi interiore nodosi, bis, ter bifidi: quorum inferior (rarius duo) remotior, longior, patens, densum horizontalis, subreflexus. Spicule subsessiles, geminatim glomeratae, oblonga, obtusissima, bi- (***) tri (****) rarius quadriflorae, (‡) adpresso, florentes divergentes. Calyx pubescens, saepe ciliatus, carinatus, scaber, subaristatus: hinc convexus latior, (†) inde depresso duplo angustior, (‡) corolla tenuior; V. interior duplo major, aristata, flosculos se duo adequans, si plures ipsa spicula brevior. Flocculi scabri, albidio-marginati, obtusi: Arista terminalis brevis, in ultimo flosculo brevissima, saepe nulla. (c.) Cor. V. interior vix brevior, apice acute bifida. (C*) Nectaria 2, lanceolato-acuminata. (L) Filamenta corolla duplo longiora. (m) Antherræ flava. Germen ovatum. (n) Stigmata plumosa. (o) Semen oblongum, sulco brevi sub apice notatum (S.) discedens. (c. f.) Durissimum dat pabulum; Equis vix pecoribus prodest. Canibus folia instante pluvia deglumentibus, vomitorium.

** *Flores biflori, vagi.*

AIRA. G. P. 81.

Cal. 2-valvis, 2-florus. Flosculi absque interjecto rudimento. S. N. 91.

a. *Mutica.*

58. AIRA, *cærulea*, panicula coarctata, floribus pendunculatis muticis convoluto-subulatis, foliis planis. Linn. S. N. 91. Spec. 95. (*Arundo*, Hall. 1518.)

H. in pratis humidis, oben im Fischuey - Grund. Floret Augusto.

T. III. f. 7. Radix subbulbosa; vaginis tunicata, fibras ex base emittens tenacissimas. Singuli Bulbi Culmus 1-2-pedalis, subfoliatus, unico geniculo juxta basin interceptus, dehinc longissime enodis, erectus, strictus, nudus, levius. Folia radicalia ultrapedalia, angusta: Culmea latiuscula, longa, plana, firma, striata, apicem versus involuta, lavia, supra marginibusque (saepe) subvillosa. Ligulae loco, series villorum brevium. Vaginæ striatae, laves. Panicula elongata, coarctata, tri-quadruplicaris. Calycibus bifloris; (1-2) humidiori & fertiliori solo saepe ultrapedalis. Calycibus 3-floris. (3) Pedunculi plures, longi, erecti, flexuosi, Pedicellis brevibus uni s. bifloris. Calyx inaequalis, corolla minor: Valvulis violaceis, uninerviis. (Aa) Corolla trinervia, violacea, marginibus involutis. (c C.) Stylos

Stylus inter flosculos, ex pedicello elongato, nudus., (y*) saepe
flocculo imperfecto instructus. (Y*) Nectaria duo, aice crenata.
l. L.) Anthere atro-carulea. Styli basi nudi, reflexi.
Stigmata plumosa, purpurea. (O) Semen oblongum, subfuscum. c. f.)

b. Aristata.

59. AIRA, cespitosa, foliis planis, panicula patente,
petalis basi villosis aristatisque: arista recta brevi.
Linn. Spec. 96. (Avena. Hall. 1487.)

H. in pratis copiosissime. Floret Junio, Julio.

T. III. f. 8. Radix multiplex, fibrosa Culni 3f. 4 pedales, erecti, stricti, subfoliati, binodes, laves. Folia plana, firma, subitus levia, pagina superiore epidermate plicato acutissimisque denticulis armato septemfalcata, omnium stratum scaberrima: Fol. radicalia angusta juniora conduplicata; Fcl. culmea latifuscula, patentia. Ligula oblonga, obtusa, supra bifida. Vaginae striatae, laves, Panicula pedalis, patens, subfusca, splendens. Internodia semitereta scabra. Pedunculi verticillati, basi in nodum coititi, angulati, ramosissimi. Calyx inaequalis. (a A) Corolla inferior basi nuda; (C. +) Superior minor, basi pilosa, (C. X) pedicellata, Pedicello demum elongato, supra calycem prominens. (C) Cor. V. exterior calycem brevior, 3 - s. 5-nervia, apice 3 - s. 5-fida, obtusa. (C) Arista ex basi prodit recta, corolla vix longior. (X) Nectaria 2, ovata. (L) Stylus inter flosculos, absque rudimento tertii. (C. y.*) Var. Calycibus tri & quadrifloris (3. 4.) saepe legi in pratis humentibus, hinter dem Elomberg. Serius florens, Augusto

60. AIRA, flexuosa, foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuosis. *Linn. Spec. 96. (Avena. Hall. 1486. var. β.)*

H. in sylvaticis montosis, muscosis Am Homberg rarius; am Beilstein, copiose. Floret Julio.

T. V. f. I. Radix ramosa, fibrosa, perennis. Culni 1 - 2 pedales, subfoliati, erecti, 2 - s. 3 - nodes, laves. Folia setacea: radicilla vaginis albidis nitidis, varie curvata, levia, culmea recta, subscabra. Ligula ovata, obtusa, bifida. Vaginae subscabrae, rufescentes. Panicula pauciflora. Pedunculi & Pedicelli gemini, angulati, divaricati, cum internodiis flexuosi. Glumae subfuscæ, nitentes. Calyx inaequalis. (a A) Flocculus inferior sessilis, superior brevissime pedicellatus; uterque albidus, 4 - nervius, basi pilosus, apice quadrifidus: (c. C.) Arista supra basin exserens rectam, dein geniculando reflexam, tortilem, (X c. f.) corolla paulo longiore. Valv. inerior vix brevior. (C*)

61. *AIRA, montana*, foliis setaceis, panicula angustata, flosculis basi pilosis aristatis: arista tortili longiore. *Linn. Spec. 96?* (*Avena - Hall. 1486. var. a.*)

H. in montosis apricis, *im Beilstein* copiose. Floret Junio.
T. V. f. 2. *Specimina mea certe præcedentis sunt varietates: Foliis radicalibus longioribus, erectis; Culmis aggregatis, purpureis; Panicula magis & pulchrioris colorata, splendente; Pedunculis rectis, nec undulatis; Floribus numerosoribus; Calycibus sub florescentia magis biantibus; Flosculis basi pilosioribus, (C e) longius aristatis, (C.S) vix differunt.*

62. *AIRA, caryophyllæa*, foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. *Linn. Spec. 97.* (*Avena. Hall. 1482.*)

H. in campis apricis arenosis, *in der Hörre*, versus Dreishach frequens. Floret Majo, Junio.

T. V. f. 7. Radix densa, fibrosa, perennis? Culmi dodrantales, erecti, foliati, binodes, laves. Folia radicalia setacea, vix ultra pollicaria, levia: plura basi in fasciculos subbulbosos, tunicatos, collecta. F. culmea setacea, brevia, recta, scabra. Ligula oblonga, bifida. Vaginæ scabra: suprema amplior, paniculam ante floresentiam basi obrvolvens. Paniculæ Pedunculi gemini, longi, Pedicellis brevibus. Calyx subinaequalis, albidus, purpureo-maculatus, nitidus. Flosculi 2, calye fere breviores, basi subpilosæ, apice subtrifidi, superior pedicellatus, distans. Utriusque Arista ex basi prodit, recta, purpurea, apice alba, subtortilis, (c. f.) vix calye longior.

MELICA. G. P. 82.

Cal. 2-valvis, 2-florus. Rudimentum floris inter flosculos. S. N. 92.

63. *MELICA, nutans*, petalis imberbibus, panicula nutante simplici. *Linn. Spec. 98. (Poa. Hall. 1472.)*

H. in sylvaticis montosis am Homberg; Beilstein; in rupibus am Geistlichenberg. Floret Majo.

T. III f. 4. Radix subrepens. Culmus 1-2-pedalis, erectus, compresso-tetragonus, tri-f. quadrinodis: ad basin squamis vaginantibus, alternis, acutis, fuscis, dein ultra medium usque Vaginis foliorum tetragonis, scabris, vestitus. Folia culmea 3 f. 4; quorum inferiora breviora, convexa, superiora subcarinata, latiuscula, pagina superiore pubescentia, marg-

*marginibus & partim carina scabra. Ligulæ loco,
margo brevis, membranaceus, fuscus. Panicula se-
cunda, subnudans: vel simplicissima, racemiformis,
pedicellis alternis, flexuosis, uni - s. bi - floris; vel
ramosa: Pedunculo uno alterove inferiore longio-
re, patente, 3 s. 4. floro. Calycæ valvulæ purpura-
scentes, albido - marginatae, (a A) exterior 3 - in-
terior 5 - nervia. Cor. V. exterior flavescens, 7-nervia.
(c. C) Nectarium monophyllum, horizontale,
orbiculatum, planum, foveola excavatum, pro Ger-
minis insertione. (l. L) Filamenta basi connata.
(n. N.) Antheræ flavae. (m) Germen obovatum,
turbanatum. (N) Styli infra medium nudi. Stig-
mata plumulosa. (o) Semen fuscum, hinc conve-
xum, inde sulco notatum. (f) Ex pedicello elonga-
to Stylus inter flosculos prominens, capitulo turbina-
to, (‡) seu tertii (sape & quarti) flosculi rudi-
mento, demum bivalvi, (‡*) terminatus.*

*** Flores multiflori, vagi.

BRIZA. G. P. 84.

*Cal. 2 - valvis, multiflorus. Spicula disticha:
valvulis cordatis, obtusis: interiore mi-
nuta. S. N. 94.*

64. BRIZA, media, spiculis ovatis, calyce flosculis
(7) breviore. Linn. Spec. 103. (Poa. Hall.
1448.)

H. in pratis, inque sylvis passim. Floret Junio.

T. VII. f. 2. Radix perennis. Culmus 1 - 3 - pedalis,
erectus, foliatus, bi - rarius trinodis, levis. Fo-
lia erecta, angusta, brevia, superiora utrinque sca-
bra. Ligula brevis, truncata, prominula. Vaginæ
laxes. Panicula triangularis pauci - (20 - 30) flora.
Pedunculi gemini, patentes, longi, violacei. Pe-
dicelli capillares, flexuosi. Spiculæ 7 - flore, ova-
to - cordata, glabre, nitidae, coloratae, nutantes,
tremulae, Cal Valvulæ 3 - nervia. (a) Corollæ
Valv. exterior calyce major, subviolacea, margine

B 5

albido,

*albido, scarioso ultra basin producto. (C) V. interior inclusa, minima, apice retusa. (C. *) Nectaria 2, oblonga, apice truncata, crenulata, margine exteriore unidentata. (L) Styli penduli, longi, basi nudii. (O) Semen binc excavatum. (S.) Spiculis minus coloratis albidis, 9 - 11 floris, saepe ludit in sylvis Am Homberg, & Beilstein.*

POA. G. P. 83.

Cal. 2 - valvis, multiflorus. Spicula ovata: valvulis margine scariosis acutiusculis.
S. N. 92.

65. *Poa, aquatica, panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. Linn. Spec. 98. (Hall. 1454.)*

H. ad ripas *Labna* circa Dietz. Floret Junio. Paniculam tantum examinavi; ipse gramen hoc nondum legi.

T. V. f. 5. *Paniculae Ramus. Panicula maxima. Pedunculi triquerrii, scabri, superne flexuosi. Spiculae ovato-lineares, subcompressae: inferiores 6-flora, superiores 7-9-10 flora. Cal. Valvulae uninervia, interior acutior longitudine corolla. Rachis lavis. (y) Cor. V. exterior obtusiflora, striata, nervis 7 parallelis, (per lentem) denticulatis. (c. C.)*

66. *Poa, trivialis, panicula diffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. Linn. S. N. 93. Spec. 99. (Confer. Hall. 1464. & 1468.)*

H. in montosis siccis am Dollberg, & Homberg; in muris urbis & pontis novi frequens. Floret initio Junii ad finem usque.

T. VI. f. 2. *Radix multiplex. Culmi numerosi, adgregati, paralleli, eretti, stricti, foliari, trinodes, laves; juxta basin Gemmæ purpurascentes ad genicula, pro futuro anno. Folia radicalia subangusta, plana, pagina superiore subscabra, demum involuta. Ligula brevis, truncata. Vaginæ laves, nervo carinali acutiusculo. Panicula 3-4-pollicaris, angusta, subdiffusa,*

diffusa. Internodia semiteretia, subscabra. Pedunculi scabri, inferiores terni, seu quini, paucis (5-7-9-) flari, pedicellis brevissimis. Spiculae triflorae quadriflora, ovato-lanceolata, spadiceo-purpurea, nitida, flosculis apice flavis, magis quam in reliquis tribus sequentibus coloratis, dorso & basi subvillosis. (c.C.) Nectaria lanceolata, saepe bifida. (L.) Antheræ flavescentes. Stylus inter flosculos nudus; in tri-quadriflorisque spiculis semper præsens. (Y.).*

67. *POA, angustifolia*, panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tenui. *Linn. Spec. 99. (Hall. 1460.)*

H. ad versuras, secus vias passim. Floret initio Maiji, ad finem usque.

T. VI. f. 3. *Radix repens. Culmi pedales, fertiliori solo 2-3-pedales, eretti, firmi, stricti, foliati, trinodes, laves. Folia radicalia eretta, longa, angustissima, pagina superiore subpubescentia, demum involuta, filiformia. Fol. culmea latiuscula, plana, obtusiuscula, firma, levia, subtus striata, glabra: nervo carinali in superioribus partim scabra. Ligula brevis, truncata. Vagina longæ, striatae, glabra. Panicula 3-4-5-pollicaris, triangularis, diffusa, ante & post florescentiam copiosissimis spiculis quasi imbricata. Internodia inferiora levia. Pedunculi inferiores plerumque quinque plures. Spiculae ovatae, acute, compressa, 4-flora, rarius 3 s. 5-flora, magnitudine valde variantes; (1. 2. 3.) Semper latiores, pallidius virentes, minus colorata nitentesque, quam in reliquis. Calyx corolla paulo minor. (a A) Flosculi basi & dorso valde villosi. (C.) Nectaria basi connata, gibba, apice brevi acuto. (L.) Antheræ erumpentes rubrae, mox demissio polline e viridi flavescentes. Flosculi maturo semine decidentes, villis coherent vagi, penduli. (f.) Stylus inter flosculos, (y*) si quini, nullus. Junio Mense Gramen hoc omne defloratum reperitur; Folia radicalia hinc inde enascentia, præcedentibus multo laxiora, brevioraque observantur.*

68. *POA,*

68. *Poa, pratensis*, panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Linn.*
Spec. 99. (Hall. 1462.)

H. in pratis nostratis infrequens; *Unter der neuen Brucke; an der Mühlbach, & alibi paucius occurrit.* Floret Julio ad finem usque.

T. VI. f. 4. Radix multiplex, subrepens. Culmi 3-4-pedales, erecti, stricti, firmi, foliati, s. f. 6-nodes. Folia radicalia pauca, emarginata. F. culmea latiuscula, plana, utrinque scabra. Ligula brevis, truncata, saepe fissa. Vaginæ striata, glabra. Panicula semipedalis, subdivaricata, mutica, scabra. Internodia teretia. Pedunculi longi, patentes, valde hispidi, inferiores quini s. seni. Pedicelli divaricati, breves. Spiculæ lanceolata, acute, compresse, margine acuto, 3-4-5-flora in eadem saepe panicula: angustiores, minus copiosa, magis distantes, magisque e luteo-virentes, quam in praecedentibus & sequente; deflorata subfuscæ, apicibus floscularum luteis, nitidis. Calycis valvulae irineriae, dorso scabre, exterior mucronata. (A) Floscui dorso & basi subvilloso. (C) Nectaria 2, apice bifida. (L.) Antheræ violacea, carulescentes, dein ochroleucae. Ex geniculis inferioribus saepe fasciculi foliorum breves, & Culmi serius florentes enascuntur. Paniculæ pars superior, uti racemi inferiores, ob tenuitatem & pondus spicularum, saepissime cernua, subnutans.

69. *Poa, dubia*, panicula diffusa, spiculis ovatis obtusis subtrifloris basi pubescentibus, vaginis foliisque subtus scabris. (*Confer. Hall. 1465.*)

H. in pratis humidiusculis ubique frequens; ad fossas; *an der Dilla, & Mühlbach copiose; etiam siccioribus locis gramineis per vulgaris.* Floret fine Junii in Septembrem usque.

T. VI. f. 5. Culni pars infima terram humidam profunde perforans, sub terra, & partim extra terram, Radiculas ex nodis emittit numerosas. Culmus supra

pra terram 3 f. 4-pedalis, erectus, foliatus, teres,
superne nudus, scaber. Geniculi 3 f. 4, subcylindra-
cei, scabriusculi. Folia radicalia emarcida. F. cul-
mea latiuscula, plana, pagina superiore subscabra,
inferiore marginibusque scaberrima. Ligula oblon-
ga, prominens, culmum semiobvolvens, obtusa, sepe
fissa. Vaginæ subcompreßa, striata, undique impri-
mis carinali nervo scabra. Panicula semi-sape peda-
lis, diffusa, patens: vel tota viridis, vel uno la-
tere tantum, vel tota e violaceo-nigricans. Interno-
dia teretia, subscabra. Pedunculi verticillati, longi,
angulati, patentes, flexuosi, subflorescentia hori-
zontales, recti. Singuli basis incrassato-callosa, cum
tulmi nodo coalita. Spiculæ exiguae, exakte ovata,
marginè & apice obtusissimæ, subnudantes, bi-
seu triflora. Flosculi obtusiusculi, basi & dorso villosi,
calyce. (A) paulo majores. (c. C) Nectaria 2,
triangularia, acuta. (L) Antheræ violaceæ, dein
tinereæ. Calyce diutius persistente, flosculi maturis
seminibus decidentes, villis coherent penduli. (c. f.)
An POA palustris Linn. Spec. 89? secundum de-
scriptionem Scheuchzeri plurimis notis convenit.

70. POA, annua, panicula diffusa angulis rectis,
spiculis obtusis, culmo obliquo compresso:
Linn. Spec. 99. (Hall. 1466.)

H. in cultis, ad vias passim. Floret Aprili in hyemem
usq[ue].

T. VI. f. 1. Radix annua. Culm semi- & pedales, decli-
nati, obliqui, compressi, foliati, binodes, laeves. Folia
latiuscula, plana, laevia, partim carinali nervo sca-
bra. Ligula oblonga, acuta, sape crenulata. Vaginæ
compressa, fissa, albido-marginata, laeves. Pani-
cula triangularis, patentissima, diffusa, subsecun-
da. Pedunculi gemini, angulati, laeves, horizonta-
les, dein subreflexi. Spiculæ ovato-lineares, com-
pressa, obtusissima, 3-4-5-flora, virentes, seu
in aliis ex purpureo-albido-viridi colore pul-
chre variegata. Flosculi basi subvillosi, margine api-
cem

- cem versus dentato-laceri. (C.) Nectaria 2, ova-
to-acuta, saepe bidentata. (L.)*
71. *Poa, compressa, panicula secunda coarctata,
culmo obliquo compresso. Linn. Spec. 101.
(Hall. 1455.)*
*H. in muris coemeterii, urbis, & pontis novi; in ar-
vis arenosis ubique frequens. Floret Julio, Augusto.*
- T.V.f.4. *Radix subrepens. Culmi pedales, declinati,
obliqui, adscendentibus, foliati, compressi; 4f. 5. no-
des, firmi, levibus. Folia angusta, erecta, plana, sub-
carinata, pagina superiore subscabra. Ligula obtusa.
Vaginæ compressæ, levæ. Panicula 1 - 2 - pollicaris,
coarctata, secunda. Pedunculi breves, gemini. Pe-
dicelli brevissimi. Spiculæ subsessiles, approximate,
lanceolato-lineares, acutiusculæ, 5 - 6, seu 7 - 9 -
floræ, saepe coloratae. Flosculi basi subvillosi. (C.)*
72. *Poa, nemoralis, panicula attenuata, spiculis
subbifloris mucronatis scabris, culmo incurvo.
Linn. Spec 102. (Hall. 1469.)*
*β. Gramen cirrhosa & villosa spongia, ad singula
genicula donatum, pániculatum alpinum. Schenckz.
Agr. 165.*
*H in dumetis am Homberg, & Geistlichenberg fre-
quens; β, in nemorosis im Beilstein, prope viam
publicam. Floret Julio.*
- T.V.f.3. *Radix subrepens. Culmi 1 - 2 - pedales, in-
firmi, foliati, 4-f. 5 - nodes, erecti, apice cum pa-
nicula antrorsum curvati. Folia angustissima, plana,
pagina superiore scabra. Ligula obtusa, brevissima.
Vaginæ subcarinata, inferiores subscabrae. Panicula
angusta, elongata, nutans, coarctata, sub florescen-
tia patens. Internodia scabra. Pedunculi subflexuo-
si, tenues, pauciflori. Spiculæ bi-rarius griflo-
re, dilute fusca, lutescentes. Calyx longitudine (†)
(si duo) floscutorum, mucronatus, scaber. (A)
Flosculi mucronati, scabri, basi subvillosi. (C)*
*Varietas major: Culmo tripedali, magis incurvo,
sæpe ramoso; Panicula majore, multiflora; Pedun-
culis*

culis pluribus, inferioribus quinis, s. senis, magis patulis; Spiculis tri - s. 4 - floris; annuum prove-
nit am Homberg. Poæ prætensi (meæ) nimis ad-
finis.

Varietas 3. Gramen omnibus partibus minus. Culmus
vix pedalis, erectus. Pasticula suberecta, fere race-
mosa, pauciflora. Spiculæ exigua, biflora, denuncio-
rufescentes. Flosculi plerumque steriles. Ex inferio-
ribus Geniculis, & quidem e culmi fissura, fibre
enascuntur numerosæ, purpurascentes, glomeratim
arcte implexæ, nodum & culmi partem undique
ambientes. (β) Non est insectorum opus. In his spon-
giolis, cultello sapissime examinatis, nunquam ve-
stigia ullius Insecti detegere potui, uti in Bedeguar
Rox. Vera sunt excrescentia fibrarum radicalium,
(+) a nimio succo nutritivo enata, quibus deciduis
Gramen forte propagatur.

73. Poa, cristata, panicula spicata, calycibus sub-
pilosis subquadrifloris pedunculo longioribus,
petalis aristatis. Linn. S. N. 94. *Aira cristata.*
Spec. 94. (*Festuca. Hall. 1444.*)

H. in montosis apricis siccis passim. Floret Julio.

T. V. f. 6. Radix multiplex, densa. Culmi 2 - 3 - peda-
les, erecti, stricti, subfoliati, basi subbulbosa Va-
ginitis albidis, aphyllis vestiti, bi s. trinodes, ultra
medium enodes, nudi, infra & inter paniculam subto-
mentosi. Folia radicalia angusta, plana, utrinque pubes-
centia, marginibus pilis albidis ciliata. Fol. cul-
mea latiuscula, plana, supra pubescens, subitus
nuda, marginibus scabris, subciliatis. Ligula bre-
vissima, truncata, subfuscata, subciliata. Vaginæ in-
feriores subvillosæ, superiores longa, nude, scabra.
Panicula florens spiculis divergentibus patula, ut
culmi internodia subtomentosa, & pedunculi visu
pateant: ante & post florescentiam in spicae for-
mam contracta, subcolorata, mutica. Pedunculi
breves, pubescentes, scabri, inferiores gemini s.
terni. Pedicelli brevissimi, alterni, inferiores tri-
flori.

flori. Spiculæ bi - tri - rarius quadriflorae. Calyx inaequalis, scariosus, compressus, carinatus, pellucidus, mucronatus, superficie punctatus (per lentem) punctis setiferis, carina scaber, subciliatus. (A) Flosculi longitudine calycis, subaristati, dorso scabri. (c. C.) Nectaria 2, apice latiori oblique truncata, crenulata, margine interiore unidentata. (L) Antheræ caeruleæ, dein flavae.

Variat. α. Panicula semipedali. β. Pedunculo inferiore uno alteriove longiore, horizontali. γ. Spiculis nudis, laevibus, forte Hall. 1445?

FESTUCA. G. P. 88.

Cal. 2 - valvis. *Spicula oblonga*, teretiuscula, glumis acuminatis. S. N. 96.

α. *Panicula secunda*.

74. FESTUCA, ovina, panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. Linn. Spec. 108.

α. Gramen foliis junceis brevibus majus, radice nigra, Scheuchz. Agr. 279. (Hall. 1442. α.)

β. Gramen capillaceum loculis pennatis non aristatis, Scheuchz. Agr. 276. (Hall. 1442. β.)

H. α, in collibus apricis aridis ubique; β, in monosis sterilibus, auf der Steinseite, & alibi frequens, Floret Majo.

T. VIII. Fig. 3. Radix densa, fibrofissima, nigra. Culmi palmares, dodrantales, erecti, striati, tetragoni, laeves, nudi, duobus geniculis fasciis, totidemque foliis setaceis, brevibus, ad basin instructi. Folia radicalia numerosa, brevia, setacea, subscabra. Ligula brevis, margine prominula. Vaginæ laeves. Panicula 1 - 2 - pollicaris, coarctata, secunda. Pedunculi solitarii; breves, uniflori, inferior 3 - s. 4 - floros. Spiculæ teretes, aristatae, subviolaceæ, pubescentes, florentes subdistichæ, (Fig. infer.) tri - s. quadrifloræ. Calyx exiguus, corolla brevior. (a) Flosculi apice aristati, pubescentes, dorso

dorso & margine scabri, saepe ciliati. Nectaria 2,
ovata, acuta. (L.)

Fig. 4. ♀. *β.* Panicula angustiore; Spiculis minoribus:
Flosculi muticis, differt.

Fig. 4. ♂. Varietatem hanc legi in sylvis in der Hör-
re: Folia radicalia copiosissima, filiformia, laevia.
Culmus fere pedalis, vix tetragonus, laevis. Pa-
nicula secunda, patula, minime contracta. Spicule
exiguae, viriæs, glabrae, muticæ.

Ovibus gratissimum pabulum.

75. *FESTUCA, duriuscula*, panicula secunda oblonga,
spiculis oblongis laevibus, foliis setaceis. Linn.
S. N. 96. Spec. 108? (Hall. 1437.)

H. in pascuis siccis auf dem Geistlichen Berg; & alibi frequens.
Floret Junio.

T. VIII. f. 2. Radix multiplex, densa, fibrosa, fusca. Culmi
1 - I $\frac{1}{2}$ pedales, erecti, stricti, teretes, subsiliari, binodes,
laeves. Folia radicalia filiformia, sulco exarata, suberigona,
scabra, uti culmi tenacissima. Folia culinea 2 1. 3, brevia,
lateribus conduplicatis setacea, demum planiuscula, angusta,
laevia. Ligula brevis, fusca. Vagina longa, laeves. Pani-
cula 3 - 4 $\frac{1}{2}$ pollicaris, angusta, oblonga, secunda. Internodia
angulata, laevia, dein flexuosa. Pedunculi solitarii, firmi.
Spicule 5 - 6. flora, oblonga, (+) sub florescentia disticha, (♀)
descendentis, panicula subnudante. Flosculi longius aristatis,
laeves, vix apice scabri, (C.) An vera?

76. *FESTUCA, rubra*, panicula secunda scabra, spi-
culis sexfloris aristatis, flosculo ultimo mutico,
culmo semitereti Linn. Spec. 109. (Hall. 1440.)

β. festuca foliis hirsutis latitculis, locustis panicula-
tis quinquefloris, aristatis, glabris. Hall. 1435.

H. α, in montolis sterilibus passim; β, in pratis ubi-
que. Floret Junio, Julio.

T. VIII f. 1. Var. β. Var. α. Radix multiplex, fibrosa. Culni I - 2-
pedales, erecti, stricti, laeves, binodes, inferne subsiliari, tere-
tes, superne longe nudi, altero latere ubi primarii pedunculi
prodeunt planiusculi, semiteretes. Folia radicalia setacea,
filiformia, subcompressa, scabra. F. culmea duo, subangusta,
plana, laevia, pagina superiori molissime albido-villosa. Ligula
obrusa, brevis. Vagina striata, laeves. Panicula patula,
secunda. Internodia semitereta, scabra. Pedunculi scabri,
pri-

primarii gemini, multiflori. Spiculae 5 f. 6. flora, pubescentes, scabra, defiorata cum culmo rufescentes. Flosculi aristati, ultimus semper imperfectus, sterilis, brevius aristatus. Nectaria duo germen cingentia, apice bidentata. (L.)

Fig. I. var. β. Culmis numerosioribus, aggregatis, tripedalibus; Panicula maiore, patente, subdiffusa; Spiculis 5-7-floris, majoribus, minus scabris, longius aristatis (C.) differt.

77. *FESTUCA, myurus, panicula spicata nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris, aristis longis.* Linn. S. N. 96. Spec. 109. (Hall. 1443.)

H. in arvis, & campis sterilibus, apricis, auf dem Homberg frequens; am Dollberg bey dem Graben rarius. Floret Julio.

T. III. f. 5. Radix fibrosa, annua. Culmi 1-1½ pedales; obliqui, foliati, trinodes, teretes. Folia radicalia paucia, brevissima, setacea, levia. F. culmea 3. f. 4, involuto-setacea, levia, vix apice scabra, superiora gradatim longiora. Ligula brevis, subbipartita. Vagina culmum undique vestientes, subangulate, striata, levae, subviolacea; superior longissima, amplior, paniculam attingens basi obvolvensque. Paniclea fere semipedalis, spicaformis, secunda, nutans. Internodia semiteretia, valde scabra. Pedunculi inferiores gemini 1. terni, erecti, spiculis alternis, subsessilibus; superiores solitarii, brevissimi. Spiculae 5-6 8-flora, disticha, scabrae, adscendentis. Calyx flosculis duplo minor. Valv. exterior minutissima. (a A) Flosculi striati, hispidiunculi: denticulis setaceis apice conseriobus, dorso marginibusque subciliati. Arista terminalis recta, tenuissima, scaberrima, demum subflexuosa, flosculo & ipsa saepe spicula longior. (C. c.) Panicula cum culmo, maturo semine, subrufescens.

Variat steriliiori solo: Culmo vix spithameo; Folio supremo a spica remotiore; Panicula spicata: Spiculis minoribus, distinctioribusque.

b. *Panicula aquatica.*

78. *FESTUCA, decumbens, panicula erecta, spiculis subovatis muticis, calyce flosculis majore, culmo decumbente.* Linn. Spec. 110. (Hall. 1434.)

H. in pascuis sterilibus am. Homberg rarius; in pratis depressis hinter dem Homberg; infra pagum Sinn, frequens. Floret Junio.

T. VII. f. 5. Radix densa, fibrosa, subrepens. Culmi 1-1½ pedales, basi subbulbos, foliati, trinodes, decumbentes; foliæ obliqui

obliqui, adscendentes. Folia radicalia longa, subangusta, plana, supra, in primis basi pilosa. F. culmea simillima, breviora. Ligula membrana brevissima, villosa, margine prominuta. Vagina striata, superne villosa. Panicula simplicissima. Pedunculi alterni, simplices, breves, uniflori; infimus longior, unico ramulo biflorus. Spiculae 5-6 f. 7, ovata, tumidiuscula, erecta, 3-4-rarius 5-flora, colorata. Calycis V. exterior saepe ipsa spicula longior; interior brevior, angustiorque. (a.) Flosculi basi pilosi. Valv. exterior 5-nervia, margine ciliata, apice obtusa, trifida; (c. C) interior plana, apice bi-saepe trifida. (C) Nectaria duo, obtusa. (l. L.) Flosculus ultimus teres, sterilis. (y. *)*

79. *FESTUCA, elatior, panicula secunda erecta, spiculis subaristatis: exterioribus teretibus.* Linn. Spec. 111. Poa. (Hall. 1451.)

H. in pratis fertilissimis copiose. Floret Julio & sequ.

- T. VIII. f. 6. - Radix articulata, profunde descendens, fibris ramosissimis subtomentosis, valde luxurians. Culmi 3 f. 4-pedales erecti, foliati, 3 f. 4-5 nodes, laeves. Folia patentia, lata, saepe involuta, supra subscabra. Ligula loco, margo brevis adnatus. Vaginae striatae, laeves. Panicula semipodalis: e vagina erumpens coarctata, nutans; florens patula, recta, secunda, pedunculis strictioribus divergentibus. Internodia semiteretta, scabra. Pedunculi gemini, compresi, semiteretes hispidi. Superiores solitarit. Pedicelli brevissimi. Spiculae teretes, rectae, seu varie curvatae, coloratae: florente compressae, exsiccatione distichae, squamosae, 5-6-sterilioris solo, 9-11-florae. Calyx corolla minor: (a) V. exteriore exigua. Flosculi mutici, saepe apice subaristati. (+) Nectarii duo, lanceolata, acuminata. (l. L.) Bobns et equis pabulum praebet praestansissimum. Variat sterili solo: Culmo vix ultrapedali; Panicula spicata: spiculis subsessilibus, alternis, patentibus, inferioribus geminis; forte HAL. 1452.

80. *FESTUCA, fluitans, panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis.* Linn. Spec. 111. (Poa. Hall. 1453.)

H. in fossis & aquis stagnantibus passim. Floret Junio & sequ.

Hujus Graminis (Mannæ) Semina, Schrubaden dicta, a nonnullis in cibum recipiuntur salidissimum.

- T. VIII. f. 5. - Culmi basis crassa, terram humidam profunde perforans, ex nodis gemmas, radiculosque emisit fibrosas. Culmi 3-4 pedales, foliati, compressi, 4 f. 5-nodes, laeves, inferne ramosi, obliqui, subrecti; in aquis stagnantibus natantes,

ses, rarius florentes. Folia latiuscula, plana, pagina superiorē subcabra. Ligula oblonga, acutiuscula. Vaginæ compressæ, laeves. Panicula saepe ultrapedalis, ramosa, patens, secunda. Rami & Pedunculi semiteretes, subscabri, erecti, sub florescentia stricti. exacte horizontales; in speciminiis natantibus, omnes erecti, minusque stricti. Spiculæ lineares, teretes, subcompressa, 7-9-11-flora, subsessiles; sub ipsa florescentia, axillares Culmo, rameae Ramo parallelae, adpressæ: superiores plures foliariae, alternæ, inferiores geminae; quarum una semper longius pedicellata, pedicello saepe bifloro. Calyx exiguus. (a. A) Cor. V. exterior septinervia, obtusiuscula, marginibus albidis, subrepandis, saepe laceris. (C.) Nectarium monophyllum, plano-concavum, margine incrassato, subemarginato, horizontaliuer antrosum a Germine dijedens. (L. L) Germen turbinatum. (N) Styli basi nudi. Stigmata penicilliformia, plumosa. (o) Equis et imprimis Suibus gratum prabet pabulum. Varietatem viviparam: Spiculis rachi elongata palmaribus, corollis germinibusque in foliola excrescentibus, saepe legi unter der neuen Brücke.

BROMUS. G. P. 89.

Cal. 2-valvis. Spicula oblonga, teres, disticha: arista infra apicem. S.N. 97.

81. *BROMUS, secalinus, panicula patente, spiculis ovatis, aristis rectis, seminibus distinctis.*
Linn, S. N. 97. Spec. 112. (Hall. 1502?)

H. in agris inter Secale,estate pluvia nimis frequens. Floret Junio, Julio.

T. XI. f. 2. Radix annua. Culmus 3 f. 4-pedalis, erectus, strictus, foliatus, laevis. Geniculi 4 f. 6, subglobosi, nudi. Vaginae fulcate, laeves. Ligula brevis, triangularis, subcrenulata, subfusca. Folia lata, plana, firma, pagina superiorē subvillosa, scabriuscula. Panicula semipedalis, patens, demum nutans. Internodia semitereta, nuda, laevia. Pedunculi longi, patentes, ramosi, compressi, scabri. Pedicelli flexuosi. Spiculæ ovato-oblongæ, teretusculæ, nudæ, 9-11-floræ, nutantes. Calyx (a A) & flocculi, subscabri. Cor. V. exterior 7-nervia, punctata, albido marginata, apice bifida. (c) Arista ex nervo medio dorsali, infra fissuram prodit crassiuscula, saepe subflexuosa, longituine corollæ. Nectaria 2, ovata, acuta. (L) Semina matura elongata Rachi, distincta. (c. f.) Hujus Semen corollæ adnasum, verum est Dors, seu Trespe germanorum; quod Secali immixtum, panem ingratum, amarumque reddit; Nec sequentis, (H. 1405.) qui inter Hordeum, nunquam Secale crescit.

82. BRO-

82. **BROMUS, mollis**, panicula erectiuscula, spiculis ovatis pubescentibus: aristis rectis, foliis molliissime villosis. *Linn. S. N. 97. Spec. 112.*
(*Hall. 1504.*)

H. in agris inter Hordeum; in ruderatis, secus vias, ubique frequens. Floret Junio & sequ.

T. XI. f. 1. *Gramen totum molle, albido-pubescentia.* Radix in arvis annua, locis desertis minus tritis, biennis. Culmi 1-2- pedales, erecti, foliati, superne subtomentosi; Geniculis tribus incrassatis, subcylindraceis, villosis. Folia latiuscula plana, 7-nervia, utrinque, supra magis, molliissime albido-villosa. Ligula brevis, semimarginata. Vaginae striatæ, inferiores villosæ. Panicula erecta, subcoarctata. Internodia compressa, subtomentosa. Pedunculi breves, erecti, depresso-pubescentes, simplices, uniflori, rarius biflori. Spiculae erectæ, ovatae, subcompressæ, pubescentes, 5-7-floræ. Valv. Cor. exterior apice acute bifida. (C) Arista tenuis, recta, corolla fere longior. Nectaria 2, ovata, obtusa. (L) Germen superne villosum. (N.) Styli infra apicem inserti, reflexo-patentes. (O) Semen corolla adnatum, (c. s.) excisacione duplo angustius, teretiusculum, uti in precedente.

Varietas in pratis sterilibus: Culmo vix spithameo; spiculis 3-4-floris, flavescensibus, levibus, duabus s. unica tantum ex apice culmi pendulis; primo aspectu diversissimum, tamen idem Gramen.

83. **BROMUS, sterilis**, panicula patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. *Linn. Spec. 113. (Hall. 1505.)*

H. ad margines agrorum, in arvis, ad sepes, auf dem Schiesplatz frequens. Floret Junio, Julio.

T. XI. f. 4. Radix annua. Culmi 1-2-3-pedales erecti, foliati, Geniculis 3-4, subcylindraceis. Folia latiuscula, plana, striata, basi subscabra, inferiora pagina superiore subvillosa. Ligula triangularis, denticulato-ciliata. Vaginae inferiores albido-vilosæ. Panicula semipedalis, patens, pauciflora (10-20) florum. Pedunculi longi, filiformes, patentes, compressi, hispidi, uniflori; inferiores quini, basi nodosi, uno alerore longiore, bifloro, pedicellis divergentibus flexuosis. Spicula magna, linearis-oblonga, nuda, scabra, septiflora, nutantes: (‡) sub anthesis disticha, ultimo flosculo brevius aristato, sterilis. Calyx & flosculi subangulati. (a. c.) Cor. V. exterior 7-nervia: nervis parallelis, viridibus, scaberrimis; albido-marginata, apice acutissime bifida. Arista infra fissuram C 3 prodit

prodit recta longitudine corolla. Nectaria 2, ovata, marginie interiore crenulata. (L) Semina rarius ad maturitatem perveniunt. (c. f.)

Variat Culino proceriori; Foliis latioribus, omnibus villosis; Panicula pedali, multiflora; Spiculis minoribus, brevius aristatis, undique pubescentibus, pendulis. (forse Hall. 1507?) intermedius quasi inter BROM. sterilem & tectorum. Habitat im Zuvinger frequens.

84. BROMUS, arvensis, panicula nutante, spiculis ovato-oblongis. Linn. Spec. 113. (Hall. 1509.)

H, ad margines agrorum, in der Aue; am Dollberg; alibi frequens, Floret Julio.

T, XI. f. 3. Radix annua. Culni obliqui, adultiores erecti, foliati, tri-f. 4-pedales: Geniculis, 3, incrassatis, interioribus subvillosis. Folia latiuscula, plana, pagina inferiore marginibusque scaberrima, superiore albido-villosa. Ligula acutiuscula, multifida. Vaginae striatæ, villosa, superiores subnuda. Panicula sere pedalis. Pedunculi longi, filiformes, compressi, hispidi, basin nodosi; vel simplices, unijiori; vel pauciores ex infimis jubramos, bis f. triflori: Pedicellis longis, flexuosis, ad ramifications nodosis, folioloque brevi, subulato, (sape) bracteatis. Spiculæ longa, ovato lineares, teretiusculæ, 7-9-10+ flora, nutantes, colorata: hinc griseo-viridescentes, inde spadiceo-purpurea, glabra, (per longem) pubescentes. Arista corolla paulo longior, recta. Nectaria 2, ovata. (L) Antheræ rubra dein flava.

Variat spiculis minoribus, magis coloratis, (+) pubescentibus. Confer. Hall. 1503?

85. BROMUS, tectorum, panicula nutante, spiculis linearibus. Linn. Spec. 114. (Hall. 1508.)

H, in collibus siccis, am hohlen Weg, bey dem dicken Thurm; in muris pontis novi; et alibi frequens. Floret Majo.

T, X. f. 2. Radix annua. Culni spithamei f. pedales, tenuis, erecti, folia i., tri-f. quadrinodes; deflorati terra incumbentes, rufescentes. Folia angusta, plana, pagina inferiore pubescentia, superiore albido-villosa, marginibus versus basin ciliata. Ligula truncata, similiuscula. Vaginae inferiores villosa, rufescentes. Panicula ex vagina erumpens erectiuscula, demum nutans, secunda. Pedunculi capillares, laxi, cum internodiis pubescentes, scabri, inferiores quini. Spiculæ pendula, linearis oblonge, pubescentes; quinqueflora; maturo semine, flosculis apice divergentibus subsquarroso. (c. l.) Flosculi superiores plerumque steriles, Arista longitudine corolla, tenuissima, recta.

86. BRO-

86. *BROMUS, giganteus, panicula nutante, spiculis quadrifloris: aristis brevioribus.* Linn. Spec. 114.
(Hall. 1510. & forte 1506? secund. Descr.)

H. locis umbrosis humentibus, ad sepes im Winkel bey dem Klingelborn; an der Mühlbach bey dem Sieghaus-Brückgen; & alibi frequens. Floret Julio.

T. X. f. 1. Radix perennis. Culmus fere orgyalis, erectus, firmus, foliatus, lavis; Articulo supremo longissimo; Geniculis quatuor, incrassatis, fuscis. Folia longa, latissima, plana, basi utrinque membrana cartilaginea, acuta, anata; pagina superiore, & apice inferioris scabra. Ligula brevissima, truncata, fusa. Vaginae sulcate, subcompressa, inferiores scabrae. Panicula ultrapedalis, nutans. Internodia longa, levia. Pedunculi ad singulum nodum gemini, patentes, longi, angulo-compressi, scabri, ultra medium indivisi. Spiculae teretiusculae: florentes lineari-lanceolata, subcompressa, demum oblonga; (+) tri quadriflora, in nostrate sepissime 6-7-flora. Calyx corolla minor, mucronatus, (a) valvula exteriore exigua. Cor. V. exterior 5-nervia, albido-marginata, apice, subfusca. Arista infra apicem prodit capillo tenuior, subflexuosa, longitudine corolla, saepe tota spicula longior. (c. C.) V. interior lanceolata, (C*) longitudine exterioris, saepe longior. Nectaria 2, lanceolata, acuta. (L 1) Semen hinc convexum, inde planum, subexcavatum. (f)

87. *BROMUS, pinnatus, culmo indiviso, spiculis alternis subsessilibus teretibus subaristatis.* Linn. S. N. 98. Spec. 115. (*Triticum. Hall. 1431.*)

H. in montosis sylvaticis am Homberg, & alibi copiosissime. Floret julio.

T. X. f. 3. Radix multiplex, teres, articulata, squamata, fibrosa. Culmus tri-f. quadripedalis, erectus, strictus foliatus, superno lavis; Geniculis tribus subvilloso. Folia flavo-viridia, lata, plana, medio latiora, supra, subsus, marginibusque subpilosa. Ligula brevis, obtusa. Vaginae striata, mollissime villoso. Spica terminalis. Receptaculum subflexuosum, denticulos remotis spiculas adfigens. Spiculae novem, alterna, bifaria, teretiusculae, pubescentes, 9-11-13-flora: Superiores sessiles, inferiores brevissime pedunculatae; ante & post florescentiam erectae, commissuris glumarum f. latere planiusculo Receptaculo adpresso: florentes horizontales, (+), f. ad angulum rectum a receptaculo discedentes; terminali semper erecta, directione lateribus contraria, (‡) uti in Triticeis. Calyx & Flosculi striati, pubescentes, margine subciliati. (a. c.) Arista terminalis, recta, brevis, maturo semine longior. (c, f.) Nectaria 2, api-

2, apicem versus latiora, oblique truncata, multiflora - ciliata
(L. L.) Antheræ flavae. Styli cum apice Germinis roti villosi (N. O.)

AVENA. G. P. 91.

Cal. 2 - valvis, multiflorus: arista dorsali contorta. S. N. 99.

88. AVENA, elatior, paniculata, calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito subnutico, masculo aristato. Linn. S. N. 99. Spec. 117. (Hall. 1492.)

H. in pratis, pomariis, ad sepes, ubique frequens.
Floret Junio & sequ.

T. X, f. 4. Radix perennis. Culmus fere orgyalis, erectus, foliatus, quadridnis, laevis. Folia lata, striata, plana, supra subvillosa, utrinque scabra. Ligula brevis, truncata, fissa. Vaginæ striatae, laves, inferiores subvillosa. Panicula semipedalis & longior, coarctata, nitida; florens patula, subnutans. Pedunculi tenues, primarii squamula acuta, brevi, involucrati. Calyx tenuis, pellucidus, mucronatus, coloratus. (a A) Flosculi duo, subaequales, vix calycem superantes: (1. 2. 3.) quorum inferior Malculus, sessilis; (♂) superior Hermaphroditus subpedicellatus: (♀) uter que basi pilosus, septinervius, coloratus, muticus. Masculi Valv. exterior supra basin aristata: Arista colorata, geniculo tortili, flosculo duplo longiore. (♂. x) Nectaria duo, exigua. (♂. L.) Germen minimum. (♂. n.) Styli brevissimi, villosi. (n. ♂) Semen abortiens. (♂. c. f.)

Hermaphroditæ arista sub apice prodit brevissima, retta. (♀x*) Nectaria duo, linearis-lanceolata, acuminate, (L. L. ♀) germine longiora. Stamina iria utri in Mare. Germen obovatum, apice villosum. (♀. n.) Styli roti villosi, erecti insculpi, (n. ♀) demum patent. (L. m.) Semen compressum, acutum, sulco notatum, (♀. f.) Colla adnatum. (♀. c. f.)

Bobus ♂ equis bonum præbet pabulum. Gallorum Fromental; Anonnullis perperam Raygrals dictum, quod Lol. perenne.

Variat;

- Variat:** *a.* Radicalibus fibris nodosis. Linn. var. *B.*
Hall. a.
- B.* Flosculo Hermaphrodito & Masculo, inermi, s.
 utroque arista destituto. (2)
- y.* Arista in utroque flosculo longiore. (3)
- d.* Arista in Hermaphrodito nulla.
- 89.** AVENA, *dubia*, paniculata, calycibus subtrifloris :
 flosculo infimo terminali arista recta ; reliquis
 apice biaristatis, dorsali arista reflexa.
- H.** in collibus siccis, apricis, in arvis sterilibus passim.
 Floret Junio.
- Gramen mihi dubium. An AVENA *Loefftingiana*,
 LINN. S. N. 99. Spec. 118? cum LINNAEI
 Charactere specifico non exakte convenit, nec in
 Scbeuchzero, nec HALLERI Opere, simile Gramen
 detegere possum.
- T. IX. f. 3.** Radix fibrosa, annua. Culmi spithamei,
 rarius pedales, erecti, foliati, tenues,
 leves ; tribus Articulis, supremo longissimo, Geniculique fusco-purpureis intercepti. Folia radicalia
 paucia, brevia, angustissima, striata, plana, nuda.
 Folia calmi conduplicato-subulata, subscabra. Ligula
 oblonga, acuta, subbifida, longe prominens. Vaginæ teretes, striatae, leves, inferiores rufescentes, superior
 triplo longior, ampliorque. Panicula pauciflora, flo-
 rens patens. Internodia teretia, subscabra. Pedun-
 culi filiformes, longi, patentibus, subscabri, simplices,
 uniflori, pauciores biflori, rarius terminali similes,
 triflori ; Glumis apicem versus alternatim pedun-
 culo adpressis, subfessilibus : Pedicellis exiguis, val-
 de incrassatis. Glumæ oblongæ, subteretes, albidae,
 subfuscæ, maculis sanguineis nitentes, bi-(+) rarsus
 triflora : (+) Flosculis omnibus fertilibus. Cal. V.
 exterior 5-nervia ; interior duplo major, 7-nervia :
 nervis parallelis, viridibus, scabris ; utraque
 acuminate, albido-marginata. (a A.)

Flosculus inferior (1) sessilis, basi nudus, (I. C. *)
 longitudine calycis. Cor. V. exterior teres, subulan-

*ta, 5 - nervia, punctata; Arista terminalis, recta longitudine corollae. (1) Valv. interior duplo brevior, plana apice bifida. (c. C. *)*

Flosculus superior (2) brevissime pedicellatus, basi pilosus, (2. C. y.) priori similis, at apice & dorso aristatus; (2. C.) Aristæ terminales duæ, capillo tenuiores, rectæ, parallelae, longitudine corollæ; (2-3.) Arista dorsalis paulo supra medium prodit, geniculata, tortilis, gluma duplo longior. (‡) Styli inter flosculos; in glumis bifloris, nudus, in trifloris: tertio flosculo, secundo simillimo, apice & dorso aristato, instructus. (3) Singuli Flosculi Stamina tria; Antheræ ochroleucae, exiguae; (in M) Nectaria duo, ovatae; (L.) Germen obovarium; (in N.) Styli roti villosi; (O) Semen corollæ adnatum, (c. l.) teres, acutum, hinc sulco notatum. (f.)

90. AVENA, *fatua*, paniculata, calycibus trifloris, flosculis omnibus basi pilosis: aristis totis lœvibus. Linn. Spec. 118. (Hall. 1491.)

H. in agris, vitium per vulgare, inter segetes nimis frequens. Floret Junio, Julio.

Eradicatur 1) Stipulis accensis, requiescente diutius agro, & arando post germinationem. LINN.

2) Repetita per plures annos seminatione graminum perennantium. SCHREBER.

T.IX.f. 4. Radix annua. Culmus 3 f. 4-pedalis, erectus, firmus, foliatus, quadridnis, lavis. Folia latissima, longa, striata, undique scabra. Ligula obtusa, fissa, brevis. Vaginæ striate, laves. Panicula pedalis, patens. Pedunculi filiformes, patentes, compressi, s. abri, uniflori, rarius biflori, inferiores quini; solo fertiliori plures, ramosiores, multisflori. Glumæ subtriflora, nutantes. Calyx flosculis major: V. exterior 9-nervia, interior 11-nervia. Rachis pilosa. (y) Flosculi basi et dorso pilosi, (c) 7-nervii, dorso scabri, acuminati, apice laceri; tertio duplo minore, (c. 3.) sape deficiente: Singuli Arista

Arista dorsalis, geniculata, reflexa, tortilis, lavis,
(per lentem scabra,) (X. O.) flosculoduplo longior.
Nectaria 2, ovato-acuminata. (L.) Semen pilosum. (c. f. s.)

91. *AVENA, pubescens, subspicata, calycibus subtropicis,*
basi pilosis, foliis planis pubescentibus.
Linn. S. N. 99. Spec. 1665. (Hall. 1498.)

H. in pratis siccioribus an der Dille, am Sieghause;
& alibi frequens Floret initio Junii.

T. IX. f. 2. *Radix substolonifera. Culmi pauci, 3 - 4 - f. 5*
pedales, erecti, foliati, laves, geniculis tribus sub-
rotundis. Folia radicalia angusta, plana, su-
pra, subitus, marginibusque pilosa. Fol. culmea
latiuscula, obtusa, utrinque tactu mollia, pube-
scentia, marginibus praesertim carinali nervo scabra:
supremo brevissimo, nudo. Ligula magna, obtusa,
subcrenulata. Vaginæ teretes, striata, laves, infe-
riores villosæ, Panicula semipedalis, coarctata; flo-
rens patula, multiflora. Internodia teretia, lavia.
Pedunculi tenues, compressi, scabri, 1 - 2 - 3 - flori,
inferiores quini. Glumæ tri-rarius bifloræ, albi-
do-purpurascentes, nitida. Calyx acuminatus.
(a) Rachis pubescens. (y) Flosculi bali valde
pilosæ, (c. y.) 5-nervii, apice laceri, multifidi,
calycis longitudine. Aristæ dorsalis, albido-violacea,
demum tortilis, unicolor, subfuscæ. Nectaria 2,
apice oblique truncata, tridentata, (L.) longitu-
dine Germinis. Semina rarissime ad maturitatem
perveniunt. (f.)

92. *AVENA, pratensis, subspicata, calycibus quin-*
quefloris. Linn. S. N. 99. Spec. 119. (Hall.
1499.)

H. in montosis sterilibus, & collibus apricis passim.
Floret medio Junii.

T. IX. f. 1. *Radix multiplex, lata spatia occupat val-*
de luxurians. Culmi numerosi, tripedes, erecti,
stricti, subfoliati, s. ultra medium nudæ, rufelcen-
tes,

tes, scabri : Geniculis duobus basi propioribus. Folia radicalia numerosa, longa, angusta, plana, nuda, marginibus scaberrima; dein involuta s. conduplicata, filiformia, extus lœvia, Vaginis basi scabris. F. culmea angusta, brevia, plana, obtusa, supra incana, scabra, subtus lœvia: omnia uti radicalia, apice purpurea. Ligula oblonga, sub. nulla. Vaginae subcompreßæ, scabré, purpureo-maculatæ. Panicula spicata, contracta, pauciflora. Internodia semiteretia, subflexuosa, scabra. Pedunculi breves, compressi, stricti, hispidi, simplices, alterni, uniflori, culmo adpressi, sub florescentia ad angulum acutum discedentes; inferiores gemini, uno longiore bifloro. Glumæ 5 floræ, rarius triflora, magis colorata, scaberrimæ, praecedentis majores. Calyx flosculis paulo brevior. (a) Flosculi basi subpilosæ, (c. y) apice acuto, bifido. (c) Arista dorsalis longior, (x) inferne tetragona recta, versicolor: dein tortilis, albo nigroque colore variegata. Nectaria 2, lanceolata, acuminata, germine longiora, (L.) margine exteriore unidentata. Semen fuscum, sape abortivus. (c. f.)

93. AVENA, *flavescens*, panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. *Linn. Spec. 118. (Hall. 1497.)*

H. in pratis & pomariis frequens. Floret Junio & sequ.

- T. X.f. 5. Radix perennis. Culmi 2-3 pedales, erecti, foliati, leves: Geniculis tribus, subvillosis, remotis. Folia latiuscula, pagina superiore subvillosa. Ligula brevis, truncata, subcrenata. Vaginae subvillosæ. Panicula *flavescens*. Pedunculi verticillati. Calyces bi-tri-rarius quadrisfiori, ultimo flosculo semper sterili. (a) Flosculi calyce paulo longiores, basi pilosi, apice bifidi: Arista dorsalis, tenuiss., flosculo longior. (c. C.) Nectaria ovato-lanceolata. (L.) Semen *flavescens*. (c. f.)

Variat.

Variat in sylvis : Panicula angustata, coarctata, calycibus (*Majo*) bifloris, (*Julio*) 3- & 4-floris.

Varietatem Viviparam legi singularem unter der neuen Brücke: Panicula spicata, squarrosa, germinibus in fasciculos foliorum excrescentibus villosos, undique divergentes.

ARUNDO. G. P. 92.

Cal. 2. valvis. Flosculi congesti, lana cineti.
S. N. 100.

94. ARUNDO, phragmitis, calycibus quinquefloris, panicula laxa. Linn. Spec. 120. (Hall. 1515)
H. ad ripas Labne, circa Dietz. Floret Julio, Augusto.
T. VII. f. 1. Panicula pedalis, laxa. Pedunculi verticillati, numerosi, angulati, scabri. Spiculae quinqueflora, rarius 4-6-flora. Calyx inaequalis: Valvulis trinerviis, muticis; exteriore duplo fere minore. (a) Cor. Valv. exterior uninervia, subulato-mucronata, Calyx longior; (c. C) Valv. interior triplo brevior, plano-concava, apice retusa. (C*) Semen villis (†) longitudine corolla cinctum. (l) **** Flores multiflori, insidentes receptaculi elongati dentibus.

TRITICUM. G. P. 99.

Cal. 2. valvis, solitarius, subtriflorus. Flos obtusiusculus, acutus. S. N. 102.

95. TRITICUM, repens, calycibus quadrifloris subulatis acuminatis, foliis planis. Linn. S. N. 102. Spec. 128. (Hall. 1426.)
H. in agris & cultis nimis frequens. Floret Julio. Pharm. GRAMINIS Radix. Verno tempore colligenda.

- T. XII. f. 3. Radix maxime repens. Culmus bipedalis, eretus, foliatus, trinodis, levis. Folia latiuscula, plana, viridia, basi utrinque membrana aucta, supra pubescentia. Ligulae margo brevis, truncatus. Vaginae levae. Spica palmaris. Receptaculum flexuoso, alternatim hinc convexum, inde excavatum, scabrum,

scabrum, dentibus interceptum. (V) Spiculae tri-
s. quadriflora, sessiles, latere plano receptaculo ob-
versa: terminali lateralibus directione contraria.
Calycis Valvulae subaequales, (a) 5-nervia, acu-
ta. Cor. V. exterior 5-nervia, punctata, mucro-
nata. (c) V. interior plana, marginibus inflexis,
*ciliatis, apice bifida. (c. *) Nectaria ovato-lan-*
ceolata. (l. L) Antherae rubra, dein flavae. Semen
discedens. (c. f.)

Non amplius dubitandum, quin hujus Radix sit antiquorum vera GRAMINIS RADIX dulcis, homines pecudesque alens.

ELYMUS. G. P. 96.

Cal. lateralis, 2-valvis, aggregatus, multi-
florus. S. N. 100.

96. ELYMUS, *caninus*, spica nutante arcta, spiculis rectis involucro destitutis: infimis geminis.

Linn. Spec. 124. (*Triticum Hall. 1426. var. 3.*)

H. ad sepes passim. Floret Julio & Ieq.

Gramen nostrum paucis notis a Tritico repente diversum, certe ejusdem Varietas est constans Perill. LINNAEUS olim ipse vocavit: *Triticum calycibus subulatis quadrifloris aristatis. Spec. Pl. Edit. 1. p. 86.* Ob Raides maxime repentes, nostrum non est *Triticum HALL. 1429.*

T. XII. f. 4. II. Radix praecedentis. Culmi 4-5-pedales, erecti, foliati, quadrinodes. Folia latiora, glaucescentia, supra subpubescentia, marginibus scabrioribus, magis basi auriculatis. Spica 5-6-pollicaris; ob tenuitatem Receptaculi, & pondus spicularum, maturo semine, ultra medium usque nutans. Spiculae maiores, oblonga, teretiuscula, minus disticha, aristata, in primario dente saxe geminæ: (+) Calyx ideoque duplex s. tetrphyllus, (a. +) subaristatus. Flores praecedentis: Arista terminalis recta, longior tundine gluma seu brevior; Cor. Valv. interior magis ciliata (t) Nectaria basi hemisphaerica. (L) Antheræ flavæ. In reliquis cum Trit. repentes exakte convenit.

T. XII.

T.XII. f. 4. I. Hanc Varietatem legi locis incultis am
Homberg. Radix multiplex, densa, vix repens.
Culmi aggregati, erecti, stricti, orgyales, crassitie
inferne digitii minoris. Folia latissima, glauca, sca-
berrima, nuda. Spica fere pedalis, pollicis inferne
crassitie, stricta, semper erecta, nec absoluta flore-
scens nutans. Spiculae majores, approximatae, di-
stichae, 7-9-florae, aristatae: superiores solitariae, in-
feriores ad spicam medium usque geminae, infime sape
teretae. In reliquis notis a priore non diversum. In
hortum transplantatum, in sequenti anno in priorem
transfuit, ob Radicem valde repentem vix eradicandum.

LOLIUM. G. P. 95.

Cal. i - phyllus, fixus, multiflorus. S. N. 100.
97. LOLIUM, perenne, spica mutica: spiculis com-
pressis multifloris. Linn. Spec. 122. (Hall. 1416.)
β. Gramen loliaceum, spica lata ex plurimis spicis dupliciti
versu dispositis constante. Schenckz. Agrost. 29.
Hall. var. γ, l. c.

H. in pascuis, pratis, ad vias passim; β. ad versuras
in der Aue, infrequens. Floret æstate.

T.XII. f. 1. Anglorum verum est Ray - Graß. Gramen
hoc pro cespite denso æqualique aptissimum, re-
petito & junius demessum, Bobus optimum præ-
bet pabulum. Radix multiplex, densa, fibrofa, per-
ennis. Culmi obliqui, florentes erecti, 1 s. 2. peda-
les, foliati, trinodes, laves. Folia radicalia angu-
stissima, plana, levia; culmea angusta, plana, supra
scabra. Ligula truncata, multifida. Vaginæ laves.
Spica 6-9-pollicaris, plana, disticha. Receptaculum fle-
xuofsum lave: hinc alternatim convexum, inde excavata-
tum, dentibus interceptum. (V) Spiculae alternae, com-
presso-planæ, distichæ, 7-9-11-floræ, laves: vel lanceola-
tae, calyce longiores; vel rhomboidea, longitudine caly-
cis. Calyx monophyllus: (a) (terminalis spicule diphyll-
lus, subæqualis,) (a*) Gluma nervosa, mutica, levia,
(a) Receptaculo excavato, alterius Valvulae vicem
gerenti, opposita. (a, fig. infer.) Cor. V. exterior
§ - ner-

5-nervia, mutica, calyce minor. (c.) Nectaria duo, ovata, obtusa. (l. L.) Semen discedens. (c. s.)

T. XII. f. 1. ♀. Var. ♂. Spicæ Receptaculo differt ramo: Ramis spicatis; Spiculis magis approximatis, 11 - 13. floris. ad basin singuli rami geminis.

98. LOLIUM, temulentum, spica aristata, spiculis compressis multifloris. Linn. S. N. 100. Spec. 122. (Hall. 1420.)

H. in agris, inter Hordeum nimis frequens. Flores Junio, Julio.

Gramen inter omnia unicum noxium. Semen temulentos vertiginososque reddit Homines; magis adhuc in pane calido, potissimum in potu cerevisia. Etiam equis, canibus, suibus, aliisque animalibus noxium, saepe lethale.

T. XII. f. 2. Radix annua, fibris subtomentosis. Culmi 2-s. 3 pedales, erecti, firmi, foliati, tri-nodes, scabri. Folia lata, plana: pagina superiore scabra, inferiore glabra. Ligula brevis, subcrenulata. Vaginæ striata, scabra. Spica semi-s. pedalis, plana, disticha. Receptaculum precedentis, crassius, firmiusque, scabrum. Spiculæ alterne, linearis-oblongæ, compressæ, scabre, aristata; in eodem plano cum culmo, dentibus adfixa, 5-7-9 flora. Calyx monophyllus, (a) (terminalis spicula diphyllus,) (a*) nervosus, muticus, longitudine spicula, Receptaculo oppositus; (V. a.) in spiculis inferioribus, saepe secunda Calycis Valvula, multo minor, oblonga, obtusa, convexa, subbifida, (a. ♀.) Receptaculi cavitas impressa, observatur. (V. a. ♀) Cor. V. exterior calyce duplo brevior, nervosa, albido-marginata: sub apice membranaceo Aristam exserens rectam, duplo longiorem. (c. x.) Nectaria 2, ovata. (l. L.) Styli basi nudi. (n. p.) Semen corolla inclusum, valvula interiori adnatum, non discedens. (c. s.)

CYNOSURUS. G. P. 87.

Cal. 2-valvis, multiflorus; Receptaculum proprium unilaterale, foliaceum, S. N. 95.

99. CYNO-

99. *CYNOSURUS, crinitatus, bracteis pinnatifidis.* Linn.
Spec. 105. (Hall. 1545.)

H. in pratis passim. Floret Junio.

T. VII. f. 4. Radix perennis. Culmi I. f. 2. pedales, eretici, stricti, foliati; quadrimodes, levres. Folia angusta, plana; utrinque levia, vix marginibus scabra. Ligula brevis, tenuis, truncata, fissa, margine prominula. Vaginae striatae, levres. Spica composita: florens semiteres, secunda, obtusa; deflorata interrupta, mutica. Rachis flexuosa, (v) torta, levius. Pendunculi breves, solitarii, alterni, duplice serie unilaterales; spiculis tribus, rarius quinque, Bracteisque semper tribus instructi. Bracteae pennatae, convexo-planae, subfessiles: ex axi subflexuoso, & pinnulis 7 f. 9, composita; (b) Singula per lensem spiculam refert disticham: valvulis subulatis, alternis, compressis, aristatis, scabris. (B O.) Spiculeae bi-rarius triflora, bracteis minores. (c. a) Calyx subinaequalis, carinatus, mucronatus: (a) Valvula exteriore basi ab altera remota, sursum arcuata, magis scabra. (A) Flosculi subaristati. (c. C) Nectaria ovata, acuta. (L.) Antherae rubra, seu violacea. Styli basi nudi. (o) Ovibus præbet operatum pabulum.

C. TRIGYNIA.

HOLOSTEUM. G. P. 104.

Cal. 5 - phyllis. Petala 5. Caps. 1 - locularis, subcylindracea, apice dehiscentia. S.N. 103.

100. *HOLOSTEUM, umbellatum, floribus umbellatis.*
Linn. Spec. 130. (Alfine. Hall. 879.)

H. in agris, arvis, & campis sterilibus passim. Floret Majo & sequ.

Stamina semper tria, semel tamen quinque numeravi. Petala apice tri-rarius bidentata. Capsula apice sexavalvi dehiscit. valvulis revolutis. Receptaculum columnare, Semina scabra filis adfigens.

MONTIA. G. P. 101.

Cal. 2 - phyllis. Cor. 1-petala, irregularis.
Caps. unilocularis, trivalvis. S.N. 103.

D

101. MON-

101. MONTIA, *fontana*, Linn. Spec. 129. (Hall. 391.)
H. secus rivulos ad Breitscheid, & Langenaubach. Floret Mayo. *

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

A. MONOGYNIA.

- Flores monopetali, monospermi, superi.
Aggregati.

DIPSACUS. G. P. 114.

*Cal. commun. polyphyllus; proprius superus.**Recept. paleaceum. S. N. 111.*

102. DIPSACUS, *fullonum*, foliis sessilibus ferratis.
Linn. Spec. 140. (Hall. 198.)

B. Dipsacus sativus, aristis fructu hamatis. Sauv. monsp. 156.

H. α , ad vias, in sterilibus siccis passim; β copiose apud nos ferit, pro usu Textorum tibialium; unde saepe spontanea occurrit am Homberg. Floret Julio, Augusto.

B. Paleis differt multo robustioribus hamatis, qua in α , debiliores, recte sunt.

103. DIPSACUS, *pilosus*, foliis petiolatis apendiculatis. Linn. Spec. 141. (Hall. 199.)

H. in sterilibus am Dollberg; in muris pomoerii; ad sepes bey denen Sieghaus-Gärten, rarius. Floret Julio, Augusto.

Receptaculum subovatum. Paleæ lanceolatae. In hoc uti in praecedente, Stigma saepissime bifidum, lobo infimo breviore.

SCABIOSA. G. P. 115.

*Cal. communis polyphyllus; proprius duplex,
superus. Recept. paleaceum s. nudum.
S. N. 112.*

104. SCABIOSA, *succisa*, corollulis quadrifidis æquilibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. Linn. S. N. 112. Spec. 142.
(*Succisa*- Hall. 201.)

H. in pratis subhumidis frequens; Hinter dem Homberg; im Gildners Grund, copiose. Floret Augusto.

Iharm. SUC CISAE 1. MoRSUS DIABOLI Radix.

Folia saepe subferrata. Corollæ lacinia superior non raro emarginata.

Calyx semenis proprius exterior 4-dentatus; interior sessilis quinq-

quefi-

quefidus, laciniis separeis equalibus. Receptaculum ovatum, paleaceum : Paleis lanceolatis.

105. SCABIOSA, *arvensis*, corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incisis, caule hispido.

Linn. S. N. 112. Spec. 143. (Scabiosa. Hall. 206.)

H. ad versuras, in pratis siccis, secus vias frequens. Corollis rubris & cæruleis ludit. Floret Junio, Julio.

Pharm. SCABIOSA Herba. & Flores.

Receptaculum villosum : willis 16-20 basi coalitis, radiantibus, singuli seminis basin vestientibus. Cal. sem. proprius exterior 4-dentatus, brevissimus ; interior subpedicellatus, 10-fidus, laciniis 5, alternis setaceis, 5, latioribus.

** *Flores monopetali, monocarpi, inferi.*

PLANTAGO. G.P. 142.

Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida : limbo reflexo.

Stamina longissima. Caps. 2-locularis, circumscissa. S. N. 122.

106. PLANTAGO, *major*, foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. *Linn. Spec.*

163. (*Hall. 660.*)

H. ad vias, in pratis siccis ; ad versuras auf dem Schläffel ; am Rosenwurzeligen copiose. Floret Junio, Julio.

Pharm. PLANTAGINIS Herba. Radix. Semina.

Spica teres, gracilis, saepe pedalis. Stamina flosculo vix duplo longiora. Capsula hexasperma.

107. PLANTAGO, *media*, foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti.

Linn. Spec. 163. (Hall. 659.)

H. in pratis, ad vias publicas passim. Floret Majo, Junio.

Spica brevior, densior, crassiorque. Capsula hexasperma.

108. PLANTAGO, *lanceolata*, foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. *Linn. Spec. 164. (Hall. 656.)*

H. ad vias, in pratis macilentis nimis frequens. Floret Majo.

Spica ovato-oblonga. Calyx inqualis 4-fidus. Capsula diisperma. Varietatem hujus singularem legi, in agris requiescit am Homberg : Foliis ultrapedalibus, subdentatis, 5-nerviosis ; Scapis bipedalibus, profunde sulcatis ; Spicis palmaribus crassis, flexuosis, basi in duas seu tres spicas laterales, divisiss.

*** *Flores monopetali, monocarpi, superi.*

SANGVISORBA. G. P. 146.

Cal. 2 - phyllus. Germen inter calycem corollamque. S. N. 124.

109. SANGVISORBA, officinalis, spicis ovatis. Linn.
Spec. 169. (*Pimpinella-Hall.* 705.)

H. in pratis depressis passim. Floret Julio, Augusto.

Pharm. SANGVISORBAE s. PIMPINELLAE ITALICAE
Radix.

***** *Flores monopetali, dicocci, superi. Stellatae.*

GALIUM. G. P. 125.

Cor. 1 - petala, plana. Sem. 2, subrotunda.
S. N. 117.

a. *Fructu glabro.*

110. GALIUM, palustre, foliis quaternis obovatis inaequalibus, caulis diffusis. Linn. Spec. 153. (Hall. 719.)

H. ad rivulos pratorum, in fossis, im *Judenwueyher* copiose; *An der Mühlbach* frequens. Floret Junio.

Folia caulina semper inaequalia, obtusissima: inferiora sape quinque vel sena; superiora quaterna, floralia bina. Planta exsiccatione nigrescit.

111. GALIUM, montanum, foliis subquaternis linearibus laevibus, caule debili scabro, seminibus glabris. Linn. Spec. 155. (Hall. 714.)

H. in sylvaticis montosis am *Beilstein*. Floret Junio. ♀

112. GALIUM, uliginosum, foliis senis lanceolatis retrorsum ferrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. Linn. Spec. 153. (Hall. 713. & 715?)

H. ad rivulos, locis umbrosis im *Wiesengrund hinter dem Homberg*; & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

113. GALIUM, spurium, foliis senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis simplicibus, fructibus glabris. Linn. Spec. 154. (Hall. 724.)

H. in agris inter segetes hinter dem *Schloß*, frequens; in arenosis unter der neuen Brücke, rarius. Floret Junio.

Differt a G. Aparine: Caulibus vix pedalibus diffusis; Geniculis equalibus, nudis; Foliis inferne senis, superne quaternis; Fructu glabro, demum rugoso, fusco.

114.

114. GALIUM, verum, foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevibus. Linn. Spec. 155. (Hall. 710.)

H. in arvis, pascuis, pratis siccis, passim. Floret Junio.
Pharm. GALLI LUTEI Herba, & Flores.

115. GALIUM, Mollugo, foliis octonis ovato-linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. Linn. Spec. 155. (Hall. 711.)

H. Varietas latifolia, ubique in dumetis & ad sepes; V. angustifolia, in sylvaticis montosis am Homberg. Floret Junio.

116. GALIUM, sylvaticum, foliis octonis laevibus subtus scabris; floralibus binis, pedunculis capillaribus, caule laevi. Linn. Spec. 155. (Hall. 712.)

H. in sylvis frequens, im Mühlberg infra pagum Sinn copiose. Floret Junio, Julio.

Caulis teres, subretragonus, laevis, geniculis incrassatis. Folia saepe senna tantum, marginibus, non carina scabra. Flores exiguoi, ante explicationem plures simul nutantes. Corolla alba, lanciniis latissimis, acutis. Stylus brevissimus. Semen nigrum, rugosum, plerumque unicum ad maturitatem pervenit.

b. Fructu hispido.

117. GALIUM, Aparine, foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructibus hispidis. Linn. S. N. 118. Spec. 157. (Hall. 723.)

H. ad sepes, in cultis, inter segetes nimis frequens. Floret Majo, Junio.

ASPERULA. G. P. 121.

Cor. 1-petala, infundibuliformis. Sem. 2, globosa. S. N. 116.

118. ASPERULA, odorata, foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. Linn. Spec. 150. (Hall. 728.)

H. in sylvis, & nemoribus frequens. Floret Majo.

Pharm. MATRISYLVÆ, f. HEPATICA STELLATA Herba.

SHERARDIA. G. P. 120.

Cor. 1-petala, infundibuliformis. Sem. 2, tridentata. S. N. 116.

119. SHERARDIA, *arvensis*, foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. *Linn. Spec. 149.*
(*Hall. 734.*)

H. in agris passim, in arvis auf dem Schießplatz copiose. Floret Junio, Julio.

Calyx *sex-* (*nec 4.*) *dentatus*, uti fructus. Semina *unilocularia*.
***** Flores *tetrapetali*, superi.

CORNUS. G.P. 149

Involucrum 4-phylum saepius. *Petala supera*
4. *Drupa nucleo biloculari.* S.N. 124.

120. CORNUS, *sanguinea*, arborea, cymis nudis, ramis rectis. *Linn. S.N. 125. Spec. 171.* (*Hall. 816.*)

H. in sepibus, dumetis, & sylvis vulgaris. Floret Majo.
***** Flores *incompleti*, inferi.

ALCHEMILLA. G.P. 165.

Cal. 8-fidus. Cor. o. Sem. 1. S.N. 129.

121. ALCHEMILLA, *vulgaris*, foliis lobatis. *Linn. Spec. 178.* (*Hall. 1566.*)

H. in pratis & pomariis, ubique vulgaris. Floret Junio, Julio.

Pharm. ALCHEMILLÆ Herba. Radix.

122. ALCHEMILLA, *Aphanes*, *hirsuta*, foliis trilobatis, lobis tripartitis & bipartitis. *Hall. 1569.*
Aphanes arvensis. Linn. Spec. 179.

H. in agris & arvis arenosis, auf dem Dallberg, & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

Floris *structura omnibus partibus Alchemillæ simillima*: Calyx *erecte octo-fidus*: (*quadrifidus Syst. NATH. III. 236.*) Lacinia alterna quatuor liceat *ripiculissimæ*, semper tamen imprimis explicata flore, praesentes; Seta 6, in laciinis majoribus, duplo pauciores, in minoribus. Stylus unicus. Semen unicum, non quam duo, centies repetita fructus anatome numeravi.

B. DIGYNTIA.

CUSCUTA. G.P. 170.

Cal. 4-f. 5-fidus. Cor. 1-petala, 4-f. 5-fida.
Capf. 2-locularis. S.N. 129.

123. CUSCUTA, *europæa*, floribus sessilibus. *Linn. Spec. 180.* (*Hall. 654.*)

a. Cu-

α . *Cuscuta major*. *Bauh. Pin.* 219. (funiformis.)

β . *Epithymum* f. *Cuscuta minor*. *Bauh. Pin.* 219. (filiformis.)

H. α , in sepibus *unter der neuen Brücke* & alibi frequens.

β , locis gramineis, inter Festucam decumbentem, *hinter dem Homberg*, copiose. Floret Julio, Augusto.

Pharm. α , *CUSCUTA*, β , *EPITHYMI*, Herba.

Caulis filiformis, (β *capillaris*,) *terragonus*, *tortus*, *dextrorsum volubilis*, *subramosus*, *perasiticus*; *Radiculas papillares*, *subsecuriformes*, *ex internodiis emittens*, *quibus plantis adfigitur*. σ -nutrimentum *viresque ex iis haurit*; *demum ad terram perit evanescitque*. *Folia nulla*. *Squamula unica ovato-acuta*, *sub singulo glomere florum*; *ubi saepe ramum edicit*. *Calyx* σ -*Corolla 4-f. 5-fida*. *Stamina 4-f. 5*. *Nectaria in præmariis floribus fere nulla*, *in senioribus semibifida*: *lacinias iterum bifidis*, *incurvis*. *Capsulas saepe tri- etiam tetraspermas vidi*.

C. TETRAGYNIA.

ILEX. G. P. 172.

Cal. 4-dentatus. Cor. rotata. Stylus o. Baccæ 4-sperma. S.N. 130.

124. ILEX, *Aquifolium*, foliis ovatis acutis spinosis.
Linn. Spec. 181. (Aquifolium - Hall. 667.)

H. in sylvis, im *Eisenrother Wald*, rarius. Flores nondum sufficienter examinare licuit. Floret Majo.

SAGINA. G. P. 176.

Cal. 4-phillus. Cor. 4-petala. Caps. 1-locularis, 4-valvis, polysperma. S.N. 131.

125. SAGINA, *procumbens*, ramis procumbentibus.
Linn. S.N. 131. Spec. 185. (Alpine - Hall. 861.)

H. in agris & arvis passim; secus rivulos pratorum *hinter dem Homberg* copiose. Floret tota fere æstate.

POTAMOGETON. G. P. 174.

Cal. o. Cor. 4-petala. Stylus o. Sem. 4. S.N. 130.

126. POTAMOGETON, *natans*, foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. Linn. Spec. 182. (Hall. 843.)
H. in stagnis versus Burgk rarius; in piscinis ad Driedorff, alibique frequens. Floret Junio.
127. POTAMOGETON, *crispum*, foliis lanceolatis alternis undulatis ferratis. Linn. Spec. 183. (Hall. 848.)
H. in fossis, stagnis, & rivulis, passim. Floret Majo.
128. POTAMOGETON, *compressum*, foliis linearibus obtusis, caule compresso. Linn. Spec. 183. (Hall. 851.)
H. in fossis, im Wassergraben auf der Herren Wiese, versus Burgk, copiose. Floret Junio.
129. POTAMOGETON, *pustulatum*, foliis linearibus oppositis alternisque distinctis: basi patentibus, caule tereti. Linn. 181? (Hall. 852.)
H. in stagnis, unter der neuen Brücke, auch bey der untern Walchenmühle, rarius. Floret Junio.
Caulis crassitie filii, teres. Folia vix pollicaria: inferiora opposita, superiora alterna. Stipulae oblongae, obtusissima, apice subsericeae. Pedunculi pollicares, teretes, caule fere crassiores. Spicae paucis-(3-4.) flora. Flores exigui. Semina gibba, obtusa.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

A. MONOGYNIA.

* Flores monopetalii, inferi, tetraspermi. Asperifoliæ.
ECHIUM. G P. 191.

Cor. irregularis, fauce nuda. S. N. 148.
130. ECHIUM, *vulgare*, caule tuberculato-hispido, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. Linn. Spec. 200. (Hall. 603.)
H. ad vias; in ruderatis, inuis vetustis, passim. Floret Junio. Julio.

PULMONARIA, G. P. 184.

Cor. infundibuliformis, fauce pervia, nuda.
Cal. prismatico-5-gonus. S. N. 146.

131. PULMONARIA, *officinalis*, foliis radicalibus ova-to - cordatis scabris. *Linn. Spec. 194.* (*Hall. 597.*)
H. foliis maculatis, ad sepes & in duinetis, *am Homberg*; *am Sieghaus*; foliis non maculatis, *auf dem Westerwald*. Floret Aprili, Majo.

LITHOSPERMUM. G. P. 181.

- Cor.* infundibuliformis, fauce perforata, nu-da. *Cal. 5* - partitus. S. N. 145.

132. LITHOSPERMUM, *officinale*, seminibus lævibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis. *Linn. Spec. 189.* (*Hall. 595.*)
H. in hortis variis; a nonnullis seritur pro succedaneo Theæ, hinc quasi indigena facta, *auf dem Hintersand*, rarius. Floret Junio, Julio.
Pharm. MILII SOLIS, Semina.

133. LITHOSPERMUM, *arvense*, seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. *Linn. Spec. 190.* (*Heliotropium - Hall. 594.*)
H. in agris inter segetes *hinter dem Schloß*; in ruderatis & cul-tis *auf dem Hintersand*, frequens. Floret Majo, Junio.

SYMPHYTUM. G. P. 185.

- Corolla* limbus tubulato- ventricosus : fauce clausa radiis subulatis. S. N. 147.

134. SYMPHYTUM, *officinale*, foliis ovato - lanceola-tis decurrentibus. *Linn. Spec. 195.* (*Hall. 600.*)
H. ad fossas, & ripas *Dille*, frequens. Varietas corollis pur-pureis apud nos vulgarissima est. Floret Majo, Junio.
Pharm. CONSOLIDÆ MAIORIS f. *SYMPHYTI*. Radix Folia.

BORAGO. G. P. 188.

- Corolla* rotata: fauce radiis clausa. S. N. 147.

135. BORAGO, *officinalis*, foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Linn Spec. 197.* (*Hall. 607.*)
H. in cultis, & rejectamentis hortorum non infrequens. Exotica Planta indigena facta. Floret Junio.

Pharm. BORAGINIS Herba. Flores.

LYCOPSIS. G. P. 190.

- Corolla* tubus incurvatus. S. N. 148.

136. LYCOPSIS, *arvensis*, foliis lanceolatis hispidis, D 5 caly-

calycibus florescentibus erectis. Linn. Spec. 199.
(Hall. 605.)

H. in agris inter segetes; in cultis & arvis auf dem Schießplatz,
frequens. Floret æstate.

CYNOGLOSSUM. G. P. 183.

*Cor. infundibuliformis, fauce clausa fornici-
bus. Semina depressa, interiore tantum
latere stylo affixa.* S. N. 146.

137. *CYNOGLOSSUM, officinale, staminibus corolla
brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis
sessilibus.* Linn. Spec. 192. (Hall. 587.)

H. in ruderatis, auf dem Hintersand; ad muros urbis, bey dem
Thurm; ad viam publicam oberhalb Burgk, copiose. Floret
Majo, & sequ.

Pharm. CYNOGLOSSI Radix, Herba.

MYOSOTIS. G. P. 180.

*Cor. hypocrateriformis, 5-fida, emarginata:
fauce clausa fornicibus.* S. N. 144.

138. *Myosotis, scorpioides, feminibus nudis, fa-
liorum apicibus callosis.* Linn. Spec. 188.

a. *Myosotis, arvensis, foliis hirsutis.* Linn. Hort. Cliff. 46.
(Scorpiurus Hall. 590.)

β. *Myosotis, palustris, foliis glabris.* Linn. Hort. Cliff. 46.
(Scorpiurus Hall. 591.)

H. a. in arvis, agris, ruderatis, ad vias; var β. ad. riu-
los, in pratis humidis; Corollis cœruleis, albis, & carneis lu-
dit. Floret æstate.

Var. a. *Radix fibrosa, annua. Caulis ramosus. Folia hirsuta.
Calyx profundius 5-fidus, maturo semine clausus.* Pecora plan-
tam intactam relinquunt.

Var. β. *Radix repens, perennis. Caulis subramosus. Folia
glabra. Calyx maturo semine patulus. Oribus noxia, saepe
lethalis.*

** *Flores monopetali, inferi, angiospermi.*

ANAGALLIS. G. P. 206.

Cor. rotata. Caps. circumscissa. S. N. 153.

139. *ANAGALLIS, arvensis, foliis indivisis, caule pro-
cumbente.* Linn. Spec. 211.

a. *Anagallis phœnico flore.* Bonb. Pin. 252. (Hall. 625.)

β. Ana-

B. *Anagallis cæruleo flore.* Baub. Pin. 252. (Hall. 626.)
H. in agris, arvis, & cultis ubique. Var, **B.** in agris ~~am~~
Homberg, *vulgaris*. Floret æstate.

Pharm. **a**, ANAGALLIDIS (flore phœnicio) Herba.

Var. **B.** in hortum introducta, faciem, & corollæ pulcherri-
 mum colorem, per plures annos non mutavit. Folia an-
 gustiora, longiora, sœpe terna, quaterna. In **a** & **B**,
 Corolla crenulata.

a. Ad Insaniam, Maniamque valere, dicitur; & in ipsa Hydro-
 phobia a nuperis laudatur. Utinam verum, non dubium est
 specificum!

LYSIMACHIA. G. P. 205.

Cyr. rotata. *Capſ.* globosa, mucronata, io-
 valvis. S. N. 152.

140. LYSIMACHIA, *vulgaris*, paniculata: racemis ter-
 minalibus. Linn. Spec. 209 (Hall. 630.)

H. ad ripas Dillæ frequens. Floret Julio, Augusto.
 Filamenta *basi coalita*, *altitudine inæqualia*. Folia *sæpe terna*, *quaterna*.

141. LYSIMACHIA, *nemorum*, foliis ovatis acutis, flo-
 ribus solitariis, caule procumbente. Linn. Spec.

211. (Hall. 628.)

H. in sylvis, *im Hirschberg* frequens. Floret Junio, Julio.

142. LYSIMACHIA, *Nummularia*, foliis subcordatis,
 floribus solitariis, caule repente. Linn. Spec.

211. (Hall. 629.)

H. locis humidis depressis umbrosis, ad scrobes passim. Flo-
 ret Junio, Julio.

Pharm. NUMMULARIAE Herba.

PRIMULA. G. P. 197.

Involucrum umbellulæ. *Corollæ* tubus cylin-
 dricus: ore patulo. S. N. 150.

143. PRIMULA, *veris*, foliis dentatis rugosis. Linn.
 Spec. 204.

a *Primula officinalis*, limbo corollarum concavo. Linn. Spec.
 204. (Hall. 610.)

B. *Primula elatior*, limbo corollarum plano. Linn. Spec.
 204. (Hall. 609.)

H. **a.** in pratis & pomariis, copiose; in sylvaticis montosis:
 scapo altiore, multifloro; var **B.** Corollis pallidioribus,
 inodoris, in pratis siccis *bey Langenaubach*, frequens. Floret
 Aprili, Majo.

Pharm.

Pharm. a. PARALYSEOS, f. PRIMULAE VERNIS
Radix, Flores.

MENYANTHES. G. P. 202.

Cor. hirsuta. Stigma 2-fidum. Caps. 1-locularis. S. N. 152.

144. MENYANTHES, *trifoliata*, foliis ternatis. *Linn.*
Spec. 208. (Hall. 633.)

H. in pratis uliginosis, infra pagum *Sinn*, copiose. Floret Mayo, Junio.

Pharm. TRIFOLII FIBRINI f. AQUATICI. Radix.
Herba.

CONVOLVULUS. G. P. 215.

Cor. campanulata, plicata. Stigm. 2. Caps.
2-locularis : loculis dispermis. S. N. 155.

145. CONVOLVULUS, *arvensis*, foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis subunifloris. *Linn. S. N.*
155. Spec. 218. (Hall. 664.)

H. in agris, arvis & cultis ubique frequens. Floret Junio & seq.

Pedunculus *tetragonus*, *infra florem teres*, *sape biflorus*. *Fructus nutans.*

146. CONVOLVULUS, *sepium*, foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis *tetragonis unifloris.*
Linn. Spec. 218. (Hall. 663.)

H. in sepibus frequens. Floret Julio, Augusto.

Capsulae dissepimentum utringue laterale, dimidiatum.

DATURA. G. P. 246.

Cor. infundibuliformis, plicata. Cal. tubulosus, angulatus, deciduus. Caps. 4-valvis. S. N. 170.

147. DATURA, *Stramonium*, pericarpiis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Linn. Spec. 255. (Stramonium. Hall. 586.)*

H. in cultis oleraceis passim. Floret Julio, Augusto.

Pharm. Datura f. STRAMONII. Herba. Semina.

HYOSCYAMUS. G. P. 247.

Cor. infundibuliformis, obtusa. Stam. inclinata. Caps. operculata, 2-locularis. S. N. 170.

148.

148. HYOSCYAMUS, *niger*, foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. *Linn. Spec. 257.* (*Hall. 580.*)

H. secus vias, in ruderatis, auf dem Hintersand, copiose, Floret Julio.

Pharm. HYOSCYAMI Herba. Semina.

VERBASCUM. G. P. 245.

Cor. rotata, subinæqualis. **Caps.** 2 - locularis, 2 - valvis. **S. N. 169.**

149. VERBASCUM, Thapsus, foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. *Linn. S. N. 169. Spec. 252.* (*Hall. 581.*)

H. in sterilibus glareofisis am Dollberg; Rehberg; & alibi frequens. Floret Julio, Augusto.

Pharm. VERBACI Radix, Herba, Flores.

Filamenta duo inferiora reliquis longiora, nuda, tria superiora albido - villosa.

Corollarum Infusum gratum & præstantissimum resolvens; in morbis pectoris, Phthisi, Tussi secca & humida, sub nomine BOUILLON BLANC, optimo cum successu, eo utuntur Galli.

150. VERBASCUM, Lychnitis, foliis cuneiformi - oblongis. *Linn. Spec. 253. (Hall. 583.)*

H. in sterilibus siccis, vulgaris; Corollis albidis minoribus. auf der Höhle. Floret Julio & sequ.

151. VERBASCUM, nigrum, foliis cordato - oblongis petiolatis. *Linn. S. N. 169. Spec. 253. (Hall. 584.)*

H. in ruderatis, secus vias ubique. Floret Julio & seq. Filamenta uti in precedente equalia, omnia villosa, in hoc purpurea.

VINCA. G. P. 295.

Contorta. Folliculi 2, erecti. Semina nuda.
S. N. 189.

152. VINCA, minor, catilibus procumbentibus, foliis lanceolato - ovatis, floribus pedunculatis. *Linn. Spec. 304. (Pervinca. Hall. 572.)*

H. ad sepes, am Heiligenfoß; am Dollberg, vulgaris. Floret Aprili, Majo.

Pharm. VINCAE PERVINCAE Herba.

Caules repentes. Rami adscendentis, simplices, uniflori; Antheræ apice barbata. Folliculi dispermi, semper in nostrate.

SOLA.

SOLANUM. G. P. 251.

Cor. rotata. Antheræ subcoalitæ, apice poro gemino dehiscentes. Bacca 2 - locularis.
S. N. 172.

153. SOLANUM, *Dulcamara*, caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. Linn. Spec. 264. (Hall. 575.)
H. ad fossas, & ripas Dilla; an der Mühlbach, vulgaris. Floret Junio, Julio.

Pharm. D U L C A M A R Æ Radix cum stipitibus.

Radix & caulum pars inferior inter sanguinem purificantia efficacissima. S A R S A P A R I L L Æ americanæ, qua facile carere possemus, præstantissimum succedaneum europæum.

154. SOLANUM, *nigrum*, caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato - angulatis, racemis distichis nutantibus. Linn. S.N. 173. Spec. 266. (Hall. 576.)
H. securis vias, in cultis, ubique vulgaris. Floret Julio, Augusto.

Pharm. S O L A N I N I G R I Herba.

ATROPA. G. P. 249.

Cor. campanulata. Stamina distantia. Bacca globosa, 2 - locularis. S N. 171.

155. ATROPA, *Belladonna*, caule herbaceo, foliis ovatis integris. Linn. Spec. 260. (*Belladonna.* Hall. 579.)

H. in sylvis in der Hörre; im Hirschberg; im Thiergarten, copiose Floret Junio, Julio.

Pharm. B E L L A D O N N A E Herba.

*** *Flores monopetalii, superi.*

PHYTEUMA. G. P. 220.

Cor. rotata, 5 - partita : laciniis linearibus. Stigma 2 - l. 3 - fidum. Caps. 2 - l. 3 - locularis, infera, perforata. S. N. 162.

156. PHYTEUMA, *spicata*, spica oblonga, capsulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. Linn. Spec. 242. (*Rapunculus* - Hall. 684.)

H. in pratis sylvaticis, am Hirschberg; auf der Rehe; in pomariis, in der untern Pitze. Corollis albis, purpureisque variat. Floret Mayo.

Val.

Valvulae 5, conniventes, Receptaculum regentes, apice in Filamenta definentes, usi in Campanula. Stigma 3-fidum.

CAMPANULA. G. P. 218.

Cor. campanulata, fundo clauso, valvis staminiferis. Stigma 3-fidum. Caps. infera, poris lateralibus dehiscens. S. N. 159.

a. *Foliis levioribus angustioribus.*

157. CAMPANULA, *rotundifolia*, foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. Linn. Spec. 232.

α. Caule unifloro. Hall. 700.

β. Caule multifloro. Hall. 701.

H. α. in collibus siccis am Stützelberg; β. in muris & arvis, passim. Floret estate.

158. CAMPANULA, *Rapunculus*, foliis undulatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. Linn. Spec. 232. (Hall. 699.)

H. in arvis & pratis sylvaticis, am Homberg; & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

Radices cum primariis foliis, a nostratibus primo vere in aceraria, Rapunzelii dicta, recipiuntur.

159. CAMPANULA, *persicifolia*, foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. Linn. Spec. 232. (Hall. 697.)

H. in sylvarum asperis am Homberg; Dollberg; im Beilstein frequens. Floret Julio.

b. *Foliis scabris latioribus.*

160. CAMPANULA, *latifolia*, foliis ovato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, floribus solitariis pedunculatis, fructibus cernuis. Linn. Spec. 233. (Hall. 691.)

H. in sylvaticis montosis, ad sepes, bey Langenaubach; & Erbach. Floret Julio.

161. CAMPANULA, *rapunculoides*, foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis sparsis, calycibus reflexis. Linn. Spec. 234. (Hall. 692.)

H. ad versuras, am Homberg; Dollberg, rarius; ad viam publicam am Beilstein copiole. Floret Julio & sequ.

162.

162. CAMPANULA, *Trachelium*, caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. Linn. Spec. 235. (Hall. 692.)

H. in sylvis, am Homberg, rarius; am Rehberg; in nemorosis circa Erbach, frequens. Floret Julio, Augusto.

163. CAMPANULA, *glomerata*, caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali. Linn. Spec. 235. (Hall. 685.)

H. ad sepes im Rosenväldgen, rarius. Floret Junio, Julio.

LONICERA. G. P. 233.

Cor. 1-petala, irregularis. *Bacca polysperma*, *2-loocularis*, infera. S. N. 165.

164. LONICERA, *Periclymenum*, capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis.

Linn. Spec. 247. (*Caprifolium*. Hall. 673.)

H. in dumetis ad pagos Schönbach & Frohnhausen. Floret Julio.

165. LONICERA, *xylosteum*, pedunculis bifloris, bacis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus.

Linn. Spec. 248. (*Caprifolium*. Hall. 677.)

H. in sepibus, & dumetis, in der Callenbach, & alibi frequentis. Floret Majo.

**** Flores pentapetalii, inferi.

RHAMNUS. G. P. 265.

Cal. tubulosus: squamis stamina minuentibus. *Cor. nulla*. *Bacca rotunda*. S. N. 178.

166. RHAMNUS, *catharticus*, spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. Linn. Spec. 279. (Hall. 824.)

H. in sepibus hinter dem Schloß: Mas cum Femina. Floret Majo.

Maris Flores Germine imperfecto: Feminae *squamis duplo minorebus*. Antherisque polline destitutis, instructi sunt. Stigma quadridem. *Bacca 4-loocularis*, *4-sperma*.

Pharm. SPINAE CERVINAE Baccae.

167. RHAMNUS, *Frangula*, inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. Linn. Spec. 280. (Hall. 821.)

H. in sylvis am Homberg; im Beilstein. Floret Majo, Junio.

Bacca

Bacca 2 - locularis: Semina 2, rarius 3.

Pharm. FRANGULÆ Cortex.

EVONYMUS. G. P. 271.

Cor. 5 - petala. Caps. 5 - gona, 5 - locularis, 5 - valvis, colorata. Sem. calyprata. S. N. 181.

168. EVONYMUS, *europeus*, (*tenuifolius*,) floribus plerisque quadrididis. Linn. Spec. 286. (Hall. 829.)

H. ad sepes am Dollberg, alibique vulgaris. Floret Majo.
Flores pentapetali in nostra rariissimi.

***** Flores pentapetali, superi.

RIBES. G. P. 281.

Cor. 5 - petala. Stamina calyci inserta. Stylus bifidus. Bacca polysperma, infera: S.N. 184.
a. Ribesia *inermia*.

169. RIBES, *rubrum*, inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. Linn. Spec. 290. (Hall. 818.)

H. in sepibus interhortenibus vulgaris. Floret Aprili, Majo.

Stylus *bipartitus*, *reflexus*. Petala *bifida*.

Pharm. RIBIUM RUBRORUM Baccæ.

170. RIBES, *nigrum*, inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. Linn. Spec. 291. (Hall. 819.)

H. in sepibus interhortenibus, über der neuen Brücke. Floret Majo.

Petala *obtusa*. Stylus *simplex*, vix sulco *semidivisus*. Stigma *bifidum*.

Hoc & præcedens, alias non spontanea, nonnunquam vero occurunt, forte ab aviculis disseminata, in truncis arborum emortuis im Beilstein.

171. RIBES, *alpinum*, inerme, racemis erectis: bracteis flore longioribus. Linn. Spec. 291. (Hall. 817.)

H. Frutex in nostra regione constanter dioicus: *Mas* in dumetis & sepibus passim; *Femina* circa pagum Beilstein tantum, cum mare, rarius. Floret Martio, Aprili.

Maris Glandulæ petiolares hyalinae. Racemi multiflori. Bracteæ longitudine florum. Flores approximati, planiusculi. Calyx patens, Petala *flavescens*. Antheræ pollinifera. Germen

nullum, vix rudimentum calyce concretum. Stylus erectus, brevis. Stigmata emarginata. Fructus nullus. Feminæ Glandulae petiolares purpureæ. Racemi 3-4-5-flori. Bractæ floribus longiores. Flores remoti, oblongi. Calyx reflexus. Petala rubra. Antheræ polline desitutæ. Germen corolla fere majus. Stylus semibifidus, staminibus longior. Stigmata subglobosa, reflexa. Baccæ erectæ, pentasperma, rubra, insipida.

b. Grossulariæ aculeatae.

172. RIBES, *Grossularia*, ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, baccis hirsutis Linn. Spec. 291?

H. in pomariis & sepibus interhortensibus auf der Schafdlle rarius. Floret Aprili.

Rami cortice laxe, aculeati: aculeis deciduis. Petiolorum pili villosi, fere pennati, non debiscenti Gemma capitati. Flos unicus, rarissime geminus, nutans. Bractæ tripartita, Ruvæ crispa duplo major. Baccæ magna, pubescens, rubra. An R. reclinati varietas?

173. RIBES, *Uva crispa*, ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla. Linn. Spec. 292. (Hall. 820.)

H. ad sepes passim; in sylvis am Beilstein, & Homberg frequens. Floret Aprili.

HEDERA. G. P. 283.

Petala 5, oblonga. *Bacca 5-sperma*, calyce cincta. S. N. 184.

174. HEDERA, *Helix*, foliis ovatis lobatisque. Linn. Spec. 292. (Hall. 826.)

H. Junior sterilis, Foliis ætate varians, in sylvis apud Homberg; im Beilstein; & alibi frequens; Arbor fructificans, ad murum Urbis vor dem Schloßpförtgen. Floret Septembri. Fructus subsequenti Aprili in maturescunt.

Pharm. HEDERÆ ARBOREÆ Folia, Baccæ, Gummi.

B. D I G Y N I A.

* *Flores monopetalii, inferi.*

ASCLEPIAS. G. P. 306.

Contorta. *Nectararia 5*, ovata, concava, corniculum exserentia. S. N. 193.

175. ASCLEPIAS, *Vincetoxicum*, foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. Linn. Spec. 314. (Hall. 571.)

H. In

H. in sylvaticis montosis *am Homberg*; *in der Callenbach*; *auf der Steinseite* copiose. Floret Junio, Julio.

Pharm. VINCENTOXICI f. HIRUNDINARIA Radix.

GENTIANA. G. P. 322.

Cor. 1 - petala. *Caps.* 2 - valvis, 1 - locularis: *Receptaculis* 2, longitudinalibus. S. N. 199.

176. GENTIANA, *verna*, corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis majoribus. Linn. Spec. 331. (Hall. 644.)

H. in pratis versus *Burgk*, & *Hirschberg*. Floret Majo. ♀

177. GENTIANA, *Centaurium*, corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. Linn. S. N. 200. Spec. 332. (Hall. 648.)

B. Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule brevissimo ramosissimo. GERARD. Prov. 311.

H. *α*, in montosis sylvaticis *am Homberg*; *Dollberg*; *hinter dem Beilstein*, alibique vulgaris; *β*, *auf dem Säuvviegenrarius*, Floret Julio. Augusto.

Antheræ sparsò polline, spiraliter tortæ.

Pharm. *α*, CENTAURI MINORIS Herba cum Floribus.

178. GENTIANA, *Amarella*, corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis. Linn. Spec. 334. (Hall. 650.)

H. in pratis montosis *am Beilstein*, *vix digitalis*; in juniperetis *auf dem Rehberg & Homberg*, *fere bipedalis*, *ramosissima*. Floret Septembri.

Calyx *inaqualis*. Corollæ faux squamis quinque triangularibus, conniventibus, longissime ciliatis, clausa.

179. GENTIANA, *cruciata*, corollis quadrifidis imberbis, floribus verticillatis sessilibus. Linn. Spec. 334. (Hall. 643.)

H. in sterilibus montosis *am Beilstein rarius*. Floret Julio, Augusto.

Denticuli Corolla laciniis interjecti bifidi, interne decurrentes. Stigmata revoluta.

** Flores incompleti.

CHENOPODIUM. G. P. 309.

Cal. 5 - phyllus, 5 - gonus. Cor. 0. Sem. 1, lenticulare, superum. S. N. 194.

a. *Foliis angulosis.*

180. CHENOPODIUM, *Bonus Henricus*, foliis triangula-
ri : sagittatis integerimis, spicis compositis
aphyllis axillaribus. *Linn. S. N.* 194. *Spec.*
318. (*Hall. 1578.*)

H. ad vias, juxta parietes, ad pagos frequens. Floret Junio,
Julio.

Pharm. BONI HENRICI Herba.

181. CHENOPODIUM, *rubrum*, foliis cordato - trian-
gularibus obtusiusculis dentatis, racemis ere-
ctis compositis subfoliosis, caule brevioribus.
Linn. S. N. 195. *Spec. 318.* (*Hall. 1583.*)

H. in ruderatis, & cultis passim. Floret Julio, Augusto.
Pharm. ATRIPLICIS SYLVESTRIS Herba.

182. CHENOPODIUM, *album*, foliis rhomboideo-
triangularibus erosis postice integris : summis
oblongis, racemis erectis. *Linn. Spec. 319.*
(*Hall. 1579.*)

H. in hortis & cultis *auf dem Hintersand*, alibique frequens.
Floret Julio.

183. CHENOPODIUM, *viride*, foliis rhomboideis den-
tato - sinuatis, racemis ramosis subfoliatis. *Linn.*
Spec. 319. (*Hall. 1580.*)

H. in cultis *in der Pitze*; *auf dem Schießplatz* copiose. Flo-
ret Julio, Augusto.

184. CHENOPODIUM, *hybridum*, foliis cordatis an-
gulato - acuminatis, racemis ramosis nudis.
Linn. Spec. 319. (*Hall. 1581.*)

H. in sterilibus & cultis passim. Floret Julio, Augusto.

185. CHENOPODIUM, *glaucum*, foliis ovato - oblön-
gis repandis, racemis nudis simplicibus glo-
meratis. *Linn. Spec. 320.* (*Hall. 1584.*)

H. in agris *am Dollberg*, & *Homberg*; *auf dem Hintersand* ra-
rius. Floret Augusto.

186. CHENOPODIUM, *urbicum*, foliis triangularibus
subdentatis, racemis confertis strictissimis cau-
li approximatis longissimis. *Linn. Spec. 318.*

H. in cultis oleraceis *in der untern Pitze*; *auf dem Schlüssel*
rarius. Floret Julio, Augusto, \ddagger .

b. *Foliis*

b. *Foliis integris.*

- 187.** CHENOPODIUM, *Vulvaria*, foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Linn. Spec. 321.* (*Hall. 1577.*)

H. unico in loco im breiten Fahrweg, vor dem untern Thor.
Floret Julio.

Pharm. VULVARIAE Herba.

- 188.** CHENOPODIUM, *polyspermum*, foliis integerimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *Linn. Spec. 321.* (*Hall. 1576.*)

H. in cultis & hortis vor dem untern Thor; auf dem Schießplatz; an der Mühlbach frequens. Floret Junio, Julio.
Racemi florentes ramos, spicati; fructiferentes cymosi, dichotomi.

HERNIARIA. G. P. 308.

Cal. 5-partitus. Cor. o. Stamina 5 sterilia.

Caps. 1-sperma. S. N. 194.

- 189.** HERNIARIA, *glabra*, glabra herbacea. *Linn. Spec. 317.* (*Hall. 1552.*)

H. in arvis sterilibus apricis am Dollberg; auf dem Schießplatz parcius; auf der Sandwiese copiose. Floret Junio & sequ.

Pharm. HERNIARIAE s. MILLEGRANAE Herba.

Calyx saepe 4-partitus, Staminibus quatuor. Filamenta Antheris destituta reliquis tenuiora, albidiioraque. Styli duo, breves: Stigmata subglobosa. Capsula membranacea; digitis compressa, Semen atropurpureum, nitidum, apice profunde emarginatum, basi demittens.

ULMUS. G. P. 316.

Cal. 5-fidus. Cor. o. Bacca exsucce, compresso-membranacea. S. N. 198.

- 190.** ULMUS, *campestris*, foliis duplicato-serratis: basi inaequalibus. *Linn. Spec. 327.* (*Hall. 1586.*)

H. circa pagum Erbach frequens. Floret Aprili.

Pharm. ULMI Cortex medius.

*** *Flores pentapetali, superi; dispermi.*

Umbellatæ.

a. *Involucro universali, partialique.*

SANICULA. G. P. 326.

Umbellæ confertæ, subcapitatæ. Fructus scaber. Flores disci abortientes. S. N. 202.

- 191.** SANICULA, *europaea*, foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. *Linn. Spec. 339. (Hall. 737.)*

H. in sylvis umbrosis, *am Rehberg; im Hirschberg; in der Hoerre* copiose. Floret Majo, Junio.

Pharm. SANICULÆ Herba.

HERACLEUM G. P. 345.

Fructus ellipticus, emarginatus, compres-
sus, striatus, marginatus. Cor. distornis,
inflexo-emarginata. Involucrum caducum.
S: N. 210.

- 192.** HERACLEUM, *sphondylium*, foliolis pinnatifidis laevibus, floribus uniformibus. *Linn. S. N. II.*

210. (*vid. Errata.*) *Spec. 358. (Sphondylium-Hall. 809.)*

H. in pratis humidis, ubique frequens. Floret Junio & sequ.

Pharm. BRANCAE VRSI Herba. (*male pro Acantho.*)

Foliorum lobi in planta serius florente (Augusto) multo minores, magisque divisi. Umbella radiata: Corollis ante explicationem purpureis seu viridibus, denum albis; inqualibus, duplo majoribus in radio; subequalibus in disco, centralibus sepe abortientibus.

OENANTHE G. P. 352.

Flosculi difformes: in disco sessiles, steriles.

Fructus calyce coronatus. S. N. 212.

- 193.** OENANTHE, *fistulosa*, stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis. *Linn. Spec. 365. (Hall. 755.)*

H. in pratis paludosis circa pagum Sinn. Floret Junio.

CAUCALIS. G. P. 331.

Cor. radiata; disci masculæ. Petala inflexo-
emarginata. Fructus setis hispidus. Involu-
cra integra. S. N. 205.

- 194.** CAUCALIS, *daucoides*, umbellis trifidis aphyllis, umbellulis trispermis triphyllis. *Linn. S. N. 205. (Hall. 739.)*

CAUCALIS leptophylla. *Linn. Spec. 347.*

H. inter segetes *am Dollberg* copiose, alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

Radix

Radix fusiformis, annua. Caulis pedalis, erectus, sulcato-angulatus, ramosus, lavis: geniculis albido-setosus. Folia supradecomposita: Petiolis uti Folia subtus setis albidis, raris adspersis, basi membranaceis; Pinnulis pinnatifidis, angustis; obtusiusculis, apice bi- s. trifidis. Umbella universalis radiis tribus, firmis, tetragonis; parrialis radius 5-7-9: quorum semper exteriores tres robustiores, fructiferi; centrales tenuiores, steriles. Involucrum rarius foliolum unicum, lanceolatum, plerumque nullum; ejus loco, seta albida congesta. Involucellum dimidiatum, triphyllum, patens: foliolis lanceolatis, longitudine flosculorum. Flores tres extimi majores, Hermaphroditi, fertiles; centrales 2-4-6; Masculi, steriles, Calycis lacinia lanceolata, extimis duabus reliquis majoribus. Petala, obcordata, emarginata, subpurpurecentia, inqualia, extimo triplo majore. Stamina longitudine petalorum. Germen scabrum: Maris nullum, Calyce lavi. Singula Umbellula Fructus tres, distantes, oblongi, magni, Calyce coronati. Semen sulcatum, setis inaequalibus, sursum hamatis hispidum; nucleus oblongum condens.

DAUCUS. G. P. 333.

Cor. subradiatae, omnes hermaphroditae. Fructus pilis hispidus. S. N. 206.

195. DAUCUS, *Carota*, seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. Linn. Spec. 348. (Hall. 746.)
H. in sterilibus am Galgenberg copiose, alibique frequens.
Floret Junio, Julio.

Pharm. DAUCIS SYLVESTRIS Semina.

TORDYLIUM. G.P. 330.

Cor. radiatae, omnes hermaphroditae. Fructus suborbiculatus, margine crenatus. Involucra longa, indivisa. S. N. 204.

196. TORDYLIUM, *Antibriscus*, umbellis confertis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. Linn.
Spec. 346. (Caucalis - Hall. 741.)
H. secus vias passim; ad sepes am Dollberg copiose. Floret Junio & sequi.

Seta in caule deorsum, in radiis umbella sursum adpresso. Involucr. univ. polyphyllum, Umbella brevius. Involucr. part. polyphyllum, longitudine Umbellula. Flosculi rubentes. Semina ovato-oblonga, trisulca; setis rigidis, hamatis, hispida.

PEUCEDANUM. G.P. 339.

*Fructus ovatus, utrinque striatus, ala cinctus.
Involucra brevissima. S. N. 208.*

197. PEUCEDANUM, *Silaus*, foliotis pinnatifidis : laniis oppositis, involucro universali diphyllo.
Linn. Spec. 354. (Hall. 797.)

- H. in pratis humidiusculis *auf dem Westerwald* inter Ober- und Nieder-Rosbach frequens. Floret Julio.
- Radix perennis. Caulis bipedalis, brachiatus, sulcato-angulatus.
- Folia supradecomposita, pinnulis petiolatis, subpinnatifidis: foliolis oppositis, lanceolatis, margine coarctata-carinatis, obtusiusculis, mucrone cartilagineo; extimis 2 f. 3, basi coadunatis.
- Umbellæ inæquales, radiis 10. Umbellulae æquales, planæ.
- Involucrum rarissime 1 - f. 2 - pbyllum, plerumque nullum.
- Involucella decaphylla: foliolis linearie-lanceolatis, margine membranaceis, longitudine. Umbellula. Corolla lutea, extus pallidiores: Petala lanceolata, acuta, apice inflexo, adnato, nervo longitudinali. Filamenta corolla duplo fere longiora.
- Germen 6 - sulcatum. Styli brevissimi, petalis decidenter longiores. Stigmata capitata. Semina ovato-oblonga, trinervia, depresso-ovalis, odorata.

CONIUM. G. P. 336.

Involucella dimidiata, subtriphylla. *Fructus* subglobosus, 5-striatus, utrinque crenatus. S. N. 206.

198. CONIUM, maculatum, feminibus striatis. Linn. Spec. 349. (Cicuta. Hall. 766.).

H. in ruderatis hinter dem Schloß; ad versuras am Homberg; in cultis *auf dem Hintersand*, alibique frequens. Floret Julio.

Pharm. CICUTÆ (tutius CONII) Herba.

Radix biennis, fusiformis, albida. Caulis tri f. quadripedalis, erectus, ramosus, teres, aequalis, fistulosus, glaber, levissime striatus; ultra medium usque maculis purpurascientibus adpersus.

Folia radicalia magna, supradecomposita, nitida; supra obscure-viridia, subetus pallidiora. Pétoli uti caulis maculati, glabri, fistulosi, succulentii, teretes, supra vix depresso-ovalis. Fol. caulinæ multo minora: Vaginis membranaceis, nervosis, margine membranula tenui, albida, acuta, apice prominula, auctis; Pinnulis teneris, subpinnatifidis, inciso-dentatis, extimis confluentibus.

Umbella planiuscula: radiis 10-12, erecto-patulis. Umbellulae consimiles, radiis 15-16. Involucrum 3-5-pbyllum: foliolis ovato-lanceolatis, acutis, basi cochlitis, inæqualibus, reflexis, ultra medium usque albido marginatis, saepe unidentatis. Involucella monophylla, dimidiata, reflexo-patula, semitri-rarius quadrifida. Laciniis inæqualibus, ovatis, acutis.

Flosculi

Flosculi aquales, ontres fertiles. Calyx nullus. Cor. Petala alba, infexo-cordata, inaqualia, nervo intermedio supra eminentiore. Stainina longitudine corollæ. Germen subrotundum, striatum. Styli reflexi, brevissimi. Stigmata vix incrassata. Fructus subglobosus, striatus: Striis undulato-flexuosis. Seminaria duo, hemispherica, nervis tribus, eminentibus, crenatis. Umbellæ in Caule & Ramis terminali proxima, saepe opposita. Totius Planta odor si digitis conquassetur, vanescens, ingratus, Urina murina non absimilis.

Licet Planta hæc pervulgatis sit, tamen ejus Descriptionem accuratiorem dare volui; ut ad præparationem Extracti CONII (CICUTÆ Clar. STOERCKII) vera ac genuina Planta, his notis ab aliis facillime distingueda, non falsa, ut saepe fieri solet, adhibeat. Hujus Extracti rite præparati præstantiam, in pluriinis morbis difficultissimis, imprimis in *Cancro exulcerato* expertus sum. Inter alios, Rusticus quidam incola Herborn-Seelbacensis *Joannes Jacobus Grafe*, qui pessimo cancro exulcerato, per plures annos in parte oris sinistra laboraverat, Anno 1769. ad me venit. Exulceratio cancerosa in labio superiore, inferiore, & gena, adeo se extendebat, ut dentes incisores canini & molares, maxillaque gingiva erosa denudata, visu horribili adspectu paterent; ichore foetidissimo manante. Solo hujus Plantæ Extracto puro crassius inspissato, absque foliorum pulvere admixto, paucisque intermixtis evacuantibus rhubarbarinis, spatio quinque mensium, horribilem istum Cancrum felicissime extirpavi; ita quidem, ut os pristinam formam exacte reciperet, barbaque novæ partes tegerentur. Et quod mirandum erat: una hoc remedio, Ulcus antiquum sinuosum manans, in colli finistra parte, quo hic vir per viginti annos affectus fuerat, se consolidavit, & penitus evanuit. Adhuc dum scribo (1774.) in vivis est, & incorrupta fruitur valetudine.

Remedium certe innocuum tutissimumque. Continuata & sensim augenda dosi, audaci non timida manu porrigidum. Dosis a granis quinque; usque ad dragmas duas & ultra, bis de die, auxi. Etiam ægroti sensibiores, a nimie hujus Extracti aucta dosi, nihil aliud ab initio fentiebant, quam lenissimas tensiones spasticas fugaces in artubus; aliquique saepe scintillulas igneas, per aëra ante oculos fere moventes observarunt, absque ullo alio damno subsequente.

BUNIUM. G. P. 335.

Cor. uniformis. Umbella conferta. Fructus ovati. S.N. 206.

199. *BUNIUM, Bulbocastanum.* Linn. Spec. 349.
(*Bulbocastanum*-Hall. 783.)

H. inter segetes *bey dem Kalkofen*; in agris *hinter dem Hohenberg* copiose; *am Galgenberg* frequens. Floret Julio.

BUPLEURUM. G. P. 328.

Involucra umbellulæ majora, pentaphylla,
Petala involuta. *Fructus subrotundus*, com-
pressus, striatus. S. N. 203.

200. *BUPLEURUM, rotundifolium*, involucris universali-
bus nullis, foliis perfoliatis. Linn. Spec. 340.
(Hall. 767.)

H. in cultis *auf dem Hintersand* rarius; in hortis variis *vor dem untern Thor* frequens. Floret Junio, Julio.

Pharm. PERFOLIATA Herba, Semina.

SIUM. G. P. 348.

Fructus subovatus, striatus. *Involucrum polyphyllum*. *Petala cordata*. S. N. 211.

201. *SIUM, latifolium*, foliis pinnatis, umbella ter-
minali. Linn. Spec. 361. (Hall. 777.)

H. in fossis & rivulis pratorum *im Pulversgrund*, *am Beilstein* rarius. Floret Julio.

202. *SIUM, angustifolium*, foliis pinnatis, umbellis
axillaribus pedunculatis, involucro universali
pinnatifido. Linn. S. N. 211. Spec. 1672.

H. in rivulis pratorum *im Fischveyhergrund*. Floret Augusto.
Foliolorum paria inferiora, a sequentibus remotissima, pinnis
utrinque auriculatis, fere hastatis. Folia caulina, pinnis angu-
stioribus, subauriculatis, serratis: serraturis latiusculis, acumi-
natisimis. Umbellæ oppositifolia, pedunculatae. Involucr. uni-
versale 5 - 7. phyllum, inaequale: foliolis plerisque pinnatifidis, uno
semper reliquis longiore. Involucella simillima, etiam pinnatifida.

203. *SIUM, nodiflorum*, foliis pinnatis, umbellis
axillaribus sessilibus. Linn. Spec. 361. (Hall.
778.)

H. cum præcedente rarius *im Guldnergrund*. Floret Julio, Au-
gusto. *

SELINUM. G. P. 337.

Fructus ovali-oblongus, compresso-planus,
in medio striatus. *Involucrum reflexum*.
Petala cordata, æqualia. S. N. 207.

204. SELINUM, *Carvifolia*, caule sulcato acutangulo, involucro universali caduco, pistillis fructus reflexis. Linn. Spec. 350. (Hall. 802)

H. in pratis humidiusculis, *im Fischvveyhergrund rarius*; circa pagum *Sinn* copiose. Floret Julio.

Radix perennis, fusiformis, superne ramosa, odorata. Caulis 20 f. 3-pedalis, subramosus, erectus, strictus, 10-sulcatus; angulis membranaceis, ad ramifications, praereditum sub Umbrella, undulato-flexuosis. Folia erecta, angustata, triplicato-pinnata: Petiolis subtetragonis, supra sulco exaratis, basi membranaceis, nervosis; Foliolis oppositis, bi f. trilobis: lobis lanceolato-acuminatis, mucrone albido cartilagineo. Umbrella plana, aquatica, maturo fructu convexa: Radiis numerosis, sulco superne exaratis. Involucrum in virgineis Umbellis (loco naturali) polyphyllum, in florentibus monophyllum: Foliolis lanceolato-subulatis, unico excepto, mox deciduis. Involucella polyphyllea, patentia: foliolis subulatis. Flores ante explicacionem purpurascentes, dein albi, existimi paulo maiores. Calyx nulus. Petala subaequalia, inflexo-cordata, erectiuscula. Stamina Corolla duplo longiora. Styli erecti, breves, demum longiores, reflexi, persistentes. Fructus ovalis, compressus: apice purpureo, Stylosque reflexis coronatus. Semina matura lateribus a se invicem diuidentia hiant, nervis dorsalibus tribus, eminentibus, notata.

ANGELICA. G. P. 347.

Fructus subrotundus, angulatus, solidus, stylis reflexis. Corollæ æquales: petalis incurvis. S. N. 211.

205. ANGELICA, *Archangelica*, foliorum impari lobo. Linn. Spec. 360. (Hall. 807.)

H. ad sepes interhortenses *am Pitzbrückgen* frequens; Quasi indigena valde luxurians. Floret Julio.

Pharm. ANGELICÆ SATIVÆ Radix.

206. ANGELICA, *sylvestris*, foliolis æqualibus ovato-lanceolatis ferratis. Linn. Spec. 361. (Hall. 806.)

H. in fossis, & pratis humidiusculis frequens. Floret Julio.

Pharm. ANGELICÆ SYLVESTRIS Radix.

b. *Involucris partialibus*; Universali nullo.

AETHUSA. G. P. 355.

Involucella dimidiata, 3-phylla, pendula.

Fructus striatus. S. N. 213.

207. AETHUSA, *Cynapium*. Linn. Spec. 367. (Hall. 765.)

H. in cultis inter olera frequens. Floret æstate.
Involucella *sepe 5-phylla*.

SCANDIX. G. P. 357.

Cor. radiata. Fructus subulatus. Petala emarginata. Floculi disci sæpe masculi. S. N. 213.

208. SCANDIX, *odorata*, feminibus sulcatis angulis. Linn. Spec. 368. (Myrrhis. Hall. 753.)

H. in pomariis *am. Homberg unter der Lithau*, alibique frequens. Floret Majo, Junio.

209. SCANDIX, *Pecten veneris*, feminibus rostro longissimo. Linn. S. N. 213. Spec. 368. (Myrrhis. Hall. 754.)

H. inter segetes *auf dem Dollberg* frequens. Floret Junio.
Involucella *apice bifida*: Semen *nucleum condens*, *uti in praedente. Rostrum scabrum*.

210. SCANDIX, *Cerefolium*, feminibus nitidis ovato-subulatis, umbellis sessilibus lateralibus. Linn. Spec. 368. (Cerefolium. Hall. 747.)

H. in cultis, ruderatis, & ad sepes frequens. Floret Majo & sequi.

Pharm. CEREFOLII Herba.

211. SCANDIX, *Anthriscus*, feminibus ovatis hispidis, corollis uniformibus, caule lævi. Linn. Spec. 368. (Caucalis. Hall. 743.)

H. in arvis inter segetes, *am Galgenberg*; olim lecta, nunc rarissima planta. Floret Julio.

Invol. universale *sæpe monophyllum*. Involucella *5-phylla*: foliolis lanceolatis, mucronatis, ciliatis. Fructus *singula umbellula 5, rarius 6, ovati, hispida, bicornes*.

CHÆROPHYLLUM. G. P. 358.

Involucrum reflexum, concavum. Petala inflexo-cordata. Fructus oblongus, lævis.
S. N. 214.

212. CHÆROPHYLLUM, *sylvestre*, caule lævi striato, geniculis tumidiusculis. Linn. Spec. 369. (Cerefolium. Hall. 748.)

H. in pratis, pomariis, ad sepes, ubique vulgaris. Floret Majo, Junio.

Pharm. CICUTARIAE Herba.

213.

213. CHAEROPHYLLUM, *bulbosum*, caule geniculis tumido, basi hirto. Linn. S. N. 214. Spec. 370. (*Myrrbis. Hall. 752.*)

H. in sylvis, *in der Hörre* frequens. Floret Julio.

214. CHAEROPHYLLUM, *temulum*, caule scabro: geniculis tumidis. Linn. Spec. 370. (*Myrrbis. Hall. 750.*)

H. ad sepes passim. Floret Junio, Julio.

Flosculi disci abortientes, centrali excepto, qui sāpe fertilis.

215. CHAEROPHYLLUM, *bifutum*, caule æquali, foliolis incisis acutis, fructibus biaristatis. Linn. S. N. 214. Spec. 371. (*Myrrbis. Hall. 751.*)

H. in sylvaticis montosis circa *Langenaubach* infrequens. Floret Junio, Julio.

PHELLANDRIUM. G. P. 353.

Flosculi disci minores. Fructus ovatus, laevis, coronatus perianthio & pistillo. S. N. 213.

216. PHELLANDRIUM, *aquaticum*, foliorum ramificationibus divaricatis. Linn. Spec. 366. (*Hall. 757.*)

H. in fossis Urbis am *Judenveveyher*. Floret Junio, Julio.

Calycis lacinia 2 exteriore, reliquo duplo longiores.

c. *Involucro nullo*; nec universali, nec partialibus.

CARUM. G. P. 365.

Fructus ovato-oblongus, striatus. Involucrum 1-phyllum. Petala carinata, inflexo-emarginata. S. N. 216.

217. CARUM, *Carvi*. Linn. Spec. 378. (*Hall. 789.*)

H. in pratis passim; *auf der Sandwiese* copiose. Floret Majo, Junio.

Pharm. CARVI Semina.

PASTINACA. G. P. 362.

Fructus ellipticus, compresso-planus. Petala involuta, integra. S. N. 216.

218. PASTINACA, *sativa*, foliis simpliciter pinnatis. Linn. Spec. 376. (*Hall. 808.*)

H. in cultis *auf dem Hintersand*; & alibi frequens. Floret Julio.

Pharm. PASTINACE Radix, Semina. ANE-

ANETHUM. G. P. 364.

Fructus subovatus, compressus, striatus.
Petala involuta, integra. S. N. 216.

219. ANETHUM, *graveolens*, fructibus compressis.
Linn. Spec. 377.

H. in cultis, inter olera frequens. Floret Julio.
Pharm. ANETHI Herba, Semina.

220. ANETHUM, *Fæniculum*, fructibus ovatis. *Linn. Spec. 377.* (*Fæniculum. Hall. 760.*)

H. in cultis oletaceis *bey dem dicke Thurm; vor dem Sand - Thor* parcus. Floret Julio.

Pharm. FOENICULI Radix, Herba, Semina.
 ÆGOPODIUM. G. P. 368.

- Fructus* ovato-oblongus, striatus. S. N. 217.

221. AEGOPODIUM, *Podagraria*, foliis caulinis summis ternatis. *Linn. Spec. 379.* (*Podagraria. Hall. 759.*)
 H. ad sepes passim. Floret Julio.

APIUM. G. P. 367.

Fructus ovatus, striatus. *Involucr. t - phyl-lum. Petala æqualia.* S. N. 217.

222. APIUM, *Petroselinum*, foliis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Linn Spec. 379.*

H. in cultis *am Sieghaus;* *auf dem Hintersand;* ali-que infrequens. Floret Julio.

Pharm. PETROSELINI Radix, Herba, Semina.

223. APIUM, *graveolens*, foliis caulinis cuneiformi-bus. *Linn. Spec. 379.* (*Hall. 784.*)

H. in fossis, *an der Mühlbach,* *unter der Walck-mühle* tarius. Floret Julio.

Pharm. API Radix, Semina.

PIMPINELLA. G. P. 366.

Fructus ovato oblongus. *Petala inflexa. Stig-mata sub globosa.* S. N. 217.

224. PIMPINELLA, *saxifraga*, foliis pinnatis, folio-lis radicalib us subrotundis; summis linearibus. *Linn. Spec. 378.*

minor,

minor, α . *Pimpinella saxifraga minor*. *Baub. Pin.*

160. (*Tragofelinum Hall. 786.*)

major, β . *Pimpinella saxifraga major*, *umbella candida*. *Baub. Pin. 159.* (*Hall. 785.*)

H. α . in pratis & pasquis siccis auf der Sandwiese;
 β . Foliis triplo majoribus, in pratis bey Senn copiose. Floret Julio.

Pharm. PIMPINELLA ALBAE Radix.

225. *PIMPINELLA*, *bircina*, foliis duplicato-pinnatis, pinnulis profundissime lobatis. (*Tragofelinum. Hall. 787.*)

Pimpinella saxifraga, *bircina var. e. Linn. Spec. 378.*

H. in collibus siccis paßim. Floret Junio & seq.

C. TRIGYNI A.

* *Flores superi.*

VIBURNUM. G. P. 370.

Cal. 5-partitus, superus. Cor. 5-fida. Bacca 1-sperma. S. N. 218.

226. *VIBURNUM*, *Lantana*, foliis cordatis serratis venenosis subtus tomentosis. *Linn. Spec. 384 (Hall. 669.)*

H. in dumetis & ad sepes am Galgenberg, versus Burgk frequens. Floret Junio.

227. *VIBURNUM*, *Opulus*, foliis lobatis, petiolis glandulosis. *Linn. Spec. 384. (Opulus. Hall. 668.)*

H. ad sepes & ripas Dille, auf der Weißgärber Wiese; & alibi vulgaris. Floret Junio.

SAMBUCUS. G. P. 372.

Cal. 5-partitus. Cor. 5-fida. Bacca 3-sperma. S. N. 219.

228. *SAMBUCUS*, *Ebulus*, cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Linn. S. N. 219. Spec. 385. (Hall. 671.)*

H. in

H. in nemorosis ad pagum Erbach & Sinn. Floret Junio.

Pharm. EBULI Radix, Baccæ, Semina.

Corolla subpurpurea: Lacinia concava, ovata, acuta, apicibus incurvis. Antheræ oblongæ. Semina receptaculo columnari affixa.

229. SAMBUCUS, nigra, cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Linn. Spec. 385. (Hall. 670.)*

H. ad sepes passim. Floret Junio.

Pharm. S A M B U C I Flores, Baccæ.

Corolla alba: Lacinia convexa, obtusissima.

230. SAMBUCUS, racemosa, racemis compositis ovatis, caule arboreo. *Linn Spec. 386. (Hall. 672.)*

H. in nemorosis bey denen Steinkammern circa Erbach frequens. Floret Martio, Aprili.

Corolla exigua, viridis: Lacinia concava. Baccæ rubrae.
** *Flores inferi.*

STAPHYLEA. G. P. 374.

Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. inflatæ, connatæ. Sem. 2, globosa cum cicatrice. S. N.

219.

231. STAPHYLEA, pinnata, foliis pinnatis. *Linn. Spec. 386. (Hall. 831.)*

H. in sylvaticis montosis auf der Schindgrube; ad sepes am Homberg rarius. Floret Majo, Junio. Styli duo, sepius tres. Capsula trilocularis. Semina constanter duo in majoribus loculamentis, tertio abortiente.

ALSINE. G.P. 380.

Cal. 5-phylloides. Petala 5, æqualia. Caps. 1-locularis, 3-valvis. S. N. 221.

232. ALSINE, media, petalis bipartitis, foliis ova-to-cordatis. *Linn. Spec. 389. (Hall 88c.)*

H. in cultis & agris copiosissime. Floret tota fere æstate.

D. T E T R A G Y N I A.

PARNASSIA. G.P. 384.

Cal. 5-partitus. Petala 5. Nectaria 5, cor-data,

data, ciliata apicibus globosis. *Caps. 4* - valvis. S. N. 221.

233. PARNASSIA, *palustris*. Linn. Spec. 391. (Hall. 832.)

H. in pratis humidis, ad pagos Enderoth, Emmerichenhain, & Erbach frequens. Floret Augusto.

E. P E N T A G Y N I A.

LINUM. G. P. 389.

Cal. 5 - phyllus. *Petala 5*. *Caps. 5* - valvis, 10-locularis. *Sem. solitaria*. S. N. 223.

234. LINUM, *usitatissimum*, calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. Linn. Spec. 397. (Hall. 836.)

H. in arvis auf dem Schießplatz; am Homberg; Dollberg; infrequens. Floret Julio.

Pharm. LINI Semina.

235. LINUM, *catharticum*, foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. Linn. Spec. 401. (Hall. 839.)

H. in pratis siccis passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. LINI CATHARTICI Herba

Filamenta basi connata, germen vestiens; interjectis denticulis alternis, exiguis, acutis. (Geranii.)

236. LINUM, *Radiola*, foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. Linn. Spec. 402. (Hall. 840.)

H. in arenosis humidis, circa Langenaubach; ipse nondum legi. Floret aestate ♀.

DROSCRA. G. P. 391.

Cal. 5 - fidus. *Petala 5*. *Caps. 1* - locularis: apice 5 - valvis. *Sem. plurima*. S. N. 225.

237. DROSCRA, *rotundifolia*, scapis radicatis, foliis orbiculatis. Linn. Spec. 402. (Rorella. Hall. 834.)

H. in pratis uidis, circa Mademühlen; Hohenroth. Floret Julio.

Pharm. RORELLA f. RORIS SOLIS Herba.

238. DROSERA, *longifolia*, scapis radicatis, foliis oblongis. Linn. Spec. 403. (Rorella. Hall. 833.) H. cum precedente rarius, cuius forte varietas est. Floret Iulio.

F. POLYGYNIA.

MYOSURUS. G.P. 394.

Cal. 5 - phyllus, basi adnatus. *Nectaria 5*, subulata, petaliformia. *Sem. numerosa*. S. N. 227.

239. MYOSURVS, *minimus*. Linn. Spec. 407. (Hall. 1159.)

H. in agris arenosis am Dollberg; in cultis in der untern Pitze frequens. Floret Majo.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

A. MONOGYNIA.

* *Flores calyculati, calyce corollaque instructi.*

BERBERIS. G. P. 442.

Cal. 6 - phyllus. *Petala 6*: ad ungues glandulis 2. *Stylus 0*. *Baccā 2* - sperma. S. N. 252.

240. BERBERIS, *vulgaris*, pedunculis racemosis. Linn. Spec. 471. (Hall. 828.)

H. ad sepes hinter dem Schloß rarius; ad pagos Fließbach & Greiffenstein frequens. Floret Junio.

Pharm. BERBERIDIS Fructus.

** *Flores spathacei s. glumacei.*

LEUCOJUM. G. P. 402.

Cor. campaniformis, 6 - partita, apicibus incaffata. *Stigma simplex*. S. N. 234.

241. LEUCOJUM, *vernū*, spatha uniflora, stylo clavato. Linn. Spec. 414. (Galanthus. Hall. 1253.)

H. in pratis an der Dille, unter dem Sieghaus; in nemorosis ad Erbach; im Thiergarten copiose. Floret Martio.

NARCIS-

NARCISSUS. G. P. 403.

- Petala 6: Nectario infundibuliformi, 1-phyllo. Stam. intra nectarium. S. N. 234.*
242. *NARCISSUS, poëticus*, spatha uniflora, nectario rotato brevissimo scarioso crenulato. *Linn. Spec. 414. (Hall. 1250.)*
H. in pomariis & pratis am Sieghause rarius. Floret Majo.
243. *NARCISSUS, Pseudo - Narcissus*, spatha uniflora, nectario campanulato erecto criso aequante petala ovata. *Linn. Spec. 44. (Hall. 1252.)*
H. in pomariis & pratis am Sieghause copiose. Floret Martio.

ALLIUM. G. P. 409.

- Cor. 6-partita, patens. Spatha multiflora, Umbella congesta. Caps. supera. S. N. 237.*
244. *ALLIUM, carinatum*, caule planitolio bulbifero, staminibus subulatis. *Linn. Spec. 426. (Hall. 1224.)*
H. in sylvaticis montosis am geistlichen Berg. Floret Julio.
245. *ALLIUM, vineale*, caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis. *Linn. Spec. 425. (Hall. 1221.)*
H. in sylvaticis montosis bey dem Eulenhause. Floret Julio.
246. *ALLIUM, oleraceum*, caule teretifolio bulbifero, foliis scabris semiteretibus subtus sulcatis, staminibus simplicibus. *Linn. Spec. 429. (Hall. 1223.)*
H. in pomariis & pratis siccis passim. Floret Julio.

*** Flores nulli

CONVALLARIA. G. P. 425.

- Cor. 6-fida. Bacca maculosa. 3-loocularis. S. N. 246.*
247. *CONVALLARIA, majalis*, scapo nudo. *Linn. Spec. 451. (Polygonatum. Hall. 1241.)*
H. in montosis auf der Steinseite; in der Cullenbach; in pratis sylvaticis bey Langenaubach; alibique frequens. Floret Majo. Pharm. LILII CONVALLII Flores.
248. *CONVALLARIA, verticillata*, foliis verticillatis. *Linn. Spec. 451. (Hall. 1244.)*

F 2

H.

H. in sylvaticis montosis *im Hirschberg*, auf dem Westerwald circa Willingen. Floret Junio.

- 249.** CONVALLARIA, *Polygonatum*, foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. Linn. Spec. 451. (Hall. 1242.)
H. in sylvis; *im Hirschberg* frequens. Floret Majo.
Pharm. SISILLI SALOMONIS Radix.

- 250.** CONVALLARIA, *multiflora*, foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillariibus multifloris. Linn. Spec. 452. (Hall. 1243.)
H. in sylvis, *in der Hörre*; *im Hirschberg* & *Thiergarten* frequens; in dumetis *am Homberg* parcus. Floret Majo.

- 251.** CONVALLARIA, *bifolia*, foliis cordatis, floribus tetrandris. Linn. S. N. 247. Spec. 452. (*Unifolium*. Hall. 1240.)
H. in pratis sylvaticis asperis, *im Hirschberg*; *in der Hörre*, vulgaris. Floret Majo, Junio.

Pedicelli *gemini*. Corolla *4-partita*. Stamina *quatuor*. Stigma *bifidum*. Bacca *bilocularis*, *disperma*.

ANTHERICUM. G. P. 422.

- Cor.* 6-petala, patens. *Caps.* ovata. S. N.
244.

- 252.** ANTERICUM, *Liliago*, foliis planis, scapo simplicissimo, corollis planis, pistillo declinato. Linn. Spec. 445. (*Phalangium*. Hall. 1207.)
H. in montosis sylvaticis *im Beilstein* frequens. Floret Junio.

ORNITHOGALUM. G. P. 418.

- Cor.* 6-petala, erecta, persistens, supra medium patens. *Filamenta* alterna basi dilata. S. N. 242.

- 253.** ORNITHOGALUM, *luteum*, scapo angulo diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. Linn. Spec. 439. (*Phalangium*. Hall. 1213.)
H. in pratis & pomariis *unter der neuen Brücke*, alibique copiose. Floret Martio, Aprili.

- 254.** ORNITHOGALUM, *minimum*, scapo angulato diphylo, pedunculis umbellatis ramosis. Linn. Spec. 440. (Hall. 1214.)
H. in agris *in der Aue*; *am Dollberg* parcus. Floret Aprili.

Scapo

*Scapo subtereti, Umbella breviore, Involuci Foliis pluribus, longioribus; Pedunculis teretibus, subramosis, pubescentibus; Corollæ petalis 6-8-9, aurea flavedine nitentibus, paten-
tissimis, acutioribus; tribus exterioribus obtusioribus, subratis pubescentibus; Pistillo subvilloso, plurimque abortiente; Bul-
bulis congestis, axillaribus, bracteatis, quibus planta propagatur,
a precedente distinguitur.*

255. *ORNITHOGALUM, pyrenaicum, racemo longisimo, filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus æqualibus: fructiferis scapo approximatis.* Linn. Spec. 440. (Hall. 1210.)

H. in pomariis am Sieghaus rarius; dubia civis ex hortis au-
fuga. Floret Majo.

SCILLA, G. P. 419.

Cor. 6-petala, patens, decidua. Filamenta filiformia. S. N. 243.

256. *SCILLA, amoena, floribus lateralibus alternis subnutantibus, scapo angulato.* Linn. S. N. 243.
Spec. 443. (*Phalangium.* Hall. 1211?)

H. in pomariis am Sieghause rarius; planta exotica originis.
Floret Majo.

ASPARAGUS. G. P. 424.

*Cor. 6-partita, erecta: petalis tribus interio-
ribus apice reflexis. Bacca 3-locularis: 2-
sperma.* S. N. 245.

257. *ASPARAGUS, officinalis, caule herbaceo tereti
erecto, foliis setaceis, stipulis paribus.* Linn.
S. N. 245. Spec. 448. (Hall. 1239.)

H. in pomariis am Sieghause; ad muros pontis novi; alibique
rarius. Floret Junio, Julio.

Pharm. ASPARAGI Radix, Semina.

*Nostra Planta culta & spontanea, semper est dioica. Maris Co-
rolla duplo major; Stamina perfecta; Pistillum imperfectum,
exiguum, abortiens. Feminæ Corolla apicibus omnibus
erectis: Stamina castrata s' Antheris destituta. Pistillum
longitudine tubi corolla; Stigma crassiusculum, trifidum. Bacca
hexasperma.*

LILIUM. G. P. 410.

*Cor. 6-petala, campanulata: linea longitu-
dinali*

F 3

dinali nectarifera. *Caps.* valvulis pilo cancellato connexis. S. N. 240.

258. LILIUM, *Martagon*, foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Linn. Spec.* 435. (*Hall. 1233.*)

H. in pionariis am Sieghause rarius. Floret Junio.

TULIPA. G. P. 415.

Cor. 6-petala, campanulata. *Stylus o.* S. N. 241.

259. TULIPA, *sylvestris*, flore subnutante, foliis lanceolatis. *Linn. Spec.* 438 (*Hall. 1236.*)

H. in pratis & pionariis unter der neuen Brücke; alibique copiosissime. Floret Majo.

Petala omnia apice, tria interiora etiam basi villosa.

**** *Flores incompleti.*

ACORUS. G. P. 434.

- T. XIII. f. 12. *Spadix cylindricus*, testus flosculis.

Cor. 6-petalæ, (c. C. M.) nudæ. *Stylus o.* *Caps.* (p). 3-locularis. (r). S. N. 249.

260. ACORUS, *Calamus*. *Linn. Spec.* 462. (*Hall. 1307.*)

H. in fossis bey der oberen Papiermühle; am steinernen Wagg rarius. Floret Junio.

Pharm. CALAMI AROMATICI Radix.

IUNCUS. G. P. 437.

Cal. 6-phyllo. *Cor.* c. *Caps.* 1-locularis. S. N. 250.

a. *Calmis nudis.* *Capsulis polyspermis.*

261. IUNCUS, *conglomeratus*, culmo nudo stricto, capitulo laterali. *Linn. Spec.* 464. (*Hall. 1312.*)

H. in pratis uliginosis, hinter dem Homberg; in der Callenbach; & alibi frequens. Floret Junio

- T. XIII. f. 1. *Radix horizontalis*, densa, oblique descendens, squamis vestita ovatis; radicalibus fibris filiformibus, longissimis. Culmi 1-f. 2-pedales, erecti, stricti, teretes, glabri, nudi; farcti medulla spongiosa; Vaginis ad basin vestiti striatis, obtusis, aphyllis, aristatis: supra triplex longiore. Folia radicibus paucæ, culmo simillima. Capitulum subrotundum, solitarium, rarius geminum, floribus glomeratis composatum,

tum; ex fissura culmi, marginibus dilatatis membranaceis, infra apicem rectum erumpens. Pedunculi breves, numerosi, conferti, subdivisi; uti in reliquis, ad basin vaginula vestiti, squamulaque lanceolato-acuminata bracteati. Calycinae squamæ dua exigua. (a) Cor. Petala sex, ovato-acuminata. (c. C.) Stamiina in hoc, sapis repetita floris anatome, constanter tria, nunquam sex, reperire potui. (C. M.) Capsula longitudine petalorum, trigona, angulis acutis apice prominulis, styllo brevi terminata. (p. P.) Semina obverse conica, acutiuscula, albida. (f. S.)

262. IUNCUS, effusus, culmo nudo stricto: panicula laterali. Linn. Spec. 464. (Hall. 1311. var. β.)

H. in fossis passim; in der Alzbach; an der Mühlbach, bey der untern Walckmühle frequens. Floret Julio.

T. XIII. f. 2. Radix, Culni, Folia radicalia, & Pedunculi præcedentis; at majora omnia. Culmus tripedalis, crassior, ractu mollior, facile rumpendus, medulla densa ad lampades aptissima farctus. Panicula lateralis, plus minusve sparsa: Pedunculis confertis, inqualibus, ramosis, sursum deorsumque vergentibus; Bracteis oblongis aristatis. Flores jufusci. Petala aequalia. (A. C.) Capsula obovata, subtrigona, obtusissima, longitudine petalorum. (p. P.) Semina fulva. (f. S.)

263. IUNCUS, inflexus, culmo nudo: apice membranaceo incurvo, panicula laterali. Linn. Spec. 464. (Hall. 1311. α.)

H. iisdem in locis cum præcedente, et alibi frequens. Floret Julio.

T. XIII. f. 3. Squamis Culni basin vestientibus purpureis, nitidis; Culmo filiformi, longiore, tenuiore, firmiore, striato, tenacissimo, minus recto, supra paniculam longius producto, apice emarcido, acutiore, incurvo, maturo fructu, infexo; Panicula majori; Pedunculis & Pedicellis longioribus, strictioribus, omnibus sursum nec deorsum vergentibus. Floribus ante explicationem exakte subulatis, cum Calycibus & Bracteis spadiceo-purpureis nitidis; Petalis longioribus, subulatis, interioribus tribus reliquis paulo brevioribus; (c) & Capsula Petalis breviore, acutiore, (p. P.) a precedente facile dignosci potest.

264. IUNCUS, filiformis, culmo nudo filiformi nubante, panicula laterali. Linn. Spec. 465. (Hall. 1313.)

T. XIII. f. 4. Radix obliqua, teres, squamata; fibris capillaribus. Folia radicalia pauca, filiformia, brevia, erecta. Culni plures, sesquipedales, infirmi, filiformes, compressi, striati, ad basin squamati; ad paniculam usque erecti, supra paniculam duplo longiores,

arcuatim deorsum flexi, apice acuto emarginato. Panicula simplicissima, pauciflora, ex fissura culmi, infra medium erumpens. Pedunculi 5 f. 7, simples, unijori, rarius biformes; foliolo lanceolato, aristato, ad basin bracteati. Calycis foliola albida, ovata, acuminata, majora quam in precedentibus. (a) Petala subulata flavo viridia: tria interiora paulo breviora. (c) Germen obtusum, purpureum. Capitulas nondum vidi.

b. *Culmis foliosis.*

265. IUNCUS, articulatus, foliis nodoso-articulatis, petalis obtusis. Linn. Spec. 465.

a. *aquaticus.* Juncus foliis compressis, articulatis, panicula semel ramosa. Hall. 1322.

β . - - - Gramen junceum, folio articuloso, cum utriculis. Schenckz. Agr. 333.

γ . *sylvaticus.* Juncus foliis teretibus articulatis, panicula repetito-ramosa. Hall. 1323.

H α . in pratis uliginosis passim; β , in pratis humentibus am Steinern Waag rarius; γ , in pratis sylvaticis udis am Beilstein; im Guldners- & Fischueyher Grund. Floret Julio & seq.

T. XIII. f. 6. a. Radix horizontalis, lignosa, teres, fibrosa. Folia radicalia ultrapedalia, compresso-teretia, glabra, fistulosa, interne isthmis intercepta, (1) exsiccatione nodo-articulata. (2) Culmus 2- f. 3- pedalis, erectus, teres, glaber, foliatus; geniculus 4 f. 5, vaginis occultatis, interceptus. Folia culmea bifaria, alterna, patentia, recta, radicalibus simillima: Vaginis longis, subcompressis, glabris, culmum ultra medium vestientibus; inferioribus aphyllis, obtusis, aristatis. Panicula terminalis. Pedunculi pauci, alterni, erecti, inaequales, dichotomo-ramosi: quorum inferior Folio florali subulato, erecto, longitudine fere Panicula instructus; reliqui squamis lanceolato-acuminatis, bracteati. Flores subcapitati; congesti, exigui, axillares, terminalesque. Calycina duo foliola ovato-acuminata, membranacea. Petala subulata, acuta subfusca, dein subpurpurea. Capsula trigona, acuminata, purpurascens, petalitis longior. (p. p.)

Var. β . vivipara: Culmo breviori; Floribus vel omnibus, vel paucis in fasciculos foliorum viridi-purpureos excrescentibus; rarius auctumno occurrit, in pratis inundatis.

Var. γ . differt: Foliis teretibus, Culmis alioribus; Panicula ramostore, supradecomposita; Capitulis multifloris, majoribus. Flo-

Floribus purpureis, nitidis. Petalis acutissimis, interioribus tribus paulo brevioribus; in reliquis vix differt.

- 266. IUNCUS, bulbosus, foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis.** Linn. Spec. 466. (Hall. 1318. & forte var. minor. 1320.)

H. in pascuis humentibus, ad vias pallium; Var. junior *bey der oberen Walkmühle*; major, *unter der neuen Brücke*, & alibi frequens. Floret Julio.

T. XIII. f. 7. Radix densa fibrosissima, horizontalis. Culmus spithameus seu pedalis, erectus, subfoliatus, glaber, compressus: uno latere convexo, altero planiore; Geniculis duobus interceptus: quorum inferius (rarius duo,) radici proprius, vaginis tectum, alterum infra paniculam, nudum. Folia bifaria, linearia, canaliculata, glabra, subitus striata, subvaginaria, culmo breviora: Vaginis ad culmi basin congestis, compressis, carinatis, membrana tenuissima, albida, apice prominula, utrinque auctis.

Folia floralia duo culmeis simillima, erecta: quorum inferius longitudine Corymbi, superius brevius. Panicula erecta, in aqua- lis, maturo fructu corymbosa. Pedunculi 3, f. 4, subdivisi; primario semper reliquis longiore: Bracteis lanceolato-setaceis. Flores solitarii, exigui, colorati; terminales saepius terni: intermedio axillari, sessili. Calycinæ squamæ ovata, albidae. (A.) Cor. Petala oblonga, obtusissima, sub florescentia ere- cituscum; interiora tria tenuiora, purpurascens. (c. C.) Stig- mata supra Corollam longe prominentia. (O) Capsule sub- globose, fere ovales, fusca, nitida, petalis longiores, stylo vix manifesto terminata. (p. P.) Semina fulva, pellucida. (f. S.)

- 267. IUNCUS, bufonius, culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus.** Linn. Spec. 466. (Hall. 1319.)

B. Gramen nemorosum calyculis paleaceis, species altera procerior. Scheuchz. Agr. 328.

H. α . locis inundatis, ad vias ubi aquæ pluviales stagnarunt, cum præcedente *bey der Walkmühle* copiosissime; β . in sylvaticis uidis im Stübers- & Fischveyher-Grund frequens. Floret Junio & seq.

- T. XIII. f. 8. α . Radix annua, fibrosa, Culni spithamei s. dodrantales; erecti, teretisculi, glabri, dichotomi. Folia culmea pauca, subvaginaria, linearia, carinata. Bracteæ lan- ceolato-setacea, inferiores foliformes. Flores solitarii, sessiles; unico semper in omnibus culni divisionibus axillari, reliquis

versus ramorum apicem dispositis, unilateralibus, remotis. Calycinæ squamæ ovato-acuminata, albida. (a.) Petala lanceolato-subulata, (c.) acutissima; (2) tria interiora breviora. (1. c.) Capsula oblonga, subtrigona, obtusissima, fusca, nitida, petalis brevior, (c. p.) trivalvis. (q.) Receptaculum puberulum, tripartibile: Singula lacinia (y) Semina utrinque adfiguntur numerosa, fusca. (f. S.)

Var. β. differt: Culmo bipedali, erectiusculo, subdiffuso, infirmore, ad dichotomiam magis nodoso; Foliis numerosioribus, majoribus; Floribus sepe in fasciculos foliorum excrescentibus; Petalis longioribus, aristatis.

c. *Capsulis trispermis.*

268. IUNCUS, pilosus, foliis planis pilosis, corymbo ramoso Linn. Spec. 468. Var. β. (Hall. 1325. & forte 1324.?)

H. in sylvis frequens; am Homberg, Geistlichenberg, alibi parsius. Floret Majo, Junio.

T. XIII. f. 10. Radix densa, fibrosa. Culmi pedales, erecti, teretes, subtrinodes, foliati. Folia vaginantia, linearis-lanceolata, nervosa, lata, plana: duo floralia inaequalia, erecta, corymbo breviora; omnia marginibus, & imprimis Ligulae loco, valde pilosa, apice callosa. Corymbus umbelliformis: Pedunculis 7-9, f. 11, simplicibus, uni- seu bifloris, rarius bifidis, triploris, basi vaginatis, bracteatisque; primariis erectis, secundariis reflexis. Flores solitarii. Calycinæ squamæ duæ ovatae, obtusissimæ. (a.) Cor. Petala ovato-acuminata, aquaria, spadiceo-purpurea, margine albido, dein flavescente. (c.) Capsula subglobosa, stylo terminata. (p.) unilocularis, trivalvis. (r.) Semina tria. (f.)

269 IUNCUS, niveus, foliis planis subpilosis, corymbis folio brevioribus, floribus fasciculatis. Linn. Spec. 468. (Hall. 1328.)

H. in sylvaticis montosis asperis im Beilstein; am Homberg; am Callenbachsberg, & alibi copiose. Floret Junio.

T. XIII. f. 9. Radix lignosa, teres, obliqua, fibris cirrhosis, sujcis. Folia radicalia numerosa, emarginata, culmo breviora. Culinus 1- f. 2-pedalis, erectus, teres, striatus, foliatus, 4. f. 5-nodis. Folia culinea vaginantia, latiuscula, nervosa, longissime acuminata, marginibus & imprimis Ligulae loco, valde pilosa. Folia duo floralia, minus pilosa, angustiora, corymbos arcuatim superantia, sepe tantum adspicantia. Pedunculi numerosi, alterni, longi, inaequales, apice in Pedicellos fere capilla-

capillares divisi, & subdivisi. Corymbi subconvexi, erecti, demum nutantes. Flores fasciculati, solitari & conferti, albidii, pulchre purpureo-maculati, nitidi Calycis Foliola duo ovata, acuta, subciliata. Corolla calyce triplo major: Petala exteriora tria breviora, ovato-acuta; tria interiora $\frac{1}{3}$ longiora, latiora, tenuioraque, lanceolata. (c. C.) Capiula ovato-globosa, acutiuscula, trisperma. (p. q. S.)

270. *LUNCUS, campestris, foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. Linn. Spec. 468. (Hall. 1330.)*

B. Juncoides montanum nemorosum villosum latifolium elatius; capitulis florum candidis & splendentibus. Mich. Gen. 42?

H. a. in pastuis siccis ubique vulgaris. Floret Martio, Aprili. B. in montosis sylvaticis hinter dem Homberg. Floret Mayo.

T. XIII. f. 5. *Radix lignosa, nodosa, fibrosa, vaginis emarginidis vestita, oblique descendens. Folia radicalia lata, plana, undique pilosa, apice callosa. Culmus spithameus i dodranalis, eretus, teres, striatus, suberinouis, foliatus. Vaginae striatae, nuda. Folia culnea radicalibus breviora, confimilia, marginibus imprimis Ligula loco, valde pilosa. Folia duo floralia alterna, pilosa, pedunculis breviora. Spicæ 3. 4. f. 5, ovatae atro-spadiceæ, nitidae; pauciores subsessiles, plures pedunculatae, erecta, demum pendula, subsecunda. Bractæ ovatae, acuminate, membranacea, albidae. Flores in singula Spica 9-11-13, conferti. Calycinæ squamae dua ovatae, albidae. Petala subqualia, lanceolato-acuminata, atro-spadicea, margine flavesciente. (c.) Capsula trisperma. p. q.)*

Var. *B.* *Folia angustiora, longiora, minus pilosa. Culmus ultrapedalis. Pedunculi 7-9, longiores. Spicæ oblongiores, tenuiores, albido-ferruginea, omnes pedunculatae. Flores triplo minores, distinctiores, minus conferti. Petala acuminatissima. In reliquis convenit.*

B. TRIGYNIA.

COLCHICUM. G.P. 457.

Spatha. Cor. 6 - partita : tubo radicato. Capsule tres, connexæ, inflatæ. S.N. 256.

271. *COLCHICVM, autumnale, foliis planis lanceolatis erectis. Linn. Spec. 485. (Hall. 1255.)*
H. in

H. in pratis humidiusculis passim. Floret Augusto & sequ.

Pharm. Colchici Radix.

Tubus longissimus, trigonus, ex basi bulbi ortus; inferne vestitus: squamis vaginantibus, rudimenta irium foliorum futuri anni includentibus. Germen extra radicem (nec intra) columnæ tereti affixum. Styli tenerrimi, flexuosi. Stigmata incurva.

TRIGLOCHIN. G. P. 453.

Cal. 3 - phyllus. Petala 3, calyciformia. Stylus o, Caps. basi dehiscens. S. N. 256.

272. TRIGLOCHIN, *palustre*, capsulis trilocularibus sublinearibus. Linn. Spec. 482. (Hall. 1308.)

H. in pratis diutius inundatis am Steinern Waag abunde. Floret Junio, Julio.

T. XII. f. 5. Radix biennis, bulbosa, vaginis emarginatis tunicata: basi emittens fibras filiformes, simplices, flavescentes. Folia culmi basin vestientia, linearia, carinato - canaliculata, laevia, culmo breviora. Vaginæ subcompressæ, membrana tenuissima, albida, apice prominula, utrinque aucta. Culmus dehinc nudus, dodrantalis, demum ultrapedalis, erectus, strictus, subtrigonous, laevis. Racemus terminalis, subspicatus. Flores exigui, erecti, alterni, brevissime, demum longius pedunculati. Bractæ nulla. Calycis tria Foliola ovata, obtusa: nervo medio crassiore, viridi, supra medium deliquescente; marginibus albidis. Corollæ petala tria cum calyce alternantia, consimilia, paulo minora, tenuiora, albida, subpurpurea: (c. C.) Singulo Foliolo Calycinno, & singulo petalo, Stamen unicum, Filamento brevissimo affixum. (M. c.) Germen obovatum, supra corollam prominens. Stigmata tria, acuta, persistentia; sub florescentia ob plumulas numerosas, reflexas, vix distinguenda. (O) Capsula obverse conica, (p.) trigona, apice tribus denticulis, (antea stigmatibus) coronata; (p) basi angustata tribus valvulis dehiscens subulatis; Receptaculo linearitrigono.

trigono. (V) *Singula valvula latere interiore longitudinaliter dehiscit,* (p.f.) *Semen demittens acuminatum.* (S.)

Gramine hoc pecora pra aliis delectantur.

RUMEX. G.P. 451.

Calyx 3 - phyllus. Petala 3, conniventia. Semen unicum, triquetrum. S. N. 254.

a. *Hermaphroditii : valvulis granulo notatis.*

273. RUMEX *Patientia*, floribus hermaphroditis : valvulis integerrimis : unica granifera, foliis cordatis. Linn. Spec. 476.

H. spontanea quasi in cultis am Dollberg ; am heiligen Floß; in pratis am Sieghaus infrequens. Floret Julio.

Pharm. PATIENTIAE Herba.

274. RUMEX, *sanguineus*, floribus hermaphroditis : valvulis integerrimis : unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. Linn. Spec. 476.

H. iisdem in locis cum præcedente rarius, Floret Julio.

Pharm LAPATHI SANGVINEI Radix, Semina.

275. RUMEX, *conglomeratus*. Murray. Prodr. Stirp. Gætt. 52.

Lapathum petiolis latescentibus, foliis longe lanceolatis, floribus verticillatis verrucosis. Hall. 1590.

H. in fossis bey der Walckmühle; in der Alzbach; alibique copiose. Floret Julio.

Caulis 1 f. 2 - pedalis, erectus, sulcatus. Rami distantes, erecto-patentes, subdiffusi. Folia ovato-lanceolata, planiuscula. Verticilli numerosi, remoti : floribus exiguis, copiosissimis, glomeratis, reflexis. Pedicelli breves; infra articulationem crassiores, purpurei. Valvulae oblongæ, integerrima, omnes graniferae: granulo purpureo s. fulvo instructæ.

276. RUMEX, *crispus*, floribus hermaphroditis : valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. Linn. Spec. 476. (Hall. 1589.)

H. in

H. in agris, ad vias, ubique pervulgaris. Floret Julio & sequ.

277. RUMEX, *acutus*, floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Linn. Spec. 478.* (*Hall. 1591.*)
H. in fossis, ad ripas *Dilla am steinern Waag* rarius.
 Floret Julio.

Pharm. LAPATHI ACUTI Radix.

278. RUMEX, *obtusifolius*, floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato oblongis obtusiusculis crenulatis. *Linn Spec. 478.* (*Hall. 1592.*)

H. ad foissas, secus vias ubique vulgaris. Floret Julio, Augusto.

Valvulae corolla integerrima, Anthesi peracta tantum dentata, triplo majores.

b. *Hermaphroditis*: *valvulis granulo destitutis s. nudis.*

279. RUMEX, *aquaticus*, floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis, *Linn. S. N. 255. Spec. 479.* (*Hall. 1588.*)

H. ad ripas *Dilla am steinern Waag* rarius. Floret Junio, Julio. +

RUMEX, *scutatus*. *Linn. Spec. 480.* (*Hall. 1594.*)

Planta gallo-provincialis, quæ alias in hortis hospitatur, sponte quasi valde luxuriat; ad sepes in graminosis *am heißen Flöß.* Floret Junio.

c. *Floribus declinis.*

280. RUMEX, *Acetosa*, floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Linn. Spec. 481.* (*Hall. 1597.*)

H. in pratis & pomariis passim. Floret Junio.

Pharm. ACETOSÆ Radix, Herba.

Maris Calyx patens, Feminæ reflexus.

281. RUMEX, *Acetosella*, floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Linn. Spec. 481.* (*Hall. 1596.*)

H. in collibus ticcis aprici passim; *am Homberg & Dollberg copiose.* Foliosis non hastatis ludit. Floret Majo & seq.

C. POLY-

C. POLYGYNIA.

ALISMA. G. P. 460.

Cal. 3 - phyllus. Petala 3. Semina plura. S.N.

257.

282. ALISMA, *Plantago aquatica*, foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. Linn. Spec. 486. (*Damasonium*. Hall. 1184.)

H. in fossis stagnis & rivulis passim. Floret Julio, Augusto.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

ÆSCULUS. G. P. 462.

Cal. 1 - phyllus, 5 - dentatus, ventricosus.

Cor. 5 - petala, inæqualiter colorata. calyci inserta. Caps. 3 - locularis. S.N. 259.

283. ÆSCULUS, *Hippo Castanum*, floribus heptandris. Linn. Spec. 488. (*Hippocastanum*. Hall. 1029. ***)

H. arbor procera intra urbem am Lövven; junior ad portam horti mei am Sieghäuser Weg. Floret Junio.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

A. MONOGYNIA.

* Flores completi.

EPILOBIUM. G. P. 471.

Cal. 4 - fidus. Petala 4. Caps. oblonga, infera. Sem. papposa. S. N. 264.

, Stami-



a. *Staminibus declinatis.*

- 284.** EPILOBIUM, *angustifolium*, foliis sparsis linea-
ri - lanceolatis, floribus inæqualibus. *Linn.*
Spec. 493. (*Hall. 1000.*)

H. in montosis sylvaticis am *Homberg*; ad versuras auf
der Weisgärber - und Sandviese; alibique fre-
quens. Floret Julio.

b. *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*

- 285.** EPILOBIUM, *hirutum*, foliis oppositis lanceo-
latis serratis decurrenti amplexicaulibus. *Linn.*
Spec. 494. (*Hall. 995.*)

B. *Lysimachia siliquosa hirsuta*, parvo flore. *Baub.*
Pin. 245.

H. a, & b, ad ripas *Dille* & an der *Mühlbach*
abunde. Floret Julio, Augusto.

- 286.** EPILOBIUM, *montanum*, foliis oppositis ovatis-
dentatis. *Linn. Spec. 494.* (*Hall. 996.*)

H. in montosis ad radices rupium am *Homberg* &
Dollberg frequens. Floret Julio.

- 287.** EPILOBIUM, *tetragomum*, foliis lanceolatis den-
ticulatis: imis oppositis, caule tetragonon.
Linn. Spec. 494. (*Hall. 997.*)

H. ad fossas passim, an der *Mühlbach* frequens. Flo-
ret Julio.

- 288.** EPILOBIUM, *palustre*, foliis oppositis lanceola-
tis integerrimis, petalis emarginatis, caule
erecto. *Linn. Spec. 495.* (*Hall. 998.*)

H. in pratis humentibus juxta rivulos im *Güldner-*
grund. Floret Augusto.

In hoc & præcedente Stigma crassiusculum clavatum,
apice subquadrididum.

OENOTHERA. G. P. 469.

*Cal. 4-fidus. Petala 4. Caps. cylindrica, infe-
ra. Sem. nuda.* S. N. 263.

- 289.** OENO•HERA, *biennis*, foliis ovato-lanceolatis
planis, caule muricato - villoso. *Linn.* S. N.
263. Spec. 492. (*Hall. 994.*)

H. ad

H. ad versuras & margines agrorum an der Weisgärber Wiese & alibi rarius. Floret Julio, Augusto.

VACCINIUM. G.P. 483.

*Cal. superus. Cor. 1-petala. Filamenta rece-
ptaculo inserta. Bacca 4-locularis, poly-
sperma. S. N. 267.*

a. *Foliis annotinis s. deciduis.*

290. VACCINIUM, *Myrtillus*, pedunculis unifloris, foliis ferratis ovatis deciduis, caule angulato. Linn. Spec. 498. (Hall. 1020.)

H. unico in loco inter Juniperos am Stützelberg versus Bälersbach; im Ebersbacher - und Freyengrund copiosissime. Floret Majo.

Calyx integerrimus, orbicularis. Corolla urceolata, apice 4-fida. Stam. 8 f. 10. Bacca 4-f. 5-locularis.

Pharm. MYRTILLI Baccæ.

b. *Foliis semper virentibus.*

291. VACCINIUM, *Vitis idaea*, racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. Linn. Spec. 500. (Hall. 1022.)

H. in sylvaticis montosis ad Dietz. Floret Majo. *

292. VACCINIUM, *Oxycoccus*, foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus nudis. Linn. Spec. 500. (Hall. 1023.)

H. in paludosis inter Sphagnum palustre im Ebersbacher - und Freyengrund. Floret Majo, Junio.

Baccæ rubra, acidissima.

ERICA. G.P. 484.

*Cal. 4-phyllo. Cor. 4-fida. Filamenta rece-
ptaculo inserta. Antheræ bifidæ. Caps. 4-
locularis. S. N. 268.*

293. ERICA, *vulgaris*, antheris bicornibus inclusis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis. Linn. Spec. 501. (Hall. 1012.)

β. Erica vulgaris glabra flore albo. Tournef. inst. 602.

H. α, in sterilissimis campis passim; β. versus Schönbach & Gisternhayn rarius. Floret Julio, Augusto.

Singulus Pedunculus unicum Foliolum sagittatum pro Bractea, duo in medio opposita pro Involucro; & plura decussata sibi invicem imposta, pro Calyculo habet.

Calycina toliola lanceolata. Corolla ventricosa semiquadrifida. Antheræ bifide, acutæ, interiore latere debiscentes; pone basin squamis duabus lanceolato-acuminatis, pilosæ, patentibus, instructæ. Stylus ascendens: Stigma subquadratum, excavatum, in foveola signo cruciformi notatum; margine coronatum: quatuor sphaerulis (veris stigmatibus) stipitatis. Capsula cernua.

** Flores incompleti.

DAPHNE. G. P. 485.

Cal. o. Cor. 4-fida, corollacea, marcescens, stamina includens. Bacca 1-sperma. S. N.

271.

294. DAPHNE, *Mezereum*, floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Linn. Spec. 509. (Thymelæa. Hall. 1024.)*

H. in sylvaticis montosis am Homberg parcus; ad Erbach aliisque copiose. Floret Martio & Aprili.

Pharm. LAUREOLÆ Cortex, COCCOGNIDIÆ Semina.

B. TRIGYNI A.

POLYGONUM. G. P. 495.

Cal. o. Cor. 5-partita, calycina. Sem. 1, angulatum. S. N. 275.

a. *Bistorta spica unica.*

295. POLYGONUM, *Bistorta*, caule simplicissimo monostachio, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Linn. Spec. 516. (Hall. 1559.)*

H. in pratis uidis in der Aue & alibi copiosissime. Floret Mayo, Junio.

Pharm. BISTORTÆ Radix.

b. *Perficariæ pistillo bifido, aut stamna minus 8.*

296. POLYGONUM, *amphibium*, floribus pentandris semidigynis, spica ovata. *Linn. S. N. 275. Spec. 517. (Hall. 1565.)*

a. *Aquatica natans*, foliis obtusis glaberrimis, staminibus corolla brevioribus.

β. Ter-

B. *Terrestris*, erecta, foliis acutiusculis scabris, staminibus corolla longioribus.

H. *a.* in fossis & fluviis *in der Dille auf der Herrn Wiese*, alibique copiose. Floret Junio, Julio.

B. in cultis *in der Pitze & vor dem Homberg*, pessimum vi- tium rarissime florens.

Stamina in *B* terrestri, non semper corolla longiora. Semen ovatum, compressum.

297. POLYGONUM, *Hydropiper*, floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submu- ticus. Linn. Spec. 517. (Hall. 1554.)

H. ad fossas ubique vulgaris, *an der Mühlbach cum sequente* copiose. Floret Julio, Augusto.

Pharm. PERSICARIAE Herba.

Planta primario gelu tacta rubescit. Vaginæ stipulares arcta, truncata, nervosæ, nervis parallelis in setas desinentibus, ciliata. Spicæ graciles, longæ, nutantes, flosculis remotiusculis, geminis, seu ternis, ex singula squama truncata vaginante. Stamina Corolla $\frac{1}{3}$ breviora. Semen subtrigonum.

298. POLYGONUM, *Perficaria*, floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceo- latis, stipulis ciliatis. Linn. Spec. 518. (Hall. 1557.)

H. cum præcedente copiose. Floret Julio, Augusto.

Vaginæ stipulares oblique truncata, laxa, nervosa, nervis inter- ruptis, in aequalibus, non prominentibus, ora pubescente vix ci- liata. Pedunculi subdivisi, Bracteis ovato-subulatis. Spi- cæ crassiusculæ: Floribus confertis, quaternis ex singula squa- ma ovato-acuta, amplexante. Stamina longitudine Corolla. Semen compressum, obtusum.

c. *Polygonum foliis indivisis, floribus octandris.*

299. POLYGONUM, *aviculare*, floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procum- bente herbaceo. Linn. Spec. 519. (Hall. 1560.)

H. in viis, plateis, cultis, arvis & agris ubique. Floret æstate.

Pharm. CENTUM NODIAE s. POLYONI Herba.

d. *Helxine, foliis subcordatis.*

300. POLYGONUM, *Fagopyrum*, foliis cordato- sa-

gittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis æqualibus. Linn. Spec. 522. (Hall. 1563.)

H. in cultis auf dem Hintersand; inter segetes am Galgenberg frequens. Floret Julio.

Glandulæ 8 cingunt Germinis basin. Filamenta 8, longitudine Corolla: 4 inter glandulas & germen: 4 inter glandulas & corollam. Semen nudum, vix basi tectum.

301. POLYGONUM, Convolvulus, foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtusatis. Linn. S. N. 276. Spec. 522. (Hall. 1561.)

H. in agris arvis & cultis passim. Floret Julio, Augusto. Corollæ lacinia tres exteriores carinata, obtusissima, due interiores planiores, angustioresque. Stamina corolla $\frac{1}{2}$ breviora. Antheræ violacea. Caulis angulato-striatus.

302. POLYGONUM, dumetorum, foliis cordatis, caule volubili laevi, floribus carinato-alatis. Linn. Spec. 522. (Hall. 1562.)

H. in sepibus & dumetis vor dem Gebäude; bey der Walkmühle; auf der Sandwiese frequens. Floret Julio, Augusto. Corollæ tres lacinia exteriores dorso membrana undulata aucta, due interiores nuda. Antheræ albida. Caulis levissime striatus.

In hoc & præcedente Stylus unicus brevis. Stigmata 3, globosa, approximata.

C. T E T R A G Y N I A.

ADOXA. G. P. 501.

Cal. 2- fidus, inferus. Cor. 4. s. 5 fida, supera. Bacca 4. s. 5 - locularis, calyce coalta. S. N. 278.

303. ADOXA, Moschatellina. Linn. Spec. 527. (Moschatellina. Hall. 1005.)

H. in umbrosis ad sepes bey der obern Walkmühle; auf dem Rœßler; in nemorosis bey Erbach frequens. Floret Aprili, Majo.

Capitulum quinque floribus compositum: Flore terminali quadrifido, octandro, tetragyno, Calyce bisido; lateralibus 4, 5- fidis, decandris, pentagynis, Calyce sape trifido. Bacca globosa, acutiuscula, supra medium calyce cincta. Semina arrisata, seu membrana carnosa a pulpa Bacca distincta, vestita. Rarissime

rissime Fructus reperiuntur, quoniam proprio pondere dependent,
et foliis aliisque plantis absconduntur.

PARIS. G. P. 500.

Cal. 4 - phyllus. *Petala 4*, angustiora. *Bacca 4* - locularis. S. N. 278.

304. PARIS, quadrifolia. Linn. Spec. 527. (Hall.
1006.)

H. in sylvis & nemoribus passim. Floret Majo.

Pharm. PARIDIS Radix, Herba, Baccæ.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

A. MONOGYNIA.

Flores polypetali æquales.

MONOTROPA. G. P. 536.

Cal. 0 Petala 10; horum 5 exteriora basi ex-
cavato-mellifera. *Caps. 5* - valvis. S. N.
296.

305. MONOTROPA, *Hypopithys*, floribus lateralibus
octandris : terminali decandro. Linn. Spec. 555.
(*Hypopithys*. Hall. 1002.)

H. in sylvis, radicum parasitica imprimis Quercum, in
Hirschberg frequens ; in Theriotropheo parcus. Floret Julio,
Augusto.

PYROLA. G. P. 554.

Cal. 5 - partitus. *Petala 5*. *Capsula 5* - locula-
ris, angulis dehiscens. S. N. 301.

306. PYROLA, *rotundifolia*, staminibus adscendentibus,
pistillo declinato. Linn. Spec. 567. (Hall.
1010.)

H. in sylvis rarius, in Hirschberg infrequens. Floret Junio. ♫
Pharm. PYROLÆ Herba.

307. PYROLA, *minor*, floribus racemosis dispersis,
staminibus pistillisque rectis. Linn. Spec. 567.
(Hall. 1009.)

G 3

H. in

H. in sylvis. in der Hörre; im Hirschberg copiose; im Thiergarten & Beilstein rarius Floret Junio, Julio.

- 308. PYROLA, secunda, racemo unilaterali. Linn.**
Spec. 567. (Hall. 1008.)

H. in tylvis, in der Hörre versus Dreisbach copiose. Floret Julio.

- 309. PYROLA, uniflora, scapo unifloro. Linn. Spec. 568. (Hall. 1011.)**

H. in sylvis, im Hirschberg rarius. Floret Junio, Julio. *

B. D I G Y N I A.

SCLERANTHUS. G. P. 562.

Cal. 1-phyllus. Cor. o. Sem. 2, calyce inclusa. S. N. 306.

- 310. SCLERANTHUS, annuus, calycibus fructus patulus. Linn. Spec. 580. (Hall. 1551.)**

H. in agris & arvis arenosis am Dolloberg; hinter dem Schloß; auf dem Homberg frequens. Floret Julio, Augusto.

Radice annua; Caulibus longioribus, minus ramosis; Foliis remotoribus; Calycis lacinia acutioribus, viridis, vix albidoo - marginatis; Staminibus 5 f. 7, brevissimis, & Calyx fructus patulo, a sequente distinguitur.

- 311. SCLERANTHUS, perennis, calycibus fructus clausis. Linn. Spec. 580. (Hall. 1550.)**

H. in campis & arvis sterilibus passim. Floret Majo & seq.

Calycis lacinia obtusa, albido - marginata, patenies, fructu maturo conniventes. In hoc & in precedente, Seinen constanter unicum, offea capsula inclusum, nec duo, invenire potui.

CHRYSOSPLENIUM. G.P. 558.

Cal. 4- f. 5-fidus, coloratus. Cor. o. Caps. 2-rostris, unilocularis, polysperma. S.N. 303.

- 312. CHRYSOSPLENIUM, alternifolium, foliis alternis. Linn. Spec. 569. (Hall. 1548.)**

H. in nemorosis humidis ad Breidscheid; in denen Steinkammern bey Erbach copiose; circa Andorf, versus Theriotropheum rarius. Floret Aprili, Majo.

Flores etiam primarii in nostrate Planae plurimque quadrifidi, octandri.

- 313. CHRYSOSPLENIUM. G.P. 558.**

- 313.** *CHRYSOSPLENIUM, oppositifolium, foliis oppositis.* Linn. Spec. 569. (Hall. 1549.)

H. in sylvaticis uidis im Hirschberg, in des Herrn Ort ad Gundersdorf frequens. Floret Majo.

Caule tenuiori, equali-tetragono, lavi: lateribus duobus oppositis latioribus planioribus, duobus angustioribus canaliculatis; Foliis omnibus oppositis, minoribus, subrotundis, obiter minusque profunde crenatis; radicalibus in florente planta fere nullis. Petiolis levibus; Floribus paucioribus, distinctioribus, in nocturno strate omnibus quadrisidis octandris, foliisque multo minoribus bracteatis; a precedente hac Species notabiliter se distinguit.

SAXIFRAGA. 559.

- Cal. 5-partitus. Cor. 5-petalà. Caps. 2-rostris, unilocularis, polysperma. S. N.**

303.

- 314.** *SAXIFRAGA, granulata, foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata.* Linn. Spec. 576. (Hall. 976.)

H. in pratis siccis am Rehberg; in collibus apricis am Güldnersgrund; Stützelberg; & alibi frequens. Floret Majo, Junio.

Pharm. SAXIFRAGÆ ALBÆ Semina. (radicis granula.)

- 315.** *SAXIFRAGA, tridaçylites, foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso.* Linn. Spec. 578. (Hall. 986.)

H. in rupestribus am Stützelberg & Rehberg; ad muros pœmærii & cæmeterij frequens. Floret Aprili, Majo.

GYPSOPHILA. G. P. 563.

- Cal. 1-phylloides, campainulatus, angulatus. Petala 5, ovata, sessilia. Capsula globosa, unilocularis. S. N. 306.**

- 316.** *GYPSOPHILA, muralis, foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis.* Linn. Spec. 583. (Saponaria. Hall. 903.)

H. in agris in der Aue; in arvis hinter dem Schloß parcus; in campis sterilibus auf dem Stützelberg copiose. Floret Augusto.

G 4.

SAPO-

SAPONARIA. G. P. 564.

Cal. 1-phillus, nudus. **Petala** 5, unguiculata. **Capsula** oblonga, 1-loocularis. S.N. 307.

317. **SAPONARIA**, officinalis, calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. **Linn. Spec. 584.** (*Hall. 908.*)

H. ad sepes & vias passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. SAPONARIA Radix, Herba.

318. **SAPONARIA**, Vaccaria, calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis sessilibus. **Linn. Spec. 585.** (*Hall. 907.*)

H. in arvis auf dem Homberg rarius. Floret Junio, Julio.

DIANTHUS. G. P. 565.

Cal. cylindricus, 1-phillus: basi squamis 4.

Petala 5, unguiculata. **Caps.** cylindrica, 1-loocularis. S.N. 307.

319. **DIANTHUS**, carthusianorum, floribus subaggregatis: squamis calycinis ovatis aristatis tubum subæquantibus, foliis trinerviis. **Linn. S. N. 307.** **Spec. 586.** (*Tunica. Hall. 899.*)

H. in campis sterilibus apricis auf dem Stützelberg frequens. Floret Julio.

320. **DIANTHUS**, Armeria, floribus aggregatis fasciculatis: squamis calycinis lanceolatis villosis tubum æquantibus. **Linn. Spec. 586.** (*Hall. 900.*)

H. in sylvaticis montosis am Homberg & Fischbueyher. Grund, alibique infrequens. Floret Julio, Augusto.

321. **DIANTHUS**, prolifer, floribus aggregatis capitatis: squamis calycinis ovatis obtusis muticis tubum superantibus. **Linn. Spec. 587.** (*Hall. 901.*)

H. in campis sterilibus & collibus apricis, hinter dem Schloß am Dollberg alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

1. Flores solitarii, plures in eodem carlo.

322. **DIANTHUS**, diminutus, floribus solitariis: squamis calycinis octonis florem superantibus. **Linn. Spec. 587?** (*Hall. 901. var. y. præc.*)

H. in

H. in sterilissimis campis auf dem Callenbachsberg. Floret Junio, Julio

Caulis ramosior; minus erecto, floribus saepe solitariis, nec in capitulum congestus, a precedente vix differt.

323. DIANTHUS, deltoides, floribus solitariis, squamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. Linn Spec. 588.

H. in pascuis fuccis, hinter dem Schloß, am Homberg, Rehberg, & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

C. T R I G Y N I A.

ARENARIA. G. P. 569.

Cal. 5-phylloides, patens. Petala 5, integra.

Caps. 1-locularis, polysperma. S. N. 312.

324. ARENARIA, trinervia, foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. Linn. Spec. 605. (Alpine. Hall. 878.)

H. in sylvaticis umbrosis; ad sepes in pomariis passim. Floret Junio & seq.

325. ARENARIA, serpillifolia, foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calycè brevioribus. Linn. Spec. 606. (Hall. 875.)

H. ad muros urbis & cœmeterii; in glareosis aridis passim. Floret Majo & sequ.

In hac & in precedente Petala calyce duplo breviora; Capsula cernua pedunculo horizontali, uti in Stellariis, apice 6- (nec 5-) fariam dehiscens.

326. ARENARIA, rubra, foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. Linn. Spec. 606. (Hall. 872.)

H. in arvis am Rehberg, in agris im Güldnersgrund rarius. Floret Junio.

327. ARENARIA, tenuifolia, foliis subulatis, caule paniculato, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus lanceolatis. Linn. S. N. 313. Spec. 607. (Hall. 866.)

H. in scopolis am Stützelberg; in rupibus versus theriotropheum abunde; in muris pontis novi rarius. Floret Junio.

Radix annua. Caulis spathameus, erectus, dichotomus, demum paniculatus. Folia subulata, basi connata, supra plana, subne-

subtus convexa, apice acuto purpureo, internodiis breviora. Pedunculi uniflori, erecti. Calycinæ foliola lanceolata, mucrone intus purpureo, vix albido-marginata, latia; uti Bractæ in sicca trinervia. Petala ovata, obtusa, lachea, ungue brevi, Calyx dimidio fere breviora. Stamina in primariis floribus 10, in senioribus 7-9, longitudine petalorum. Antheræ didymæ, carnea, polline hyalino. Styli 3, longitudine staminum. Capsula erecta, ovato-trigona, calyce paulo longior, apice valvulis tribus obtusiusculis dehiscens. Semina punctata, fusca.

STELLARIA. G.P. 568.

Cal. 5 · phyllus, patens. Petala 5, bipartita.

Caps. 1 · locularis, polysperma. S.N. 311.

328. *STELLARIA, nemorum, foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramosis. Linn. Spec. 603. (Myosotis. Hall. 886.)*

H. in nemorofis ad pagum Erbach; in ambrosis im Zuvinger, alibique frequens. Floret Majo.

Caule sesquipedali, tereti, subhирto. Foliis pubescentibus, subtus pallidioribus: inferioribus cordatis petiolatis, intermediis latolanceolatis subpetiolatis, superioribus ovatis sessilibus. Floribus erecto-patulis subcampaniformibus; Calyx tavi; Styli 3. Pedunculis fructu maturo cernuo, horizontalibus; Capsulis ovato-cylindraceis, sexvalvibus; loco natali semper umbriso; temporeque florendi præcociori, (Majo,) a Cerastrio aquatico, cui simillima, facilissime dignoscenda.

329. *STELLARIA, Holostea, foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bifidis. Linn. Spec. 603. (Alpine. Hall. 884.)*

H. in sylvaticis umbrosis & ad sepes passim. Floret Majo, Junio.

330. *STELLARIA, graminea, foliis linearibus integerimis, floribus paniculatis. Linn. Spec. 604. (Hall 882.)*

α. Caryophyllus arvensis glaber flore minore. Baub. Pin. 210.

β. Alpine, folio gramineo angustiore, palustris. Dillen. append. 169.

H: α, in pratis juxta rivulos passim; β in salicetis an der Dille. Floret Junio, Julio.

α, Caulis paniculatus. Flos patentissimus. Petala ultra medium bipartita. β, Caulis altior, minus ramosus. Flores duplo majores.

majores, erecto-patentes. Petala semibifida. Capsula in utraque calyce minor, apice sex valvi debiscens.

331. **STELLARIA**, *dilleniana*, foliis lanceolatis integrerimis, caule procumbente.

Alfina aquatica, folio gratiolare, stellato flore. Dillen. Cat. app. 39. (Alfina. Hall. 881.)

Var. γ. praecedentis. LINN. Flor. Suec. Edit. II. no. 393.

H. in fossis & rivulis pratorum abunde; an der Mischbach frequens Floret Mayo.

Foliis lanceolatis, basi ciliatis; Pedunculis ternis axillaribus, ex caulis medio apiceque tantum prodeuntibus, basi duobus foliolis lanceolatis in ala folii sessilibus, bracteatis; lateralibus 2 bifidis, trifloris: Pedicellis peracta flores contia divaricatisimis, apice incrassatis. Petalis calyce brevioribus, ad unguem usque bipartitis, laciniis distantibus. Staminibus 5 uniusbus petularum, 5 totidem glandulis germe cingentibus, insertis; a priori differt. Nonne hac planta his notis a precedente satis discrepans, tanquam propria Species proponi meretur?

CUCUBALUS. G. P. 566.

Cal. inflatus. Petala 5, unguiculata, absque corona ad faucem. Caps. 3-locularis. S. N. 308.

332. **CUCUBALUS**, *Beben*, calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. *Linn. Spec. 591. (Viscago. Hall. 913.)*

H. in pratis montosis, & ad versuras passim. Floret Junio, Julio.

SILENE. G. P. 567.

Cal. ventricosus. Petala 5, unguiculata: coronata ad faucem. Capsula trilocularis. S. N. 309.

333. **SILENE**, *nutans*, petalis bifidis, floribus lateribus secundis cernuis, panicula nutante. *Linn. Spec. 596. (Viscago. Hall. 915.)*

H. in pratis sylvaticis am Rehberg alibique frequens. Floret Mayo, Junio.

Capsula sexfariam apice debiscit in hac & precedente.

D. PEN-

D. P E N T A G Y N I A.

SEDUM. G. P. 579.

Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. Squamæ nectariferæ 5, ad basin germinis. Caps. 5. S. N. 316.

334. SEDUM, *Telephium*, foliis planiusculis ferratis, corymbo folioso, caule erecto. Linn. Spec. 616. (Hall. 954.)

α , *Telephium (album)* vulgare. Bauh. Pin. 287.

β , *Telephium (purpureum)* purpureum majus. Bauh. Pin. 287.

H. α , in agris in der Aue, alibique; β , in siccis asperis am Dollberg; ad sepes am Siegbäuer Weg. Floret Augusto. Pharm. α . TELEPHII Radix, FABARIAE Folia.

335. SEDUM, *reflexum*, foliis subulatis sparsis basi solutis: inferioribus recurvatis. Linn. Spec. 618. (Hall. 967.)

H. in collibus siccis apricis passim; am Dollberg copiose. Floret Julio, Augusto.

Corolla Petalis 6-7-8-9. cum totidem Germinibus, duploque Staminum sapissime lauit.

336. SEDUM, *album*, foliis oblongis obtusis tenuiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. Linn. Spec. 619. (Hall. 959.)

H. in rupibus am Homberg; in muris urbis & pontis novi frequens. Floret Julio.

337. SEDUM, *acre*, foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. Linn. Spec. 619. (Hall. 966.)

H. in campis & collibus siccis sterilibus passim. Floret Junio.

Pharm. SEDI MINORIS Herba.

338. SEDUM, *sexangulare*, foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis. Linn. Spec. 620. (Hall. 965.)

H. similibus locis, cum præcedente am Dollberg rarius. Floret Julio.

339 SEDUM, *villosum*, caule erecto, foliis planiusculis pedunculisque subpilosis. Linn. Spec. 620. (Hall. 962.) H.

H. in paludosis *im Hirschberg, in des Herrn Ort ad Gundendorf* copiose; ad pagum *Breitscheid* rarius. Floret Julio.

SPERGULA. G. P. 586.

Cal. 5-phyllo. Petala 5, integra. Capsula ovalis, unilocularis, 5-valvis. S.N. 321.

340. SPERGULA, *arvensis*, foliis verticillatis, floribus decandris. *Linn. Spec. 630. (Alpine. Hall. 873.)*

H. in arvis & agris inter Linum *in der Aue*, alibique frequens. Floret Julio & seq.

341. SPERGULA, *pentandra*, foliis verticillatis, floribus pentandris. *Linn. Spec. 630.*

H. in sterilibus glareosis *auf der Sandwiese*; jam dudum leta nunc rarissima planta. Floret Majo.

342. SPERGULA, *nodosa*, foliis oppositis subularis laevibus, caulis simplicibus. *Linn. Spec. 630. (Hall. 871.)*

H. in pratis uidis *im Pulvers-Grund*. Floret Julio.

CERASTIUM. G. P. 585.

Cal. 5-phyllo. Petala bifida, Capsula 1-lo- cularis, apice dehiscens. S.N. 320.

a. *Capsulis oblongis.*

343. CERASTIUM, *vulgatum*, foliis ovatis, petalis calyci æqualibus, caulis diffusis. *Linn. Spec. 627. (Myosotis. Hall. 893.)*

H. in pomariis & pratis siccis passim. Floret Majo & sequ.

344. CERASTIUM, *viscosum*, erectum villoso-viscosum. *Linn. Spec. 627. (Hall. 895.)*

H. in pascuis sterilibus, *hinter dem Schloß*, alibique. Floret Majo.

345. CERASTIUM, *semidecandrum*, floribus pentandris, petalis emarginatis. *Linn. Spec. 627. (Hall. 894.)*

H. in pascuis macilentis *am Homberg* rarius; ad pagum *Erbach* frequens. Floret Majo.

346. CERASTIUM, *arvense*, foliis linear-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus. *Linn. Spec. 628. (Hall. 889.)*

H. in pascuis, versuris, & ad vias passim. Floret Majo, Junio.

b. *Capsu-*

b. *Capsulis subrotundis.*

347. CERASTIUM, *aquaticum*, foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis.

Linn. Spec. 629. (Hall. 885.)

H. ad fossas, locis humentibus unter der neuen Brücke; an der Mühlbach copiose. Floret Julio, Augusto.

Caule tripedali, subtetragono, glabro, subramoso: geniculis carinatis foliorum rufescens. Foliis cordatis, glabris, ampliatis, caulis, margine undulatis; superioribus pubescentibus. Floribus patentissimis; Pedunculis Calycibusque viscosis pubescentibus. Petalorum laciinis latioribus, distantibus; Stylis quinque; Pedunculis fructu maturo recto, nutantibus. Capsulis calyce conniventib; tectis, ovatis, 5-valvibus, Valvis bifidis, reflexis; Tempore florendi seniori; (Augusto) Loco natali semper humente, a *Stellaria nemorum* distinguitur.

AGROSTEMA G.P. 583.

- Cal. 1-phillus, coriaceus. Petala 5, unguiculata: Limbo obtuso, indiviso. Caps. unilocularis. S. N. 319.

348. AGROSTEMA, *Githago*, hirsuta, calycibus corollam æquantibus, petalis integris nudis. Linn. Spec. 624. (Lychnis. Hall. 926.)

H. in agris inter segetes frequens. Floret Junio.

LYCHNIS. G. P. 584.

- Cal. 1-phillus, oblongus, lævis. Petala 5, unguiculata: Limbo subbifido. Caps. 5-locularis. S. N. 319.

349. LYCHNIS, *Flos cuculi*, petalis quadrifidis, fructu subrotundo. Linn. Spec. 625. (Hall. 921.)

H. in pomariis & pratis humidis passim. Floret Majo, Junio.

Capsula unilocularis.

350. LYCHNIS, *dioica*, floribus dioicis. Linn. Spec. 626. (Hall. 923.)

H. in dumetis & sepibus passim. Floret Junio & sequ.

Capsula unilocularis, apice 10-fariam dehiscens, valvulis revolutis. Petalis 4-fidis ludit. Hermaphroditam nondum vidi.

OXALIS. G. P. 582.

- Cal. 5-phillus. Petala unguibus connexa.

Caps. angulis dehiscens, 5-gona. S. N.

318.

a. Scapo

a. Scapo radicali.

351. OXALIS, *Acetosella*, scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamosa articulata. *Linn. Spec.*
620. (*Hall. 928.*)

H. in sylvis & nemoribus abunde; in dem Haynvvinkelgen
parcius. Floret Aprili, Majo.

Pharm. ACETOSELLÆ Herba.

b. Foliis caulinis alternis.

352. OXALIS, *corniculata*, pedunculis umbelliferis,
caule ramoso diffuso *Linn. Spec. 623.* (*Hall. 929.*)
H. in cultis & hortis ad Dillenburg. Floret Junio.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

A. M O N O G Y N I A.

ASARUM. G. P. 589.

- Cal.* 3-f. 4-fidus, germini insidens. *Cor..o.*
Cap. coriacea, coronata. S. N. 325.

353. ASARUM, *europæum*, foliis reniformibus ob-
tusis binis. *Linn. Spec. 633.* (*Hall. 1547.*)

H. in sylvis & nemorosis frequens, am Homburg parcius. Flo-
ret Aprili.

Pharm. ASARI Radix, Herba.

LYTHRUM. G. P. 604.

- Cal.* 12-fidus. *Petala* 6, calyci inserta. *Ca-
psula* 2-locularis, polysperma. S. N. 328.

354. LYTHRUM, *Salicaria*, foliis oppositis cordato-
lanceolotis, floribus spicatis dodecandris. *Linn.
Spec. 640.* (*Salicaria. Hall. 854.*)

H. ad ripas Dilla frequens. Floret Julio, Augusto.

Pharm. SALICARIAE Herba.

B. D I G Y N I A.

AGRIMONIA. G. P. 607.

- Cal.* 5-dentatus, altero obvallatus. *Petala*
5. *Sem.* 2, in fundo calycis, S. N. 329.

355.

355. AGRIMONIA, *Eupatoria*, foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hispidis. *Linn.*
• *Spec. 643. (Hall. 991.)*

H. in pascuis siccis, ad versuras vulgaris. Floret Julio, Augusto.

Pharm. AGRIMONIÆ Herba.

C. T R I G Y N I A.

RESEDA. G. P. 608.

Cal. 1 - phyllus, partitus. *Petala laciniata.*

Caps. ore dehiscens, 1 - locularis. S. N.
329.

356. RESEDA, *Luteola*, foliis lanceolatis integris basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis.

Linn. S. N. 329. Spec. 643. (Hall. 1058.)

H. in sterilibus am Dollberg; auf dem Hinter-Sand, alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

EUPHORBIA. G. P. 609.

Cor. 4 - f. 5 - petala, calyci insidens. Calyx 1 - phyllus, ventricosus. Caps. 3 - cocca.
S. N. 330.

a. *Umbella trifida.*

357. EUPHORBIA, *Peplus*, umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Linn. Spec. 653. (Titbymalus. Hall. 1049.)*

H. in cultis inter olera abunde. Floret Julio, Augusto.
Petala bicornia. Fructus tricarinatus: carina membranacea undulato - crenata, sulco divisa. Semina pulchre reticulata.

358. EUPHORBIA, *exigua*, umbella trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Linn. Spec. 654. (Hall. 1048.)*

Tithymalus (acuta) f. Esula exigua. Bäub. Pin. 291.
Tithymalus (retusa) f. Esula exigua foliis obtusis. Bäub. Pin. 291.

H. α, in agris post messem am Homberg; β, in der Alzbach copiosissime. Floret Julio, Augusto.

Caulis vix nisi ad basin ramosus, umbella sapius brevior. Folia linearia: in α, acutiuscula; in β, truncata, retusa, cum mucro.

mucrone. Involucra & Involucella ovato - lanceolata, basi inaequalia, uno latere latiore. Flores omnes fertiles, exigui. Petala 4, bicornia. Capsula levigata. Semina subreticulata.

b. *Umbella quinquefida.*

359. EUPHORBIA, *dulcis*, umbella quinquefida: bifida, involucellis subovatis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis. Linn. Spec. 656. (Hall. 1051.)

H. in sylvaticis montosis ad Breitscheid. Floret Majo, Junio.

Radix perennis, horizontalis, densa, annulata, basi fibrofissima. Caules plures, herbacei, pedales, eretti, subteretes, glabri; Coma ante florescentiam nutante. Folia alterna, sessilia, patentia, lanceolata, obtusa, tenera; supra larvia, subtus pallidiora, mollissime albido - villosa: Epidermide sapius circa constam secedente, subinflata. Umbella radiis 5: Pedunculis bifidis, rarius bis bifidis, nec ultra. Involucrum pentaphyllum: foliolis ovato-lanceolatis, folio vestitu simillimi. Involucella duo, ovato-cordata, basi truncata, acutiuscula, utrinque larvia; marginibus uti Involucra & Folia superiora, subtilissime ferrulata. Raini fertiles ex superioribus foliorum alis, aphylli, pedunculis simili: quorum tres superiores saepe umbella adeo approximati, ut hec octofida octonisque involucri foliolis instruta, primo intuitu videatur. Flos primarius ramorum & peduncularum in semel bifidis fertilis, in bis bifidis semper sterilis. Calyx turbinatus, quadridentatus, pubescens. Petala quatuor, subrotunda, pelviformia, flava, ungue brevissimo. Capsula glandulosa purpureis conicis verrucosa. Semina ovata, larvia. Succus planta lattens insipidus, non acris.

360. EUPHORBIA, *belioscopia*, umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ferratis. Linn. Spec. 658. (Hall. 1050.)

H. in cultis inter olera passim. Floret Julio, Augusto. Pharm. ESULÆ Herba.

c. *Umbella multifida.*

361. EUPHORBIA, *Esula*, umbella multifida: bifida, involucellis subcordatis, petalis subbicarinibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus. Linn. Spec. 660. (Hall. 1046.)

H. in sylvaticis montosis, inter lapidum acervos im Beilstein; jam dudum lecta. Floret Majo.

362. EUPHORIA, *Cyparissias*, umbella multifida: dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, foliis setaceis, caulinis lanceolatis.
Linn. Spec. 661. (Hall. 1047)

H. in pascuis sterilibus *im Thiergarten* abunde. Floret Majo.

D. DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM. G. P. 612.

- Cal. 12-partitus. Petala 12. Capsulae 12, polyspermæ. S. N. 335.*
363. SEMPERVIVUM, *tectorum*, foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Linn. Spec. 664. (Sedum. Hall. 949.)*

H. in tectis frequens. Floret Julio.

Pharm. SEMPERVIVI MAIORIS Herba.

Petala, Stamina, Germina, Nectariaque 12-18.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

A. MONOGYNIA.

PHILADELPHUS. G. P. 614.

- Cal. 4-f. 5-partitus, superus. Petala 4-f. 5.*
- Caps. 4-f. 5-locularis, polysperma. S.N. 339.*

364. PHILADELPHUS, *coronarius*, foliis subdentatis.
Linn. Spec. 671. (Hall. 1100.)

H. in dumetis *am Homberg*; ad sepes frequens. Floret Junio.

PRUNUS. G. P. 620.

- Cal. 5-fidus, inferus. Petala 5. Drupæ nux futuris prominulis. S. N. 341.*

365. PRUNUS, *Padus*, floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis. *Linn. Spec. 677. (Padus. Hall. 1086.)*

H. in sepibus ad *Beilstein*; in dumetis *versus Langenaubach*. Floret Majo.

366.

366. PRUNUS, *Cerasus*, umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Linn. S.N. 342. Spec. 679. var. a. (Cerasus. Hall. 1083.)*

H. in sylvaticis *am Homberg*; ad sepes passim. Floret Majo.
Pharm. CERASORUM ACIDORUM Fructus.

367. PRUNUS, *avium*, umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis subtus pubescentibus conduplicatis. *Linn. S.N. 342. Spec. 680. (Hall. 1082.)*

H. in sylvis, ad pagos *Hirschberg* & *Fleisbach* frequens. Floret Majo.

Fructu rubro, & nigro variat.

Pharm. CERASORUM NIGRORUM Fructus. (potius Nuclei.)

368. PRUNUS, *domestica*, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis mucicis. *Linn. Spec. 680. (Prunus. Hall. 1079.)*

a. Prunus. Bauh. Pin. 443.

β. Pruna majora dulcia & parva atro-cerulea. Bauh. Pin. 443. no. 23.

H. *α & β* in sepibus & dumetis *am Homberg*, alibique frequenter. Floret Majo.

Pharm. β, PRUNI DAMASCENAE Fructus.

369. PRUNUS, *infinitia*, pedunculis geminis, foliis ovatis subvillosis convolutis, ramis spinescentibus. *Linn. S.N. 342. Spec. 680. (Hall. 1081.)*

H. in sepibus ad pagum *Breitscheid*. Floret Majo.

370. PRUNUS, *spinosa*, pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosiss. *Linn. Spec. 681. (Hall. 1080.)*

H. in dumetis & sepibus passim. Floret Aprili.

Pharm. ACACIÆ Flores, Fructus.

B. D I G Y N I A.

CRATÆGUS. G. P. 622.

Cal. 5 - fidus. Petala 5. Bacca infera, 2 - sperma. S. N. 342.

371. CRATÆGUS, *Aria*, foliis ovatis incisis ferratis subtus tomentosis. *Linn. S.N. 342. Spec. 681. (Mespilus. Hall. 1089.)*

H 2

H. in

H. in sylvaticis montosis *am Callenbachs - Berg.* Floret Majo ?
Flores nondum vidi.

372. CRATAEGUS, *torminalis*, foliis cordatis septangulis : lobis insimis divaricatis. Linn. Spec. 681. (*Mespilus. Hall. 1088.*)

H. in sylvis *im Hirschberg; in der Hörre.* Floret Majo. ♀

373. CRATAEGUS, *Oxyacantha*, foliis obtusis subtrifidis ferratis. Linn. Spec. 683. (*Mespilus. Hall. 1087.*)

H. in sepibus dumetis & sylvis passim. Floret Majo.

C. TRIGYNIA.

SORBUS. G.P. 623.

Cal. 5-fidus. Petala 5. Bacca infera, 3-sperma. S.N. 343.

374. SORBUS, *aucuparia*, foliis pinnatis utrinque glabris. Linn. Spec. 683. (*Mespilus. Hall. 1091.*)

H. in sylvis frequens. Floret Majo.

Pharm. SORBI AUCUPARIAE Baccae.

D. PENTAGYNIA.

MESPILUS. G.P. 625.

Cal. 5-fidus. Petala 5. Bacca infera, 5-sperma. S.N. 343.

375. MESPILUS, *Cotoneaster*, inermis, foliis ovatis integerrimis : subtus tomentosis. Linn. S.N. 343. Spec. 686. (*Mespilus. Hall. 1093.*)

H. in rupibus, & quideam unico tantum in loco umbroso, *am Homberg über der Lithau.* Floret Aprili, Majo.
Loco natali plerumque Styli tres in Flore, & Semina tria in Fructu pyriformi umbilico pervio, observavi. Petala calycæ vix majora, conniventia.

PYRUS. G.P. 626.

Cal. 5-fidus. Petala 5. Pomum inferum, 5-loculare, polyspermum. S.N. 344.

376. PYRUS, *communis*, foliis ferratis, floribus corymbosis. Linn. S.N. 344. Spec. 686. (*Hall. 1096.*)

H. in sylvis & ad pagos frequens. Floret Majo.

377. PYRUS, *Malus*, foliis ferratis, umbellis sessilibus. *Linn. Spec.* 686. (*Hall.* 1097.)
H. in sylvis, ad vias & pagos passim. Floret Majo.
SPIRÆA. G. P. 630.

Cal. 5 - fidus. *Petala* 5. *Capulæ* polyspermæ. S. N. 347.

378. SPIRÆA, *Ulmaria*, foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymosis. *Linn. Spec.* 702. (*Filipendula. Hall.* 1135.)
H. ad ripas Dilla passim; an der Mühlbach frequens. Floret Julio.
Pharm. ULMARIA Radix, Flores.

E. POLYGYNIA.

ROSA. G. P. 631.

Petala 5. *Cal.* urceolatus, 5-fidus, carnosus, collo coarctatus. *Semina* plurima, hispida, calycis interiori lateri affixa. S. N. 348.

379. ROSA, *Eglanteria*, germinibus globosis pendunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis acutis. *Linn. Spec.* 703?

Rosa spinis aduncis, foliis subtus rubiginosis. *Hall.* 1103:
H. in sepibus & sylvis passim. Floret Majo, Junio.
Caulis, Rami & Petoli aculeis validis apice recurvis armati.
Stipulæ Petoli Calycesque setis capitatis viscosiss adpersi.
Foliola quina s. septena, impari majore, ovata, acuta, serrata: serraturis incisis glanduliferis; supra lavia, subetus villosus rubiginosus, viscidus, odoratus: Pedunculi solitarii & terni, setis scabri. Petala carnea, ungue starvo albidoque. Fructus globosus, basi setis hispidiusculus, demum nigrescens. Semina lavia.

380. ROSA, *umbellata*, germinibus ovatis glabris capitatis subumbellatis, caule aculeato. Leyser.
Flor. *Hal.* 435?

H. in sylvis in der Hörre; im Beilstein frequens. Floret Junio.
Pedunculi setis scabri terminales tres: intermedio unifloro, lateralis trifidis, trifloris. Fructus septem, magni, globosi, glabri,

glabri, dein nigricantes, altitudine equates; in reliquis ab ascendente vix diversa. Utraque R. villosa (nostra) valde at finis.

- 381.** *Rosa, cinamomea*, germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis stipularibus, petiolis subinermibus. *Linn. Spec. 703.*

H. in sepibus am Siegbäuser Weg, bey dem Steg; in dumetis ad viam publicam bey der untern Walckmühle. Floret Junio.

Frutex orgyalis: Ramis longis, purpureis, glaberrimis, vernice quasi oblinitis. Aculei recti, albidi: duo tantum ad basin singuli Ramuli ex Stipula. Stipulae oblonga, dilatata, subcolorata, serrulata: serraturis purpureo-glandulosis. Petioli subvillosi, inermes. Foliola septena, oblonga, serrata, subens albido-villosa. Pedunculi Germinaque levia. Calycis foliola integrerima, subvillosa. Flores in nostrate semper multiplicati, suaveolentes, steriles.

- 382.** *Rosa, canina*, germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Linn. Spec. 704. (Rosa. Hall. 1101.)*

H. in sepibus & dumetis passim. Floret Junio.

Pharm. Rosæ SYLVESTRIS Flores; CYNOSBATI Fruetus, Semina; Fungi BEDEGUAR.

- 383.** *Rosa, pendulina*, germinibus ovatis glabris, pedunculis cauleque hispidis, petiolis inermibus, fructibus pendulis. *Linn. S. N. 348. Spec. 705.*

H. in sylvis im Hirschberg rarius. Floret Junio.

- 384.** *Rosa, spinosissima*, germinibus globosis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatissimis. *Linn. S. N. 348. Spec. 705. (Hall. 1106.)*

H. in montofis am Beilstein. Floret Junio. *

- 385.** *Rosa, villosa*, germinibus globosis pedunculisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomentosis. *Linn. S. N. 348. Spec. 704? (Hall. 1105.)*

H. in dumetis auf der Höhle, bey dem heiligen Crentz. Floret Junio.

A *Rosa villosa in hortis culta, nostra vix differt, nisi: Aculeis quidem rectis, apicibus autem subrecurvus; Foliolis magis ovatis, utrinque tanen valde villosis; Pedunculis, Calycibus, Germi-*

Germinibusque quidem aculeatis, Fructu maturo vero duplo minore subaculeato, aculeos (basi excepta) deponente.

RUBUS. G. P. 632.

Cal. 5-fidus. Petala 5. Bacca composita acinis monospermis. S. N. 349.

a. *Frutescentes.*

386. RUBUS, *idæus*, foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. Linn.
Spec. 706. (Hall. 1108.)

b. Caule lœvi inermi.

H. in sepibus *hinter dem Schloß*; in sylvaticis montosis passim,
β. im Zwingen. Floret Majo & sequ.

Pharm. RUBI IDÆI Baccæ.

387. RUBUS, *cæsus*, foliis ternatis subnudis: lateribus bilobis, caule aculeato tereti. Linn.
Spec. 706. (Hall. 1110.)

H. in sepibus & dumetis passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. RUBI BATTI Folia. (Sequentis gratiora.)

388 RUBUS, *fruticosus*, foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. Linn.
Spec. 707. (Hall. 1109.)

H. in dumetis & sepibus frequens. Floret Junio.

b. *Herbacei.*

389. RUBUS, *saxatilis*, foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. Linn. S. N. 349.

Spec. 708. (Hall. 1111.)

H. in sylvaticis montosis im Hirschberg; ad pagum Lieben-seheid. Floret Majo, Junio.

TORMENTILLA. G. P. 635.

Cal. 8-fidus. Petala 4. Semina subrotunda, (8) nuda, receptaculo parvo exsucco affixa. S. N. 352.

390. TORMENTILLA, *erecta*, caule erectiusculo, foliis sessilibus. Linn. Spec. 716. (Fragaria. Hall.

1117. C

H. in pastuis sylvaticis montosis, am Rehberg; Homberg, alibique parcius. Floret Junio, Julio.

Pharm. TORMENTILLÆ Radix, Herba.

FRAGARIA. G. P. 633.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5. *Receptaculum* semi-num ovatum, baccatum, deciduum.
S. N. 349.

391. FRAGARIA, vesca, flagellis reptantibus. Linn.
S. N. 349. *Spec.* 708. (*Hall.* 1112.)

β. *Fragaria* sterilis, stigmatibus destituta, du *Chesne Hist. des Fraisiers.* 107. *Hall.* var. n. l. c.

H. in sylvis copiosissime. Floret Majo, Junio.

Pharm. α, FRAGARIAE Radix, Herba, Baccæ.

Var. β. Scapo sesquipedali, multifloro; Stolonibus plerumque nullis; Floribus triplo majoribus; Antheris Stigmatibusque sphacelo-quasi correptis, fusco-atris, fere nullis; Fructibus abortientibus; annuatim provenit in dumetis am. Homberg, alibique.

392. FRAGARIA, sterilis, caule decumbente, ramis floriferis laxis. Linn. *S. N.* 350. *Spec.* 709. (*Hall.* 1113.)

H. in pascuis sterilibus passim. Floret Apriki, Majo.

Petala obcordata, *Calyci* equalia. *Bacca exsuffca.* (Potentilla.)

POTENTILLA. G. P. 634.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5. *Semina* subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsuffco affixa.
S. N. 350.

a. *Foliis pinnatis.*

393. POTENTILLA, *Anserina*, foliis pinnatis serratis, caule repente, pedunculis unifloris. Linn.
S. N. 350. *Spec.* 710. (*Fragaria Hall.* 1126.)

H. in pascuis, ad vias passim. Floret Majo & sequa.

Pharm. ANSERINA Herba.

b. *Foliis digitatis.*

394. POTENTILLA, *argentea*, foliis quinatis cuneiformibus incisis subtus tomentosis, caule erecto. Linn. *Spec.* 712. (*Hall.* 1124.)

H. in collibus siccis, ubique frequens. Floret Junio, Julio.

395. POTENTILLA, *verna*, foliis radicalibus quinatis acute serratis retusis, caulidis ternatis, caule declinato. Linn. *Spec.* 712. (*Hall.* 1119.)

H. in

H. in collibus apricis siccis passim. Floret Aprili, Majo, & Septbr.

- 396.** *POTENTILLA, reptans*, foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Linn. S. N. 351.* *Spec. 714. (Hall. 1118.)*

H. ad versuras & margines hortorum *im Fischveybergrund*; *in der Alzbach*; alibique frequens. Floret Julio.

Pharm. PENTAPHYLLI Radix, Herba.

GEUM. G. P. 636.

- Cal. 10-fidus. Petala 5. Sem. aristata geniculata. S. N. 352.*

- 397.** *GEUM, urbanum*, floribus erectis, fructibus globosis villosis: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Linn. S. N. 352. Spec. 716. (Hall. 1130.)*

H. in umbrosis ad sepes ubique. Floret Junio.

Pharm. CARYOPHYLLATAE Radix.

Receptaculum ovatum, subsessile.

- 398.** *GEUM, rivale*, floribus nutantibus, fructu oblongo: aristis plumosis. *Linn. Spec. 717. (Hall. 1129.)*

H. in pratis humentibus ad pagos *Rehe*, & *Langenaubach*. Floret Majo & sequ.

Receptaculum oblongum, pedunculatum. Floribus ex latere prolieris saepe ludit.

COMARUM. G. P. 638.

- Cal. 10-fidus. Petala 5, calyce minora. Receptaculum seminum ovatum, spongiosum persistens. S. N. 353.*

- 399.** *COMARUM, palustre. Linn. Spec. 718. (Fragaria. Hall. 1128.)*

H. in paludosis ad pagum *Sinn*. Floret Junio, Julio.

Planta hac in hortum translata, solo tam sicco quam humido, Caulibus viget suffruticosiss. perennantibus, Radice valde luxurianti.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

A. MONOGYNIA.

* *Flores tetrapetalii.*

PAPAVER. G. P. 648.

Cor. 4-petala. Cal. 2-phyllo. Capsula 1-lo-
cularis, sub stigmate persistente poris de-
hiscens. S. N. 360.

a. *Capsulis hispidis.*

400. PAPAVER, *Argemone*, capsulis clavatis hispidis,
 caule folioso multifloro. Linn. Spec. 725.
 (Hall. 1061. p. 15. no. 1.)

H. inter segetes am Dollberg, alibique. Floret Junio, Julio.
 b. *Capsulis glabris.*

401. PAPAVER, *Rheas*, capsulis glabris globosis,
 caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. Linn. Spec. 726. (Hall. 1064.)

H. inter segetes passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. PAPAVERIS ERRATICI f. RHOEADIS Flores.

402. PAPAVER, *dubium*, capsulis oblongis glabris,
 caule multifloro setis adpressis, foliis pinnati-
 fidis incisis. Linn. Spec. 726. (Hall. 1063. p. 15.
 no. 3.)

H. inter segetes am Dollberg, alibique frequens. Floret Junio,
 Julio.

403. PAPAVER, *somniferum*, calycibus capsulisque
 glabris, foliis amplexicaulibus incisis. Linn.
 Spec. 726. (Hall. 1065.)

H. in cultis auf dem Hintersand; in der Pitze, alibique quasi in-
 digena rarius. Floret Junio.

Pharm. PAPAVERIS ALBI & NIGRI Capita, Semina.

CHELIDONIUM. G. P. 647.

Cor. 4-petala. Cal. 2-phyllo. Siliqua 1-lo-
cularis, linearis. S. N. 359.

404. **CHELIDONIUM**, *majus*, pedunculis umbellatis.

Linn. Spec. 723. (Hall. 1059.)

H. ad sepes hortorum passim. Floret Junio & sequ.

Pharm. C H E L I D O N I I M A J O R I S Radix.

ACTÆA. G. P. 644.

Cor. 4-petala. Cal. 4 - phyllus. Bacca unilocularis. Semina semiorbiculata. S. N. 359.

405. **ACTÆA**, *spicata*, racemo ovato, fructibus baccatis. *Linn. Spec. 722. (Hall. 1076.)*

H. in nemorosis ad Erbach; in dumetis *am Beilstein; am Homberg, unter der Lithau* frequens. Floret Majo, Junio.

Pharm. C H R I S T O P H O R I A N A E Radix, Herba.

** *Flores pentapetalii.*

CISTUS. G. P. 673.

Cor. 5-petala. Cal. 5 - phyllus: foliolis duobus minoribus. Capsula. S. N. 366.

406. **CISTUS**, *Helianthemum*, suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis. *Linn. Spec. 744. (Hall. 1033.)*

H. in pascuis sylvaticis siccis, *am Hornberg, Rehberg*, alibique vulgaris. Floret Junio, Julio.

TILIA. G. P. 660.

Cor. 5-petala. Cal. 5 - partitus. Bacca sicca, globosa, 5-locularis, 5-valvis, basi dehiscens. S. N. 363.

407. **TILIA**, *europaea*, floribus nectario destitutis.

Linn. Spec. 733. (Hall. 1030.)

H. in sylvis, & culta circa urbem frequens. Floret Junio, Julio.

Pharm. T I L I A E Flores.

Germen 5-loculare. Capsula turbinata-globosa, 5-carinata, unilocularis: Semine unico, reliquis quatuor semper abortientibus.

*** *Flores polypetali.*

NYMPHÆA. G. P. 653.

Cor. polypetala. Cal. 4 - f. 5 - phyllus. Bacca multilocularis, truncata. S. N. 361.

408. **NYMPHÆA**, *lutea*, foliis cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo majore. *Linn. S. N. 361. Spec. 729. (Hall. 1066.)*

H. in

H. in piscinis ad *Emmerichenhain* rarius. Floret Junio, Julio. ♀
409. *NYMPHÆA*, *alba*, foliis cordatis integerrimis,
 calyce quadrifido. *Linn. Spec. 729.* (*Hall. 1067.*)

H. in piscinis ad *Driedorf*, alibique infrequens. Floret
 Junio.

Pharm. NYMPHÆAE ALBÆ Radix, Flores.

B. TRIGYNIA.

DELPHINIUM. G. P. 681.

*Cal. o. Petala 5. Nectarium bifidum, postice
 cornutum. Siliquæ 3. f. 1. S. N. 370.*

410. *DELPHINIUM*, *Consolida*, nectariis monophyl-
 lis, caule subdiviso. *Linn. Spec. 748.* (*Hall. 1203.*)

H. inter segetes frequens. Floret Junio, Julio.

Pharm. CONSOLIDÆ REGALIS Flores.

411. *DELPHINIUM*, *Ajacis*, nectariis monophyllis,
 caule simplici. *Linn. Spec. 748.* (*Hall. 1202.*)

H. in caltis quasi indigena, *bey der oberen Walckmühle* frequens.
 Floret Julio.

ACONITUM. G. P. 682.

*Cal. nullus. Petala 5 : supremo fornicato.
 Nectaria 2, pedunculata, recurva. Sili-
 quæ 3 - f. 5. S. N. 371.*

412. *ACONITUM*, *Napellus*, foliorum laciniis linea-
 ribus superne latoribus linea exaratis. *Linn.
 Spec. 751.* (*Hall. 1197.*)

H. in sylvaticis & pratis siccis *bey Langenbach*; ad pagum
Sinn frequens; *im Rosenväldgen* rarius. Floret Julio,
 Augusto.

*Nectaria sex minora linearia acuta, Stamina cingentia: quorum
 duo superiora apice bifida.*

C. PENTAGYNIA.

AQVILEGIA. G. P. 684.

*Cal. o. Petala 5. Nectaria 5, corniculata,
 inter petala. Capsulæ 5, distinctæ. S. N.
 372.*

413.

413. AQVILEGIA, *vulgaris*, nectariis incurvis. *Linn.*
Spec. 752. (Hall. 1195.)
H. in pomariis am Homberg; alibique frequens. Floret Junio.
Pharm. AQVILEGIÆ Flores, Semina.

D. POLYGYNIA.

CLEMATIS. G. P. 696.

- Cal. o. Petala 4, rarius 5. Semina caudata.*
S. N. 376.

414. CLEMATIS, *Vitalba*, foliis pinnatis: foliolis cordatis scandentibus. *Linn. Spec. 766. (Hall. 1142.)*

H. in dumetis ad viam publicam am Bockshayn. Floret Julio.

Foliolis integris, & subdentatis ludit.

THALICTRUM. G. P. 697.

- Cor. o. Petala 4 - f. 5. Semina ecaudata.*
S. N. 377.

415. THALICTRUM, *flavum*, caule foliōso sulcato, panicula multiplici erecta. *Linn. Spec. 770. (Hall. 1138.)*

H. in pratis ad pagos Breitscheid, Roth, & Langenaubach frequens. Floret Julio.

Pharm. THALICTRI Radix.

CALTHA. G. P. 703.

- Cal. o. Petala 5. Nectaria o. Capsulæ plures polyspermæ. S. N. 381.*

416. CALTHA, *palustris*. *Linn. Spec. 784. (Hall. 1188.)*

H. in pratis humentibus passim. Floret Majo.

ANEMONE. G. P. 694.

- Cal. o. Petala 6 - 9. Semina plura. S. N. 374.*

a. Hepatica, *Flore subcalculato.*

417. ANEMONE, *Hepatica*, foliis trilobis integerrimis. *Linn. Spec. 758. (Hepatica. Hall. 1156.)*

H. in nemorosis ad Erbach rarius. Floret Martio, Aprili.

Pharm. HEPATICÆ NÓBILIS Herba, Flores.

b. Ane-

b. Anemonoidea flore nudo, seminibus ecaudatis.

- 418. ANEMONE, nemorosa, seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro. Linn. Spec. 762. (Hall. 1154.)**

H. in sylvaticis montosis am Homberg; Rehberg; & alibi copiose. Floret Aprili, Majo.

Pharm. RANUNCULI ALBI Flores.

- 419. ANEMONE, ranunculoides, seminibus acutis, foliolis incisis, petalis (5) subrotundis, caule subbifloro. Linn. Spec. 762. (Hall. 1153.)**

H. in nemorosis ad pagum Erbach frequens. Floret Majo, Junio.

TROLLIUS. G. P. 700.

Cal. o. Petala circiter 14. Capsulae plurimæ, ovatæ, monospermæ. S.N. 380.

- 420. TROLLIUS, europæus, corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum. Linn. Spec. 782. (Hall. 1189.)**

H. in pratis humidiusculis, ad Erbach; Gundersdorff; alibi que copiose. Floret Junio.

Capsulae carinata, erecta, introrsum sutura dehiscentes: Seminibus in nostrate (cultæ) semper quatuor, ovatis, fuscis, nitidis, sutura affixis.

RANUNCULUS. G.P. 699.

Cal. 5 - phyllus. Petala 5 intra unguis poro mellifero. Semina nuda. S.N. 378.

a. Foliis simplicibus.

- 421. RANUNCULUS, Flammula, foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. Linn. Spec. 772. (Hall. 1182.)**

H. juxta rivulos in pratis udis, hinter dem Homberg; alibique vulgaris. Floret Junio, Julio.

- 422. RANUNCULUS, Ficaria, foliis cordatis angustatis petiolatis, caule unifloro. Linn. S.N. 378. Spec. 774. (Ficaria. Hall. 1160.)**

H. in pomariis & cultis passim. Floret Aprili, Majo.

Pharm. C E L I D O N I I M I N O R I S Radix, Herba.

b. Foliis dissectis & divisis.

- 423. RANUNCULUS, auricomus, foliis radicalibus reniformibus crenatis incisis; caulinis digitatis linearie-**

nearibus, caule multifloro. *Linn. Spec. 775.*
(Hall. 1177.)

H. in pomariis & pratis sylvaticis frequens. Floret Aprili & sequi.

Huius Flores vernalis (Aprili) *apetalis*; *seriores* (Majo) *uno altero* Petalo, *denuo* (Junio) Petalis *quinque instructi*, *obervantur*.

424. RANUNCULUS, *sceleratus*, foliis inferioribus palmatis; summis digitatis, fructibus oblongis. *Linn. Spec. 776.* (*Hall. 1175.*)

H. in aquis stagnantibus theriotrophei rarius; in fossis ad Heyer frequens. Floret Majo, Junio.

425. RANUNCULUS, *bulbosus*, calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto multifloro, foliis compositis. *Linn. S. N. 379. Spec. 778.* (*Hall. 1174.*)

H. in pascuis pomariis & pratis ubique. Floret Majo, Junio.

Locis superioribus & sterilioribus, Radice semper bulbosa; *in humentibus & pinguioribus*, tota fibrosa reperitur. Calyce retroflexo, & stolonum repentium defectu, a RAN. repente; Pedunculis sulcatis a RAN. acri dignoscendus.

426. RANUNCULUS, *repens*, calycibus patulis, pedunculis sulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis. *Linn. S. N. 379. Spec. 779.* (*Hall. 1173.*)

H. in cultis, pomariis, seclus vias, ubique. Floret Majo, Junio.

427. RANUNCULUS, *polyanthemos*, calycibus patulis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Linn. Spec. 779?* (*Hall. 1171.*)

H. in pratis humentibus ad pagum Gundersdorf parcus. Floret Junio.

Caule *glabro*, *adiori*, *ramosiori*, *multifloro*; Foliis *magis ad petiolum usque divisis*, *glabrioribus*, *acutius dentatis*; Pedunculis *substriatis*, *a sequente noſter vix differt*.

428. RANUNCULUS, *acris*, calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito - multifidis: summis linearibus. *Linn. Spec. 779.* (*Hall. 1169.*)

H. in pratis & pomariis abunde. Floret Majo, Junio.

Pharm. RANUNCULI Herba.

429. RANUNCULUS, *lanuginosus*, calycibus patulis, pedun-

pedunculis teretibus, caule petiolisque hirsutis, foliis trifidis lobatis crenatis holosericeis. *Linn.*

S. N. 379. *Spec. 779. (Hall. 1172.)*

H. in sylvaticis montosis am Homberg über der Lithau rarius; in nemorosis ad Breitscheid & Langenaubach frequens Floret Majo, Junio.

430. *RANUNCULUS, arvensis*, semenibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. *Linn.* *Spec. 780. (Hall. 1176.)*

H. in arvis & agris, inter segetes frequens. Floret Majo, Junio.

431. *RANUNCULUS, hederae*, foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Linn.* *Spec. 781.*

H. in aquis stagnantibus bey der untern Walckmühle copiose. Floret Junio, & sequ.

Caulis repens ramosissimus, teres, glaber, fibras simplices ex foliorum emittens alii. Folia infima longissime petiolata, reniformia, glabra, semiquinqueloba; superiora triloba; lobis obtusissimis; pagina superiore macula purpureo-fusca notata. Stipulae duas oblonga ad basin singuli petioli. Pedunculi oppositifolii, teretes, crassi, (respectu floris) uniflori. Flos exiguis. Calyx patens. Petala obovata, alba, ungue flavo, poro nectarifero uti in sequente. Stamina 5-6 s. 8. Fructus subglobosus, maturo nomine nutans. Semina obtusissima, fusca. Odor totius plantae Moichi, Adoxæ similis.

432. *RANUNCULUS, aquatilis*, foliis submersis capillaceis, emersis peltatis. *Linn.* S. N. 380. *Spec. 781.*

a. *Ranunculus aquaticus* folio rotundo & capillaceo. *Baeh.* *Pin. 180. (Hall. 1163.)*

B. *Ranunculus* foliis omnibus capillaceis circumscriptione rotundis. *Linn.* H. Cliff. 231. *(Hall. 1162.)*

y. *Ranunculus* foliis omnibus capillaceis circumscriptione oblongis. *Rey.* *Lugdb. 492. (Hall. 1161.)*

H. a. in stagnis auf der Sandwiese; *B.* & *y.*, in der Dille & Mühlbach copiose. Floret Majo & sequ.

CLAS-

CLASSIS XIV.

D I D Y N A M I A.

A. G Y M N O S P E R M I A.

* *Calyces subquinquefidi.*

LEONURUS. G. P. 722.

Antheræ punctis nitidis adspersæ. S. N. 396.

433. LEONURUS; *Cardiaca*, foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Linn. Spec. 817.* (*Cardiaca. Hall. 274.*)

H. in ruderatis, ad sepes frequens. Floret Junio.

Pharm. CARDIACÆ Herba.

GLECOMA. G. P. 714.

Antherarum singulum par in formam crucis connivens. Cal. 5-fidus. S. N. 393.

434. GLECOMA, *bederacea*, foliis reniformibus crenatis. *Linn. Spec. 807.* (*Chamaelema. Hall. 245.*)

H. in pomariis, ad sepes passim. Floret Aprili, Majo.

Pharm. HEDERA TERRESTRIS. Herba.

MENTHA. G. P. 713.

Cor. subæqualis, 4-fida: lacinia latiore emarginata. Stamina erecta, distantia. S. N. 391.

a. *Spicata.*

435. MENTHA, *sylvestris*, spicis oblongis, foliis oblongis tomentosis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Linn. Spec. 804.* (*Hall. 227.*)

H. in pratis uidis, juxta rivulos im Fischüveyher-Grund frequens. Floret Julio, Augusto.

b. *Capitata.*

436. MENTHA, *birsuta*, floribus capitatis, foliis ovatis serratis subsessilibus pubescentibus, staminibus corolla longioribus. *Linn. S. N. 392.* Mantiss. 81. (*Hall. 225. B.*)

I

H. in

H. in aquosis & inundatis *an der Mühlbach*; ad ripas *Dille am steinern Waag* frequens. Floret Augusto, Septembri.

437. MENTHA, *aquatica*, floribus capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. Linn. S. N. 392. Spec. 805. (Hall. 225. a.)

H. similibus in locis cum precedente copiosissime. Floret Augusto, Sept.

c. *Verticillata.*

438. MENTHA, *gentilis*, floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus corolla brevioribus. Linn. Spec. 805.

H. in fossis *an der Dille und Mühlbach* rarius. Floret Augusto.

439. MENTHA, *arvensis*, floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ferratis, staminibus corollam æquantibus. Linn. Spec. 806. (Hall. 223.)

H. in agris post mensem copiosissime. Floret Julio, Augusto.

Pharm. MENTHA SYLVESTRIS Herba.

TEUCRIUM. G. P. 706.

Corollæ labium superius (nullum) ultra basin 2-partitum, divaricatum ubi stamina. S. N. 387.

440. TEUCRIUM, *Botrys*, foliis multifidis, floribus lateralibus ternis pedunculatis. Linn. S. N. 387. Spec. 786. (Chamædrys. Hall. 289.)

H. in arvis *am Dollberg* frequens; *auf dem Homberg* alibique rarius. Floret Julio.

441. TEUCRIUM, *Scorodonia*, foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. Linn. Spec. 789. (Hall. 287.)

H. in montosis sylvaticis *am Homberg über der Lithau; am Rehberg; Galgenberg; im Beilstein* frequens. Floret Julio.

442. TEUCRIUM, *Chamædrys*, foliis cuneiformi-ovatis incisis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus subpilosis. Linn. S. N. 388. Spec. 790. (Hall. 286.)

H. in montosis apricis *am Galgenberg*. Floret Julio. ♀.

Ipse plantam hanc nondum legi.

Pharm. CHAMÆDRYOS Herba.

AJU-

AJUGA. G. P. 705.

*Corollæ labium superius minimum. Stamina
labio superiore longiora.* S.N. 387.

443. AJUGA, *pyramidalis*, tetragono - pyramidalis
villoso, foliis radicalibus maximis. Linn. S.N.
387. Spec. 785. ? (*Bugula*. Hall. 283. a.)

H. in arvis & campis siccis apricis am Homberg, alibique
vulgatis. Floret Majo, Junio.

Caulis *simplex*, *palmaris*, *sensim pedalis*, *erectus*; *villosum*.
Folia caulina *inferiora reliquis majora*, *petiolata*, *ovato - oblonga*,
repando - crenata. Bractæ *decussata*, *subtriloba*, *settangulato - dentata*, *inferiores virides*, *superiores violaceæ*, *villosa*. Flores *utrinque 5*. Calyx *villosum*; *violaceus*. Corolla
saturate cœrulea.

444. AJUGA, *alpina*, caule simplici, foliis caulinis
radicalia æquantibus. Linn. S.N. 387. Man-
tiss. 80? (Hall. 283? β.)

H. in montosis siccis am Galgen- und Rebberg, rarius. Floret
Junio.

Caulis *spithameus*, *villofissimus*. Folia caulina *inferiora oblonga*,
lineata, *crenato - dentata*, *subsessilia*, *villosa*, *reliquis minora*.
Bractæ *ovata*, *crenulata*, *villosa*, *non colorata*. Floribus
utrinque 5, *inque reliquis ab antecedente vix differt*; *cujus for-
te varietas est*.

445. AJUGA, *gentvensis*, foliis tomentosis *lineatis*,
calycibus *hirsutis*. Linn. S.N. 387. Spec. 785.

H. in arvis sterilibus am Hemberg & Reuterberg rarius;
jam dudum lecta, nunc rarissima planta. Flor. Junio.

Caulis *semipedalis*, *simplex*. Folia *cuneiformi - oblonga*, *dentata*,
villosa, *lineata*, *inferiora reliquis minora*. Bractæ *remotiores*,
ovata, *dentata*, *superiores fusco - purpurea*. Flores *utrinque tres*.
Calyx *vilosus*, *purpurascens*. Corolla *incarnata*, *tubo longi-
fimo, tenui*.

446. AJUGA, *reptans*, *glabra*, *stolonibus reptantibus*.
Linn. S.N. 387. Spec. 785. (*Bugula*. Hall. 282.)

H. in pratis & pomatiis passim. Floret Majo.

Pharm. CONSOLIDÆ MEDIAS Herbae.

BETONICA. G. P. 718.

*Cal. aristatus. Corollæ labium superius ad-
scendens, planiusculum; tubus cylindri-
cus.* S.N. 394.

447. BETONICA, *officinalis*, spica interrupta, collarum labii lacinia intermedia emarginata.

Linn. Spec. 810. (Hall. 264.)

H. in sylvaticis am Homberg, alibique vulgaris. Floret Julio.
Pharm. BÉTONICAE Herba, Flores.

LAMIUM. G. P. 716.

Corollæ labium superius integrum fornicateum; labium inferius 2-lobum; faux utrinque margine dentata. S. N. 393.

448. LAMIUM, *maculatum*, foliis cordatis acuminatis, verticillis decemfloris. *Linn. Spec. 809. (Hall. 270? a.)*

H. ad sepes in poinariis passim. Floret Majo, Junio.

Differet a sequente: Foliis latioribus, obscure-viridis, primo vere autumnoque albido-maculatis; serrato-dentatis: dentibus duplo paucioribus, acutioribus, superioribus profundius incisis, per paria remotoribus; Floribus in singulo Verticillo 10, nec-20. Calyce incurvo, nulla macula fusca ad basin notato: dentibus inaequalibus, triangularibus, aristatis, pilosis, superiore reliquis majore. Corolla purpurea: Galea crenulata; Labio albido, venis sanguineis undulatis picto.

449. LAMIUM, *album*, foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Linn. S. N. 393. Spec. 809. (Hall. 271.)*

H. in cultis & pomariis ad sepes passim. Floret Majo & seq.

Pharm. LAMI ALBI f. GALEOPSIS Flores.

450. LAMIUM, *purpureum*, foliis cordatis obtusis petiolatis. *Linn. Spec. 809. (Hall. 272.)*

H. in agris & cultis ubique. Floret Aprili & seq.

451. LAMIUM, *amplexicaule*, foliis floralibus sessiliibus amplexicaulibus obtusis. *Linn. Spec. 809. (Hall. 273.)*

α . Corollis non explicatis, galeis purpureis holosericeis.

β . Corollis perfectis, tubo longissimo.

H. α , in cultis primo vere passim; β in arvis & agris auf dem binter Stahl, alibique frequens. Floret serius Junio, Julio.

GALEOPSIS. G. P. 717.

Corollæ labium superius subcrenatum, fornica-

nicatum; labium inferius supra 2-dentatum. S. N. 393.

452. GALEOPSIS, *ladnum*, internodiis caulinis æquilibus: verticillis omnibus remotis, calycibus inertibus. Linn. S. N. 393. Spec. 810. (Hall. 266.)

H. in agris arenosis, inter segetes passim. Floret Julio & sequ.

453. GALEOPSIS, *dubia*, foliis rhomboideis serratis sericeis, verticillis diffitis. Hall. 267. add. 183.

Var. *grandiflora* γ. Galeopsis *Terrabit*, LINN. Flor. Suec. edit. II. 523.

H. in arenosis sterilibus auf der Sandwiese, alibique rarius. Floret Julio.

Internodia ramorumque basis incrassata. Folia ovato-lanceolata, pubescens, mollia, subserrata. Verticilli remoti, densi, subtomentosi. Calyx setis capitatis flavis adspersus: laciniis subæqualibus, setaceis, brevibus. Corollæ Tubus cylindricus, calyce quadruplo longior. Faux inflata, sulcata. Galea forniciata, pubescens; apice subbifida, crenulata, reflexa. Labium maximum: Denticulis eminentibus incrassatis; Laciniis crenulatis: lateralibus quadratis, intermedia duplo latiore emarginata. Colore albido, flavo, purpureoque pulcherrime ludit. Internodiis incrassatis, a precedente, Calycibus non aristatis verticillisque remotis a sequente differt. In hortum introducta, per plures annos faciem non mutavit.

454. GALEOPSIS, *Terrabit*, internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis, calycibus pungentibus. Linn. S. N. 393. Spec. 810. (Hall. 268.)

H. in agris & cultis, ad sepes passim. Floret Julio & sequ.

455. GALEOPSIS, *Galeobdolon*, verticillis sexfloris: involucro tetraphyllo. Linn. Spec. 810. (Cardiaca, Hall. 275.)

H. in sylvaticis umbrosis am Homberg; ad sepes am Heiligen-Floß; in cultis am Sieghaus rarius. Floret Majo & sequ.

Caulis repens, florens erectus. Folia byeme albido-maculata.

STACHYS. G. P: 719.

Corollæ labium superius fornicatum; labium inferius lateribus reflexum: intermedia

- majore emarginata. *Stamina* deflorata versus latera reflexa. S. N. 394.
456. *STACHYS*, *sylvatica*, verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Linn. Spec. 811.* (*Cardiaca. Hall. 276.*)
H. in umbrosis, ad sepes passim. Floret Junio & sequ.
457. *STACHYS*, *palustris*, verticillis sexfloris, foliis linearis-lanceolatis semiamplexicaulibus. *Linn. Spec. 811.* (*Stachys. Hall. 257.*)
H. ad fossas; in agris & cultis vitium pessimum. Floret Junio, Julio.
458. *STACHYS*, *alpina*, verticillis multifloris, foliorum ferraturis apice cartilagineis, corollis labio plano. *Linn. Spec. 812.* (*Hall. 256.*)
H. in montosis asperis ad pagos *Schönbach*; *Breischeid*; & alibi non infrequens. Floret Julio, Augusto.
- 459 *STACHYS*, *germanica*, verticillis multifloris, foliorum ferraturis imbricatis, caule lanato. *Linn. Spec. 812.* (*Hall. 255.*)
H. in montosis asperis *bey dem Eulenhaus*; *auf dem Stiesselberg*; *am Beilstein* frequens. Floret Julio & sequ.
460. *STACHYS*, *annua*, verticillis sexfloris, foliis ovato-lanceolatis trinerviis laevibus petiolatis, caule erecto. *Linn. S. N. 395. Spec. 813.* (*Betonica. Hall. 263.*)
H. in agris & arvis *am Dollberg* frequens; alibique rarius. Floret Julio, Augusto.
461. *STACHYS*, *arvensis*, verticillis sexfloris, foliis obtusis nudiusculis, corollis longitudine calycis, caule debili. *Linn. S. N. 395. Spec. 814.* (*Trixago. Hall. 231.*)
H. in cultis *am Homberg & Dollberg* frequens; *auf dem Schießplatz* rarius. Floret Julio, Augusto.
- NEPETA. G. P. 710.
- Cor. labium inferius lacinula intermedia crenata*: faux margine reflexo. *Stamina* approximata. S. N. 390.
462. *NEPETA*, *Cataria*, floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-

tato - ferratis. *Linn. Spec. 796.* (*Cataria Hall. 246.*)

H. in ruderatis & ad sepes hortorum ; am Sieghaus frequens.
Floret Julio, Augusto.

Pharm. NEPETA Herba.

SATUREGIA. G. P. 707.

Corollæ laciniæ subæquales. Stamina distan-
tia. S. N. 389.

463. SATUREGIA, *hortensis*, pedunculis bifloris. *Linn.*
Spec. 795.

H. in cultis auf dem Hintersand ; am Sieghaus , alibique qua-
si-indigena rarius. Floret Julio, Augusto.

BALLOTA. G.P. 720.

Cal. hypocrateriformis, 5-dentatus, 10-stria-
tus. Corollæ labium superius crenatum,
concavum. S.N. 395.

464. BALLOTA , *nigra* , foliis cordatis indivisis ser-
ratis, calycibus acuminatis. *Linn. Spec. 814.*
Ballote. Hall. 259.)

H. ad sepes auf dem Schießplatz alibique frequens. Floret Ju-
lio, Augusto.

MARRUBIUM. G. P. 721.

Cal. hypocrateriformis, rigidus, 10-striatus.
Corollæ lab. super. 2-fidum lineare rectum.
S. N. 395.

465. MARRUBIUM, *vulgare* , dentibus calycinis seta-
ceis uncinatis. *Linn. Spec. 816.* (*Hall. 258.*)

H. in montosis asperis duris Theriotrophei ; Seminibus hinc
inde per me dispersis , auf dem Schießplatz copiose. Floret
Julio , Augusto.

Pharm. MARRUBII ALBI Herba.

** *Calyces bilabiati.*

SCUTELLARIA. G. P. 734.

Calyx ore integro : post florescentiam clau-
so, operculato. S. N. 403.

466. SCUTELLARIA, *galericulata*, foliis cordato -lan-
ceolatis crenatis , floribus axillaribus. *Linn.*
Spec. 835. (*Cassida. Hall. 280.*)

H. ad fossas & ripas *Dilla*; an der Mühlbach; alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

THYMUS. G. P. 727.

Calycis bilabiati faux villis clausa. S. N. 399.

467. THYMUS, *Serpillum*, floribus capitatis, caulis repentinibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. Linn. S. N. 399. Spec. 825. (Hall. 235.)

α. *Serpillum vulgare inajus*; & minus. Baub. Pin. 220.

β. *Serpillum vulgare minus capitulis lanuginosis.* Tourn. inst. 197.

H. α, in collibus siccis passim; β, in sterilibus editioribus vento boreali expositis, am Dollberg & Stützelberg infrequens. Floret Julio, Augusto.

Pharm. α, SERPYLLI Herba, Flores.

468. THYMUS, *Acinos*, floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulis erectis subramosis, foliis acutis serratis. Linn. S. N. 399. Spec 826. (Cinopodium. Hall. 237.)

H. in collibus siccis am Homberg, Dollberg, & alibi frequens. Floret Julio, Augusto.

Labii lacinia intermedia emarginata.

PRUNELLA. G. P. 735.

Filamenta bifurca: altero apice antherifera.

Stigma bifidum. S. N. 404.

469. PRUNELLA, *vulgaris*, foliis omnibus ovato-oblongis petiolatis. Linn. Spec. 837. (Brunella. Hall. 277.)

β. Foliis integerrimis, spicis majoribus, bracteis non coloratis, corollis albis.

H. α, in pratis, pomariis & pascuis passim; β. in asperis sylvaticis in der Horre frequens; auf dem Homberg rarius. Floret Julio, Augusto.

Pharm. α, PRUNELLA Herba.

470. PRUNELLA, *lacinata*, foliis ovato-oblongis petiolatis: supremis quatuor lanceolatis dentatis. Linn. Spec. 837. (Hall. 279.)

H. in sylvaticis montosis am Beilstein; am Gißdners-Grund; am Homberg parcius. Floret Julio, Augusto.

Exceptis foliis supremis, omnibus in partibus cum præcedente convevit, cuius varietas est.

ORIGA-

ORIGANUM. G.P. 726.

Strobilus tetragonous, spicatus, calyces colligens, S.N. 399.

471. ORIGANUM, *vulgare*, spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. Linn. Spec. 824. (Hall. 233.)
H. in sylvaticis montosis am Homberg, Rehberg, & Dollberg copiose. Floret Julio, Augusto.

Pharm. ORIGANI VULGARIS Herba.

CLINOPODIUM. G. P. 725.

Involucrum multifidum, verticillo subiectum. S.N. 398.

472. CLINOPODIUM, *vulgare*, capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis. Linn. Spec. 821. (Hall. 239.)
H. montosis sylvaticis am Homberg; Beilstein, alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

B. ANGIOSPERMIA.

* Calyces bifidi.

OROBANCHE. G. P. 779.

Cal. 2-fidus. Cor. ringens. Caps. 1-locularis, 2-valvis, polysperma. Glandula sub basi germinis. S. N. 422.

473. OROBANCHE, *major*, caule simplicissimo pubescente, staminibus subexsertis. Linn. Spec. 882. (Hall. 295.)

H. in pratis & agris sterilibus im Ebersbacher Grund. Plantam ipse nondum legi, ab rustico mili iudicata tantum vidi. Floret Junio.

** Calyces quadrifidi.

LATHRÆA. G. P. 743.

Cal. 4-fidus. Glandula depressa, ad basin futuræ germinis. Capsula 1-locularis. S. N. 406.

474. LATHRÆA, *Squamaria*, caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. Linn. Spec. 844. (Squamaria. Hall. 297.)

I

H. in

H. in nemorosis umbrosissimis im *Hirschberg* parcius. Floret Majo. \ddagger .

EUPHRASIA G. P. 741.

Cal. 4 - fidus, cylindricus. *Caps.* 2 - locularis, ovato-oblonga. *Antheræ* inferiores altero lobo basi spinosæ. S. N. 405.

475. EUPHRASIA, officinalis, foliis ovatis lineatis argute dentatis. Linn. Spec. 841. (Hall. 303.)
H. in paucis sterilibus, pratis & pomariis passim. Floret Julio.

Pharm EUPHRASIA Herba.

Inferiorum Antherarum infimus lobus tantum apice spinula terminatus.

476. EUPHRASIA, Odontites, foliis linearibus omnibus ferratis. Linn. Spec. 841, (Odontites. Hall. 304.)

H. in agris sterilibus bey dem Kalckofen copiose; locis humentibus an der Mühlbach, bey der untern Walckmühle frequens. Floret Julio, Augusto.

Corolla a priori diversissima: Galea compressa, vix emarginata. Labii inferiores tres lobii Galea breviores, aquales, truncati, crenulati. Lobii Antherarum omnes apice spinosi. basi barbati.

RHINANTHUS G. P. 740.

Cal. 4 - fidus, ventricosus. *Capsula* 2 - locularis, obtusa, compressa. S. N. 405.

477. RHINANTHUS, Crista galli, corollis labio superiore compresso breviore. Linn. S. N. 405. Spec 840.

α . Alectrolophus calycibus glabris. H A L L. 313.

β . Alectrolophus calycibus hirsutis. H A L L. 314.

H. α . in pratis fuccis passim; β . caule altiori magis difuso, calycibus pubescentibus, corollarum rostris violaceis: in pratis humentibus auf der Abr., & alibi frequens. Floret α . Majo. β . Junio.

MELAMPYRUM. G. P. 742.

Cal. 4 - fidus. Corollæ lab. super. compressum, margine replicato. *Caps.* 2 - locularis obliqua, hinc dehiscens. Semina 2, gibba. S. N. 406.

478.

478. MELAMPYRUM, *cristatum*, spicis quadrangularibus: bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis. *Linn. Spec. 842.* (*Hall. 311.*)

H. in pratis & pastuis siccis *am Homberg über der Lithau*; *am Rehberg*; *am Stützelberg* frequens. Floret Julio.

479. MELAMPYRUM, *arvense*, spicis conicis laxis: bracteis dentato-setaceis coloratis. *Linn. Spec. 842.* (*Hall. 310.*)

H. in agris inter segetes passim. Floret Junio, Julio.

480. MELAMPYRUM, *pratense*, floribus secundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis clausis. *Linn. S. N. 406.* *Spec. 843.* (*Hall. 302.*)

H. in pratis sylvaticis *am Homberg* frequens. Floret Junio, Julio.

481. MELAMPYRUM, *sylvaticum*, floribus secundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis hiantibus. *Linn. S. N. 406.* *Spec. 843.* (*Hall. 307.*)

H. in sylvaticis montosis *auf der Steinseite* rarius. Floret Junio, Julio, ♀

*** *Calyces quinquefidi.*

LIMOSELLA. G. P. 776.

Cal. 5-fidus. Cor. 5-fida, æqualis. Stamina per paria approximata. Caps. 1-locularis, 2-valvis, polysperma. S. N. 421.

482. LIMOSELLA, *aquatica*. *Linn. Spec. 881.* (*Hall. 300.*)

H. in aquis stagnantibus *bey der untern Walckmühle*; ad viam publicam *in der untern Pitze*; in rivulis *an der Herrnvvieje*, *unter dem Bockshayn*, alternis annis plus minusve frequens. Floret Julio, Augusto.

SCROPHULARIA. G. P. 756.

Cal. 5-fidus. Cor. subglobosa, resupinata. Capsula 2-locularis. S. N. 413.

483. SCROPHULARIA, *nodosa*, foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo. *Linn. S. N. 413.* *Spec. 863.* (*Hall. 326.*)

H. in fossis, ad vias *bey der Walckmühle*, & alibi passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. SCROPHULARIAE Radix.

484.

484. SCROPHULARIA, *aquatica*, foliis cordatis obtusis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. Linn. Spec. 864. (Hall. 325.)

H. in aquofis, *an der Mühlbach* alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

Pharm. SCROPHULARIAE Herba.

485. SCROPHULARIA, *vernalis*, foliis cordatis, pendunculis axillaribus solitariis dichotomis. Linn. Spec. 864. (Hall. 327.)

H. in aquofis *am Pitzbrückgen*; ad sepes *am Sieghäuser Weg*. Floret Majo.

Planta alias non indigena, seminibus per me dispersis annuatim locis indicatis provenit.

DIGITALIS. G. P. 758.

Cal. 5 - partitus. Cor. campanulata, 5-fida, ventricosa. Caps. ovata, 2- locularis. S. N.

414.

486. DIGITALIS, *purpurea*, calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis : labio superiore integro.

Linn. Spec. 866. (Hall. 330.)

H. in sylvaticis montosis ad Heyer, Frohnhausen, & Bach copiose. Corollis albis ludit. Floret Junio, Julio.

487. DIGITALIS, *lutea*, calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis : labio superiore bifido.

Linn. Spec. 867.

B. Digitalis foliis calycinis lanceolatis, galea incisa, faucibus maculosis. HALL. 331. Digitalis *ambigua*. MURRAY Prodri. St. Gaett. 62.

H. B., in sylvaticis montosis im Thiergarten, *an der Rüsterbach rarius*. Floret Junio, Julio.

Planta præcedente tenuior, subviscida ; imprimis differt : Caule bipedali, subpubescente ; Foliis supra glabris, subter subpubescentibus, venis anastomosantibus nullis, margine levissime & argute serratus ; Racemo apice nutante ; Bracteis angustioribus, obtusioribus ; Calycinis Foliolis lanceolatis ; Corolla paulo minore, mollissime pubescente, pallide flava, intus pilosa fusco-maculata : Labia superiore brevissimo, obtusissimo, bifido, lacinias lateralibus inferioreque acutis ; Stylo recto ; Stigmate bifido, connivente ; Capsulis secundis, remotis, ovato-elongatis, acuminatis, calyce duplo longioribus.

ANTIRR.

ANTIRRHINUM. G. P. 750.

Cal. 5 - phyllus, *Corollæ* - basis deorsum promi-
mens, nectarifera. *Caps.* 2 - loculatis.
S. N. 409.

488. ANTIRRHINUM, *Elatine*, foliis hastatis alterni:
caulibus procumbentibus. *Linn. Spec.* 851.
(*Hall.* 340.)

H. in arvis & agris am *Dollberg*; auf dem *Reuterberg*; in cul-
tis am *Sieghäuser Weg* frequens. Floret Julio, Augusto.

489. ANTIRRHINUM, *spurium*, foliis ovatis alternis,
caulibus procumbentibus. *Linn. Spec.* 851.
(*Hall.* 341.)

H. in arvis am *Homberg*, *Rehberg*, jam dudum lesta, nunc
visu rarioer planta. Floret Junio, Julio.

490. ANTIRRHINUM, *arvense*, foliis sublinearibus :
inferioribus quaternis, calycibus piloso - visci-
dis, floribus spicatis, caule erecto. *Linn.*
Spec. 855. var. α .

H. in agris & arvis am *Dollberg* frequens; am *Homberg*, ali-
bique rarius. Floret Julio.

Radix annua. Caudis dodrantalis s. pedalis, simpliciusculus, ere-
ctus, levis, infra spicam nudus. Folia linearia: inferiora terna,
quaterna, rarius quina; superiora sparsa, ex quorum alis saepe ra-
muli steriles. Spica terminalis, floribus confertis. Bractæ li-
neares reflexæ, longitudine floris. Calycina foliola subinaqua-
lia laticeolata, uti germinis apex pilis capitatis adspersa. Co-
rolla cœrulea, odorata: Tubus basis ventricosus, Calcari te-
nui recurvo, bractea breviore; Laciniae dua superiores acutissi-
ma scula: inferiores tres aquales, brevissima, obtusa. Capsula sub-
remota, obovata, striata, apice sexvalvi dehiscentes, Valvu-
lum intermedium utrinque deponentes. Semina margine mem-
branaceo cincta uti in A. *Linaria*.

491. ANTIRRHINUM, *minus*, foliis plerisque alter-
nis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo dif-
fuso. *Linn. Spec.* 852. (*Hall.* 335.)

H. in agris & arvis am *Dollberg*, *Homberg*, auf dem *Schieß-
platz*; & alibi frequens. Floret Julio, Augusto.

492. ANTIRRHINUM, *Linaria*, foliis lanceolato - li-
nearibus confertis, caule erecto, spicis termi-
nalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Linn.*
Spec. 858. (*Hall.* 336.)

B. PELO-

B. PELORIA, proles hybrida. LINN. S. N. 411. Spec.

859. Amoen. acad. I. p. 55. T. 3.

H. α . in cultis & ruderatis auf dem Hintersund, am Sieghauß;
& alibi frequens. Floret Julio, Augusto.

B. PELORIAM Anno 1769 legi: ad versuras auf der
Weisgärber Wiese; & copiosius am Wässer-Graben hinter dem
Bockshayn. Floret Julio.

Pharm. α . LINARIE Herba.

PELORIÆ (in meis speciminibus) Radix, Caulis, Foliaque ut
in A. Linaria. Spicæ flores inferiores A. Linaria; duo vel
tres terminali proximi, bi - seu tricalcarati; Flos terminalis
PELORIÆ. Calyx 5-fidus, equalis; vel, duobus calycibus
confluentibus 10-fidus, inæqualis. Corolla regularis, flava: Tu-
bus ventricosus, basi in quinque cornua subulata, incurva;
longitudine corolla divisus, collo cylindrico contracto; Limbus 5-
fidus, laciniis equalibus brevibus, obtusis, reflexis, tubi collo
adpresso, non patulis; Palatum gibbum: eminentia quinque
tumidis, conniventibus, villosis, fulvis, intra tubum decurren-
tibus. Stamina 5, inæqualia, receptaculo nec tubo inser-
ta. Antheræ ovales. Pistillum imperfectum, abortiens. In
hortum introducta, in sequente anno in A. Linariam trans-
fuit. Simillimam metamorphosin in Viola martia observavi.

493. ANTIRRHINUM, Orontium, corollis ecaudatis,
floribus subspicatis, calycibus corolla longio-
ribus. Linn. S. N. 411. Spec. 860. (Hall. 334.)

H. in agris & arvis am Dollberg & Galgenberg frequens; Co-
rollis albis auf dem Schießplatz rarius. Floret Julio, Au-
gusto.

Pharm. ANTIRRHINI Herba.

PEDICULARIS. G. P. 746.

Cal. 5-fidus. **Caps.** 2-locularis, mucronata,
obliqua. **Semina** tunicata. S. N. 407.

494. PEDICULARIS, palustris, caule ramoso, caly-
cibus cristatis calloso-punctatis, corollis labio
obliquis, Linn. S. N. 407. Spec. 845. (Hall. 320.)

H. in pratis uliginosis ad pagum Sinn copiose. Floret Junio,
Julio.

Pharm. PEDICULARIS Herba.

495. PEDICULARIS, sylvatica, caule ramoso, calyci-
bus oblongis angulatis laevibus, corollis labio
cordato. Linn. Spec. 845. (Hall. 321.)

H. in

H. in pratis sylvaticis humidis *im Pulversgrund*, am *Beilstein* rarius; ad pagos *Hörbach* & *Schönbach* frequens. Floret Ma-jo, Junio.

CLASSIS XV.

TETRADYNAZIA.

A. SILICULOSA.

* *Silicula integra*, nec apice emarginata.

DRABA. G. P. 800.

Silicula integra, ovali-oblonga: valvis planiusculis, dissepimento parallelis. *Stylus nullus*. S. N. 432.

496. DRABA, verna, scapis nudis, foliis subferratis.

L. S. N. 432. Spec. 896. (Hall. 496.)

H. in collibus sterilibus, agris & arvis ubique. Floret Martio, Aprili.

LUNARIA. G. P. 809.

Silicula integræ, elliptica, compresso-plana, pedicellata: valvis dissipimento æqualibus, parallelis, planis. *Calyx* foliolis saccatis. S. N. 438.

497. LUNARIA, *rediviva*, foliis alternis. Linn. Spec. 911. (Hall. 500.)

H. in rupibus *bey denen Steinkammern* ad pagum *Erbach*. Flo-ret Majo, Junio.

MYAGRUM. G. P. 796.

Silicula stylo conico terminata; loculo sub-monospermo. S. N. 431.

498. MYAGRUM, *sativum*, siliculis obovatis pedunculatis polyspermis. Linn. Spec. 894. (*Alyssum*. Hall. 489.)

H. in agris inter Linum *in der Aue* vulgare. Floret Janio, Julio.

** *Silicula emarginata apice*.

ALY-

ALYSUM G. P. 805.

Filamenta quædam introrsum denticulo notata. Silicula emarginata. S. N. 435.

499. ALYSSUM, *calycinum*, caulis herbaceis, staminibus omnibus dentatis, calycibus persistentibus. Linn. Spec. 908.

H. in arvis sterilibus *am Beilstein* rarius. Floret Junio, Julio. ♀

500. ALYSSUM, *campestre*, caule herbaceo, staminibus stipatis pari setarum, calycibus deciduis. Linn. Spec. 909. (Hall. 494. Secund. descript.)

H. in agris, & arvis sterilibus *am Dollberg*; alibique frequens. Floret Majo, Junio.

Petala apice bifida, flava, dein albida, Calyx paulo longior; Setæ duæ ad latus singuli Filamenti brevioris, receptaculo insertæ. Calyx ad maturitatem fere silicula, non vero ad dicti scendentiam usque valvularum persistens.

COCHLEARIA. G. P. 803.

Silicula emarginata, turgida, scabra: valvulis gibbis obtusis. S. N. 434.

501. COCHLEARIA, *Coronopus*, foliis pinnatifidis, caule depresso. Linn. S. N. 435. Spec. 904. (Coronopus. Hall. 502.)

H. in eollibus apricis nudis, *im Beilstein* rarius. Floret Julio, Augusto.

502. COCHLEARIA, *Armoracia*, foliis radicalibus lancicolatis crenatis, caulinis incisis. Linn. Spec. 904. (Nasturtium. Hall. 504.)

H. in fossis *an der Dille*; *auf der Sanduviese* rarius. Floret Julio.

Pharm. ARMORACIA Radix.

LEPIDIUM. G. P. 801.

Silicula emarginata, cordata, polysperma: valvulis carinatis contrariis. S. N. 433.

503. LEPIDIUM, *sativum*, floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. Linn. Spec. 899.

H. in cultis inter olera *am Sieghäuser Weg*; alibique rarius. Floret Julio, Augusto.

THLA-

THLASPI. G. P. 802.

Silicula emarginata, obcordata, polysperma: valvulis navicularibus, marginato - carinatis. S. N. 434.

- §04. THLASPI, *arvense*, siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. Linn. Spec. 901. (*Nasturtium. Hall. 511.*)

H. in agris & cultis auf dem Dollberg; alibique vulgaris. Floret Majo, Junio.

Pharm. THLASPEOS Semina

- §05. THLASPI, *campestre*, siliculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis. Linn. 902. (*Nasturtium. Hall. 509.*)

H. in campis & arvis sterilibus auf der Höhle; alibique vulgaris. Floret Majo, Junio.

- §06. THLASPI, *montanum*, siliculis obcordatis, foliis glabris: radicalibus carnosis obovatis integerrimis, caulinis amplexicaulibus, corollis calyce majoribus. Linn. Spec. 902. (*Lepidium. Hall. 518.*)

H. in sylvaticis montosis muscosis am Homberg & Galgenberg frequens. Floret Aprili, Majo.

Radix biennis. Caulis spithameus, erectus, subramosus. Folia radicalia numerosa, subdentata, rarius integra, infima petiolata: caulina cordato-oblonga, amplexicaulia, sinuato-dentata. Corymbi Flores ante explicationem purpurei. Calyx equalis, erecto-patulus. Petala alba, calyce duplo longiora. Stamina distantia, longitudine fere petalorum: Antheris purpureis. Stylus longitudine Germinis. Silicula oblongo-obcordata, subtus convexa, margine tenui acuto cincta. Semina 6 f. 8.

- §07. THLASPI, *perfoliatum*, siliculis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris subdentatis, petalis longitudine calycis, caule ramoso. Linn. Spec. 902. (*Nasturt. Hall. 510.*)

H. in arvis & campis sterilibus ad pagum Ballersbach rarius. Floret Majo.

- §08. THLASPI, *Bursa pastoris*, siliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. Linn. Spec. 903. (*Nasturt. Hall. 514.*)

H. in agris arvis & cultis passim. Floret tota aestate.

Pharm. BURSAE PASTORIS Herba.

K

B. SILI-

B. S I L I Q V O S Æ.

* *Calyx clausus foliolis longitudinaliter conniventibus.*

RAPHANUS. G. P. 822.

Cal. clausus. Siliqua torosa, subarticulata, teres, Glandulæ melliferæ 2 inter stamina breviora & pistillum, totidem inter stamina longiora & calycem. S. N. 445.

§ 9. RAPHANUS, *Raphanistrum*, siliquis tereribus articulatis lœvibus unilocularibus. Linn. Spec. 935. (Hall. 468.)

H. inter segetes æstivas, alibique frequens. Floret Junio, Julio.

Corolla Petala flava; albida venis violaceis in nostrate rufissima.

ERYSIMUM. G. P. 814.

Siliqua columnaris, exacte tetraëdra. Calyx clausus. S. N. 441.

§ 10. ERYSIMUM, *officinale*, siliquis spicæ adpressis, foliis runcinatis. Linn. Spec. 922. (Hall. 478.)

H. in cultis & ruderatis, ad vias vulgaris. Floret æstate. Pharm. ERYSIMI Herba.

§ 11. ERYSIMUM, *Barbarea*, foliis lyratis extimo subrotundo. Linn. Spec. 922. (Hall. 479.)

H. in fossis, ad ripas Dille frequens. Floret Mayo.

§ 12. ERYSIMUM, *Alliaria*, foliis cordatis. Linn. Spec. 922. (Hall. 480.)

H. in pomariis ad sepes passim. Floret Mayo & sequ.

Pharm. ALLIARIAE Herba.

§ 13. ERYSIMUM, *chevrantboides*, foliis lanceolatis integerrimis, siliquis patulis. Linn. S. N. 441. Spec. 923. (Hall. 477.)

H. in arvis am Dollberg; in ruderatis auf dem Hintersand rarius. Floret Junio, Julio.

ARABIS. G. P. 818.

Glandulæ nectariferæ 4, singulæ intra calycis foliola, squamæ instar reflexæ. S. N. 443.

514.

§ 14. ARABIS, *tbaliana*, foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. Linn. Spec. 929. (Hall. 452.)
H. in arvis & agris sterilibus paucum. Floret Aprili, Majo.
Folia radicalia *subferrata*, sericea *furcata* *scabra*.

BRASSICA. G. P. 820.

Cal. erectus, connivens. *Sem.* globosa. *Glandula* inter *stamina* breviora & *pistillum*, interque longiora & *calycem*. S. N. 444.

a. *Style obtusifolius*.

§ 15. BRASSICA, *campestris*, radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus.

Linn. Spec. 931. (Eruca. Hall. 457.)

H. in agris inter Hordeum ad pagos Amdorf & Burgk parcius. Floret Junio.

§ 16. BRASSICA, *Napus*, radice caulescente fusiformi. Linn. Spec. 931.

H. in agris inter segetes alibique frequens. Floret Majo.
Pharm. N. A. P. I Semina.

b. *Eruca siliquis style ensiforme*.

§ 17. BRASSICA, *Erucastrum*, foliis runcinatis, caule hispido, siliquis laevibus. Linn. S. N. 444:
Spec. 932. (Eruca. Hall. 459.)

H. ad vias & margines agrorum ad pagum Fleischbach rarius. Floret Junio & sequ.

TURRITIS. G. P. 819.

Siliqua longissima, angulata. *Calyx* connivens, erectus. *Corolla* erecta. S. N. 443.

§ 18. TURRITIS, *Brassica*, foliis omnibus glabris: caulinis cordato-sagittatis amplexicaulibus, radicalibus ovatis petiolatis.

BRASSICA, *alpina*. Linn. S. N. 444. Mantiss. 95. (Turritis. Hall. 454.)

H. in sylvaticis montosis am Homberg & Beilstein parcius; in nemorosis ad Erbach & Breitscheid frequens. Floret Majo.

Radix perennis. Caulis simplex, sesquipedalis, erectus, teres, glaber. Folia radicalia petiolata, ovata, firma, glabra, subtus rubra: marginalibus denticulis exiguis, callosis, remotis; sub planta florescentia emarcida, fere nulla. Folia caulinata amplexicaulia, patens, glabra, cordato-sagittata, acuminata carinata,

rinata, integerrima, glauca, subitus allidiora. Corymbus angustatus. Calycis Foliola erecta, subconniventia, flavescens : quorum duobus latiora convexa, duo opposita angustiora plana, paulo longiora. Petala alba, linearis-oblonga, obtusissima, calyx duplo longiora : unguibus eretis, lamina (loco natali umbroso) erecto-patente. Stamina duo longitudine calycis, totidem Glandulis noctiferis inserta ; quatuor calice longiora, nulla glandula instructa : Antheris sagittatis, flavis, apice reflexis. Germinis subtetragonum, fuscum purpureum, longitudine staminum. Stylus nullus. Stigma obtusum, capitatum. Siliqua longissima, stricta, erecta pendunculo patente, obtusa, tetragona : angulis duobus oppositis subcompressa ; Lissepimento valvulis subaequali, apice non prominente. Semina numerosa, obovata, compressa, subemarginata.

- § 19. *TURRITIS, glabra, foliis radicalibus dentatis hispidis ; caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. Linn. Spec. 930. (Hall. 455.)*

H. ad margines agrorum bey der Weisgärber Wiese ; in sylvaticis montosis am Rehberg, alibique. Floret Junio.

- § 20. *TURRITIS, hirsuta, foliis omnibus hispidis ; caulinis amplexicaulibus. Linn. Spec. 930. (Hall. 456.)*

H. in sylvaticis theriotrophei rarius Floret Junio.

DENTARIA. G.P. 811.

Siliqua elastice dissiliens valvulis revolutis. Stigma emarginatum. Calyx longitudinale connivens. S. N. 438.

- § 21. *DENTARIA, bulbifera, foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus, Linn. Spec. 912. (Hall. 470.)*

H. in sylvis, in der Hörre ; im Hirschberg frequens Floret Major. Calyx bianus foliolis superne distantibus.

CARDAMINE. G.P. 812.

Siliqua elastice dissiliens valvulis revolutis. Stigma integrum. Calyx subhians. S. N. 438.

- § 22. *CARDAMINE, impatiens, foliis pinnatis incisis stipulatis, floribus apetalis. Linn. Spec. 914. (Hall. 471.)*

H. in sylvaticis humidis im Hirschberg frequens. Floret Major. Radix

Radix biennis. Caulis acutangulatus, levis. Stipulae pilosa. Flos in nocturne constanter apetalus.

§23. CARDAMINE, *parviflora*, foliis pinnatis exstipulatis, foliolis lanceolatis obtusis, floribus corollatis. Linn. S. N. 439. Spec. 914.

Cardamine caule foliisque hirsutis, pinnis subrotundis. Hall. 472. α . addend. III. 184.

H. in nemorosis umbrosis humidis im Hirschberg ad pagum Gundersdorf. Floret Majo.

Radix annua. Caulis ultra medium usque, Petioli & Folia inferiora pilis raris parulis subhirta. Stipulae nulla, Flores magnitudine T. Bursa pastoris. Petala 4, alba. Stamina sex.

§24. CARDAMINE, *bifurcata*, foliis pinnatis, floribus tetrandris. Linn. Spec. 915.

Cardamine tetraphyllum, caule glabro, foliis subhirsutis, imis subrotundis. Hall. 472. β . add. III. 184.

H. in arvis & pascuis sterilibus an der Sanduviese; olim legit, nunc rarissima planta. Floret Junio.

Flores paulo maiores quam in precedente. Petala alba. Stamina 4: duo breviora semper deficiens.

§25. CARDAMINE, *pratensis*, foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. Linn. Spec. 915 (Hall. 473.)

H. in pomariis & pratis humidis passim. Floret Majo.

§26. CARDAMINE, *amara*, foliis pinnatis, axillis stoloniferis. Linn. Spec. 915. (Hall. 474.)

H. in nemorosis ad pagos Sinn & Gundersdorf; fecas rivulos im Zwingen; an der Mühlbach parcus. Floret Majo.

SINAPIS. G. P. 821.

Cal. patens. Cor. unguis recti. Glandula inter stamina breviora & pistillum, interque longiora & calycem. S. N. 444.

§27. SINAPIS, *arvensis*, siliquis multangulis torosoturgidis laevibus rostro ancipiti longioribus. Linn. S. N. 444. Spec. 933. (Sinapi. Hall. 467)

H. in agris inter segetes aestivas, alibique vulgatissima. Floret Majo & sequ.

SISYMBRIUM. G. P. 813.

Siliqua dehiscentia valvulis rectiusculis. Calyx patens, Corolla patens, S. N. 439;

a. Siliquis declinatis brevibus.

- §28. *SISYMBRIUM*, *Nasturtium aquaticum*, siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis subcordatis. *Linn. Spec. 916.* (*Hall. 482.*)

H. in rivulis, ad scatarigines, in sylvaticis uidis ad *Brocksfeld & Langenaubach* frequens. Floret Junio.

Pharm. NASTURTII AQUATICI Herba.

- §29. *SISYMBRIUM*, *sylvestre*, siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis lanceolatis serratis. *Linn. S. N. 439.* *Spec. 916.* (*Hall. 485.*)

H. ad margines fossarum auf der Sandwiese, jam dudum lesta. Floret Junio.

- §30. *SISYMBRIUM*, *amphibium*, siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis serratis. *Linn Spec. 917.*

a. *palustre*. Radicula foliis pinnatis, pinnis dentatis, petalis calyce brevioribus. *Hall. 487.*

b. *aquaticum*. Radicula foliis integris, aut pinnatifidis, petalis calyce longioribus. *Hall. 486.* a.

c. *terrestre*. Radicula foliis inferioribus ovaris serratis, superioribus semipinnatis. *Hall. 486.* b.

H. a, in fossis im Quellenwreyher; b. ad ripas Dille; c. der Mühlbach alibiique. Floret Mayo & sequ.

b. *Caule nudo*.

- §31. *SISYMBRIUM*, *arenosum*, caule subfolioso ramoso, foliis lyratis rectangulo-dentatis hispidis: pilis ramosis. *Linn. Spec. 919.* (*Eruca. Hall. 462.*)

H. in arvis & pratis sterilibus hinter dem Homberg rarius. Floret Mayo.

Petala violacea. Foliorum feta bi- s. trifidae, cassina simplices.

c. *Foliis pinnatis*.

- §32. *SISYMBRIUM*, *Sophia*, petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. *Linn. Spec. 920.* (*Hall. 484.*)

H. in ruderatis auf dem Hinterland, alibiique rarius. Flores Mayo, Junio.

Pharm. SOPHIA Semina.

CLAS.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

A. DECANDRIA.

GERANIUM. G. P. 832.

*Monogyna. Stigmata 5. Fructus rostratus,
5-coccus. S. N. 452.*

a. *Staminibus quinque antheriferis.*

533. GERANIUM, *cicutarium*, pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis, caule ramoso. Linn. S. N. 454.
Spec. 951. (Hall. 944.)

H. in arvis ruderatis & cultis passim. Floret Aprili & sequ. Vernalis Planta Caule nullo, Scapo radicali, Petalis superioribus duobus macula notatis; aestivalis Caule ramoso, procumbente, Petalis omnibus immaculatis. In hoc & sequentibus sub singulo filamento breviori, Squama nectarifera exigua.

534. GERANIUM, *pumillum*, pedunculis bifloris, petalis emarginatis, caule depresso, foliis reniformibus palmatis linearibus acutis. Linn. S. N. 456. *Spec. 957. (Hall. 940.)*

H. in sterilibus ad sepes hortorum, am Homberg, alibique frequens. Floret Majo.

Radix annua. Caules pures, depresso, procumbentes, ramosi, diffusi, laves, seu pube vix per lentem conspicua tectoria molles. Folia radicalia septiloba, caulina omnia opposita, quinquelobata: lobis linearibus, trifidis, acutis: Stipulis pilosis; Petiolis Pedunculisque depresso. Bracteæ 4, lanceolata, subpilosa. Pedicelli declinati, demum erecti, apice incrassati. Calycina foliola mucica, pilosa. Petala obcordata, caerulea, calyci non longiora. Stamina 5 castrata, 5 antherifera: Antheris cerasulcentibus. Stigmata albida, patula. Rostrum Fructus tenuis, breve. Arilli fuscis, nitidis, laves, per tentem fetis sursum adpresso vestiti.

b. *staminibus 10 antheriferis.*

535. GERANIUM, *sylvaticum*, pedunculis bifloris, foliis subpeltatis quinquelobis inciso-serratis, K 4 caule

caule erecto, petalis emarginatis. Linn. Spec.

954. (Hall. 932.)

H. in sylvaticis im Hirschberg; ad pagos Brütschel & Langenaubach, alibique rarius. Floret Majo, Junio.

Caulis sesquipedalis, erectus, teres, glaber, nudus; superne dichotomus, foliosus. Pedunculi ex caulis divisionibus & axillis foliorum superiorum, erecti, bi-rarius triflori: terminales plures (saepe 4) subuniflori, fastigiati. Pedicelli breves, apice vix incrassati, sub & post florescentiam erecti. Flos campanulato-patens. Calycina foliola subvillosa, aristata: aristis frumentis maturo recurvis. Petala subemarginata, coerulea, venis 5 purpureis. Stigmata erecta.

§36. GERANIUM, palustre, pedunculis bifloris longissimis declinatis, petalis integris, foliis quinquelobis incisis. Linn. Spec. 954. (Hall. 933.)

H. in fossis & dumetis ad margines pratorum bey der untern Papiermühle, alibique frequens. Floret Julio.

Caulis saepe cubitalis, obliquus, subprocumbens, pubescens, sexangulus, angulis obtusis: duobus oppositis depressionibus; geniculis valde incrassatis; ramis divaricatis. Pedunculi bifori, longi. Pedicelli longi post florescentiam declinati, apice incrassati. Flos patens. Calycis foliola nervosa, levia, aristata: aristis maturo fructu erectis. Petala magna, integra, subanguinea, venis saturatioreibus. Stigmata recurva.

§37. GERANIUM, pratense, pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis rugosis acutis, petalis integris, Linn. S. N. 455. Spec. 954. (Hall. 931.)

H. in pratis succulentis ad Erbach, infrequens. Floret Julio. Plantam hanc mihi adhuc dubiam, nondum sufficienter examinare licuit.

§38. GERANIUM, robertianum, pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis. Linn. Spec. 955. (Hall. 943.)

H. in umbrosis, ad sepes frequens. Floret Majo & sequ. Pharm. GERANII ROBERTIANI Herba.

§39. GERANIUM, molle, pedunculis bifloris foliisque floralibus alternis, petalis bifidis calycibus muticis, caule erectiusculo. Linn. S. N. 455. Spec. 955? (Hall. 939?)

H. in cultis, ad sepes hortorum am Dollberg & Homberg infrequens. Floret Majo, Junio.

Tota Planta tactu mollissima. Caules pauci, erectiusculi, vix ramosi: pilis raris patulis adspersi. Folia radicalia semiseptila-

bis;

ba; Caulina alterna, remota, quinqueloba: lobis subtrifida, obtusis. Stipulae & emarcidae. Pedunculi opositifolii, alterni, pilosi. Bractae 4 exiguae, rubrae. Pedicelli reflexo-declinati, apice vix incrassati. Calycina Foliola ovata, mutica, mucrone brevissimo rubro. Petala semibifida, subsanguinea, venis tribus saturioribus, calyci longiora. Stamina omnia antherifera: Antheris coeruleis. Stigmata patula, purpurea. Fructus rostrum breve, crassus/custum, 5 sulcatum, leve. Arilli nudis, transversim rugos. Caules in culta Planta ramosiores; Foliolum lobi obtusissimi. His notis a G. pusillo (nostro) cui simile, caute distinguendum; ob Folia lobata & Petala semibifida esse nequit G. rotundifolium, cuius specimina tantum deflorata hucusque a me lecta, nondum satis perscrutari & cum G. molli conferre licuit.

540. GERANIUM, columbinum, pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinquepartito-mul trifidis, arillis glabris, calycibus aristatis. Linn. S. N. 455. Spec. 956. (Hall. 938.)

H. in umbrosis, ad sepes am Dollberg, alibile frequens. Floret Junio, Julio.

Pedunculi longissimi. Calyx aristatus aristis longis, nervosus, fructu maturo maximus, pedicellis longis, declinatis. Petala subsanguinea, trivenia, emarginata, vel retusa interjecto mucrone, calyce nec aristis longiora. Arilli & rostrum larvæ?

541. GERANIUM, dissectum, pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villosis. Linn. Spec. 956. (Hall. 937.)

H. in cultis passim. Floret Junio, Julio.

Stipulae & Bractae purpurea, nitida. Calycina foliola pilosa, aristata. Petala sanguinea, emarginata, calycis longitudine. Pedicelli brevissimi, declinati: Rostrum arillique pilosum.

542. GERANIUM, rotundifolium, pedunculis bifloris, petalis subintegris longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incisis. Linn. S. N. 456. Spec. 957. (Hall. 941.)

H. in cultis in der Pitze rarius. Floret Junio & seq. ♀

B. POLYANDRIA.

MALVA. G. P. 841.

Cal. duplex: exterior triphyllus. Arilli plurimi, monospermi S. N. 459.

543. *MALVA, rotundifolia*, caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. *Linn. S.N. 460.*
Spec. 969. (Hall. 1070.)

H. in cultis, ruderatis, ad vias paßim. Floret æstate.

Pharm. MALVA VULGARIS Herba, Flores, Semina.

544. *MALVA, sylvestris*, caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. *Linn. Spec. 969. (Hall. 1069.)*

H. ad sepes hortorum & quidem unico tantum in loco: *in der Hölle am Dollberg*. Floret Junio & sequ.

545. *MALVA, crispa*, caule erecto, foliis angulatis crispis, floribus axillaribus glomeratis. *Linn. Spec. 970.*

H. in cuitis oleraceis *vor dem Homberg*, ad sepes *bey der Walkmühle*, alibique quasi indigena parcus. Floret Julio & sequ.

546. *MALVA, Alcea*, caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis. *Linn Spec. 971. (Hall. 1071.)*

H. in montosis ad versuras *am Rebberg* infrequens. Floret Julio.

547. *MALVA, moschata*, caule erecto, foliis radicibus reniformibus incisis; caulinis quinque-partitis pinnato-multifidis. *Linn. S. N. 461.*
Spec. 971. (Hall. 1072.)

H. in montosis sterilibus *auf dem Galgen- und Dollberg* frequens. *am Rosenwaldgen* parcus. Floret Julio.

Caulibus brevioribus sesquipedalitus. Foliis caulinis *ad petiolum usque 5 - partitis*: lobis pinnatifidis, summis angustissimis. Floribus paulo minoribus; Arillis hirsutis; odoreque sub flore-scentia mochato, a precedente distinguitur.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

A. HEXANDRIA.

FUMARIA. G. P. 849.

Cal. diphyllus. Cor. ringens. Filamenta 2, membranacea, singula Antheris 3. S. N. 469.

548.

§ 48. FUMARIA, *bulbosa major*, caule simplici, bracteis longitudine florum. Linn. Spec. 983, var. α . *cava*, & β . *intermedia*.

Fumaria radice bulbosa, cava, caule simplici bifolio, bracteis ovato-lanceolatis. Hall. 348. vid. Nomenclat.

H. α . & β . in nemorosis ad pagum Erbach copiose, ad sepes in pratis hinter dem Schloß parcus. Floret Majo.

Pharm. ARISTOLOCHIAE CAVÆ Radix.

Planta junioris α , Radix subglobosa, solida, radiculas undique emittens; adultioris Radix hemisphaerica, subius excavata, a priori estate tantum diversa. Bracteæ integerrima, floribus breviores. Corollis albis & purpuratis ludit.

§ 49. FUMARIA, *bulbosa minor*, radice bulbosa, solida, caule simplici multifolio, bracteis digitatis. Hall. 349.

Fumaria *bulbosa*, var. γ , Linn. Spec. 983.

H. in pomariis ad sepes unter der neuen Brücke, alibique frequens. Floret Aprili.

Pharm. ARISTOLOCHIAE FABACEÆ Radix.

Hujus Radicis Bulbus semper solidus, obovatus; radiculas tantum basi emittens. Bracteæ digitorum parallelorum instar fissa, longitudine florum. Corolla semper (in nostrar) purpurea, minores. Abortum promiscue cum antecedente transplantata, Radicem solidam in cavam, & Bracteas fissas in integerrimas, per decennia annos non mutavat.

§ 50. FUMARIA, *officinalis*, pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso. Linn. Spec. 984. (Hall. 346.)

H. in agris & cultis passim. Floretestate.

Pharm. FUMARIA Herba.

B. OCTANDRIA.

POLYGALA. G. P. 851.

Cal. 5 - phyllus: foliolis duobus alæformibus, coloratis. Legumen obcordatum, biloculare. S. N. 470.

§ 51. POLYGALA, *vulgaris*, floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis linearis-lanceolatis. Linn. Spec. 986. (Hall. 344.)

H. in pascuis sylvaticis montosis passim. Corollis violaceis, albidis & carneis ludit. Floret Majo, Junio. C.

C. D E C A N D R I A.

* *Stamina omnia connexa.*

S P A R T I U M. G. P. 858.

Stigma longitudinale, supra villosum. Filamenta germini adhaerentia. Calyx deorsum productus. S. N. 474

552. SPARTIUM, *scoparium*, foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. *Linn. Spec. 996. (Hall. 354.)*

H. in montosis sylvaticis *am Homberg* frequens. Floret Mayo, Junio.

Calyx bilabiatus, labio superiore bi-inferiore tridentato. Siliqua compresso-plana, marginibus villosa.

GENISTA. G. P. 859.

Cal. 2-labiatus: $\frac{2}{3}$. Vexillum oblongum, a pistillo staminibusque deorsum reflexum.

S. N. 474.

a. *inermes.*

553. GENISTA, *Jagattalis*, ramis ancipitibus membranaceis articulatis, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. S. N. 475. Spec. 998. (Hall. 353.)*

H. in montosis sylvaticis *am Beilstein* rarius. Floret Junio.

554. GENISTA, *tinctoria*, foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. *Linn. Spec. 998. (Hall. 350.)*

H. in sylvaticis *am Homberg, Rehberg*, alibique vulgaris.

Pharm. GENISTÆ Herba. Flores. Semina.

555. GENISTA, *pilosa*, foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato decumbente. *Linn. Spec. 999. (Hall. 351.)*

H. in sylvaticis *im Hirschberg* parcus. Floret Junio.

b. *Spinosa.*

556. GENISTA, *germanica*, spinis compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Linn. Spec. 999. (Hall. 352.)*

H. in sylvis *am Beilstein*, alibique vulgaris. Floret Junio.

ANTHYLLIS. G. P. 864.

Cal. ventricosus. Legumen subrotundum, tectum. S. N. 480. 557.

557. ANTHYLLIS, *Vulneraria*, herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Linn.*
Spec. 1012. (*Vulneraria Hall. 398.*)

H. in pratis sylvaticis fccis am Rehberg, alibique. Floret Junio.

ONONIS. G. P. 863.

Cal. 5 - partitus : laciniis linearibus. *Vexillum* striatum. *Legumen* turgidum, sessile.
Filamenta connata absque fissura. S. N. 478.

558. ONONIS, *arvensis*, floribus racemosis geminatis, foliis ternatis : superioribus solitariis, ramis inermibus villosis. *Linn. S. N. 478.*
Spec. spinosa. 1006. (*Anonis Hall. 256.*)

H. in campis sterilibus passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. ONONIDIS Radix, Herba.

** *Stigma pubescens.* (nec priorum notæ.)

OROBUS. G. 871.

Stylus linearis. *Cal.* basi obtusus : laciniis superioribus profundioribus, brevioribus. S. N. 485.

559. OROBUS, *vernus*, foliis pinnatis ovatis, stipulis semifagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. Spec. 1028.* (*Hall. 416.*)

H. in nemorosis ad Breitscheid ; im Hirschberg ; im Thiergarten frequens. Floret Mayo.

560. OROBUS, *tuberosus*, foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semifagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. Spec. 1028.* (*Hall. 417.*)

H. in sylvis im Hirschberg ; im Driedorfer Wald rarius. Floret Junio. *

LATHYRUS. G. P. 872.

Stylus planus, supra villosus, superne latior. *Calycis* laciniæ superiores 2 breviores. S. N. 486.

561. LATHYRUS, *pratensis*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis : foliolis lanceolatis. *Linn. Spec. 1033.* (*Hall. 436.*)

H. in pratis & sepibus ubique. Floret Junio.

562.

§62. *LATHYRUS*, *sylvestris*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Linn. Spec. 1033.* (Hall. 434.)

H. in sylvaticis am Geistlichen Berg, Homberg, alibique. Floret Julio.

§63. *LATHYRUS*, *latifolius*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Linn. Spec. 1033.* (Hall. 433.)

H. in nemorosis ad Erbach rarius. Floret Julio.

VICIA, G. P. 873.

Stigma latere inferiore transverse barbatum.

S. N. 487.

§64. *VICIA*, *pisiformis*, pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: foliolis ovatis: infimis sessilibus. *Linn. Spec. 1034.* (Hall. 428.)

H. in sylvaticis montosis am Beilstein copiose. Floret Junio, Julio.

Caules cubitales, *erecti*, *angulati*. *Stipulae semisagittatae*, *dentatae*. *Foliola* 6 f. 8, *ovata*, *integerrima*, *rarius subcrenulata*, *mucrone apice prominulo*: *quorum inferiora duo reliquis majora*, *inter petiolum & caulem subsessilia*, *caulique approximata*, *Stipulas obtectentia*, *Cirri multifidi*. *Pedunculi angustati*, *multiflori*. *Bracteae setacea*, *sub floribus superioribus nulla*. *Flores 20-30.* (Astragal. *glycyphyllo*.) *Filamentum solitarium basi lanceolatum*. *Germen pedicellatum*. *Nectarium obvolum*. *Siliqua brevis*.

§65. *VICIA*, *sylvatica*, pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stipulis denticulatis. *Linn. Spec. 1035.* (Hall. 426.)

H. in sylvis, im Hirschberg, in der Hörre infrequens. Floret Junio, Julio.

§66. *VICIA*, *Cracca*, pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescens, stipulis integris. *Linn. Spec. 1035.* (Hall. 424.)

H. inter segetes rarius, in sepibus passim. Floret Julio.

§67. *VICIA*, *sativa*, leguminibus sessilibus subbinateis erectis, foliolis retusis, stipulis notatis. *Linn. Spec. 1037.* B. Vi-

$\beta.$ *Vicia* foliis imis ovatis, superioribus linearibus, scapis brevissimis bifloris. *Hall.* 430.

H. $\alpha.$ & $\beta.$ in agris inter Lentem frequens. Floret Julio.

568. *VICIA*, *latbyroides*, leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris, foliolis senis : inferioribus obcordatis. *Linn. Spec.* 1037 ?

H. in montosis apricis aridis theriotrophei an der Rüsterbach rarius. Floret Majo, Junio.

Caulis spithameus, erectus, subramosus, subtrigonus. Stipula dentata, nulla macula subtus notata. Petioli inferiores brevissimi, cirrho nullo : Foliolis minimis, senis, obcordatis cum acumine ; superiores breves, cirrhiferi : Foliolis 6 f. 8, angustissimis, linearibus, glabris, retusis cum acumine ; junioribus conduplicatis. Flos solitarius, sessilis, *V. c. sativa* triplo minor, eiusdem tamen figura & coloris. Legumen erecto-patens, subfessile, glabrum, 8-spermum. Vereor ne planta hac pulchella habitu & structura a priori (β) diversissima, ob pubescenciam licet levissimam in foliolis inferioribus & ipso legumine, eiusdem sit mera varietas.

569. *VICIA*, *sepium*, leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerimis : exterioribus decrescentibus. *Linn. Spec.* 1038. (*Hall.* 429.)

H. in pomariis sepibus & sylvis frequens. Floret Majo, Junio.

*** *Legumen subbiloculare.* (nec priorum notæ.)

ASTRAGALUS. G. P. 892.

Legumen biloculare, gibbum. S. N. 498.

570. *ASTRAGALUS glycyphyllos*, caulescens prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliolis ovalibus pedunculo longioribus. *Linn. S. N.* 498. *Spec.* 1067. (*Hall.* 413.)

H. in sylvaticis montosis im Beilstein frequens. Floret Junio.

Calycis denticuli inferiores tres setacei aquales, reliquis longiores.

**** *Legumina submonosperma.* (nec priorum notæ.)

TRIFOLIUM. G. P. 896.

Flores subcapitati. Legumen vix calyce longius, non dehiscens, deciduum. S. N. 501.

a.

a. *Melilotus, leguminibus nudis polypermis.*

- 571.** TRIFOLIUM, *Melilotus officinalis*, leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. Linn. Spec. 1078. (*Melilotus. Hall 362.*)
H. in ruderatis auf dem Hinterland; in arvis auf dem Reuterberg; alibique parcius. Floret junio, Julio.
Pharm. MELILOTI Herba cum Floribus.

b. *Lotoidea leguminibus tectis, polyspermis.*

- 572.** TRIFOLIUM, *hybridum*, capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule adscendente. Linn. Spec. 1079. (*Hall. 368.*)
H. in pratis subhumidis passim. Floret Junio, Julio.
573. TRIFOLIUM, *repens*, capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. Linn. Spec. 1080. (*Hall. 367.*)
H. in pratis pomariis & pascuis ubique. Floret Majo & sequ. Pharm. TRIFOLII ALBI Flores.

c. *Lagopoda calycibus villosis.*

- 574.** TRIFOLIUM, *pratense*, spicis subvillosois cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis. Linn. Spec. 1082. (*Hall. 377.*)
H. in pomariis & pratis pinguioribus passim. Floret Junio & sequ.
Caulis teres, superne striatus lavis. Stipulae amplexantes, ovatae, dilatatae, acuminatae, nervosa: suprema duæ florales subovata, scariosa, nervis rubris. Foliola mollia, supra maculae subsagittata notata, subitus vix villosa; inferiora ovata, obtusa, superiora lanceolata acuta. Capitulum terminale (in planta non culta) solitarium, ovatum, sessile inter stipulas duorum foliorum. Calycis dentes pilosi, 4 breves, infimo longitudine fere tubi corolla. Corolla monopetala pallide purpurea, minor quam in sequente: Alis vexillo brevioribus.

- 575.** TRIFOLIUM, *alpestre*, spicis subglobosois villosis terminalibus, caule erecto, foliis lanceolatis ferrulariis. Linn. S.N. 502. Spec. 1082? (*Hall. 376.*)
H. in moniosis sylvaticis passim. Floret Junio & seq.
Caulis subdepressus, pubescens, superne teres, subvillosus. Stipulae vaginantes, subulatae; suprema duæ florales ovato-lanceolatae, virides. Foliola firma, omnia linearis lanceolata, supra rarissime maculata, subitus albido-villosa. Capitula terminalia duo, subglobosa, sessilia inter duas stipulas; demum oblonga, pedun-

pedunculata. Calycis dentes brevissimi, subpilos, recti, insimo tubo corolla dimidio breviore. Corolla monopetala major quam in præcedente, saturatius purpurea: Alis longitudine vexilli. Hoc & præcedens calyce villoso & lavi, nervis rubris & non coloratis; foliolisque integris & serrulatis ludet. Caulem in nostro alpestris magis obliquum fere procumbentem, in prætensiæ vero adscendensem erectum, semper observavi.

576. TRIFOLIUM, *angustifolium*, spicis villosis conico-oblongis, dentibus calycinis setaceis subæqualibus, foliolis linearibus. Linn. Spec. 1083.

H. in pascuis siccis sterilibus in der Hörre rarius. Floret Julio, Augusto.

Differet a sequente: Caule altiori erectiori, subetragono, lavi, non pubescere. Ramis caule multo brevioribus. Stipulis nervosis longius acuminatis. Foliolis angustioribus, utrinque levibus, subitus striatis. Capitalis subcylindricis, angustioribus, longioribus. Calycibus striatis: dentibus purpureis nudis, non plumosis, inferioribus tribus reliquis paulo longioribus. Corollis calyce brevioribus, albidis. absque macula alarum sanguinea. Receptaculo nudo nec villoso.

577. TRIFOLIUM, *arvense*, spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis villosis æqualibus.

Linn. S. N. 503. Spec. 1083. (Hall. 373.)

H. in agris arvis & campis sterilibus passim. Floret Julio & sequ.

578. TRIFOLIUM, *striatum*, capitulis sessilibus sublateralibus ovatis calycibus striatis rotundatis.

Linn. Spec. 1085.

H. in pascuis siccis am Dollberg. Floret Majo, Junio.

Radix biennis, lignosa, ramosa. Caules plures, procumbentes, spithamei, subramosi, teretes, subvillosi. Stipulae ovato-acuminatae, ubeis rubris. Foliola obovata, integerrima, pubescens. Floralia scutinacula, antice serrulata. Capitula oblonga, dumum ovata, terminalia axillariaque, sessilia in foliorum stipulis. Calyx tubulosus, viridis, denticulis rectis: superioribus 4 æqualibus, inferiore duplo majore. Corolla exigua, carnea, calyce pando major. Calyx Fructus subglobosus, collo contracto, nervis 10 rubris striatus, Legumen orato-acutum monospermum includens.

d. Lupulina vexillis corolle inflexis.

579. TRIFOLIUM, *montanum*, spicis subimbricatis subtribus: vexillis subulatis emarginatibus,

L. caly-

- calycibus nudis, caule erecto. *Linn. Spec. 1087.*
(Hall. 372.)
- H. in pratis auf dem Westerwald; ad pagos Waldaubach, Liebenschied, alibique frequens. Floret Julio.
580. *TRIFOLIUM, agrarium*, spicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis persistentibus, calycibus, nudis, caule erecto, *Linn. Spec. 1087.*
(Hall. 363.)
- H. in agris & arvis am Dollerg, Reuterberg, alibique. Floret Junio & sequ.
581. *TRIFOLIUM, spadiceum*, spicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. *Liun. Spec. 1087.*
(Hall. 365.)
- H. in sylvaticis montosis im Beilstein rarius. Floret Julio.
582. *TRIFOLIUM, procumbens*, spicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis persistentibus, caulis procumbentibus. *Linn. Spec. 1088.* (*Hall. 364.*)
- H. in arvis & campis siccis am Dollberg; Homberg; auf dem Schießplatz frequens. Floret Julio & sequ.
- Radix biennia. Caules dodrantales, procumbentes, ramosi, firmi, pilosi. Stipulae ovatae, acuta, nervosa. Foliola obovata, retusa, antice serrulata, subitus striata. Pedunculi pilosi, longitudine foliorum. Capitula ovalia, multisflora. Calycis denti-
tuli tres inferiores reliquis duplo longiores, filo brevi sub apice.
Vexillum margine serrulatum. Semen 1, saepe 2.
583. *TRIFOLIUM, filiforme*, spicis subimbricatis: vexillis deflexis persistentibus, calycibus pedicellatis caulis procumbentibus. *Linn. Spec. 1088.* (*Hall. var. præc. 364.*)
- H. in pratis & pomariis copiosissime. Floret Majo, Junio.
- Radix annua. Caules saepe ultrapedales, filiformes, procumbentes, inter gramina erecti sculi, vix ramosi, subnudi. Stipulae exiguae, ovatae. Folia remota, brevissime petiolata. Foliola obcordata, antice serrulata, utrinque striata. Pedunculi tenues, foliis longiores. Capitula pauci- (10-15-) flora. Flores subpedicellati. Calyx præcodentie. Vexillum vix manifesto serrulatum. Alae striatae. Semen unicum.
- **** Legumen subarticulatum.

HEDYSARUM. G. P. 887.

Cor. carina transverse obtusa. Legumen articulis 1-spermis. S. N. 493.

584.

384. HEDYSARUM, *Onobrychis*, foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus, caule elongato. *Linn.*
Spec. 1059. (Onobrychis. Hall. 396.)

H. in pratis *bey der obern Papiermühle* rarius. Floret Junio, Julio.

Oeconom. SAINT FOIN, seu *ESPARSETTE*.

MEDICAGO. G. P. 899.

Legumen compressum cochleatum. *Carina* corollæ a vexillo deflectens. S. N. 505.

385. MEDICAGO, *sativa*, pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Linn. Spec. 1096. (Medica. Hall. 382.)*

H. in pratis & pomariis *an der Dille bey dem Sieghaus*. Floret Julio, Augusto.

Oeconom. LUZERNE.

386. MEDICAGO, *lupulina*, spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caulis procumbentibus. *Linn. S. N. 506. Spec. 1097. (Medica. Hall. 380.)*

H. in pascuis arvis & agris ubique. Floret Junio & sequ.

***** *Legumen uniloculare polyspermum*. (nec priorum notæ.)

ERVUM. G. P. 874.

Cal. 5-partitus, longitudine corollæ. S. N. 488.

387. ERVUM, *Lens*, pedunculis subbifloris, seminibus compressis convexis. *Linn. Spec. 1039. (Lens. Hall. 421.)*

H. in agris inter segetes *am Dollberg*, sibique. Floret Junio.

388. ERVUM, *tetraspermum*, pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis. *Linn. Spec. 1039. (Vicia. Hall. 423.)*

H. in agris & arvis *am Hornberg & Dollberg*; in cultis *am Sieghaus*. Floret Julio.

Foliola 8 f. 10, linearis lanceolata, acuta: quorum infimum par cauli approximatum. Stipulae lanceolatae, acuminatae, unicò sape denticulo laterali. Cirri trifidi, interdum simplicissimi. Pedunculi 1-f. 2-flori. Calyx corolla brevior, dentice-

L 2 lis

lis inferioribus tribus reliquis longioribus. Legumen nutans ob-
tusissimum, glabrum, 3 - f. 4 - spernum.

589. ERVUM, *bifutum*, pedunculis multifloris, semi-
 nibus globofis binis. Linn. Spec. 1039. (Vi-
 cia. Hall. 422.)

H. in agris & cultis ubique; vitium nimis frequens. Floret
 Junio & sequ.

Stipulae *tripartita*. Folia 16 - 18, *linearia*, *retusa cum acuminis*,
 Pedunculi 4 - 5 - 6 - flori. Calyx corolla *paulo brevior*, subpilo-
 sus; denticulus *subequalibus*. Legumina *pendula*, *bifurca*, *acu-*
ta, *oblonga*, *disperma*.

590. ERVUM, *monanthos*, pedunculis unifloris.
 Linn. Spec. 1040.

H. in agris inter Lentem cum Homberg, alibique rarius. Flo-
 ret Julio.

Lentu *vulgaris major*, Cirrhis bi- f. *trifidis scandens*. Petioli
horizontales. Foliola 16 - 18, *linearia*, *retusa cum acuminis*,
 Stipulae *duae*, *alternatim majores*, figura diverse: quarum uni-
 ca *brevissima lanceolata*, altera *opposita quinqueplo major*; petiolata,
 pedato - *multifida*; lacinias *setaceas*, *longissimas*, *patulis*. Peduncu-
 lis *uniflorus*. Calyx corolla *triplo brevior*, denticulus *subaque-*
libus. Vexillum *compressum*, *albidum venis violaceis*. Le-
 gumen *magnum*, *subnutans*, 2 - f. 3 - *spermum*. Semen *magni-*
tudine pisti compressum, *margine obtuso*.

591. ERVUM, *Ervilia*, germinibus undato - plicatis,
 foliis impari - pinnatis. Linn. Spec. 1040. (Er-
 vum. Hall. 420.)

H. in agris inter Lentem cum praecedente rarius. Floret Ju-
 nio.

Pharm. E R V I f. O R O S I Semina.

Planta erecta, non scandens. Stipulae *ovatae*, *dentatae*. Foliola
 18 - 24, *lineari - oblonga*, *retusa cum acuminis*. Petiolus *apice*
in mucronem productus, *loco cirrhi*, quo caret. Pedunculi
 2 f. 3 - flori. Calyx corolla *duplo brevior*, denticulus *subaque-*
libus, *superioribus duobus decussatis*. Vexillum *subemarginatum*,
cum acuminis. Germen *lineare*, *rectum*, *Anthesis per-*
ata tantum undulato - plicatum. Legumina *pendula*, *articu-*
lata, *nodosa*, 3 f. 4 - *sperma*. Semina *subangulosa*.

LOTUS. G. P. 897.

Legumen cylindricum strictum. Alae sur-
 sum longitudinaliter conniventes. Calyx
 tubulosus. S. N. 504.

592. *LOTUS, corniculatus*, capitulis depresso-
cavatis decumbentibus, leguminibus cylindricis
patentibus. *Linn. Spec. 1092.* (*Hall. 385.*)
H. in pratis & pomariis ubique. Floret Julio, Augusto.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.
POLYANDRIA.

HYPERICUM G. P. 902.

Cal. 5-partitus. Petala 5. Filamenta multa,
in 5 phalanges basi connata. Capsula. S. N.
509.

593. HYPERICUM, *quadrangulum*, floribus trigynis,
caule quadrato herbaceo. *Linn. Spec.*
1104. (*Hall. 1038.*)

H. in pratis humidis juxta rivulos hinter dem Homberg; bey
der untern Walkmühle; auf dem Schlüssel. Floret Julio.

Caulis *tetragonus*, angulis membranaceis, punctis purpureis adspersis. Folia margine nigro-punctata, flavo-viridia, demum rufescens. Flores minores quam in sequentibus. Calycis lacinia lanceolata, acuminata. Petala *integra*, punctis nullis. Filamentorum phalanges 3, longitudine corolla. Punctum Antherarum atrum, dein album, uti in sequentibus. Capsula ovato cylindrica.

594. HYPERICUM, *dubium*, floribus trigynis, caule
subquadrato herbaceo, foliis ovatis, calyci-
bus obtusissimis.

H. ad sepes am Sieghaus; am Homberg; ad vias passim. Flo-
ret Julio, Augusto.

Caules, plures 2-1. 3-pedales, erecti, subquadrangulares, punctis né-
gris adpersi. Folia magna, amplexicaulia, ovata, margine
acutissimo scarioso subeius nigro-punctata, apice subretusa
cum acuminis breviter. Flores maiores quam in sequenti-
bus, subcorymbosis. Sepium terni, pedunculati. Calyx pentaphyl-
lus: Foliolis distinctis, ovatis, integrerrimis, obensissimis, flavo-viri-
dibus, lineolis interruptis acris undique notatis. Petala magna,
integrerrima, supra lineolis, subtus margine punctis acris raris
notata.

notata. Staminum phalanges 3, longitudine corolla. Capsula ventricosa, triangularis, calyce reflexo ad basin cincta. An precedentis varietas? an HYP. perforatum S. N. 510. no. 32? cuius Perilli LINNAEUS nec in Speciebus Pl. nec in Mantissa mentionem fecit.

595. HYPERICUM, perforatum, floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis. Linn. Spec. 1105. (Hall. 1037.)

H. in montosis am Homberg. Dollberg & alibi copiosissime. Floret Julio, Augusto.

Pharm. HYPERICI Herba, Flores.

Calycis Foliola lanceolata acuta. Petala oblique truncata, crenulata, puncto atro inter singulare crenata. Staminum phalanges 3. Capsula ovata, acuminata.

596. HYPERICUM, montanum, floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis glabris. Linn. S. N. 510. Spec. 1105. (Hall. 1042.)

H. in sylvaticis montosis am Homberg über der Lithau frequens. Floret Julio.

Caulis sesquipedalis, simplex, teres, levius. Folia ovato-oblonga, glabra; margine inferiore punctis atris in lineam ordinatis notata. Calycis Foliola & Bracteæ Floribus subjecta serrata: serraturis lateralibus setaceis glanduliferis, terminali nulla glandula instructa. Petala obtusa, punctis nullis. Phalanges Filamentorum in primariis Floribus quinque, in superioribus tres. Stigmata purpurea. Capsula ovata, apicibus divaricatis. Semina nigra.

597. HYPERICUM, bifidum, floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus. Linn. Spec. 1105. (Hall. 1043.)

H. in dumetis & sepibus am Homberg frequens. Floret Julio.

Calycis foliola & non raro Bracteæ serrata, serraturis omnibus etiam terminalibus glanduliferis. Petala lineolis nigris notata. Punctum sub Antheris in hoc nullum. Capsula ovato-oblonga. Semina rubra.

CLAS.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

A. POLYGAMIA
ÆQUALIS.

* Semiflosculosi T. *Corollis ligulatis omnibus.*

CICHORIUM. G. P. 921.

Receptaculum subpaleaceum. *Calyx* calycula-
tus. *Pappus* sub 5-dentatus, obsolete
pilosus. S. N. 527.

598. CICHORIUM, *Intybus*, floribus geminis sessi-
libus, foliis runcinatis. Linn. Spec. 1142.
(Hall. I.)

H. in arvis & versuris *bey der Sanduviese*; am Renterberg
frequens. Floret Julio & seq.

Pharm. CICHIORI Radix, Herba, Flores, Semina.

HYPOCHÆRIS. G. P. 918.

Receptaculum paleaceum. *Cal.* subimbrica-
tus. *Pappus* plumosus. S. N. 526.

599. HYPOCHÆRIS, *glabra*, calycibus oblongis imbri-
catis, caule ramoso nudo, foliis dentato-sinua-
tis. Linn. Spec. 1140. (Hall. I. pag. 3. III. p. 181.)
H. in sylvaticis montosis *hinter Burgk* verius Theriotropheum
rarius. Floret Julio.

600. HYPOCHÆRIS, *radicata*, foliis runcinatis ob-
tusis scabris, caule ramoso nudo lævi, pedun-
culis squamosis. Linn Spec. 1140. (Hall. 3?)
H. in pratis pomariis & pascuis frequens. Floret Julio &
sequi.

TRAGOPOGON. G. P. 905.

Receptaculum nudum. *Calyx* simplex. *Pap-*
pus plumosus. S. N. 518.

601. TRAGOPOGON, *pratense*, calycibus corollæ
L 4 radic-

radium æquantibus, foliis integris strictis.

Linn. Spec. 1109. (Hall. 8.)

H. in pomariis & pratis passim, ad versuras am Dollberg frequens. Floret Junio, Julio.

PICRIS. G. P. 907.

Receptaculum nudum. Cal. calyculatus. Pappus plumosus. Semina transversim sulcata. S. N. 519.

602. *PICRIS, Hieracioides*, perianthiis laxis, foliis integris. *Linn. Spec. 1115. (Hall. 24.)*

H. in campis sterilibus, ad versuras am Beilstein copiose; in dumetis bey der untern Walckmuhle rarius. Floret Julio, Augusto.

LEONTODON. G. P. 912.

Receptaculum nudum. Calyx imbricatus squamis laxiusculis. Pappus plumosus. S. N. 521.

603. *LEONTODON, Taraxacum*, calyce squamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis laevibus. *Linn. S. N. 521. Spec. 1122. (Taraxacum. Hall. 56.)*

H. in pratis pascuis & pomariis passim. Floret Majo & sequ. *Pharm. TARAXACI Radix, Herba.*

Pappus longissimo stipitatus, simplex.

604. *LEONTODON, autumnale*, caule ramoso, pendunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Linn. Spec. 1123. (Picris. Hall. 28.)*

H. in pratis, pomariis, ad versuras passim. Floret Julio & sequ.

Seminum radialium Pappus sessilis, centralium substipitatus.

605. *LEONTODON, bispidum*, calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hispidis: setis furcatis. *Linn. S. N. 522. Spec. 1124 (Picris. Hall. 25.)*

H. in pratis & pomariis ubique. Floret aestate.

606. *LEONTODON, hirtum*, calyce toto erecto, foliis dentatis hirtis: setis simplicissimis. *Linn. S. N. 522. Spec. 1123. (Rbagadiolus. Hall. 7.)*

H. in pratis paludosis ad pagum Sinn frequens. Floret Julio.

Plan.

Planta precedenti simillima; sed praeципue differe: Radice premorsa. Foliis flavo-viridibus, dum sicca, undulato-flexuosis, pilis simplicibus, non furcatis, in petiolo tereti vix depresso longioribus, confertioribusque; dentibus brevioribus, sursum, nec deorsum ut in illa obliquatis. Scapo levu, minus manifeste striato, nulla bracteola, nisi sapient in precedente, instructo. Flore minore. Ceterum Calyx latus, vix basi setis paucis subhirsitus: Squamis 13 lanceolatis, planisculis, rotundisque exterioribus minimis, basi dilatatis, sursum adpresso constructus. Corollula extima radii tot quot squama calycis, (13) suberas livida, demum flavo: Stigmatibus extra antheras non praevenitibus. Semen incrassatum, albidum, vix scabrum, calyculo brevi multidentato, loco pappi, coronatum. Corollulae inferiores duplo minores: Stigmatibus revolutis. Semen tenui, subfuscum, scabrum: Pappo sessili, in centralibus sustipitato, instructum: radius 13, basi lanceolatis, extrorsum plumosus, alternis rotidem brevioribus simplicibus. Calyx ante explicacionem nutans uti in precedente, peracta florescentia vero, ad semina radii calycinis squamis involuta, subglobosus, angulo-falcatus, pappo vix prominente, squamis demum patulis non reflexis. Setas foliorum saepe in hoc etiam apice bifidas observabis, si microscopia usus fueris.

SONCHUS. G. P. 908.

Receptaculum nudum. Calyx imbricatus, ventricosus. Pappus pilosus S. N.

519.

607. SONCHUS, arvensis, pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. Linn. Spec. 1116. (Hall. 23.)

H. in agris inter segetes passim. Floret Junio, Julio.

608. SONCHUS, oleraceus, pedunculis tomentosis, calycibus glabris. Linn. Spec. 1116.

a. Sonchus (*latus*) laciniatus latifoliis. Bauh. Pin. 124. (Hall. 21.)

β. Sonchus (*asper*) laciniatus & non laciniatus. Bauh. Pin. 124. (Hall. 22.)

H. a. in cultis oleraceis copiosissime. β. in agris & arvis am Homberg, alibique frequens. Floret Julio & sequ.

CREPIS. G. P. 914.

Receptaculum nudum. Calyx calyculatus L. 5 squa-

- squamis deciduis. *Pappus pilosus*, (*) stipitatus. S. N. §24.
609. CREPIS, *fætida*, foliis runcinato-pinnatis hirtis, petiolis dentatis. *Linn. Spec. 1133.* (*Hall. 29.*)
H. ad versuras *am Reuterberg*; in arvis *am Dollberg* copiose.
Floret Julio, Augusto.
Calyx albidos, *ante explicationem nutans*. *Pappus stipitatus calyce longior*. Receptaculum *subpilosum*.
610. CREPIS, *tectorum*, foliis lanceolato-runcinatis sessilibus laevibus, inferioribus dentatis. *Linn. S.N. 525. Spec. 1135.* (*Hall. 31?*)
H. in pascuis & arvis, secus vias ubique frequens. Floret Julio, Augusto.
Pappus sessilis. *Planta polymorpha, magnitudine & habitu maxime varians*.
611. CREPIS, *biennis*, foliis runcinato-pinnatifidis scabris: basi superne dentatis, calycibus muricatis. *Linn. Spec. 1136.* (*Hall. 30.*)
H. in pratis & pomariis passim. Floret Majo, Junio.
Calycis exterioris squama laeves, *interioris setis nigris rigidis hispida*. *Pappus sessilis*.
- PRENANTHES. G. P. 911.
Receptaculum nudum. *Calyx calyculatus*.
Pappus simplex, *subsessilis*. *Flosculi simplici serie*. S. N. 521.
612. PRENANTHES, *muralis*, flosculis quinis, foliis runcinatis. *Linn. Spec. 1121.* (*Hall. 18.*)
H. in sylvaticis umbrosis passim. Floret Julio & sequ.
- HIERACIUM. G.P. 913.
Receptaculum nudum. *Cal. imbricatus, ovatus*. *Pappus simplex*, *sessilis*. S. N. 522.
a. *Scapo nudo unifloro*.
613. HIERACIUM, *Pilosella*, foliis integerimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. *Linn. S.N. 522. Spec. 1125.* (*H. 55.*)
H. in campis & collibus siccis passim. Floret Majo & sequ.
Pharm. PILOSELLA L. AURICULÆ MURIS Herba
Corolla extima subitus rubra. b. *Scapo*

(*) *plumosus*, S. N. l. c. ex errore typogr. forte.

b. *Scapo nudo multifloro.*

614. HIERACIUM, dubium, foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro. Linn. Spec. 1125? (Hall, 53?)

H. in montosis am Homberg frequens. Floret Julio & seq.

Stolones repentes plures, foliati. Folia subtus nuda, supra sub-pilosa, basi ciliata. Scapus spithameus, latus, nudus, Foliolo ad basin unico lanceolato instructus. Pedunculi umbellares 3 f. 4, simplices, Bracteis rotidem brevibus involucratis. Flores (H. Pilosella) altitudine subaquales. Corollæ utrinque pallide flavae.

615. HIERACIUM, Auricula, foliis integerrimis lanceolatis, scapo nudo multifloro, stolonibus repentibus. Linn. S. N. 522. Spec. 1126? (Hall. 52?)

H. in pascuis pomariis & ad vetsuras am Dollberg; in ruderatis auf dem Hintersand. Floret Mayo & sequ.

Stolones repentes pauci, subfoliati. Folia lati-lanceolata, sub-denticulata, obscure viridia, utrinque scabra. Scapus pedalis, setis nigris ad basin confertioribus undique muricatus; Foli unico supra basin instructus: Flores terminales, cymosi, conferti. Pedunculi 5 - f. 6, ramosi, crassifusti, breves, uti calyces setis basi nigris confertis, in aequalibus adspersi. Corollæ utrinque saturatius flavae. Receptaculum subpilosum. Ramo unico florifero ex scapi medio prodeunse, sepe ludit.

616. HIERACIUM, cymosum, foliis lanceolatis integris pilosis, scapo subnudo basi piloso, floribus subumbellatis. Linn. Spec. 1126? (Hall. 51?)

H. in pascuis arvis & agris am Homberg frequens. Floret Junio & Septembri.

Radix premorsa. Stolones nulli. Folia omnia radicalia, erecta, longe lanceolata, acutiuscula, glabra; pagina superiore, carinaque subpilosa, pilis albidis flexuosis basi purpureis. Scapus sesquipedalis, striatus, fere latus, foliolo lanceolato nudo infra medium instructus. Pedunculi terminales, longiores quam in praecedentibus, tenuiores ramosioresque; sub florescentia cymosi, dum inaequales sub paniculati. Flores magnitudine Crep. tector. Calyx albidus, setis brevibus nigris adspersus. Corollæ utrinque pallide flavae.

6. Canis

c. *Caule folioso.*

617. HIERACIUM, *murorum*, caule ramoso, foliis radicalibus ovaris dentatis; caulino minori. Linn. Spec. 1128. (Hall. 46.)

a. Hieracium (*pilosissimum*) murorum folio pilosissimo. Baud. Pin. 129.

β. Hieracium (*sylvaticum*) murorum minus pilosum. Baud. Pin. 129.

γ. Hieracium (*myophoron*) myophoron, sive mures profrens. Heuch. prov. 2. p. 74. t. I.

H. a. in muris cœmeterii & urbis; β, in sylvaticis ubique; γ, in sylvis im Beilstein; am Rehberg & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

618. HIERACIUM, *paludosum*, caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis. Linn. Spec. 1129. (Hall. 45.)

H. in pratis humidis im Stübers-Grund; in der Callenbach; hinter dem Homberg copiose. Floret Junio.

Calyx subcylindricus, setis nigris scaber. Caulis Folia & Pedunculi glabri.

619. HIERACIUM, *sabaudum*, caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus. Linn. Spec. 1131. (Hall. 35.)

H. in sylvaticis montosis in der Callenbach; im Beilstein, alibi que frequens. Floret Julio, Augusto.

620. HIERACIUM, *umbellatum*, foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis. Linn. Spec. 1131. (Hall. 34.)

H. in pasuis sterilibus am Homberg, Rehberg, alibique. Floret Julio, Augusto.

Calycina foliola planiuscula, apice patula. Receptaculum pilosum uti in precedente. Caule spithameo & bi-f. tripodali; Folii linearibus & ovato-lanceolatis; integrimis & subdentatis, maxime ludit.

LAPSANA. G. P. 919.

Receptac. nudum. Calyx calyculatus, squamis singulis interioribus canaliculatis.

S. N. 526.

621. LAPSANA, *communis*, calycibus fructus angustatis,

latis, pedunculis tenuibus ramosissimis. Linn.

Spec. 1141. (Hall. 6.)

H. in ruderatis cultis & arvis frequens. Floret Junio & sequ.

** *Capitati.*

CARLINA. G. P. 929.

Calyx radiatus squamis marginalibus longis,
coloratis. S. N. 532.

622. CARLINA, vulgaris, caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calycibus radiis albis. Linn. Spec. 1161. (Hall. 182.)

H. in monteſis asperis duris pefſim. Floret Julio, Augufto.

Anthera ſingula infra Filamentum, in ligulam apice bifidam pro-ducta. Seminis Pappus radiis 9, tripartitis, plu-moſis.

CNICUS. G. P. 926.

Calyx ovatus, imbricatus squamis ramoso-
ſpinosis, obvallatus bracteis. Corollulae
æquales S. N. 530.

623. CNICUS, oleraceus, foliis pinnatifidis carinatis nudis, bracteis concavis integris subcoloratis.

Linn. S. N. 530. Spec. 1156. (Cirsium. Hall. 173.)

H. in pratis humidis; ad ripas Dilla atibique vulgaris. Floret Julio, Augufto.

Antherarum appendices minima, bifida, sicut in precedente.

ARCTIUM. G. P. 923.

Cal. globosus: squamis apice hamis inflexis.
S. 528.

624. ARCTIUM, Lappa, foliis cordatis inermibus petiolatis. Linn. Spec. 1143. (Lappa. Hall. 161.)

a. Lappa major f. Arctium Dioscoridis, Baub. Pin. 198.

B. Lappa major montana, capitulis tomentosis. Baub. Pin. 198.

H. a. & B. ad vias in ruderatis auf dem Hinterfand, alibi-que vulgaris. Floret Julio, Augufto.

Pharm. BARDANÆ Radix, Semina.

CARDUUS. G. P. 925.

Cal. ovatus, imbricatus squamis spinosis.

Recept. pilosum. S. N. 529.

a. Foliis

a. Foliis decurrentibus.

- 625. CARDUUS**, *lanceolatus*, foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis: laciiniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso. *Linn. Spec. 149. (Cirsium. Hall. 169.)*

H. ad vias & pagos vulgaris. Floret Julio, Augusto.

In hoc & omnibus sequentibus Carduis, appendices Antherarum breves, apice plerumque non bifidae, Filamentis pilosis. In hoc Pappus longissimus, plumosus.

- 626. CARDUUS**, *nutans*, foliis semidecurrentibus spinosis, floribus cernuis: squamis calycinis superne patentibus. *Linn. Spec. 1150. (Hall. 167.)*

H. ad vias passim. Floret Julio, Augusto.

Pappus pilosus.

- 627. CARDUUS**, *crispus*, foliis decurrentibus sinuatis: margine spinosis, floribus aggregatis terminalibus: squamis inermibus subaristatis patulis. *Linn. S. N. 529. Spec. 1150. (Hall. 165.)*

H. in dumetis & sepiis *bey der untern Papiermühle*. Floret Julio, Augusto.

Pappus pilosus.

- 628. CARDUUS**, *palustris*, foliis decurrentibus dentatis: margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Linn. Spec. 1151. (Cirsium. Hall. 170.)*

H. in pratis iudicis passim; ad vias *bey der untern Walkmühle* frequens. Floret Julio, Augusto.

Calycis squama ovata, adpressa, apice spinescenti, subinermis, viscosa. Pappus plumosus. Corollis albis iudicis.

b. Foliis sessilibus.

- 629. CARDUUS**, *mariannus*, foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato-spinosis. *Linn. Spec. 1153. (Silybum. Hall. 181.)*

H. in ruderatis *am Kirchhof*; in cultis *vor dem untern Thor* rarius. Floret Julio, Augusto.

Pharm. CARDUI MARIA Semina.

630. *CARDUUS, acaulis, acaulis, calyce glabro.* Linn.

Spec. 1156. (Cirsium. Hall. 178.)

H. in pascuis montosis apricis auf dem Stützelberg; am Galgenberg frequens. Floret Augusto.

Caulis sept. bipanicarum, folio uno altero vix instructus.

Pappus longissimus, plumosus.

ONOPORDUM. G. P. 927.

Recept. favosum. Calycis squamæ mucronatæ. S. N. 531.

631. *ONOPORDUM, Acanthium, calycibus squarro-sis: squamis parentibus, foliis ovato-oblongis sinuatis.* Linn. S. N. 531. Spec. 1158. (Hall. 159.)

H. in ruderatis, ad vias passim. Floret Julio, Augusto.

SERRATULA. G. P. 924.

Cal. subcylindricus, imbricatus, muticus. S. N. 528.

632. *SERRATULA, arvensis, foliis dentatis spinosis.* Linn. Spec. 1149. (Cirsium. Hall. 171.)

H. in agris arvis & cultis, ad vias passim. Floret Julio, Augusto.

Pappus plumosus, Recept. pilosum.

Variat Corollis purpureis & albidis; a) Calyce majori, magis cylindrico: corollulis minimis, saturatius purpureis; Stigmatibus parentissimis. b) Calyce ovato-oblongo, corollulis duplo majoribus, pallidioribus, Stigmatibus subbifidis, erectis.

*** *Discoidei.*

EUPATORIUM. G. P. 935.

Receptaculum nudum. Pappus plumosus.

Calyx imbricatus, oblongus. Stylus semi-bifidus, longus. S. N. 536.

633. *EUPATORIUM, cannabinum, foliis digitatis.*

Linn. Spec. 1173. (Hall. 136.)

H. secus rivulos in pascuis sylvaticis im Beilstein copiofissime; in dumetis bey der unteren Walckmühle rarius. Floret Julio, Augusto.

Pharm. EUPATORIUM Herba.

Pappus capillaris, radice flexuosa, simplicior, nec plumosus.

BIDENS.

BIDENS. G. P. 932.

*Receptac. paleaceum. Pappus aristis erectis,
scabris. Calyx imbricatus. Cor. rarius
flosculo uno alterne radiante instruitur.
S. N. 534.*

634. BIDENS, *tripartita*, foliis trifidis, calycibus
subfoliofis, seminibus erectis. Linn. Spec. 1165.
(Hall. 121.)

H. in fossis passim; an der Mühlbach copiose. Floret Julio,
Augusto.

635. BIDENS, *cernua*, foliis lanceolatis amplexicau-
libus, floribus cernuis, seminibus erectis. Linn.
Spec. 1165. (Hall. 120.)

H. similibus in locis cum precedente rarius; bey der oberen
Walckmühle; auf dem Säuvviesgen; auf der Bürgermeister-
Wiese frequens. Floret Julio, Augusto.

Corollulæ octo in ambitu disci uti centrales Hermaphrodite, Tu-
bo ramen semper ventricosore depresso, locis diutius inunda-
tis in Corollulas ligulatas neutras transunt. Vid.
COREOPSIS. Bidens.

B. POLYGAMIA SUPERFLUA.

* Discoidei.

ARTEMISIA. G. P. 945.

- Recept. subvillosum vel nudiusculum. Pap-
pus nullus. Cal. imbricatus squamis ro-
tundatis, conniventibus. Corollæ radii
nullæ. S. N. 541.*

636. ARTEMISIA, *Absinthium*, foliis compositis
multifidis, floribus subglobosis pendulis: re-
ceptaculo villoso. Linn. Spec. 1188. (Absin-
thium. Hall. 124.)

H. in cultis & ruderatis passim. Foret Julio, Augusto.

Pharm. ABSINTHI VULGARIS Herba.

Corollulæ Radii circiter 15, femineæ, nudaæ.

637. ARTEMISIA, *vulgaris*, foliis pinnatifidis planis
incisis subeis tomentosis, racemis simplicibus
recur-

recurvatis, floribus ovatis : radio quinquefloro.
Linn. S. N. 542. Spec. 1188. (*Artemisia*, Hall. 130.)

H. in ruderatis, ad vias auf dem Hintersand, alibique copiose.
Floret Julio, Augusto.

Pharm. ARTEMISIA ALBA & RUBRA Herba.

TANACETUM. G. P. 944.

Receptaculum nudum. Pappus submarginalis.
Cal. imbricatus, hemisphaericus.
Cor. radii obsoletæ, 5-fidæ. S. N. 541.

638. TANACETUM, *vulgare*, foliis bipinnatis incisis ferratis. Linn. Spec. 1184. (Hall. 132.)

H. ad versuras & margines pratorum, in ruderatis paucim.
Floret Julio, Augusto.

Pharm. TANACETI Herba, Semina.

CONYZA. G. P. 950.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. imbricatus, subrotundus. Cor. radii trifidæ.
S. N. 547.

639. CONYZA, *squarrofa*, foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboso, calycibus squarrosis.

Linn. S. N. 547. Spec. 1205. (Hall. 135)

H. in montosis siccis apricis am Döllberg; Hemberg; im Beilstein frequens. Floret Julio, Augusto.

GNAPHALIUM. G. P. 946.

Recept. nudum. Pappus plumosus. Cal. imbricatus: squamis marginalibus rotundatis scariosis, coloratis. S. N. 543.

a. *Argyrocoma*, f. *calycibus albis*.

640. GNAPHALIUM, *dioicum*, farmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, floribus dioicis. Linn. S. N. 545. Spec. 1199. (*Filago*. Hall. 157.)

a. Gnaphalium (Mas) montanum flore rotundiore. Bauh. Pin. 263.

β. Gnaphalium (Femina) montanum longiore & folio & flore. Bauh. Pin. 263.

M

H.

H. α . & β . in collibus & sterilibus montosis am Homberg
Dollberg & Rehberg copiose. Floret Majo, Junio.
Feminae flosculi etiam corollati: Tubo tenui, superne purpureo,
Limbo 5-fido-erecto. Pappus vix plumosus, in Mare radiis
apice incrassatis.

Pharm. GNAPHALII Flores.

b. Filaginoidea s. calycibus cinereis.

641. **GNAPHALIUM**, *sylvaticum*, caule herbaceo sim-
plicissimo erecto, floribus sparsis. **Linn.** S. N.

545. Spec. 1200. (*Filago. Hall. 148.*)

H. in sylvaticis montosis am Beilstein copiose; im Guldmer-
grund rarius. Floret Julio, Augusto.

Corollulae hermaphroditae 3 f. 5 in centro disci; Femineæ nu-
merosa in ambitu: Tubo tenui, Limbo 5-fido erecto instru-
cta. Pappus capillaris, simplex.

642. **GNAPHALIUM**, *uliginosum*; caule herbaceo ra-
moso diffuso, floribus confertis terminalibus.

Linn. S. N. 545. **Spec. 1200.** (*Filago. Hall. 151.*)

H. in stagnis, locis inundatis auf aem Schießplatz, & alibi
frequens. Floret Julio, Augusto.

Calices basi tomentosi, squamis acutiusculis fuscis, demum nigris.
Corollulae hermaphroditae pauca in disco; Femineæ plures in
ambitu, tubulosa, Limbo 5-fido. Pappus radiis tantum seta
brevibus deciduis constat.

** Radiati.

BELLIS. G. P. 962.

Recept. nudum, conicum. **Pappus nullus.**

Cal. hemisphæricus: squamis æqualibus.

Semina obovata. S. N. 560.

643. **BELLIS**, *perennis*, scapo nudo. **Linn.** Spec.

1248. (*Hall. 93.*)

H. in pascuis pratis & pomariis ubique. Floret toto fere anno.

Pharm. **BELLIDIS MINORIS** Herba, Flores.

MATRICARIA. G. P. 967.

Recept. nudum. **Pappus nullus.** **Cal.** hemi-
sphæricus, imbricatus: squamis margin-
ibus solidis, acutiusculis. S. N. 563.

644. **MATRICARIA**, *Partbenium*, foliis compositis
planis: foliolis ovatis incisis, pedunculis ra-
mosis. **Linn.** Spec. 1255, (*Hall. 100.*)

H.

H. in ruderatis auf dem Hintersand; in cultis am Sieghaus; ad sepes passim. Floret Julio, Augusto.

Pharm. MATRICARIAE Herba, Flores.

645. *MATRICARIA, suaveolens*, receptaculis conicis, radiis deflexis, squamis calycinis margine æqualibus. *Linn. S. N. 563. Spec. 1256.*

H. in agris ad pagum Sinn; in der Aue rarius. Floret Julio, Augusto.

646. *MATRICARIA, Chamomilla*, receptaculis conicis, radiis patentibus, squamis calycinis margine æqualibus. *Linn. S. N. 563. Spec. 1256. (Hall. 101.)*

H. in agris præsertim secalinis ubique copiosissime. Floret Majo & sequ.

Pharm. CHAMOMILLÆ VULGARIS Flores.

CHRYSANTHEMUM. G. P. 966.

Recept. nudum. Pappus marginatus. Calyx hemisphæricus, imbricatus: squamis marginalibus membranaceis. S: N. 561.

a. *Leucanthemum.*

647. *CHRYSANTHEMUM, Leucanthemum*, foliis amplexicaulibus oblongis: superne ferratis; inferne dentatis. *Linn. Spec. 1251. (Matricaria. Hall. 98.)*

H. in pomariis & pratis passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. BELLIDIS MAIORIS Herba.

648. *CHRYSANTHEMUM, inodorum*, foliis pinnatis multifidis, caule ramoso diffuso. *Linn. Spec. 1253.*

H. in agris & cultis in der untern Pitze; in ruderatis bey dem dicken Thurm; am Dollberg rarius. Floret Julio, Augusto. Flores quam in C. Leucanth. paulo minorēs. Calyx plane - convexus: squamis interioribus margine membrana fusca scariose undulata auctis. Flosculi radii 13-15. Semina terebrata, atra, angulis eburneis, apice 4-dentata. Receptaculum ovato-oblongum, intus cavum.

649. *CHRYSANTHEMUM, corymbosum*, foliis pinnatis inciso-ferratis, caule multifloro. *Linn. Spec. 1251. (Pyretrum. Hall. 95.)*

H. in sylvis im Beilstein; am Homberg, alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

Semina tetragona, Calyculo tubuloso, oblique truncato, denticulata, coronata.

b. *Chrysanthemum.*

650. **CHRYSANTHEMUM**, *segetum*, foliis amplexicaulibus : superne laciniatis ; inferne dentato-seratis. *Linn. Spec. 1254.*

H. inter segetes ; in cultis, ruderatis, ad vias passim. Floret Julio, Augusto.

ARNICA. G. P. 958.

Recept. nudum. Pappus simplex. Corollulae radii filamentis 5 absque antheris. S. N.

559.

651. **ARNICA, montana**, foliis ovatis integris : caulinis geminis oppositis. *Linn. Spec. 1245.* (*Hall. 89.*)

H. in pratis siccis circa pagos Mademühlen ; Roth ; alibi frequens ; in pratis am Rehberg rarius. Floret Julio.

Pharm. ARNICA Herba, Flores.

Calycis foliola 20, ordine duplii : exteriora subcarinata, hirsuta, viscosa ; interiora alterna linearia, lavia. Corollulae radii 500 quot calycis foliola, quinque-julcata, apice tridentata. Filamenta 3-4, rarius 5, inqualia, sulcis respondentia, fauca tubo inserta. Semen Hermaphroditum angulato-cylindricum, sursum pilosum, Pappo capillari coronatum. Femina Semen angulo unico planiore, Pappo similimo instructum.

INULA. G. P. 956.

Recept. nudum. Pappus simplex. Anthera basi in setas duas desinentes. S. N. 557.

652. **INULA, Helenium**, foliis amplexicaulibus ovatis rugosis : subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *Linn. Spec. 1236.* (*Aster. Hall. 72.*)

H. in pomariis & ad margines agrorum am Dollberg. Floret Julio, Augusto.

Pharm. HELENII s. ENULAE Radix.

Radii Corollulae acute tridentatae, nec integrae.

653. **INULA, Pulicaria**, foliis amplexicaulibus undulatis, caule prostrato, floribus subglobosis : radio brevissimo. *Linn. S. N. 558. Spec. 1238.* (*Aster. Hall. 80.*)

H. in

H. in inundatis *anf dem Schiesplatz* copibse; *auf dem Steinwiesen rarius.* Floret Julio, Augusto.
Radii Corollulæ *Limbo brevissimo, tridentato.*
Seminum Pappus radiis tantum sex constat, mox decidit.

ERIGERON. G. P. 951.

Recept. nudum. *Pappus pilosus.* Cor. radii lineares, angustissimæ. S. N. 549.

654. ERIGERON, *canadense*, caule floribusque paniculatis. Linn. Spec. 1210. (Hall. 84.)

H. in agris inter Solanum tuberosum, seinel lectum am Dollberg. Floret Augusto.

Caulis bipedalis, sulcatus, setis albidis rectis hirtus. Folia radicalia ovato-lanceolata, trinervia, sub serrata: Caulina sparsa, parentissima, linearis-lanceolata, ciliata. Corollulæ Disci Limbo 4-fido, patulo: Stigmatibus apice conniventibus. Cor. Radii acute bidentatae, Stigmatibus longis, parentissimis.

655. ERIGERON, *acre*, pedunculis alternis unifloris. Linn. Spec. 1218. (Hall. 85.)

H. in fuccis glareosis am Homberg; Dollberg; *auf dem Schiesplatz, & alibi frequens.* Floret Julio, Augusto.

Floris corollulæ triplices: a, Disci centrales pauca hermaphrodita: Limbo 5-fido, calyce breviores. b, Disci laterales numerosa feminæ: Tubo tenui; Limbo oblique truncato, longitudo calycis. c, Radii plures feminæ, ligulata, erecta: Limbo bidentato, calyce longiores. Omnium Styli altitudine inter se & Pappo aquales.

SOLIDAGO. G. P. 955.

Recept. nudum. *Pappus simplex.* Cor. radii circiter 5. Calycis squamæ imbricatae, clausæ. S. N. 556.

656. SOLIDAGO, *Virga aurea*, caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis.

Linn. Spec. 1235. (Hall. 69.)

H. in sylvaticis montosis am Homberg, alibique. Floret Julio, Augusto.

Corollulæ radiis sapientis 6-7; disci 9-10. Stigmata apice conniventia.

SENECIO. G. P. 953.

Recept. nudum. *Pappus simplex.* Cal. cylindricus, calyculatus: squamis apice sphaerulatis. S. N. 550.

a. *Floribus flosculosis.*

657. SENECIO, vulgaris, corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis.

Linn. Spec. 1216. (Hall. 58.)

H. in cultis inter olera, vitium ubique vulgatissimum. Floret toto fere anno.

Pharm. SANECIONIS Herba.

b. *Floribus radiatis: radio revoluto.*

658. SENECIO, viscosus, corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Linn. Spec. 1217. (Hall. 60.)*

H. in cultis & ruderatis auf dem Hintersand; in muris cœmerii & urbis frequens. Floret Julio, Augusto.

659. SENECIO, sylvaticus, corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboso erecto.

Linn. Spec. 1217. (Hall. 59.)

H. in sylvis in der Hoerre copiose. Floret Julio.

c. *Floribus radiatis: radio patente, foliis pinnatifidis.*

660. SENECIO, erucifolius, corollis radiantibus, foliis pinnatifidis dentatis subhirtis, caule erecto.

Linn. Spec. 1218. (Hall. 62. var. s.)

H. ad margines agrorum am Dollberg; Homberg; & alibi frequens. Floret Julio, Augusto.

661. SENECIO, Jacobæa, corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto.

Linn. Spec. 1219. (Hall. 62. var. a.)

H. iisdem in locis cum præcedente. Floret Julio, Augusto.

d. *Floribus radiatis: radio patente, foliis indivisis.*

662. SENECIO, saracenicus, corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis glabriusculis. *Linn. Spec. 1221. (Hall. 61.)*

H. in dumetis auf der Weißgarberuviese; auf der Sanduviese; in sylvis im Beilstein frequens. Floret Julio, Augusto.

Pharm. CONSOLIDÆ SARACENICÆ Herba.

TUSSILAGO. G. P. 952.

Recept. nudum. Pappus simplex. Calycis squa-

squamæ æquales, discum æquantes, submembranaceæ. S. N. 550.

663. TUSSILAGO, *Farfara*, scapo unifloro imbri-bricato, foliis subcordatis angulatis denticulatis. Linn. Spec. 1214. (Petasites. Hall. 143.)

H. in agris argillosis humentibus in der Aue frequens. Floret Aprili.

Pharm. TUSSILAGINIS f. FARFARÆ. Radix, Herba, Flores.

Corollulae Radii integrerrima.

664. TUSSILAGO, *hybrida*, thyrso oblongo, flosculis femineis nudis plurimis. Linn. Spec. 1214. (Petasites. Hall. 140.)

H. in pratis humidis unter der neuen Brücke; bey der unsrer Walkmühle; auf der Pfingstwiese copiose. Floret Aprili.

Corollulae femineæ numerosæ, apice bifidae. Hermaphrodita vix 3- f. 5. in centro disci.

665. TUSSILAGO, *Petasites*, thyrso ovato, flosculis femineis nudis paucis. Linn. S. N. 550. Spec. 1215. (Petasites. 138.)

H. cum præcedente copiosissime. Floret Aprili.

Corollulae femineæ in nostræ penitus nulla. Pappus in hac & præcedentibus sessilis, nec stipitatus.

ANTHEMIS. G. P. 970.

Recept. paleaceum. Pappus nullus. Cal. hemisphæricus, subæqualis. Flosculi radii plures quam 5. S. N. 565.

a. Radio discolori f. albo.

666. ANTHEMIS, *arvensis*, receptaculis conicis: paleis setaceis, seminibus coronato-mARGINATIS. Linn. Spec. 1261. (Chamaemelum. Hall. 103.)

H. in agris arvis & cultis passim. Floret Junio & sequ.

Radix biennis. Caules plures, prostrati, diffusi. Folia canescens.

Pedunculi longi, angulato-sulcati, pubescentes. Calycis squamae ovato-lanceolata: interiores ovatae, membrana scariosa aucta. Semina levia, subterragona, 10 - sulcata, apice incrassata, centro excavata, gibberibus 10 coronata. Receptaculum ovatum: Paleæ lanceolata, carinata, acuminata. Planta aliquem habet odorem, minus raman facientem quam in sequente.

667. ANTHEMIS, *Cotula*, receptaculis conicis: paleis setaceis, seminibus nudis. *Linn. Spec. 1261.* (*Chamæmelum. Hall. 104.*)

H. in arvis ruderatis & cultis ubique. Floret Julio & sequ. Radix annua. Caulis unicus, erectus. Folia laevia. Pedunculi striati. Calycis squamae linearis, margine vix ulla. Semina obovata, striata, pubescens, apice contracto, vix poro excavato, nudo. Receptaculum oblongum: Paleae setacea, angustissima. Planaria foetida.

668. ANTHEMIS, *tinctoria*, foliis bipinnatis ferratis subtus tomentosis, caule corymboso. *Linn. Spec. 1263.* (*Chamæmelum. Hall. 105.*)

B. Buphtalmum alpinum flore candido. Triumf. obs. 79. t. 80.

H. α , in sterilibus siccis, inque muris & ruderatis passim. **B.** Floribus minoribus, Radio albo, infra medium flavescens: am Dollberg & auf dem Schiesplatz rarius. Floret Julio, Augusto.

ACHILLEA. G. P. 971.

Recept. paleaceum. **Pappus** nullus. **Calyx** ovatus, imbricatus. **Flosculi** radii circiter 5. S. N. 566.

669. ACHILLEA, *Ptarmica*, foliis lanceolatis acuminatis argute serratis. *Linn. Spec. 1266.* (*Hall. 117.*)

H. ad fossas, in pratis humidis ubique. Floret Julio, Augusto.

Pharm. PTARMICA Herba, Flores.

670. ACHILLEA, *Millefolium*, foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus superne sulcatis. *Linn. S. N. 567. Spec. 1267.* (*Hall. 107.*)

B. Millefolium purpureum majus. *Bauh. Pin. 140.*

H. α , in pascuis siccis, ad versuras passim; **B.** in graminosis auf dem Hintersand; auf der Sandwiese. Floret Julio & sequ.

Pharm. α . MILLEFOLII Herba, Flores.

671. ACHILLEA, *nobilis*, foliis bipinnatis: inferioribus nudis planis, superioribus obtusis tomentosis, corymbis convexis confertissimis. *Linn. Spec. 1268.* (*Hall. 109.*)

H. in

H. in montosis aridis apricis circa Aslar & Werdorff. Floret Julio. +
Plantam hanc ipse nondum legi.

C. P O L Y G A M I A F R U - S T R A N E A.

CENTAUREA. G. P. 984.

Recept. setosum. *Pappus simplex.* *Cor.* radii infundibuliformes, longiores, irregulares. S. N. 572.

672. CENTAUREA, *Cyanus*, calycibus serratis, foliis linearibus integerrimis; infimis dentatis. *Linn.* Spec. 1289. (*Cyanus. Hall.* 191.)

H. in agris inter segetes passim. Floret Junio, Julio.
Pharm. CYANI Flores.

673. CENTAUREA, *Scabiosa*, calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis. *Linn.* Spec. 1291. (*Cyanus. Hall.* 186.)

H. in montosis sterilibus frequens. Floret Julio.

674. CENTAUREA, *Jacea*, calycibus scariosis laceris, foliis lanceolatis: radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis. *Linn.* Spec. 1293. (*Rhaponticum. Hall.* 195.)

H. in pratis siccis ubique. Floret Julio, Augusto.
Pappus etis brevissimis, paucis, mox deciduis, constat.

RUDBECKIA. G. P. 980.

Recept. paleaceum, conicum. *Pappus marginé 4-dentato.* *Calyx dupli ordine squamarum.* S. N. 570.

675. RUDBECKIA, *laciniata*, foliis compositis laciniosis. *Linn.* Spec. 1279.

H. in salicetis, ad ripas Dillz auf der Burgermeisterwiese; semel lecta, nec iterum reperta; forte aliunde ex hortis aufuga fluminisque inundatione advecta. Floret Julio & sequ.

COREOPSIS. G. P. 981.

Recept. paleaceum. *Pappus bicornis.* *Cal. erectus, polyphyllus, basi radiis patentibus cinctus.* S. N. 570.

676. COREOPSIS, *Bidens*, foliis lanceolatis ferratis oppositis amplexicaulibus. *Linn. Spec. 1281.* (*Bidens. Hall. 120. B.*)

H. in fossis & locis inundatis an der Mühlbach; bey der oberen Walkmühle; alibique alterius annis plus minusve frequens. Floret Julio, Augusto.

Caulis altior, erectior, minusque ramosus; Folia latiora, longius acuminata, argutius serrata, basi manifestius connata, quam in Bidente cernua. Florum radio excepto, omnibus in reliquis partibus cum ea convenit. Calyx exterior pentaphyllus, radio paulo longior: Foliolis lanceolatis, integris, subciliatis. Calyx interior erecto-patens: squamis octo planis, glabris, striatis, margine flavis. Disci corollulae hermaphroditae, & Semina quadri-aristata: aristis duabus alternis brevioribus, uti in illa. Radii Corollulae vero octo neutra, squamis calycinis opposita, ovali-oblonga, plana, patentes, flavae; supra novem-sulcata, subitus binervata, apice bi-s. tridentata. Sape insegerrima: Tubo brevi; Germine inermi, sterili; Stylo nullo instructa. Quoniam inter has sape observatur Corollula una alterave tubulosa hermaphrodita: Limbo 5-fido, Stylo Staminibusque imperfectis instructa, ceteroquin Corollulis otto in Bidentis cernua ambitu memoratis simillima, extra dubium esse patet: Plantam hanc ab illa minime esse diversam, solo Floris radio vero, singulari artificio Natura, diversissimam evadere. Caussa hujus metamorphoseos in loco natali diutius inundato ceree latet: quia aestate humida post diurnas pluvias, diversis in locis, ubi simplici Flore provenire solebat, mere flores radiatos, ac ne unicum quidem absque radio, in numerosis plantis reperire potui; aestate sicciori vero, simplici flore non radiato, iisdem in locis semper, semel tantum flores radiatos & non radiatos in eadem planta observavi.

D. POLYGAMIA NECESSARIA.

FILAGO. G. P. 995.

Recept. nudum. Pappus nullus. Cal. imbricatus. Flosculi femininei inter squamas calycis locati. S. N. 580.

677. FILAGO, *germanica*, panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirsutis, foliis acutis. *Linn. Spec. 1311.* (*Hall. 153.*)

H. in sterilibus arenosis auf dem Stützelberg; auf dem Schießplatz; alibique vulgaris. Floret Julio, Augusto. Caulis

Caulis dodrantalis, erectus, foliatus, albido-tomentosus, basi ramosus. Capitulum terminale globosum, ex pluribus floribus arte congestis compositum; sub quo dein rami duo oppositi rarius tres evascuntur, similibus Capitulis terminatis; sic divisione ramosum simil modo repetita, caulis tandem dichotomo-brachiatus sit, ramis horizontalibus, & capitula antea terminalia demum axillaria evadunt. Flores pentagoni, basi tomentosi: squamis calycinis ovato-acuminatis, interioribus aristatis, coloratis, nitidis. In hac Specie & duabus sequentibus triplices flosculos in singulo Flore, omnes corollatos, observo:

- a. Disci centrales 2. s. 3. hermaphroditici, embulosis: Limbo 4-fido, parente; Stigmatibus erecto-patulis, longitudo Limbi; Germine exiguum, abortiente, Pappo brevi simplici instructo.
- b. Disci laterales numerosi, feminei: Tubo tenuis basi tumido; Limbo 4-fido, erecto; Stigmatibus patulis, Limbo longioribus; Semine fertili, Pappo simili coronato.
- c. Flosculi inter squamas Calycis exteriores 5 s. 7, feminei, etiam corollati: Tubo tenuissimo, vix armatis oculis conspicuo; Limbo bifido, acuto: Stylo limbo longiore; Stigmatibus longis parentibus; Semine oblongo fertili, Pappo nullo.

678. *FILAGO, montana*, caule subdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribusque. Linn. S. N. 580. Spec. 1311. (Hall. 155.)

H. in arvis & campis arenosis am Dollberg; Homberg; alibique vulgaris. Floret Julio, Augusto.

679. *FILAGO, arvensis*, caule paniculato, floribus conicis lateralibus. Linn. Spec. 1312. (Hall. 154.)

H. in campis aridis sabulosis ubique. Floret Julio, Augusto. Hujus Semen hermaphroditici Pappo desitutum. In hac & antecedente Flosculi triplices, omnes corollati, usi in F. germanica.

CALENDULA. G. P. 990.

Receptac. nudum. Pappus nullus. Cal. polyphyllus, æqualis. Semi. disci membranacea. S. N. 577.

680 CALENDULA, officinalis, seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. Linn. Spec. 1304.

H. in

H. in cultis am Sieghaus; auf dem Hintersand rarius. Floret Julio, Augusto.
Pharm. CALENDULÆ Flores.

E. MONOGAMIA.

JASIONE, G. P. 1005.

Cal. communis 10 - phyllus. Cor. 5 - petala, regularis. Caps. infera, bilocularis.

S. N. 582.

681. JASIONE, montana. Linn. Spec. 1317. (*Rapunculus. Hall. 678.*)

H. in collibus apricis siccis passim, am Rehberg; Galgenberg; alibique copiose. Floret Julio, Augusto.

Calyx constanter icosiphyllo: Foliolis quatuor serierum subferratis, exterioribus gradatim majoribus. Antheræ ante pertusionem Stigmatis fere coalita, demum evanescere polline patentes, basi coherentes. Flosculi Disci centrales steriles: Stigmata clavato integerrimo, polline adsperso, nec villoso; Capsulis brevius pedicellatis, nunquam ad maturitatem pervenientibus. Flosculi laterales numerosiores fertiles: Stigmata clavato demum bifido. Quoniam horum Antheræ, tempore ruptionis Stigmata, Polline evanescunt, verisimile esse patet, Stigmata a Polline superiorum Antherarum facundari. Styli superiorum floscularum omnes erecti; inferiorum fertiliorum vero declinati, Stigmata pro facilitate Pollinis receptione sursum porridentes.

VIOLA. G. P. 1007.

Cal. 5 - phyllus. Cor. 5 - petala, irregularris, postice cornuta. Caps. supera, 3 - valvis, 1 - locularis. S. 584.

a. Acaules.

682. VIOLA, birta, acaulis, foliis cordatis pilosohispidis. Linn. Spec. 1324. (Hall. 559.)

H. in sylvaticis im Beilstein; in dumetis & sepibus am Rehberg & Homberg frequens. Floret Majo, Junio.

Capsula subglobosa, tricarinata, birta, nutans, terram petens.

683. VIOLA, odorata, acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. Linn. Spec. 1324. (Hall. 558.)

H. in pomariis, locis pinguibus umbrosis frequens. Floret Martio, Aprili.

Pharm.

Pharm VIOLARIE Herba; **VIOLA** Flores, Semina.

Hujus Prolem hybridam semel legi loco umbroso am Homberg: Floribus majoribus, campanulatis; Petalis fere aequalibus commixtis, omnibus basi calcaratis, Aquilegiæ Flores, dentis petalis, referentibus. **VIOLA PELORIA?**

b. *Caulescens.*

684. VIOLA, canina, caule adultiore adscendente, foliis oblongo-cordatis. *Linn. Spec. 1324.* (*Hall. 563.*)

H. in pascuis sylvaticis; ad sepes ubique. Floret Aprili, Majo.

Hujus varietatem singularem legi in 'sylvis in der Hoerre': Caule dextrorotundali erecto. Foliis obtusioribus, scabriuscis. Floribus radicalibus primo vere nullis; caulinis inferioribus omnibus ferilibus: Petalis Antheris Germineque quidem instructis, ut in *V. canina*. Stigmate vero semper imperfecto, capitato, setis sursum versis hirsuto. Floribus superioribus omnibus ferilibus: at apetalis, vel vix rudimentis Petalarum minimis instrutis; Antheris nullis; Pistillò perfecto, mox in Capsulam intumescens *V. Canina* simillimam. Ad Violam mirabilem accederet, nisi Stipula serrato-ciliata, & Flores inferiores magnitudine, colore, odorisque delectu, Violæ canina effensa simillimi.

c. *Stipulus pinnatifidus; Stigmate urceolato.*

685. VIOLA, tricolor, caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis, stipulis pinnatifidis. *Linn. S. N. 589. Spec. 1326.*

a. *Viola bicolor arvensis. Benth. Pin. 200. (Hall. 569.)*

β. *Viola tricolor hortensis repens. Benth. Pin. 299. (Hall. 568.)*

H. α. in cultis & agris ubique copiose; β. in cultis auf der Schafdille. Floret æstate.

In Var. α, Petala vix calycis longitudine, sapientis breviora.

IMPATIENS. G. P. 1008.

Cal. 2- phyllus. Cor. 5-petala, irregularis, nectario cucullato. Caps. supera, 5-valvis. S. N. 586.

686.

- 686.** *IMPATIENS, noli tangere*, pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Linn. Spec. 1329.* (*Hall. 517.*)
H. in nemorosis subhumidis ad *Erbach* copiose; *im Beilstein*; *an der Mühlbach* alibi frequens. Floret Julio.
Squamæ *duæ*, *ovata*, *minima*, *ad basin Petali superioris*,
Calyce testæ: quid?

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.
A. DIANDRIA.

ORCHIS. G. P. 1009.

Nectarium corniforme pone florem. S. N.
589.a. *Bulbis indivisis.*

- 687.** *ORCHIS, bifolia*, bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo, petalis patentibus. *Linn. Spec. 1331.* (*Hall. 1285.*)

B. *Orchis trifolia minor.* *Baub. Pin. 83.**H. α*, in sylvaticis montosis *am Beilstein & Homberg*; *β*, floribus duplo minoribus, odoratissimis, calcaribus filiformibus: in pratis fiscis *am Rehberg* copiose. Floret Majo. Junio.

- 688.** *ORCHIS, Morio*, bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso ascendentem, petalis obtusis conniventibus. *Linn. S. N. 589, Spec. 1333.* (*Hall. 1282.*)

H. in pomariis *am Sieghaus rarius*; in pratis fiscis *am Rehberg* frequens, Floret Majo.

- 689.** *ORCHIS, mascula*, bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis. *Linn. Spec. 1333.* (*Hall. 1283.*)

H. in pratis sylvaticis *hinter dem Homberg*; & alibi frequens. Floret Majo. Junio.*Pharm. SATYRIS Radix.*

690. ORCHIS, *ustulata*, bulbis indivisis, nectarii labio quadridido punctis scabro: cornu obtuso, petalis distinctis. *Linn. Spec. 1333.* (*Hall. 1273.*)
 H. in montosis muscosis am Rehberg rarius. Floret Junio.
 b. *Bulbis palmatis.*
691. ORCHIS, *latifolia*, bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Linn. Spec. 1334.* (*Hall. 1279.*)
 H. in pratis humidis passim. Foliis maculatis, & non maculatis ludit. Floret Majo.
692. ORCHIS, *maculata*, bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore: labio piano, petalis dorsalibus erectis. *Linn. S. N. 590. Spec. 1335.* (*Hall. 1278.*)
 H. in pratis sylvaticis am Rehberg copiose. Floret Majo, Junio.
 Bracteæ subserrulatae. Labii lacinia intermedia minor, integrerrima, acuta.
693. ORCHIS, *odoratissima*, bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo breviore: labio trilobo, foliis linearibus. *Linn. S. N. 590. Spec. 1335.* (*Hall. 1274.*)
 H. in pratis siccis am Rehberg. Floret Junio.
694. ORCHIS, *conopsea*, bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo germinibus longiore: labio trifido, petalis duobus patentissimis. *Linn. Spec. 1335.* (*Hall. 1287.*)
 H. in pratis montosis am Rehberg; & alibi frequens. Floret Majo, Junio.
 c. *Bulbis fasciculatis.*
695. ORCHIS, *abortiva*, bulbis fasciculatis filiformibus, nectarii labio ovato integrerrimo, caule aphylo. *Linn. S. N. 591. Spec. 1336.* (*Epipactis. Hall. 1288.*)
 H. in sylvis, im Schoenbacher Wald rarius. Floret Majo. *

OPHRY'S.

OPHRY'S. G. P. 1011.

Nectarium subitus tubcarinatum. S. N.
592.

696. OPHRY'S, *Nidus avis*, bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato aphylllo, nectarii labio bifido. Linn. S. N. 592. Spec. 1339. (*Epipactis*. Hall. 1290.)

H. in nemorosis ad Schoenbach; im Hirschberg copiose; in pratis sylvaticis am Rehberg rarius. Floret Majo, Junio.

697. OPHRY'S, *ovata*, bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. Linn. Spec. 1340. (*Epipactis*. Hall. 1291.)

H. in pratis sylvaticis am Rehberg frequens; in pomariis passim parcus. Floret Majo, Junio.

SERAPIAS. G. P. 1012.

Nectarium ovatum, gibbum, labio ovato.
S. N. 593.

698. SERAPIAS, *latifolia*, bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. Linn. S. N. 593. S. *Helleborine*. a. Spec. 1344. (*Epipactis*. Hall. 1297.)

H. in pratis humidis ad pagos Schoenbach, Driedorff & Roth. Floret Junio, Julio.

699. SERAPIAS, *longifolia*, bulbis fibrosis, foliis ensiformibus sessilibus, floribus pendulis. Linn. S. N. 593. (*Epipactis*. Hall. 1296.)

H. in pratis siccis hinter dem Homberg copiose. Floret Julio.

700. SERAPIAS, *rubra*, bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis: nectarii labio acuto. Linn. S. N. 594. (*Epipactis*. Hall. 1299.)

H. in sylvis im Beilstein; in der Hoerre; im Hirschberg infrequens. Floret Julio.

Bulbi teretes, flexuosi, subtomentosi, simplices. Spadix pedalis, ad basem squamis aliquot striatis vaginatis vestitus; superne undus, inter Flores pubescens. Folia 5-nervia: infimum ovatum, sequentia duo ovato-lanceolata, reliqua 2 f. 3. ensiformia. Flores

Flores erecti, magni, pauci. (5 f. 9.) Bracteæ lanceolate, acuta, inferiores longitudinaliter Germinis, superiores gradatim breviores. Petala quinque, ovato-lanceolata, acuminata, purpurea, subconniventa, inferioribus duobus basi latioribus magis hiancibus. Nectarium Petalis vix longius, subtus convexo-platum, pone gibbum, sulco longitudinali: Labellum albidum subcordatum, acuminatum, apice reflexum, margine adscendente serrulato; supra totum cum postica parte, lineolis novet, eminentibus, longitudinalibus, undulatis, flavis, notatum. Stylus arcuatus, supra convexus, subtus canaliculatus, apice tridentato. Antheræ minima. Capsula oblonga, angulosa.

B. HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA. G. P. 1022.

Hexagyna. Cal. nullus. Cor. 1 - petala, lingulata, integra. Caps. 6 - locularis, infera. S. N. 600.

701. ARISTOLOCHIA, clematitis, foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. Linn. Spec. 1364. (Hall. 1029.)

H. in cultis in der Callenbach copiose; in hortis vor dem und tern Thor, alibique vitium pervulgare. Floret Junio. Pharm. ARISTOLOCHIA Herba.

C. POLYANDRIA.

ARUM. G. P. 1028.

Spatha monophylla, cucullata. Spadix supra nudus, inferne femineus, medio stamineus. S. N. 603.

702. ARUM, maculatum, acaule, foliis hastatis integrerrimis: spadice clavato, Linn. Spec. 1370. (Hall. 1302.)

H. in sylvis & nemoribus passim. Foliis maculatis & non maculatis ludit. Floret Major. Pharm. ARUM Radix.

N

CLAS.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

A. DIANDRIA.

LEMNA. G. P. 1038.

MASC. *Cal.* 1 - *phyllus.* *Cor.* nulla.

FEM. *Cal.* 1 - *phyllus.* *Cor.* nulla. *Stylus*
1. *Caps.* 1 - *locularis.* S. N. 614.

703. LEMNA, *minor*, foliis sessilibus utrinque planis-
tusculis, radicibus solitariis. *Linn. Spec.* 1376.
(*Hydrophace. Hall.* 1900.)

H. in aquis stagnantibus im Quedenvveyer; bey der Weissgärber-
vviese, & alibi frequens. Floret Junio; Julio.

704. LEMNA, *gibba*, foliis sessilibus subtus hemi-
sphæricis, radicibus solitariis. *Linn. Spec.* 1376.
(*Hall.* 1898.)

H. in stagnis ad Driedorf. Floret Julio.

B. TRIANDRIA.

CAREX. G. P. 1046.

MASC. Amentum imbricatum. *Cal.* 1 - *phyl-*
lus. *Cor.* o.

FEM. Amentum imbricatum. *Cal.* 1 - *phyl-*
lus. *Cor.* o. *Nectarium inflatum*, 3 - den-
tatum. *Stigmata* 3. *Semen triquetrum*,
intra nectarium. S. N. 616.

A. *Stylus bifidus.* Semina hinc convexa, inde plana.

a. *Spica unica simplici.*

705. CAREX, *pulicaris*, spica simplici androgyna:
superne mascula, capsulis divaricatis retrofle-
xis. *Linn. Spec.* 1380. (*Hall.* 1350.)

H. in pratis uliginosis in der Alzbach frequens. Floret Mayo,
T. XIV.

T. XIV. f. 1. Radix *densa*, *fibrosa*, *rufescens*. Culmi florentes vix spithamai, deflorati dodrantales, s. pedales, erecti, nudi, enodes, laeves, teretes, altero latere planiore: Vaginis aliquot ad basin vestiti, inferioribus in foliola brevia, superioribus in acumina desinentibus. Folia radicalia erecta, carinato-setacea, scabra, apice compressa, culmo breviora. Spica terminalis, simplex, cylindracea, subtrigona, (1) superne ad medium usque mascula; (♂) inferne feminea. (♀) Cal. squamæ fusca, albido-marginatae: mascula oblongas, obtusae, (♂ a A II.) persistentes; feminea ovata, acuta, decidua. (♀ a) Capsulae spadiceo-rufescentes, nitidae, erectae, rachi trigona articulatae adpressa, demum retroflexa. (p.)

b. Spicis androgynis.

706. CAREX, *arenaria*, spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo triquetro. Linn. Spec. 1381. (Hall. 1362. & 1363.?)

T. XIV. f. 2. Radix suniformis, articulata, profunde sub terra repens; geniculis remotis, fibrosis, setis barbatis. Culmi ultrapedales, subfoliati, triquetri, superne nudi scabri. Folia angusta, carinata, scabra, inferiora levia, longitudine culmi florentis. Spica erecta, idem nutans, composita: Spiculis 20. l. 30. sessilibus, oblongis, acuminatis, flavo-ferrugineis, nitidis, confertis, inferioribus remotioribus, alternis; (I. ♀. ♀.) quarum, duas infra & terminalis (II ♀) tota feminea; intermediae 2 l. 3, feminæ apice masculæ; (♀ ♀ ♂) superiores plures (15-20) confertæ, totæ masculæ, (♂) steriles. Bractea singula spicula subiecta sessilis, lanceolato-acuminata; (♀ II.) duæ seu tres inferiores ovata, in foliolum setaceum propriæ Spicula vix longius desinentes. Cal. squamæ masculæ lanceolata; (a. ♂.) feminæ ovata, acuta. (♀ a) Nectarium margine scabrum. (l. L) Spicula feminæ fructu maturò ovata, valde incrassatae. (♀) Capsulae ovatae, acuminatae, acute marginatae, apice bifido; (p) sape corniculatae, majore; (*) ob larvam Insecti cuiusdam inhabitantis, monstrosa.

707. CAREX, *leporina*, spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis. Linn. Spec. 1381. (Hall. 1361.)

H. in pratis humidis ad pagum Sinn; im Pulversgrund, & alibi infrequens. Floret Mayo.

T. XIV. f. 6. Radix multiplex; fibrosa. Culmi 1 l. 2-pedales, erecti, subfalcati, trigoni, laeves, inter spiculas flexuosi,

scabri. Folia angusta, carinata, scabra, culmo brevioribus
Spiculae 5 f. 6, alterna, distincta: florentes ovata, (I)
fusco-virentes, fructifera subrotunda, (II) ferruginea s. fusca-
nitida; omnes feminæ, apice masculæ. Bractæ ovato-
oblonga, quarum infima subaristata, spiculis breviores, Cal-
lî quamæ ovato-lanceolata, acuminata, (a A) ferruginea, nervo
viridi, margine albido. Capsulæ lanceolata, acuminatae,
margine acuto, scabro, (p. P.) calyce non longiores. (A. P.)

- 708 *CAREX, vulpina*, spica supradecomposita in-
 ferne laxiore, spiculis ovatis androgynis glo-
 meratis: superne masculis. Linn. S. N. 616.
Spec. 1382. (Hall. 1364?)

H. in fossis urbis & cœmeterii, im Quedenueyer; in der
 Altxbach frequens. Floret Majo, Junio.

- T. XIV. f. 5. Radix multiplex, densa, fibrosa. Culni bi- f. tri-
 pedales, subfoliati, exacte triquetri, crassi, angulis acutis su-
 perne retrorsum scabris; farcti medulla arachnoidea. Folia
 lata, carinata marginibus replicatis, flavo viridia: radicalia
 levia; culmea marginaque scaberrima. Spica coarctata-
 ramosa, demum hispida, plus minusve contracta, compo-
 sita: ramulis inferioribus 3 f. 4 alternis, sub florescentia distin-
 tioribus, (I) spiculis glomeratis obtectis. Spiculae ovatae,
 griseo-virentes: omnes femineæ (♀) apice masculæ. (♂)
 Bractæ ramulis subiectæ semiamplexantes, basi ovata in fo-
 liolum setaceum longitudine ramuli, desinentes; Bractæ singula spic-
 ula propria, lanceolato serratae. (†) spicula vix longior. Ca-
 pilulae ovatae, acute, fusca, (p.) divergentes. (II)

709. *CAREX, muricata*, spiculis subovatis sessilibus
 remotis androgynis, capsulis acutis divergen-
 tibus spinosis. Linn. Spec. 1382. (Hall. 1365.
 Et var. minor. 1366?)

H. in pratis sylvaticis hinter dem Homberg, alibique frequens.
 Floret Majo.

- T. XIV. f. 8. Radix multiplex. fibris longissimis simpliciæculis.
 Culni numerosi, subfoliati, trigoni, laeves; florentes dito vix
 longiores; fructu maturæ pedales. Spiculae 3-4. f. 5, alterna,
 remotiusculæ, inferne cylindraceæ masculæ, (♂) superne
 ovatae femineæ: terminali longiore. (I. ♀.) Bractæ sub-
 vaginantes, acutæ, spiculis breviores. Cal. squamæ acutæ,
 viridescentes: masculæ ovato-triangulares, (a A ♂) femineæ
 ovato-acuminatae. (a ♀.) Capsulæ ovato-acuminatae, di-
 vergentes. (II p.)

710. CAREX, *remota*, spicis ovatis subsessilibus remotis androgynis, bracteis culmum æquantibus.
Linn. S. N. 617. Spec. 1383. (Hall. 1357.)

H. in pratis humidis secus rivulos im Gœldnersgrund; am Dollberg; im Zuvinger copiosissime. Floret Majo.

T. XV. f. 1. Radix multiplex, fibrosa, fibris firmis simpliciæ sensilis. Culni tonues, infirmi, trigoni, subscabri; florentes pedales, foliorum vaginis toti obtecti, fructiferi tripedales. Folia angusta, carinata, longa, subscabra, flavo-viridia. Spiculæ 6. 7. f. 8, ovata, feminæ, inferne masculæ, (♀ ♂) remotissimæ, sessiles in alis foliorum: quorum inferiores duo culmum superantia, tertium angustius, ejusdem longitudinis, reliqua gradatim breviora; supremis spiculis subjecta, setacea, brevissima. Cal. squamæ alvido-virentes, lanceolata, acuta. (a A) Capsulæ subflavescentes, acutæ. (p.)

711. CAREX, *elongata*, spiculis oblongis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis acutis.
Linn. Spec. 1383. (Hall. 1359.)

H. in pratis uliginosis ad pagum Sinn, am Mühlberg infrequens. Floret Majo.

T. XIV. f. 7. Radix priorum, fibrosa, albida. Culni sesquipedales, subfoliati, triquetri, laeves, infra spicam scabri. Folia angusta, subcarinata, lavia, vix apice scabra, longitudine culm. Spiculæ 7-8-9, alterna, remota, distinctæ, oblongæ, feminæ, inferne masculæ. (♀ ♂) Bractæ ovatae, apice setacea, brevissimæ, albidae. Cal. squamæ ovatae, acutæ. (a. A) Capsulæ griseo-virentes, exiguae, utrinque subconvexæ, acuta. (p. P.)

712. CAREX, *canescens*, spiculis subrotundis remotis sessilibus obtusis androgynis, capsulis ovatis obtusiusculis. Linn. Spec. 1383? (Hall. 1360.)

H. ad versuras & sepes, locis siccis graminosis ubique frequens. Floret Majo.

T. XIV. f. 3. Radix crassiuscula, fibrosa, setis atro-fuscis barbata. Culni subfoliati, triquetri, superne scabri, I f. 2-pedales, erecti, demum obliqui, procumbentes. Folia angusta, laevia, carinata, marginib. replicatis, apicem versus scabra. Vaginæ hinc truncatae, membranaceæ, albidae, tenuissimæ. Spica 1-2-3 pollicaris. Spiculæ in minoribus speciminibus 5, subrotundæ; in majoribus 9-15, ovatae, obtusissimæ: inferne, feminæ, superne masculæ: quarum inferiores alterna, subremotæ, distinctæ, infima saepe duabus lateralibus minoribus, & raro pluribus ramulo brevi insidentibus, acutæ. (I. II) Bractæ setacea, brevissimæ. Cal. squamæ ovato-lanceolata,

acuta, (a) cinerescentes, nerva viridi, margine ferruginea, nitida. Capsulæ acute marginatae, apice-bifidae; sæpius corniculatae, maiores, varie curvatae. (*) Insectorum opus.) Carici vulpinae (nostræ) maxime adfinitis; vereor ne sit eiusdem varietas scicioribus in locis proveniens.

713. CAREX, paniculata, racemo composito, spiculis androgynis. Linn. Spec. 1383. (Hall. 1368.)

B. Cyperoides palustre spica laxa minus. Scheuchz. Agr. 501, (Hall. 1368, var. B.)

H. in paludosis prope pagum Sinn frequens. B. ibidem rarius; Floret Majo.

T. XIV. f. 4. Radix multiplex, lignosa, fibrosa. Culmi 3 f. 4-pedales, erecti, subfoliati, triquetri, hispidae, ad basin squamis fusco-atris, nitidis, subimbricatis, vestiti. Folia latiuscula, striata, carinata; dum siccæ, convoluto-fistulosa, marginibus & partim carina hispida. Spica ramosa, demum paniculata, hispida, composita: Ramulis alternis, remotiusculis, striatis, spiculis uniuersitate obtectis. Spiculæ inferne masculæ, superne feminæ; florentes subovatae, distinctiores; (I.) fructiferae glomeratae, confluentes, hispidae. (II.) Bractæ setacea, ramulis paula breviores. Cal. squamae ovato-acuminatae, fuscae, margine albido. (a) Capsulæ utrinque convexae, ventricosæ, exiguae, fuscae, divergentes, margine obtususcule, apice acuto, subbifidae.

Var. B. Spica simplici 1 - 2 - pollicari, ramis nullis differt.

B. Stylus trifidus, Semina triquetra,

b. Spicis sexu distinctis: feminis sessilibus.

714. CAREX, flava, spicis confertis subsessilibus subrotundis: mascula linearis, capsulis acutis recurvis. Linn. Spec. 1384. (Hall. 1380.)

H. in pratis uliginosis sylvaticis hinter dem Homberg; im Beilstein frequens. Floret Aprili, Majo.

T. XV. f. 6. Radix multiplex, fibrosa. Culmi laves: florentes subtriangulares, undique vaginis obiecti, vix digito longiores; (Fig. super.) fructiferi triquetri, subnudi, pedales. Folia latiuscula, subcarinata, scabra. Spica terminalis mascula, cylindrica, gracilis; squamis imbricata oblongis, obtusis, (a) inferioribus acutis, (a A *) infima saepe aristata. Spicæ feminæ duæ f. tres, approximatae; florentes, subrotundæ, sessiles; fructiferae subpedunculatae, subovatae, squarrosoe. (Fig. infer.) Bractæ foliacæ, vaginantes, culmo longiores. Cal. squamae late-lanceolatae, murronatae, ferrugineæ, nervo viridi, (a A ♀) capsulis breviores. Capsulæ ventricosæ, striatae, flavescentes, rostro longo, reflexo, brevissime bifido. (p. P.)

715.

715. CAREX, *digitata*, spicis linearibus erectis: mascula breviore inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus. *Linn. Spec. 1384.*
Hall. 1376.)

H. in sylvaticis montosis am. Homberg infrequens. Floret Martio, Aprili.

T. XVI. f. 4. Radix multiplex, descendens, squamis purpureis tunicata. Culni spithamei s. pedales, subnudi, hinc convexi inde planiusculi, laeves, apice scabri; ad basin vestiti vaginis quatuor carinatis, purpureis, aphyllis, superioribus in foliola setacea brevissima desinentibus. Folia radicalia angusta, subcarinata, firma, striata, inferne sursum, superne retrorsum scabra. Spica terminalis mascula, cylindrica, brevis: reliquae duæ s. tres feminine, graciliores, longiores, lineares; sessiles, dein pedunculatae: quarum superior florens altitudine masculae aequalis; deflorata pedunculo elongato altior evadit ipsa mascula. Bracteæ vaginantes, spadiceo-purpureæ, laxæ, oblique truncatae, aphyllæ. Cal. squamæ oblongæ, obtusæ, spadiceo-rufescentes, margine albido, nitido; (a ♂) feminine nervo medio viridi, apice setaceo, prominulo. (a ♀) Capsulæ alternæ, remotæ, trigonæ, acutæ, basi productiori attenuata, pubescentes. (p. P.)

716. CAREX, *montana*, spicis feminineis sessilibus subsolitariis ovatis masculæ approximatis, culmo nudo, capsulis pubescentibus. *Linn. Spec. 1385.* (*Hall. 1372.*)

H. in montosis apricis am. Homberg; Dollberg; alibique vulgaris. Floret Aprili.

T. XVI. f. 6. Radix multiplex, fibrosa. Culni spithamei, subnudi, subtrigoni, laeves, erecti, maturo fructu procumbentes; Foliis 3 s. 4 vaginantibus, brevibus, ad basin vestiti. Folia radicalia numerosa, angusta, plano-carinata, marginibus & apice carinae subscabra, flavescens, culma florenti breviora, demum aequalia: Vaginis inferioribus purpurascientibus. Spica terminalis mascula, subcylindrica, acutiuscula; deflorata apice subventricosa. (II) Spicæ feminine duæ, (rarius unica,) approximatae, sessiles, breviores, oblongæ s. subovatae, paucifloræ. Bracteæ sessiles, obcordatae, atropurpureæ, nervo medio viridi, apice in foliolum setaceum propria spicula brevius desinentes. Cal. squamæ spadiceo-purpureæ, demum atrae, nervo dorsali flavescens apice prominulo: masculæ oblongæ, (a ♂.) feminine subovata, (a ♀.) truncata mucrone prominulo. Nectarium ovatum, apice purpureo; bi-s. trifido. (I. L.) Capsulæ subtrigona gibba, hirta, divergentes. p. P.)

717. CAREX, *tomentosa*, spicis femineis subpedunculatis, capsulis subglobosis tomentosis. Linn. S. N. 617. *Mantissa*, 123. (Hall. 1373.)

H. in pratis humidis im *Pulversgrund* rarius; in paludosis ad pagum *Sian* frequens. Floret Majo.

T. XV. f. 7. Radix repens, articulata, squamis fusco-purpureis tunicata. Culmi dodrantales, demum sesquipedales, subfoliati, subtrigoni, striati, superne scabri. Folia radicalia angusta, subcarinata, supra scabra, subtus levissime pubescentia, culmo florenti breviora; culmea lavia apice scabra. Spica terminalis mascula, teres, subtrigona; laterales duæ (sepe unica) femineæ, triplo minores, oblonga, sessiles, (I) subapproximata, demum pendiculata, remotiores. (II. III) Bractæ foliaceæ, subvaginantes; quarum inferior masculana demum superans; superior propria spicula paulo longior. Cal. squamæ mascula oblonga, obtusiflora, (a A ♂) ferrugineo-purpurea, nervo lato flavescente, margine albido, inferiores majoros; feminea duplo minores, ovato-acuminata, (a ♀) purpurascentes, nervo viridi. Capsulæ 15 s. 20, subglobosa, albido-villosa, apice vix prominulo bifido. (p. P.) Semen triquetrum, uti in reliquis, stylo brevi apice vix prominulo terminatum. (s. S.)

718. CAREX, *filiformis*, spica mascula oblonga, femineis sessilibus oblongis: inferiore foliolo proprio breviore. Linn. Spec. 1385.

α . Varietas minor (Hall. 1381?) Scheuchz. Agr. 433. no. 4.

β . - - - major (Hall. 1383?) Scheuchz. Agr. 425. no. I.

γ . - - - media (Hall. 1387?) Scheuchz. Agr. 428. no. I.

H. α . in pascuis pomariis & pratis siccis copiosissime. Floret Martio, Aprili; β . in sylvaticis montosis im *Beilstein*; γ . in collibus siccis am *Homberg* rarius. Floret Aprili, Mayo.

T. XVI. f. 5. Radix repens. Culmi in α , palmatae, β , ultrapedales, filiformes, γ , spithamei; subnudis, trigoni, laves. Folia subangusta, carinata, recurva, firma, subscabra, Spica terminalis

minalis mascula, oblonga, obtusa, ferruginea; duæ vel tres feminæ, approximata, breviores, sessiles, demum subpedunculata. Bractæ subvaginantes, setacea: inferiore propria Spicula (sepo) longior. Calycinæ squamæ luteo-virentes, subfuscæ, nitidae; mascula obtusifuscæ, (σ . a) feminæ truncata interjecto mucrone. (φ a) Capsulae subhirtæ, (P. p) conferta.

In Var. β (III) Spica feminæ longius pedunculata.

Var. γ . Spicas feminæ remotiores, 3-4- f. s. 5, pedunculata: quarum mascula proxima androgyna, s. superne partim mascula. Capsulae in hac sepo ustilaginea, globosa, crusta cinerea, nitida, indurata, duplo majores.

c. Spicis sexu distinctis: feminæ pedunculatis.

719. CAREX, limosa, spicis ovatis pendulis: mascula longiore erectiore, radice repente, Linn. Spec. 1386. (Hall. 1392.)

β . Cyperoides palustre, spicis purpureo-spadiceis, tenuibus pediculis insidentibus. Scheuchz. Agr. 467. (Hall. 1408.)

H. α , & β , in pratis sylvaticis uidis; juxta rivulos hinc dem Homberg frequens. Floret Majo.

T. XV. f. 3. Radix repens, stolonifera. Culmi 1- f. 2-pedales, subtrigonis, leaves, basi foliatis. Folia numerosa, carinata, latinscula, firma, recurva, scabra, albido-viridia: Vaginis inferioribus purpureis. Spicae atro-purpureae: terminalis mascula: in Var. α unica; in β duas seu tres, pedunculate, terminali breviores, gracilioresque, squamula ovata acuta bracteata. (σ) Spicae feminæ 2 f. 3, ovata: in β oblonga, ventricosa, pedunculata, versus culmi apicem prodeuntes, erecta, demum pendula. (φ) Bractæe foliacea: insima vaginans, longitudine culmi; superior multo angustior, sessilis, propria spica vix longior; utramque basi duabus auriculis exiguis, atro-spadiceis sucta. Cal squamae oblongæ: feminæ nervo dorsali lato flavescente, apice prominulo; (φ A) mascula

N 5

*mascula obtusae, consimili nervo, (a A ♂) in Var. α,
fere nullo conspicuo instructa. Nectarium flar-
vum, sepe atrum, subpurpureum. Capsulae den-
tissime conferta, depresso-*scula*, basi producta, ca-
lyces superantes. (p.)*

720. CAREX; *capillaris*, spicis pendulis: *mascula*
erecta, femineis oblongis distichis, capsulis
*nudis acuminatis. Linn. Spec. 1386? (Hall.
1394.)*

β. *Carex spicis femininis pendulis, raris, prælongis, capsulis*
rostratis bifidis. (Hall. 1395.)

H. α, in pratis uidis sylvaticis im Güldnersgrund; ad pagum
Erbach; β, in sylvis in der Heerde frequens. Floret
Majo.

T. XV. f. 2. In Var. α, Culmus dum floret vix di-
gito longior, demum spithameus; Capsulis pauciori-
bus, alternis, remotiusculis, subdistichis. Var. β. om-
nibus partibus major: Radix subrepens. Culmi
spithamei, demum bipedales, foliati, triquetri,
infirmi, leves; inter spicas supremas tantum sca-
bri. Folia radicalia longitudine culmi, latiuscula,
carinata marginibus replicatis; subtus levia, mar-
gine & pagina superiore scabra. Fol. culmea pla-
niora, utrinque levia. Spica terminalis mascula,
(♂) teres, subtrigona; femineae 4, saepius 5,
remotissimae, graciliores, 1 - 2 - 3 - pollicares;
quarum suprema masculae approximata subsessilis;
reliqua pedunculis filiformibus, triquetris, infi-
mis longissimis, pendulae. Bracteae foliaceae, vagi-
nantes, masculae apicem plerumque non superantes;
superiore propria Spica demum breviore. Cal. squamæ
masculae oblongæ, acutæ, albidae, nervo viridi;
(a. ♂) femineæ ovato-setaceæ. (A. ♀) Capsulae
ventricosæ, subtrigonæ, erectæ, inferiores remotio-
res, alternæ; superiores subtriangulariæ, approxi-
matae; rostro longo, setaceo, recto, (p. P.) apice
bispidato.

721. CAREX, *pallens*, spicis pendulis; mascula erecta, femineis ovatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. Linn. Spec. 1386. (Hall. 1393.)

H. in pratis uidis passim. Floret Mayo.

T. XV. f. 4. Radix multiplex, fibrosa. Culmi numerosi, aggregati, spithamei s. pedales, subfiliati, triquetri, scabri. Folia radicalia latiuscula, subcarinata, hispida. Fol. culmea s. f. 6, consimilia, supremo culmo longiore: Vaginis subvillosis. Spica terminalis mascula, (σ) teres, subferruginea; femineae duas s. tres pedunculatae, subremotae: florentes ovatae, erectae, (Fig. infer.) fructu maturo subovatae, pendulae. (Fig. super.) Bracteae foliaceae subvaginantes, basi transversim undulatae - plicatae: quarum infima auriculis duabus basi aneta, longitudine masculae; subsequens angustior: tertia setacea, propria spica vix longior. Cal. squamae masculae obovatae, acutae; (σ A.) feminea ovatae, acuminatae, minores, grisea-virentes, capsulis breviores; (a ♀) Capsulae confertae, oblongae, inflatae, obtusissimae, (p. P.)

722. CAREX, *panicea*, spicis pedunculatis erectis remotis; femineis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis. Linn. Spec. 1387. (Hall. 1405.)

H. in pratis uliginosis passim. Floret Aprili, Mayo.

T. XV. f. 5. Radix repens. Culmi spithamei, demum pedales, erecti, incurvi: inferne foliati, teretes, superne nudi, obtuse-trigoni, laeves. Folia latiuscula, subcarinata, scabra, subtus glauco-viridia, culma breviora. Spica terminalis mascula, cylindrica; femineae duas (saepe unica) pedunculatae, erectae, lineares, graciliores, longiores, remotae. Bracteae foliaceae, vaginantes, convexae, inferiore demum propria spicula via longiore. Cal. squamae

squamæ atro-purpureæ, nervo flavo, albido-marginaliæ: masculæ oblongæ, obtuse; (♂ a) feminea ovata, acuta, (♀. a.) capsulis breviores. Capsulae paucæ, inflatae, subglobosæ: vel conformatiores flavescentes, vel remotiores alterne, saepe arræ, apice brevissimo bifido, recurvo. (p. l.)

Variat a. *Spica feminea suprema saepe androgyna; b, Spica feminea tertia ex basi culmi prodeunte, longissime pedunculata; c) Capsulis ustilagine corropsis, majoribus, globosis, crusta cinerea nitida induratis.*

d. *Spicis sexu distinctis: masculis pluribus.*

723. CAREX, acuta, spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusifusculis.
Linn. Spec. 1388.

nigra, ♂. Cyperoides nigro-luteum vernum minus. Scheuchz. Agr. 450. (Hall. 1406.) Tab. XVI. Fig. I. ♀.

rufa ♂. Cyperoides latifolium spica rufa, sive caule triangulo. Scheuchz. Agr. 458. (Hall. 1404) Tab. XVI. Fig. I.

H. ♂, in pratis inundatis passim; ♂, ad ripas Dille, auf der Weißärberwiese, &c alibi frequens. Floret Majo.

T. XVI. f. I. ♀. Var. ♂., Culmo palmari, l. spathacea, spicis omnibus atris, magis approximatis, & feminea saepe unica tantum, absque nervo viridi squamarum, differt.

T. XVI. f. I. Var. ♂. Radix crassa, subrepens. Culmi 2-3-pedales, triquetri, firmi, hispidae, ad medium usque foliati. Folia culmea lacinicula, carinata, apice involuta, marginibus & partim carina hispida, superiora longitudine culmi. Spica terminalis & tres l. quatuor laterales masculæ, sessiles, alternæ, approximate: quarum unica ex infimis saepe androgyna, ad basin pluribus spiculis minimis aucta. Spicae femineae duae, rarius tres, remotæ, cylindraceæ, masculis longiores; florentes sessiles, fructu maturo pedunculata, erecta, subangulata. Maic, Bractææ atro-spaticeæ,

dicee, truncata interjecto mucrone setaceo, nervo viridi. Androgynae Bractea foliacea, angusta, sessilis, basi auriculata, propria spica longior. Fem- Bracteae Folia sessilia, masculam terminalem non su- perantia, duo tantum cuimi latera basi amplectentia, auriculata: squamis 2, subrotundis, atro-spa- diceis, tertio lateri culmi adpresso. Cal. squamae obovata, spadicea, nervo viridi plus minusve con- spicuo. Stylus in hac semper bifidus. (o. O.) Capsulae hinc convexe bisulcate, inde planiscula apice brevissimo bifido, calyce majores. (p. P.)

724. CAREX, vesicaria, spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis; capsulis inflatis acumi- natis. Linn. Spec. 1388.

α . Cyperoides vesicarium, spicis viridantibus & subfuscis. Scheuchz. Agr. 470? (Hall. 1409?) Tab. XVI. Fig. 2. II.

β . Cyperoides latifolium, spica spadiceo - viridi majus. Scheuchz. Agr. 464. & Cyperoid. angustifol. 452. (Hall. 1398. & 1399?) Tab. XVI. Fig. 2. I.

γ . Cyperoides vesicarium, spicis teretibus erectis majus. Scheuchz. Agr. 476. (Hall. 1401?) Tab. XVI. Fig. 2. III.

H. α & β in paludosis ad pagum Sinn; γ , in fossis ur- bis & cemeterii; auf dem Judentrueyer; ad ripas Dilla und Steinern Waag frequens. Floret Mayo.

T. XVI. f. 2. Var. α , (II) differt: Foliis angusti- simis, longissimis; Spicis femineis gracilioribus, pendulis: (φ) quarum infima saepe minoribus spiculis basi aucta; Capsulis minoribus divergentibus. Var. β . (I) Spicis masculis paucioribus, (saepe 2,) crassioribus; (σ) infima androgyna; (σ φ) Capsulis ellipticis, convexis, subfuscis. (I p) Hac plurimis notis fructu maturo ad Car. acutat var. β accedit, at stylus semper trifidus.

Var. γ , (III.) Radix crassa, profundissime desca- dens. Culmi 2 - s. 3 - pedales, foliati, triquerris, hispidae. Folia lata, carinata, hispida, culma longiora. Spicae masculae 2 s. 3 terminales, sub- remota, sessiles, cylindracea: deflorata ventricosiores, squamis laxis. Spicae femineae 2. rarius 3, pen- dulae

dunculata, *remota*: *florentes graciles*, (♀ , *fig. infer.*) *maturo fructu crassiores, erecta*. (♀ , *fig. super.*) *Bracteae foliacea, subvaginantes, inferiores culmum superantes*. *Cal. squamae subfuscæ, nervo viridi: masculæ oblongæ, acutiusculæ; (a A. ♂) femineæ lanceolato-setacea, (♀ a.) Capsulis breviores. Stylus Nectario acutissime bifido (1 L*) brevior, (n N.) constanter trifidus. (o) Capsulae erecto-patentes, inferiores remotiores: ventricosæ, inflatae, striatae, flavescentes, collo acuminato, brevissime birostris. (p. P.)*

725. *CAREX*, *birta*, *spicis remotis: masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis. Linn. Spec. 1389. (Hall. 1403.)*

H. in pratis uidis im Stübersgrund copiose; ad fossas in det Altxbach frequens. Floret Majo.

T. XVI. f. 3. *Radix crassa, teres, subarticulata, squamis vestita setosis; horizontaliter profunde sub terra repens. Culmi spithamei; demum ultrapendales, subfoliati, subtrigoni, inter spicas triquetri. Folia latiuscula, carinata, firma, scabra. Spica terminalis, &c f. 2 laterales duplo minores masculae, sessiles, oblongæ, ventricosæ, subapproximatæ; Bracteis sessilibus, setaceis, brevibus: (o) quarum infima carinata, longitudine propriæ spicæ. Spicae femineæ duæ, a masculis remotæ, pedunculatae, erectæ, florentes graciles. (L. ♀) Bracteae foliacea, vaginantes, carinatae, longitudine masculæ terminalis. Cal. squamae masculatae obovatae, purpurascentes, nervo viridi apice prominulo; (o) femineæ lanceolato-setacea, capsulis longiores; inferiores remotiores, alternæ. (♀ a. p) Nectarium apice profunde bifidum. (L. l.) Capsulae ventricosæ, acuminatae, subbicornes, (p.) supra planiusculæ.*

In hac Vaginae, Folia, Culmi apex, Squamae masculæ, Capsulae, omnia albido villosa. Pedunculi & Squamae femineæ tantum nuda levata.

SPAR.

SPARGANIUM. G. P. 1041.

TAB. XIII. f. II. MASC. Amentum subrotundum.
 (♂) Cal. 3- phyllus. (c. ♂ C.) Cor. nulla.
 FEM. Amentum subrotundum. (♀) Cal. 3-
 phyllus, (♀ c. C.) Cor. nulla. Stigma bi-
 fidum. (o) Drupa exsuccea, (p) 1- sperma.
 (r. u. s.) S. N. 615.

726. SPARGANIUM, *erectum*, foliis erectis trique-
 tris. Linn. Spec. 1378. (Hall. 1303.)

H. in fossis urbis im *Quadenveyer*; ad ripas *Dilla am Bockshayn*,
 alibique frequens. Floret Junio.

Spica simplici & ramosa variat. Calycis foliola erecta, su-
 perne latiora, apice inflexo subtrifido. (c) Stamina Calyx lon-
 giora. (m. M.) Stigma sapissime unicum; rima longitudinali;
 (O* o) rarius duo. (o) Drupa (p) Nucleum plerumque
 unicum, (r) angulatum, (u) monospermum, (s,) condens.

TYPHA. G. P. 1040.

MASC. Amentum cylindricum. Cal. obso-
 letus, 3- phyllus. Cor. o.

FEM. Amentum cylindricum, infra masculi-
 los. Cal. capillo villoso. Cor. o. Sem. 1,
 insidens Pappo capillari. S. N. 614.

727. TYPHA, *latifolia*, foliis subensiformibus, spica
 mascula feminineaque approximatis. Linn. Spec.
 1377. (Hall. 1305.)

H. in fossis & stagnis ad *Greiffstein* & *Emmerichenhayn*. Floret
 Julio. ♀.
 Typhæ fructificationis partes sufficienter examinare, mihi non
 dum licuit.

C. TETRANDRIA.

URTICA. G. p. 1054.

MASC. Cal. 4- phyllus. Cor. o. Nectarium
 centrale, cyathiforme.

FEM. Cal. 2- valvis. Cor. o. Sem. 1, nitidum.
 S. N. 621.

728. URTICA, *urens*, foliis oppositis ovalibus, Linn.
 Spec. 1396. (Hall. 1615.)

4. in

H. in cultis, juxta parietes & sepes hortorum passim. Floret Junio & sequ.

Pharm. URTICA MINORIS Herba.

729. URTICA, dioica, foliis oppositis cordatis, racemis geminis. Linn. Spec. 1396. (Hall. 1614.)

H. ad sepes ubique. Floret aestate.

Pharm. URTICA MAIORIS Herba, Radix.

In hac & precedente Calyx femineus tetraphyllus : foliolis duobus ovato-cordatis, duabus oppositis ovatis exiguis, quadruplo minoribus.

BETULA. G. P. 1052.

MASC. Cal. 1 - phyllus 3 - fidus, 3 - florus. Cor. 4 - partita.

FEM. Cal. 1 - phyllus, sub 3 - fidus, 2 - florus. Semina utrinque membrana alata. S. N. 621.

730. BETULA, alba, foliis ovatis acutiminatis ferratis. Linn. Spec. 1393. (Hall. 1628.)

H. in sylvis ad Ballersbach ; am Homberg. Floret Mayo.

Amenta mascula cylindracea brevia, solitaria vel gemina, simpliciter pendula. Calyx squamis constat tribus : media majore, pubescente, laterales 2 obtegente. Corollæ tres patentæ, laciniis inqualibus : quarum extima reliquis quadruplo major ; huic opposita multo minor, utraque oblonga ; reliqua due opposita, ovata, exiguae, staminibus breviores. Amenta semineæ solitaria cylindracea, graciliora, pedunculis petiolaribus pendula. Strobilus cylindricus, squamis membranaceis imbricatus. Semina alata.

731. BETULA, Alnus, pedunculis ramosis. Linn. Spec. 1394. (Alnus. Hall. 1630.)

H. ad ripas Diltz am Steinern Wang, & alibi frequens. Floret Aprili.

Amenta mascula inferiora, cylindracea, longa ; feminea superiora, pauciora, ex uno eodemque pedunculo ramoso pendula. Calyx squamis constat quintus : media maiori, laevi : laterales 4 semiobtegente. Corollæ 3 aquales : laciniis erecto-patulæ. Strobilus ovatus ; squamus coriaceæ, duræ, ternis semper oppositis instructus. Semina depresso-nuda, non alata.

D. PO.

D. POLYANDRIA.

Stamina plura quam 7.

MYRIOPHYLLUM. G. P. 1066.

MASC. *Cal. 4.* phyllus. *Cor. o.* *Stam. 8.*FEM. *Cal. 4.* phyllus. *Cor. o.* *Pistill. 4.* *Stylus o.* *Sem. 4,* nuda. S. N. 628.

732. MYRIOPHYLLUM, *spicatum*, floribus masculis interrupte spicatis. Linn. Spec. 1409. (Pentapteris Hall. 993.)

H. in fossis & fluviiis; auf der neuen Wiese, in der Mühlbach, in der Dille vor dem Gebäude frequens. Floret Julio.

Masc. Flores corollati, dupli Calyce instructi; quorum exterior 4-phyllus: foliolo extimo ovato, acuto; lateralibus 2 duplo minoribus; quarto cauli proximo exiguo, saepe nullo. Calyx corollæ monophyllos, semi quadrifidus: lacinias erecto patulis, ovatis, acutis, serratis. Corollæ Petala quatuor, calycis intus insertæ, oblonga, convexa, erectiuscula, subpurpurea, Stamina includentia, his erumpentibus mox decidua. Stamina petalis duplo longiora, erecta. Gerit enim exiguum in fundo Calycis sterile. Feminei flores apetali cum Descriptione Generica exacte convenient; Capsulas tamen 4 connatas, s. 4-loculares, 4-parribiles, singulam I-spermum, observe.

733. MYRIOPHYLLUM, *verticillatum*, floribus omnibus verticillatis hermaphroditis. Linn. S. N.

628. Spec. 1409. (Pentapteris. Hall. 992.)

H. in piscina Theriotrophei semel lectum. Flores nondum satis examinare licuit. Floret Julio.

CERATOPHYLLUM. G. P. 1065.

MASC. *Cal. multipartitus.* *Cor. o.* *Stamina 16-20.*FEM. *Cal. multipartitus.* *Cor. o.* *Pist. 1.* *Styl. o.* *Sem. 1,* nudum. S. N. 628.

734. CERATOPHYLLUM, *demersum*, foliis dichotomo-bigeminis, fructibus trispinosis. Linn. Spec. 1409. (Hall. 1599.)

H. in piscinis & fossis ad Beilstein. Floret Julio.

735. CERATOPHYLLUM, *submersum*, foliis dichotomis trigeminis, fructibus muticis. Linn. Spec. 1409.
H. cum precedente rarius. Floret Julio. +

POTERIUM. G. P. 1069.

MASC. Cal. 4- phyllus. Cor. 4- partita. Stam. 30-40.

FEM Cal. 4- phyllus. Cor. 4- partita. Pist. 2. Bacca e tubo corollæ indurato. S. N. 629.

736. POTERIUM, *Sanguisorba*, inerme, caulis subangulosus. Linn. Spec. 1411. (Pimpinella. Hall. 706.)

H. in pascuis & pratis fuccis ubique. Floret Junio.

Pharm. PIMPINELLA MINORISS. SANGUISORBA Herba. In fore masculo etiam Germen & stigmata; at imperfecta sterilitaque omnia, uti in VALERIANA dioica.

FAGUS. G. P. 1072.

MASC. Cal. 5- fidus, campanulatus. Cor. o. Stam. 12.

FEM. Cal. 4- dentatus. Cor. o. Styli 3. Capsula (Calyx antea) muricata, 4- valvis. Sem. 2. S. N. 630.

737. FAGUS, *sylvatica*, foliis ovatis obsolete serratis. Linn. Spec. 1416. (Hall. 1622.)

H. in sylvis per vulgaris. Floret Majo.

QUERCUS. G. P. 1070,

MASC. Cal. 5- fidus fere. Cor. o. Stam. 5-10.

FEM. Cal. 1- phyllus, integerrimus scaber. Cor. o. Styli 2-5. Sem. 1, ovatum. S. N. 629.

738. QUERCUS, *Robur*, foliis deciduis oblongis superne latioribus: sinibus acutioribus: angulis obtusis. Linn. Spec. 1414. (Hall. 1626.)

H. cum precedente, vastissimas Sylvas constituentes. Floret Majo.

Pharm. QUERCUS Folia, Cortex.

JUGLANS.

JUGLANS, G. P. 1071.

MASC. *Cal.* 1 - *phyllus*, *squamiformis*. *Cor.*
6 - *partita*. *Filamenta* 18.

FEM. *Cal.* 4 - *fidus*, *superus*. *Cor.* 4 - *par-*
tita. *Styli* 2. *Drupa* *nucleo* *sulcato*. S. N.
630.

739. JUGLANS, *regia*, *foliolis* *ovalibus* *glabris*
subferratis *subæqualibus*. Linn. Spec. 1415.
(Hall. 1624.)

H. *arbor* *culta* *intra* & *extra* *urbem*, *ver* *dem* *unum* *Ther.*
Floret *Majo*.

CORYLUS, G. P. 1074.

MASC. *Cal.* 1 - *phyllus*, 3 - *fidus*, *squamifor-*
mis, 1 - *florus*. *Cor* o. *Stam.* 8.

FEM. *Cal.* 2 - *phyllus*, *lacerus*. *Cor.* o. *Styli*
2. *Nux* *ovata*, S. N. 631.

740. CORYLUS, *Avellana*, *stipulis* *ovatis* *obtusis*.
Linn. Spec. 1417. (Hall. 1625.)

H. *in* *sylvis* *montosis*, *ad* *sepes* *passim*. Floret Martio.

CARPINUS, G. P. 1073.

MASC. *Cal.* 1 - *phyllus*: *squama* *ciliata*. *Cor.*
o. *Stam.* 20.

FEM. *Cal.* 1 - *phyllus*: *squama* *ciliata*. *Cor.* o.
Germina 2. *Styli* *singulis* 2. *Nux* *ovata*,
S. N. 631.

741. CARPINUS, *Betulus*, *squamis* *strobilarum* *pla-*
nis. Linn. Spec. 1416. (Hall. 1627.)

H. *in* *sylvis* *passim*. Floret Aprili, Majo.

E. MONADELPHIA.

PINUS, G. P. 1077.

MASC. *Cal.* 4 - *phyllus*. *Cor.* o. *Stam.* *pluri-*
ma. *Antheræ* *nudæ*.

O 2

FEM.

FEM. *Cal. strobili: squama 2 - flora. Cor. 8.*
Pist. 1. Nux ala membranacea excepta.
S. N. 632.

742. *PINUS, sylvestris, foliis geminis: primordia libus solitariis glabris. Linn. Spec. 1418. (Hall. 1660.)*

H. in sylvis montosis passim. Floret Mayo.
Pharm. PINI Turiones s. Summitates, Resina.

743. *PINUS, Abies, foliis solitariis subulatis mucronatis laevibus bifarium versis. Linn. Spec. 1421. (Hall. 1656.)*

H. in sylvis infrequens. Floret Mayo.
Pharm. ABIES Resina.

F. SYNGENESIA.

BRYONIA. G. P. 1093.

MASC. *Cal. 5 - dentatus. Cor. 5 - partita. Filamenta. 3.*

FEM. *Cal. dentatus. Cor. 5 - partita. Stylus 3 - fidus. Bacca subglobosa, polysperma.*
S. N. 640.

744. *BRYONIA, alba, foliis palmatis utrinque calloso - scabris. Linn. Spec. 1438. (Hall. 574.)*

H. in dumetis & sepibus passim. Floret Junio, Julio.
Pharm. BRYONIAE Radix.

Bryonia nostra constanter est dioica. Mas & Femina loco natali plerumque a se invicem remotissimo crescunt; Semel tantum, & quidem unico in loco, in sepibus ad viam: nach dem Rosenväldzen, Feminam cum Mare promiscue scandentem observavi, Caulibus tamen ex diversa Radice provenientibus.

Maris Pedunculi folio longiores, multi - (10 - 20) flori; Pedicellis pedunculo brevioribus, sparsis. Floribus majoribus sterilibus, desiduis: Antheris polliniferis; Pistillo nullo instructis. Feminæ Pedunculi brevissimi, pauci - (3 - 6) flori; Pedicellis umbellaribus vel subcymosis, sub florescentia pedunculo longioribus. Floribus triplo minoribus, albidosoribus: Staminibus nullis; Pistillo perfecto fertili: Bacca globosa, rubra, 5 f. 6 - sperma.

CLASSIS.

CLASSIS XXII.

D I O E C I A.

A. D I A N D R I A.

SALIX. G. P. 1098.

MAS. *Amenti squamæ. Cor. o. Glandula basi
seos nectarifera.*

FEM. *Amenti squamæ. Cor. o. Stylus 2-fidus.
Caps. 1-locularis, 2-valvis. Sem. pap-
posa. S. N. 647.*

a. *Foliis glabris serratis.*

745. SALIX, *triandra*, foliis serratis glabris, flori-
bus triandris. Linn. Spec. 1442. (Hall. 1637.)

H. Mas, ad ripas Dilla gegen dem Schiesplatz über; Femina
bey dem Sinnerhoff. Floret Majo.

*Amenta pedunculata, foliata. Glandula duplex singula squama:
unica major, convexa, subemarginata, supra filamenta squama
basi, & unica minor infra filamenta squamae medio
affixa. Similes glandulas duplices, figura & magnitudine
diversas, in omnibus fere Salicibus nostratis observarvi.
In nonnullis utraque glandula basi coalita, filamentorum basin ve-
stiens; in aliis inferior longior ipsa superiori, in aliis vice versa.*

746. SALIX, *phylicifolia*, foliis serratis glabris lan-
ceolatis: crenis undatis. Linn. Spec. 1442.

H. Mas, in salicetis bey dem Sinnerhoff. Floret Majo.

747. SALIX, *vitellina*, foliis serratis ovatis acutis
glabris: serraturis cartilagineis, petiolis calloso-
punctatis. Linn. Spec. 1442. (Hall. 1635. 3?)

H. Mas, an der Mühlbach; am Sieghäuserweg. Floret
Majo.

748. SALIX, *amygdalina*, foliis serratis glabris lan-
ceolatis petiolatis, stipulis trapeziformibus.
Linn. Spec. 1443. (Hall. 1636.)

H. Femina, ad ripas Dilla gegen dem Schiesplatz über, inter
s: triandr. & fragilem. Floret Aprili.

749. SALIX, *bastata*, foliis serratis glabris subova-
tis acutis sessilibus, stipulis subcordatis. Linn.
Spec. 1443. (Hall. 1654?)

H. in salicetis auf der Sandwiese parcus. Floret Aprili & Mayo.

750. SALIX, *fragilis*, foliis serratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentatq. - glandulosis, Linn. Spec. 1443. (Hall. 1638.?)

H. Mas, & Femina ad ripas Dilla; am steinern Waaag. Floret Mayo.

751. SALIX, *purpurea*, foliis serratis glabris lanceolatis: inferioribus oppositis. Linn. Spec. 1444. H. Mas, an der Mühlbach; bey dem Sieghaus. Floret Mayo.

752. SALIX, *Helix*, foliis serratis glabris lanceolato-linearibus: superioribus oppositis obliquis. Linn. Spec. 1444. (Hall. 1640.)

H. Mas ad ripas Dilla, auf der Weißgärberwiese; & alibi non infrequens. Floret Aprili.

Amenta in junioribus ramis opposita, in adultioribus alternatae: Squamis constanter monandris. Anthera crass., tetradyma, juvenilis coccinea.

753. SALIX, *myrsinites*, foliis serratis glabris ovatis venosis. Linn. Spec. 1445. (Hall. 1645?)

H. Femina, an der Mühlbach bey der oberen Walckmühle; ad margines pratorum auf dem Schüssel. Floret Aprili.

b. Foliis integrimis, villosis.

754. SALIX, *aurita*, foliis integerrimis utrinque villosis obovaris appendiculatis. Linn. Spec. 1446. (Hall. 1652.)

H. Femina, in sylvaticis am Homberg; in sepibus am Heiligen-
Hof. Floret Mayo.

755. SALIX, *arenaria*, foliis integris ovatis acutis: supra subvillosis, subtus tomentosis. Linn. Spec. 1447. (Hall. 1642.)

H. Mas, ad ripas Dilla, auf der Weißgärberwiese; Femina an der Mühlbach bey dem Sieghaus, alibique. Floret Aprili.

c. Foliis subferratis, villosis.

756. SALIX, *caprea*, foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis undatis, superne denticulatis. Linn. Spec. 1448. (Hall. 1653.)

H. Mas, unter der neuen Brücke; Femina, in der Gellenbach, vulgaris. Floret Aprili.

757.

757. *SALIX, viminalis*, foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. *Linn. Spec. 1448.* (*Hall. 1641.*)

H. *Mas*, ad ripas *Dille unter der neuen Brücke*; *Femina* ibidem & *am steinern Waag*. Floret Aprili,

758. *SALIX, cinerea*, foliis subserratis oblongo-ovatis: subtus subvillosis, stipulis dimidiato-cordatis. *Linn. Spec. 1449.*

H. *Femina*, ad ripas *Dille* cum præcedente. Floret Aprili.

759. *SALIX, alba*, foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque pubescentibus: serraturis infimis glandulosis. *Linn. Spec. 1449.* (*Hall. 1635.*)

H. *Femina*, *an der Mühlbach*; *am Sieghäuserweg*. Floret Majo,

B. TETRANDRIA.

VISCUM. G. P. 1105.

Mas. Cal. 4-partitus. Cor. o. Filamenta. o. Antheræ calyci adnatæ.

FEM. Cal. 4-phillus, superus. Stylus o. Cor. o. Bacca 1-sperma. Sem. cordatum. S. N. 650.

760. *VISCUM, album*, foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *Linn. Spec. 1451.* (*Hall. 1609.*)

H. in *Pyro*, *Malo*, imprimis *Quercu*, parasitica; ad pagum *Seelbach* frequens. Floret Martio.

Pharm. Viscum Lignum.

C. PENTANDRIA.

CANNABIS. G. P. 1115.

MAS. Cal. 5-partitus. Cor. o.

FEM. Cal. 1-phillus, integer, latere hisans. Cor. o. Styli 2. Nux 2-valvis, intra calycem clausum. S. N. 653.

761. *CANNABIS, sativa*. *Linn. Spec. 1457.* (*Hall. 1616.*)

H. in cultis & agris, inter segetes in der Aue rarius. Floret Julio.

Pharm. CANNABIS Semina.

HUMULUS, G. P. 1116.

MAS. Cal. 5 - phyllus. Cor. o.

FEM. Cal. 1 - phyllus, oblique patens, integer. Cor. o. Styli 2. Sem. 1, intra calycem foliatum. S. N. 653.

762. HUMULUS, *Lupulus*, Linn. Spec. 1457. (*Lupulus*. Hall. 1618.)

H. in dumetis & sepibus am Sieghäusernweg; alibique copiose. Floret Julio.

Pharm. LUPULI Flores, (potius Strobili.)

D, OCTANDRIA,

POPULUS, G. P. 1123.

MAS. Amenti Cal. lamina lacera. Cor. turbinata, obliqua, integra.

FEM. Amenti Cal. & Cor. maris. Stigma 4-fidum. Caps. 2 - locularis. Sem. multa, papposa. S. N. 656.

763. POPULUS, "alba", foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. Linn. Spec. 1463. (Hall. 1634.)

H. Mas, ad pagos frequens; ad ripas Dilla alibique parcus. Floret Martio, Aprili.

Gemmae floriferæ ovata, fusca, nitida: squamis interioribus marginæ laceris, scariosis. Amenta crassiora, longiora, quam in *P. nigra*, ex ovata basi cylindracea. Cal. squamæ semimultifida: lacinia simplicibus, villosis. Stamina 8.

764. POPULUS, *tremula*, foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. Linn. Spec. 1464. (Hall. 1633.)

H. Mas in sylvaticis am Geistlichenberg, alibique frequens; Femina am Hirschberg bey der Hoerbacher Mühle. Floret Martio.

Hujus partes fructificationis uti in precedente.

765. **POPULUS, nigra**, foliis deltoidibus acumina-
tis ferratis. *Linn. Spec.* 1464. (*Hall.* 1632.)

H. Mas ad ripas Dilla passim. Floret Martio.

Pharm. **POPULI** Gemmæ,

Gemmæ toriferæ ovato-oblongæ, acuminata: squamis integris,
viscofisis. Amenta cylindracea. Cal. squamae 3-f. 4-pa-
rata: laciniis pinnatifido-multifidis, nudis. Stamina 16.

E, ENNEANDRIA,

MERCURIALIS. G. P. 1125.

MAS. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o. *Stam.* 9-f. 12,
Antheræ globosæ, didymæ.

FEM. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o. *Styli* 2. *Ca-
psula* dicocca, 2-locularis; 1-sperma.
S. N. 657.

766. MERCURIALIS, *perennis*, caule simplicissimo, fo-
liis scabris. *Linn. Spec.* 1465. (*Hall.* 1601.)

H. in nemorosis ad Erbach copiosissime, in sylvaticis mon-
tosis am Homberg über der Lithau; am Callenbachsberg rarius.
Floret Aprili, Majo.

767. MERCURIALIS, *annua*, caule brachiato, foliis
glabris, floribus spicatis. *Linn. Spec.* 1465.
(*Hall.* 1600.)

H. in cultis inter olera rarius. Floret Julio.

Pharm. MERCURIALIS Herba.

F, MONADELPHIA,

JUNIPERUS. G. P. 1134.

MAS. Amenti Calyx squamæ. *Cor.* o. *Stam.* 3.

FEM. Calyx 3-partitus, Petala 3. Styli 3.

Bacca 3-sperma, tribus tuberculis calycis
inæqualis. *S. N.* 660.

768. JUNIPERUS, *communis*, foliis ternis patentibus
mucronatis, bacca longioribus. *Linn. Spec.*
1470. (*Hall.* 1661.)

H. sylvis & montosis sterilibus passim. Floret Aprili, Majo.

Pharm. JUNIPERI Radix, Lignum, Baccæ, Resina; (SANDARACA.)

Antheræ sub squamis lateralibus saepe 5.

O S

CLASSIS

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

A. MONOECIA.

HOLCUS. G. P. 1146.

HERMAPHROD. Cal. Gluma 1 - l. 2 - flora.

Cor. Gluma aristata. Stamina 3. Styli 2.

Sem. 1.

MASC. Cal. Gluma 2 - valvis. Cor. Q. Stam. 3. S. N. 669.

769. HOLCUS, *mollis*, glumis bifloris nudiusculis: flosculo hermaphrodito mutico; masculo aristata geniculata. Linn. Spec. 1485. (Avena. Hall. 1485.)

H. in dumetis & sepibus in der Alzach; am Geistlichenberg; im Fischruveyhergrund copiose. Floret Julio, Augusto.
 T. VII. f. 7. Radix repens. Culni pauci, 2 f. 3 - pedales, folium 7- f. 9 - nodes, laves, prostrati, vel erecti: articulis infimis 3 f. 4 procumbentibus: Geniculis subrotundis, villosis. Folia late, plana, apicem versus involuta, levia, supra villis raris vix per lentem conspicuis tactu molles: Vaginis lavibus: Ligula evata, crenulata. Panícula 3 - f. 4 - pollicaris, sub florescens patens, albida; demum contracta, flavescens. Pedunculi ♂ Pedicelli gemini, pauciflori, patentes, stricti, levissime villosi basi callosi. Calyx inequalis, ovato-acuminatus, compressus carinatus, subciliatus: (a. A) Valv. exterior brevior, acuta albido-virens, basi purpurascens: interior major, mucronata, nervis tribus viridis: quorum duo laterales carina approximatis, eidemque parallelis, a margine remotis. Flosculi duo calyce minores: quorum inferior subsessilis, hermaphroditus: (Q.) superior pedicellatus, masculus, angustior; (♂) singulari Valv. exterior ventricosa, trinervia, interior plana, mutica, subæqualis. Masculus infra apicem Aristam exserit dorsalem, seabram, rectam, demum geniculò subreflexam, (♂ X.) Calyce longiorē. In utroque Flosculo Stamina tria, calyce breviora: Antheris flavescencibus. Hermaphroditī Nectaria 2, lanceolato-acuminata (l. L.) Germine longiora. Germinis subovatum. (n. ♀) Styli patentes, plurimō, Semen ovatum, acutum,

acutum, corolla adnatum, (f. S.) calyce rectum. (a. f.)
Maris Germen Nectarinaque exigua. (♂, n) Styli brevif-
simi, villosi. Semen abortiens.

Variat varius: a) Flosculo utroque Hermaphrodito, fertili.
 b, Calyce uno alterove trivalvi, trifloro: quorum in-
 sumus flosculus masculus; reliqui duo pedicello opposito affixi
 hermaphroditi, unus infra apicem Aristam unicaem, alter ex
 ipso apice Aristas duas exserit rectas.

770. *HOLCUS, lanatus, glumis bifloris villosis:*
flosculo hermaphrodito mutico, masculo ari-
sta recurva. Linn. Spec. 1485. (Avena. Hall.
1484.)

T. VII. f. 6. Radix multiplex, densa, fibrosissima, radiculis subrotundatis.
 Culni plurimi, aggregati, foliati, eretti, articulo uno alteroве infe-
 riore aliquo: Geniculis 3 f. 4, cylindraceis, incrassatis, villosis.
 Folia lata, plana, utrinque mollissime villosa: Vaginis tassis,
 striatis, villosis, suprema ventricosore; Ligula truncata crin-
 culata. Panicula 4 f. 6- pollicaris, patens, subdiffusa, vagie
 & pulchre colorata, demum palefens. Pedunculi gemini,
 multiflori, horizontales, mollissime sericeo-villosi. Calyx bi-
 florus uti in praecedente, glumis majoribus, oblongioribus, pu-
 bescensibus, magis coloratis, carina setis patulis distinctioribus
 ciliatis: (a A) interioris Valvulae Nervi laterales duo a ca-
 rina remoti, margini (nec carina) paralleli. Flosculi duo
 uti in H. molli; Hermaphroditus setis paucis basi subhirtus. (♀)
 Maris Arista glabra, recta, (X*) demum recurva, uncinata,
 calyce brevior. (X ♂) Antherae rubra seu flava, Nectaria
 duo lanceolata, longitudine germinis. (1 L.) Germen Horm-
 phroditi, (n. N. ♀.) Maris, (n. N. ♂) & reliqua uti
 in H. molli. In hoc sensu observantur: Flosculi pauci in ra-
 mulis Panicula inferioribus minores, albidi, steriles, emarginati
 penduli.

VALANTIA. G. P. 1151.

HERMAPHROD. Cal. o. Cor. 4-partita. Stam. 4-
 Stylus 2-fidus. Sem. I.

MASC. Cal. o. Cor. 3-f. 4-partita. Stam. 3-
 f. 4. Pistillum obsoletum. S. N. 672.

771. *VALANTIA, Cruciata, floribus masculis qua-*
drifidis, pedunculis diphyllis. Linn. Spec. 1491.
(Galium. Hall. 709)

H. in

H. in dumetis & sepibus ad pagum Breitscheid copiose; auf dem Schiesplatz, parcus. Floret Majo, Junio.

Pharm. CRUCIATA Herba.

Radix fibrosa, perennis. Caules plures, simplices, infirmi, erecti, rufi, tetragnoni, pilosi. Folia quaterna, ovato-lanceolata, marginibus carinaque pilosa. Pedunculi axillares, utrinque tres, diphylli, pilosi, trifidi: Pedicellus intermedius simplex, brevior. Flore hermaphrodita, (a) seu a parte masculina sterilis, fructifero, instructus; duo laterales ramoso-quadrifidi: quarum infimus Peduncellus utrinque Florem hermaphroditum (b) seu a parte feminea sterilem; reliqui tres Flores masculos (c) preferunt. Flores masculi (c) Antheris polliniferis. Pistillo nullo instructo, steriles, decidui. Hermaphroditi (b,) Antheræ pollinifera; Germen exiguum; Stylus bifidus, brevissimus; Fructus rudimentum abortiens, nutans. Hermaphrodite Floris (a) Antheræ polline destituta; Germen didymum; Stylus semibifidus; Fructus unicus plerunque, altero abortiente, reniformi-globosus, glaber, nervosus, monospermus; pedicello revoluto, foliis reflexis caulinque arcte adpresso occultatus. Foliolis floralibus tribus, Floribusque tam masculis quam hermaphroditis quinquefidis, sapo ludit.

ACER, G. P. 1155.

HERMAPHROD. Cal. 5 - fidus. Cor. 5 - petala. Stam. 8. Pistill. 1. Caps. 2 f. 3, mono-spermae, ala terminatæ.

MASC. Cal. 5 - fidus. Cor. 5 - petala. Stam. 8. S. N. 674.

772. **ACER, Pseudo-Platanus**, foliis quinquelobis inaequaliter serratis, floribus racemosis. **Linn.** Spec. 1495. (Hall. 1029. *****)

H. pulcherrima arbor altitudine cum Quercu certans, in nemoribus Stein-Kammern vulgo dictis, ad pagum Erbach frequens. Floret Majo.

Racemi subovati, cornuti, Flores flavo-virentes. Capsularum ala crassa.

773. **ACER, Platanoides**, foliis quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, floribus corymbosis. **Linn.** Spec. 1496. (Hall. 1029. ****)

H. in sylvis im Hirschberg rarius. Floret Majo. *

774. **ACER, campestre**, foliis lobatis obtusis emarginatis. **Linn.** Spec. 1497. (Hall. 1029. *****)

H. in

H. in sepibus hortorum passim sterilis; in sylvaticis montosis am Beilstein ad viam publicam & am Callenbachsberg fertilis. Floret Majo.

Corymbi triplices flores, flavi: a, Flores masculi reliquis m̄nores: Antheris polliniferis; Pistillo nullo; b, Hermaphroditi: Antheris polliniferis Pistilloque imperfecto sterili; c, Fl. hermaphroditae majores: Filamentis corolla brevioribus, Antheris polline destitutis, Pistillo perfecto fertili, infracte, Capsularum ala patentes. Receptaculum proprium columnare, apice bifidum.

ATRIPLEX G. P. 1153.

HERMAPHROD. *Cal. 5 - phyllus. Cor. o. Stam.*

5. *Stylus 2 - partitus. Sem. 1; depresso.*

FEM. *Cal. 2 - phyllus. Cor. o. Stam. o. Stylus 2 - partitus. Sem. 1; compressum. S. N. 673.*

775. *ATRIPLEX, bortensis, caule erecto herbaceo, foliis triangularibus.* *Linn. Spec. 1493.*

H. in cultis in der Pitze, quasi spontanea frequens. Floret Julio.

776. *ATRIPLEX, bastata, caule herbaceo, calycinis valvulis feminineis magnis deltoidibus sinuatis.*

Linn. S. N. 673. Spec. 1494. (Hall. 1617.)

H. ad vias, in cultis in der Pitze; vor dem Hemberg, & alibi frequens. Floret Julio, Augusto.

Calycinæ valvulæ feminineæ haud raro in hac etiam disco dentata.

777. *ATRIPLEX, patula, caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco dentatis.* *Linn. Spec. 1494. (Hall. 1616*)*

H. in cultis passim. Floret Julio, Augusto.

B. D I O E C I A.

FRAXINUS. G. P. 1160.

HERMAPHROD. *Cal. o. Cor. o. Stam. 2. Pist. 1. Sem. 1; lanceolatum.*

FEM. *Pist. 1. lanceolatum. S. N. 679.*

778. *FRAXINUS, excelsior, foliolis ferratis, floribus apetalis.* *Linn. Spec. 1509. (Hall. 528.)*

H. ad ripas Dilla; an der Mühlbach; in sepibus im Rosena uwaldgen. Floret Aprili.

Pharm. FRAXINI Cortex, Semina.

CLASSIS

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

A. FILICES.

* *Fructificationes spicatæ.*

EQUISETUM. G. P. 1169.

Spica fructificationibus peltatis, basi dehiscen-
tibus multivalvi. S. N. 684.

779. EQUISETUM, *sylvaticum*, caule spicato, fron-
 dibus compositis. Linn. Spec. 1516. (Hall.
 1680.)

H. in sylvis in der Hoerre copiose, circa Langenaubach, Rehe,
 & Breitscheid frequens; am Beilstein rarius. Floret Aprili,
 Majo.

Frondes 3 f. 4 pedales: Caule gracili, scabro; Vaginis ampliis,
 dilatatis: dentibus latis. Folia in singulo Verticillo 16-24,
 longa, stricta, tenuia, tetragona, subscabra, iterum verticillata:
 Foliolis quinque vel septemc. Spica terminalis elongata in
 eadem fronde.

780. EQUISETUM, *arvense*, scapo fructificante nu-
 do; sterili frondoso. Linn. Spec. 1516. (Hall.
 1676.)

H. in agris in der Aue; in cultis in der Pitsche copiosissime.
 Floret Aprili, Majo.

Pharm. EQUISETI Herba.

Scapus fructificans brevis, crassus, aphyllus, marcescens: Vaginis
 amplis, laxis. Spica oblonga, ventricosa, acuta. Frondes steriles
 seriores, sesquipedales, scabra: Caule tenue; Vaginis multi-
 dentatis; Folii 12-15 in singulo verticillo, subramosis.

781. EQUISETUM, *palustre*, caule angulato, frondi-
 bus simplicibus. Linn. Spec. 1516. (Hall. 1677.
 a. & b III.)

β , Equisetum palustre minus polystachyon. Bauk. Pin. 16.
 (Hall. 1677. a II.)

H. a in pratis paludosis hinter dem Homberg; β , in pratis
 aquosis auf der Burgermeisterwiese rarius. Floret Juno.
 Scapus fructificans pedatus, angulato sulcatus, levius, nudus i
 Spica reliquis minore, ovata, deflorata graciliori, linearis. Sub
 florescens Folia 6-10 ex Vaginis attris enascuntur brevia,
 demum

demum longiora, sultata, levia; apice caulis ante spicifero, in mucronem folio similem longissimum producto.

Huius Pollen ex Spica Peltis recens excassum, omniam vivacissime saltare vidi.

Pollen hdt sphaerula constat nitidis; quarum singula juxta basin emittit fila quatuor albida aqualia, duo semper duplo longiora, omnia apice in tendiculam terminata; ante explicationem globulum arte circumligans. Si charta imponuntur, fila omnia elastice simul, annexa basi, dissiliunt; alternaque conractione & dilatatione, sphaerula tripudiare, & pyroboli instar subsubtus facere, per lensem observantur.

Var. β, differt: Frondibus minoribus; Foliis fere omnibus apice spiciferis; caulinis Spica reliquis duplo majore.

782. EQUISETUM, fluviatile, caule striato, frondibus subfimpcibis. Linn. Spec. 1517. (Hall. 1675.)

H. in fossis auf der neuen Wiese, am Bockshayn copiose. Floret Majo, Junio.

Scapus fructificans 3 f. 4-pedalis, trahitie digitii minoris, aphtyllos, striatus, fistulosus, glaber. Spica coloratiuscula: Polline carulescente. Frondes steriles maiores, laves: Vaginis multidentatis; Foliis in singulo verticillo 24-36-fimpcisculis, tetragonis, sulcatis, lavis.

783. EQUISETUM, limosum, caule subnudo laevi. Linn. Spec. 1517. (Hall. 1677. β. II.)

H. in paludibus am Mühlberg circa Sinn copiosissime. Floret Majo.

Specimina mea vix credo differre a precedente; Caulis minus sulcatus, Vaginæ ampliores, argutissimæ dentata. Folia pauciora, sape nulla. Spica simillima.

784. EQUISETUM, hyemale, caule nudo scabro basi subramoso. Linn. Spec. 1517. (Hall. 1679.)

H. in sylvaticis uliginosis im Ereteischedervvald; ad Langenbach, bey dem wvilden Weiberhäusgen frequens. Floret Majo.

Caulis 3-4-5-pedalis simplex, teres, strictus, sulcatus, asperimus, basi tantum rarius foliosus: Vaginis brevibus, articulis, solis; dentibus nigris. Equisetum hoc ob eximiam durabiliorēm que asperitatem, Scriniariis, Tornatoribus & Aurisabris necessarium; ad lavigationem & politionem aptissimum.

OPHIOGLOSSUM. G. P. 1171.

Spica articulata, disticha: articulis transversim dehiscentibus. S. N. 684.

•

785.

785. OPHIOGLOSSUM, *vulgatum*, fronde ovata. Linn.

Spec. 1518. (Hall. 1685. Weis. Plant. crypt. 283.)

H. in pratis editioribus subhumidis *in der Alzbach; am Homberg; im Guldnersgrund; im Thiergarten copiose.* Floret Junio.

Pharm. OPHIOGLOSSI Herba.

OSMUNDA. G. P. 1172.

Spica ramosa: Fructificationibus globosis,
S. N. 684.

786. OSMUNDA, *Lunaria*, scapo caulinō solitario,
fronde pinnatā solitaria. Linn. *Spec. 1519.*
(*Hall. 1686. Weis. P. c. 285.*)

H. in pratis & pascuis siccioribus *hinter dem Homberg; im Thiergarten bey dem alten Haus copiose; am Rehberg parcius.* Floret Majo, Junio.

Pharm. LUNARIA Herba.

787. OSMUNDA, *Spicant*, frondibus lanceolatis pinnatifidis: laciṇiis confluentibus integerimis parallelis. Linn. *Spec. 1522. (Struthiopteris.*
Hall. 1687. Weis. P. c. 287.)

H. in sylvaticis circa *Niederdresselndorff & Burbach rarius.*
Floret Junio.

•• *Fructificationes frondosae, in pagina inferiore.*

ACROSTICHUM. G. P. 1173.

Fructificationes discum totum frondis tegentes. S. N. 685.

788. ACROSTICHUM, *septentrionale*, frondibus nudis linearibus laciṇiatis. Linn. *Spec. 1524. (Hall.*
1714. Weis. P. c. 301.)

H. in fissuris rupium *am Homberg; im Beilstein, alibique.*
Floret Aprilia.

POLYPODIUM. G. P. 1179.

Fructificationes in punctis subrotundis, sparsis per discum frondis. S. N. 691.

a. *Fronde pinnatifida lobis coadunatis.*

789. POLYPODIUM, *vulgare*, frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subferratis obtusis, radice squamata. Linn. *Spec. 1544. (Hall. 1696. Weis.*
P. c. 303.)

H. ad

H. ad radices Quercuum inque rupium fissuris, *am Homberg & Beilstein rarius*; *im Hirschberg ad Guntersdorf* alibique copiose. Floret Aprili.

Pharm. POLYPODII Radix.

b. *Fronde pinnata.*

790. POLYPODIUM, *fontanum*, frondibus pinnatis laciniatis: foliolis subrotundis argute incisis, stipe laevi. *Linn. S. N. 693. Spec. 1550. Hall. 1706.*
H. ad radices rupium *am Galgenberg* parcius. Floret Majo. ♀

c. *Fronde subbipinnata.*

791. POLYPODIUM, *cristatum*, frondibus subbipinnatis: foliolis ovato-oblongis: pinnis obtusisculis apice acute serratis. *Linn. Spec. 1551. Hall. 1705. Weif. P. c. 317. var. Fil. fem.*

H. in dumetis *auf dem Galgenberg*. Floret Majo.

792. POLYPODIUM, *Felix mas*, frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Linn. Spec. 1551. Hall. 1701. Weif. P. c. 310.*

H. in sylvis, ad sepes locis umbrosis passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. FILICIS Radix.

793. POLYPODIUM, *Felix femina*, fronde bipinnata: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Linn. Spec. 1551. Hall. 1703. Weif. P. c. 313.*

H. in sylvaticis *am Homberg*, in nemorosis ad *Erbach* frequens. Floret Julio.

794. POLYPODIUM, *aculeatum*, frondibus bipinnatis: pinnis lunulatis ciliato-dentatis, stipite strigoso. *Linn. Spec. 1552. Hall. 1712. Weif. P. c. 322.*

H. in nemorosis ad *Breitcheid*; *im Hirschberg*, & alibi infrequens. Floret Julio.

795. POLYPODIUM, *fragile*, frondibus bipinnatis: foliolis remotis: pinnis subrotundis incisis. *Linn. Spec. 1553. Hall. 1707. Weif. 319. a.*

H. in muris pomorum, in rupium fissuris *bey dem Kalckofen*; in nemorosis circa *Erbach* copiosissime. Floret Julio.

796. POLYPODIUM, *regium*, frondibus bipinnatis: foliolis suboppositis: pinnis alternis laciniatis. *Linn. S. N. 694. Spec. 1553. Hall. 1708. Weif. P. c. 321. β. var. prec.*

P

H. in

H. in rupibus ad arceum Beilstein frequens. Floret Julio.
d. Fronde supradecomposita.

797. POLYPODIUM, *Dryopteris*, frondibus supradecompositis: foliolis ternis bipinnatis. Linn. Spec. 1555. Hall. 1699. Weis. P. c. 324.
H. in fissuris rupium bey dem Eulenhaus; am Homberg; im Hirschberg copiose. Floret Julio.

ASPLENIUM, G. P. 1178.

Fructificationes in lineolis disci frondis spatialis. S. N. 689.

a. Fronde pinnatifida.

798. ASPLENIUM, *Ceterach*, frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtusis. Linn. S. N. 689. Spec. 1538. Hall. 1694.

H. in fissuris rupium bey der Krebsgrube im Kamp; im Thiergarten frequens. Floret Junio, Julio.

Pharm. CETERACH Herba.

b. Fronde pinnata.

799. ASPLENIUM, *Trichomanes*, frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. Linn. Spec. 1540 Hall. 1693. Weis. P. c. 296.

H. in rupium fissuris hinter dem Schloß copiose. Floret Aprili. Pharm. ADIANTI RUBRI f. TRICHOMANIS Herba.

800. ASPLENIUM, *Ruta muraria*, frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. Linn. Spec. 1541. Hall. 1691. Weis. M. M. 298.

H. in muris antiquis passim. Floret April.

Pharm. RUTA MURARIA Herba.

801. ASPLENIUM, *germanicum*. Weis. P. c. 299.

Asplenium caule pinnato, pinnis imis trifoliatis, superioribus simplicibus dentatis. Hall. 1690.

H. in rupium fissuris am Homberg, am geistlichen Berg; im Beilstein; & alibi parcius. Floret Majo.

Diversissimum a precedente. Frondes multo angustiores, altiores, magisque erecta, simpliciter pinnata. Stipes subsrigonous, uno latere planiore, ad duas tertias partes nudus, inferne fusco-purpureus, deum rufescens, inter folia flexuosus. Pinnae 5 i. 7, subopposita, angusta, cuneiforme-oblonga, erecta, apice obtuso, inciso-crenata, disco sulcata; quarum infima duæ subpetiolata,

lata, subirifoliata, s. trilobata: lobo infimo ad petiolum usque diviso; reliqua pinna simpliciores, subbifida; terminali longiore subdensata. Fruct. Lineolæ 2 s. 5, longa, distincta, squama albida longitudinaliter rupta, cincta; demum non confluentes, Foliolique discum minime obtengentes, uti in R. muraria. Capsulae paniculares, subfuscæ, annulo crassiore.

802. *ASPLENIUM, Adiantum nigrum*, frondibus subtripinnatis: foliolis alternis: pinnis lanceolatis inciso ferratis. *Linn. Spec. 1541. Hall. 1692.*
H. in rupibus am Homberg parcus; im Beilstein frequens. Floret Martio.

PTERIS. G. P. 1174.

Fructificationes in lineis marginalibus. S. N.
687.

803. *PTERIS, aquilina*, frondibus supradecompositis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis; superioribus minoribus. *Linn. Spec. 1533. Weis. P. c. 289. Felix. Hall. 1688.*
H. in sylvis ad Breitscheid; Schönbach; & Niederdresselndorf. Floret Julio. ♀.

B. M U S C I.

* *Acalyptati.*

LYCOPODIUM. G. P. 1185.

Anthera bivalvis, sessilis. Calyptra nulla.
S. N. 697.

804. *LYCOPODIUM, clavatum*, foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. *Linn. Spec. 1564. Hall. 1722. Weis. P. c. 269.*
Neck. Method Musc. 150.
H. in sylvis in der Hoerre circa Bicken; im Hirschberg copiose. Floret Julio.

Pharm. Musci CLAVATI Herba; LYCOPODII Semen.

805. *LYCOPODIUM, annotinum*, foliis sparsis quinque fariis subferratis, surculis annotino-articulatis, spicis terminalibus glabris erectis. *Linn. Spec. 1566. Hall. 1720. Weis. P. c. 272. Neck. M. M. 146.*
H. in sylvis montosis ad Haynchen versus Siegen. Ebertz. M. D. Floret Julio. ♀.

SPHAGNUM. G. P. 1187.

Anthera operculata: ore lævi. *Calyptra nulla*.
S. N. 698.

806. SPHAGNUM, *palustre*, ramis deflexis, *Linn. Spec. 1569. Hall. 1724. Weis. P. c. 263. Hypn. cubile. Neck. M. M. 188.*

β . *Sphagnum palustre* molle deflexum, squamis capillaceis. *Dillen. H. M. 243. T. 32. f. 2.*

α . & β . in paludosis *unter dem Sinnerhof* copiose. Floret Julio.

PHASCUM. G. P. 1189.

Anthera operculata: ore ciliata. *Calyptra minuta*. S. N. 699.

807. PHASCUM, *acaulon*, *acaule*, *anthera sessili*, foliis ovatis acutis. *Linn. S. N. 699. Spec. 1570. Weis. P. c. 266. Spbagnum. Hall. 1726. Br. bulbiforme. Neck. M. M. 230.*

β . *Shagnum acaulon* *bulbiforme* mintis. *Dillen. H. M. 252 T. 32. f. 12.*

α , in areis hortorum passim; β . ad scrobes & vias cavas humidas *am Homberg*. Floret Martio, Aprili.

Surculi in α , basi ramosis, in β , simplices. Folia nervo carinali non destituta: superiora triplo majora, apice pilifera. Anthera *subglobosa*, *subpedunculata*, *rufa*. Calyptra *Antheram oblique semivestiens*, *rostrata*. Operculum *rostratum*, *rectum*, in hoc & sequente non deciduum. Cilia non vidi.

808. PHASCUM, *subulatum*, *acaule*, *anthera sessili*, foliis subulato-setaceis patulis. *Linn. Spec. 1570. Weis. P. c. 268. Spbagnum. Hall. 1727. Bryum ericetorum. Neck. M. M. 231.*

H. ad aggeres fossarum, *am Homberg* alibique frequens. Floret Martio.

Surculi *caulescentes*, *simplices*, ad duas tertias partes terra absconditi. Folia *inferiora* *ovato-acuminata*, *carinata*, *reflexa*: *superiora longissima*, *lineari-subulata*, *plana*, *nervo destituta*; *juniore subsecunda*. Anthera *ovalis*, *pedunculata*, *flava*. Calyptra & Operculi *rostrum* *obliquum*:

** *Calyptri diclini.*

POLYTRICHUM. G. P. 1192.

Anthera operculata, *apophysī minimæ insidens*. *Calyptra villosa*.

Stella

Stella feminea in distinto individuo. S.N. 700.

809. POLYTRICHUM, *commune*, caule simplici, anthera parallelepipedata. Linn. Spec. 1573.

α . *majus*. Weis. P. c. 168. Neck. M. M. 124. Mnium. Hall. 1835.

β . *minus*. Weis. P. c. 171. Mn. Hall. 1835. α . γ .

γ . *pilosum*. Weis. P. c. 172. Neck. M. M. 123. Mnium. Hall. 1836.

H. in sylvis passim; α , in uliginosis spongiosis im Beilstein. & Hirschberg copiose; β , in pascuis editioribus subudis, am Homberg & goistlichen Berg; γ , in montosis siccis auf dem Eulenhouse alibique. Floret Novembris. in ver usque.

Pharm. α , ADIANTI AUREI Herba.

Pol. hoc Calyptra gaudet duplice: exteriore pilosa, interiore multo minore, membranacea, albida, lavi, exteriore obtecta. In Var. γ . Folia apice pilifera, certe margine non serrata.

810. POLYTRICHUM, *urnigerum*, caule ramosissimo, pedunculis axillaribus. Linn. Spec. 1573. Neck. M. M. 120. Bryum. Hall. 1801

H. in montosis sylvaticis Theriotrophei, alibique frequens. Floret autumno in ver usque.

Surculi juniores simplices, fere acaules, sequentis simpillimi; Foliis serratis viridibus stellatim expansis: Pedunculo terminali; adulatorum demum ex latere ramosi, 2 - f. 3 - pollicares, subdichotomi, ramis fastigiatis, apice incrassatis. Folia inferiora bimaculata, rufa; superiora annotina arcta, viridia. Pedunculi axillares, lateralesque, rubri, 2 - 3 - pollicares: Vagina rufa: Tuberculo flavescens, acuto, non bulbo. Anthera ovato-cylindracea, rufa, erecta; demum obliqua f. subcernua basi, ventricosa albida: Operculo fulvo, cuspidate albida: Ore annulata, membrana albida testo; Ciliis 32; Apophysi nulla.

Surculi femininei simplices, 2 - pollicares; Foliis vestiti confertis, patulis, superioribus contractis; terminalibus confertioribus, majoribus, radianibus. Stella in centro sessilis, scyphiformis, simplex, uia in Pol. communis; at multo minor, non prolifera.

811. POLYTRICHUM, *nanum*, capsula cylindrica erecta; surculis, brevissimis, foliis ferrulatis. Weis. P. c. 173.

α . Mnium, *polytrichoides*, calyptra villosa, var. β Linn. Spec. 1577. Hall. 1837. Polytr. *mnioides*. Neck. M. M. 123. Dillen. H. M. 429. T. 55. f. 7.

β . Mn. *polytr.* var. α . Linn. Spec. 1576. Hall. 1838. Polytr. *nanum* folio non ferrato. Weis. P. c. 175. Neck. M. M. 119. Dillen. H. M. 428. T. 55. f. 6.

H. ♂, ad terram in ericetis uidis Theriotrophei, am Graben nach dem alten Hans; ♀, in der Heerre; im Hirschberg frequens. Floret Februar. & sequ.

Ob Surculos demum ex latere proliferos; Folia serrata; Antheræ demum albidae, membrana setosa; Cilia 32; & Apophysis nullam, suspicor hoc Pol. merata Varietatem iuniorum esse praecedentis. In his Individuis feminis quorundam Folia in stellam expansa sunt, nullus verum discus scobiferum reperi potui; In aliis vero surculis obverse-conicis, - vix tres vel quatuor lineas longis, Foliis adpresso: Stellam scyphiformem, repetito-proliferam, observo.

MNIUM. G. P. 1893.

Anthera operculata. Calyptra laevis
Fem. capitulum nudum, pulverulentum,
remotum. S. N. 700.

812. MNIUM, pellucidum, caule simplici, foliis ovatis. Linn. 1574. Hall. 1853. Weis. P. c. 161.
Neck. M. M. 233.

H. in pratis uliginosis im Steinberg; am Steinberg
frequens. Floret Martio.

Antheræ & Capitula in distincto individuo simplici. Calyptra albida, longa, conica, apice fulvo, basi 5-6-fida. Capitula terminalia, scyphiformia, composta: Foliolis 3 s. 5 et 6 inclusis; disco convexo: scabe foliis per lensem simillima.

813. MNIUM, fontanum, caule simplici geniculis inflexo. Linn. Spec. 1574. Weis. P. c. 145.
Hall. 1851. Bryum. Neck. M. M. 209.

H. in pratis uidis scaturiginosis, im Fischwegber. & Gießners-
grund; in uliginosis unter dem Sinnerhof copiose. Floret Mayo.
Folia serrulata, patula; in junioribus individuis subsecunda. In
hoc & Mn. palustri individua stellata & antherifera basi ita
arcte coharent, ut ambo ex eodem caule enasci, primo
intuitu, videantur; Si cultello caule vero separantur, semper
distinctis surculis, feminis simplicioribus, reperiuntur.

814. MNIUM, palustre, caule dichotomo, foliis subulatis. Linn. Spec. 1574. Hall. 1855. Weis.
P. c. 165. Bryum. Neck. M. M. 210.

H. in pratis uliginosis cum precedente. Floretestate.

815: MNIUM, androgynum, caule ramoso, andro-
gynum. Linn. Spec. 1574. Hall. 1854. Weis.
P. c. 163, Mn. angustifolium. Neck. M. M. 234.

♂. Mnium prolixum. Neck. M. M. 235. Hall. 1856. Dillen.
H. M. 235. T. 31. f. 4. H. locis

H. locis umbrosis uliginosis passim; **B.** im Stübersgrund. Floret Aprili, Mayo.

Antheræ & Capitula in eodem individuo ramoso. Capitula terminalia, pedunculata, subglobosa, nuda: composta foliolis exiguis confertissimis, receptaculo ovato affixis, deciduis, carinaliis foliis per lenteas simillimis. Antheras serius profere.

Var. **B.** Caule 2-3-pollicari, ramosissimo, ramis caule brevioribus, attenuatis, ramib. apice capituliferis, differs. Capitula caducissima.

816. **MNIUM, hygrometricum**, acaule, anthera nuntante, calyptra reflexa tetragona. *Linn. Spec. 1575. Hall. 1852. Weis. P. c. 147. Bryum. Neck. M. M. 221.*

H. ad muros; in umbrosis ad sepes passim, Floret Februario, Martio.

817. **MNIUM, purpureum**, caule dichotomo: axillis pedunculiferis, anthera erecta, foliis carinatis. *Linn. Spec. 1575. Bryum. Hall. 1816. Weis. P. c. 198. Neck. M. M. 211.*

B. Var. major: Surculis 2-pollicaribus dichotomo-ramosis, operculo conico. *Hall. 1818. Dillen. 387. T. 49. f. 52.*

H. ad muros cœmeterii & urbis; ad terram auf dem Hinterland; **B.** in sylvarum umbrosis im Beilstein; am Homberg alibi copiosissime. Floret Februario, Martio.

818. **MNIUM, setaceum**, antheris crectis, operculis filiformibus longitudine antherarum. *Linn. Spec. 1575. Hypnum. Hall. 1788. Weis. P. c. 206. Bryum. Neck. M. M. 212.*

H. ad muros cum precedente, vulgatissimum. Floret Februario, Martio.

819. **MNIUM, cirratum**, foliis arefactione revolutis. *Linn. Spec. 1576. Hypnum. Hall. 1786. Weis. P. c. 207. Bryum. Neck. M. M. 213.*

H. ad muros; in testis vetustis ligneis ver dem Homberg rarius. Floret Martio, Aprili.

820. **MNIUM, annotinum**, foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis subradicalibus, antheris nutantibus. *Linn. S. N. 700. Spec. 1576. Weis. P. c. 151. Bryum. Neck. M. M. 222.*

H. in locis udis sylvarum; am Homberg; im Beilstein: in ambulacris hortorum in denen Sieghausgärten frequens. Floret Junio.

Individua *juniora sterilia bulbifera*: Bulbulis *purpureis subrotundis, pellucidis, solitariis, sessilibus in foliorum alis.*

- 821. MNIUM, bornum**, antheris pendulis, pedunculo curvato, surculo simplici, foliolis margine scabris *Linn. Spec. 1576. Hall. 1846. Weis. P. c. 149. a. Bryum. Neck. M. M. 215.*

H. in nemorosis, ad terram udam im Hirscheberg frequens. Floret Aprili, Majo.

- 822. MNIUM, capillare**, antheris pendulis, foliis ovatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis. *Linn. S. N. 700. Bryum capillare. Spec. 1586. Hypnum. Hall. 1791. Weis. P. c. 205. Bryum. Neck. M. M. 214.*

H. ad muros cum Mn. caspitiæ, am Kirchhof; im Zwingen; in uliginosis am Beilstein Pedunculis longioribus. Floret Aprili, Majo.

- 823. MNIUM, caspitiæ**, antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato-setaceis, pedunculis longissimis. *Linn. Spec. sub nom. Br. caspitiæ. 1586. Br. Neck. M. M. 228. Hypnum. Hall. 1790. Weis. P. c. 203.*

H. ad muros pontis novi cœmeterii & urbis, alibique passim. Floret Martio, Aprili.

Ob individus stellifera Muiis ad sociandum. Surculi feminei distincti, simplicissimi, 4- f. 5. lineas longi, eretti, graciliores: Foliis vestiti raris, minoribus, ceterum simillimis. Stella terminalis bulbiformis, rarius expansa; Foliis latioribus, Capitulum pulverulentum, convexum, fuscum, semiinludentibus.

- 824. MNIUM, crudum**, antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis *Linn. Spec. 1576. Hall. 1843? Bryum. Neck. M. M. 223.*

H. ad terram umbrosam, in sylvula auf der Andorf hinter dem Weitzberg, linker Hand nach dem Bergarten zu. Floret Aprili.

Individua antherifera semipollucaria, simplicissima: Foliis superioribus triplo longioribus, confertis, erecto-patulis. Anthera ovato-cylindracea, erecta: doin nutans, denum iterum erecta. Calyptra erecta, nutante Anthera recurva. Operculum hemisphaericum, ore crassius, umbilico protuberante brevi. Individua stellifera vix semipollucaria; Foliis superioribus latioribus, majoribus, in stellam expansis: disco pulverulento subfuscō.

- 825. MNIUM, serpillifolium**, pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Linn. Spec. 1577.*

a, pun.

α , punctatum. *Dillen.* H. M. 416. T. 53. f. 81. & forte 80.
Hall. 1845. *Weis.* P. c. 153. *Bryum.* *Neck.* M. M. 216. &
 β . 217.

β , cuspidatum. *Dillen.* H. M. 413. T. 53. f. 79. *Hall.* 1841.
Weis. P. c. 155. *Bryum.* *polymorph.* *Neck.* M. M. 218.

γ , proliferum. *Dillen.* H. M. 411. T. 52. f. 77. *Hall.* 1839. *Mn. roseum* *Weis.* P. c. 157. *Bryum roseum.* *Neck.* M. M. 219.

δ , undulatum. *Dillen.* H. M. 410. T. 52. f. 76. *Hall.* 1844.
Weis. P. c. 158. *Bryum dendroides.* *Neck.* M. M. 218.

H. α . in sylvis ad Erbach; locis opacis ad radices rupium
 am Geistlichenberg; β . similibus in locis Theriotrophi;
 γ . locis udis umbrosis hinter dem Schloß in der Höhle; δ . in
 pomariis ad sepes unter der neuen Brücke; bey dem Hayn-
 winkel copiose. Floret Martio, Aprili.

826. *MNIUM, triquetrum*, foliis trifariis patulis su-
 bulato-lanceolatis carinatis. *Linn. Spec.* 1578.
Hall. 1849. *Bryum.* *Neck.* M. M. 208.

β . *Mnium* *Hall.* 1847. *Dillen.* H. M. 405. T. 51. f. 73!
 & *Hall.* 1850. *Dill.* 412. T. 52. f. 78.

H. in paludosis am Mühlberg; am Geistlichenberg; β . am
 Beilstein ad viam publicam alibi. Floret Majo.

827. *MNIUM, trichomanis*, foliis distichis integer-
 rimis. *Linn. Spec.* 1578. *Neck.* M. M. 236. no. 4.
Jungermannia. *Hall.* 1858.

H. iisdem in locis cum sequente; im Hirschberg copiosissime.
 Floret Aprili.

In hoc Perichaetia frondulis abscondita vidi: ergo Jungermanniis
 ad sociandum.

828. *MNIUM, fissum*, foliis distichis bifidis. *Linn.*
Spec. 1579. *Hall.* 1864, *Neck.* M. M. 236. no. 5.

H. ad radices & parietes rupium, in nemorosis ad Erbach.
 Floret Majo.

Mnium fissum foliis bidentatis apice globuliferis *Neck.* M. M.

237. no. 6. mera est varietas: Foliis viridioribus, magis
 approximatis, umbrosioribus locis proveniens. In utroque Fo-
 lia duabus apicibus globulifera, haud raro observavi.

*** *Calyprati monoclini.*

BRYUM. G. P. 1194.

Anthera operculata. *Calyptra* lævis. *Filamen-*
tum e tuberculo terminali ortum. S. N

a. *Antheris sessilibus.*

829. BRYUM, *apocarpum*, antheris sessilibus terminalibus, calyptra minima. Linn. Spec. 1579. Weis. P. c. 179. Neck. M. M. 199. Hypnum. Hall. 1793.

β . Sphagnum nodosum hirsutum incanum. Dillen. H. M. 246. T. 32. f. 5. Bryum, Weis. P. c. 180. Hypnum. Hall. 1792.

H. ad saxa & terram truncosque arborum, ~~am~~ Homberg alibique frequens. Floret Februario, Martio.

830. BRYUM, *striatum*, attheris sessilibus sparsis, calyptris striatis sursumve pilosis. Linn. S. N. 701. Spec. 1579.

α . magus, Dillen. H. M. 430. T. 55. f. 8. Polytrich. bryoides

α . Weis. P. c. 175. Polytrich. striat. Neck. M. M. α . 121. Bryum. Hall. 1799. β .

β . minus. Dillen. H. M. 431. T. 55. f. 9. Weis. P. c. 176. Neck. M. M. 122. β . Hall. 1799. α .

γ . medium, Dillen. H. M. 432. Tab. 55. f. 10. Hall. 1799. γ .

δ . capillaceum. Dillen. H. M. 433. T. 55. f. 11. Weis. P. c. 177. Neck. M. M. 122. γ . Hall. 1798.

H. α . ad truncos arborum passim; β , ad muros & saxa ~~am~~ Homberg; γ . in rupibus ~~am~~ Galgen- und Geistlichenberg; δ , in sylvis ad truncos Fagorum Quercuumque. Floret Februario, Martio.

b. *Antheris peduncularis erectis.*

831. BRYUM, *pomiforme*, antheris erectis sphæricis.

Linn. Spec. 1580. Hall. 1803. Weis. P. c. 181.

Neck. M. M. 208.

H. in rimis rupium earumque cavernulis ~~am~~ Homberg; Galgenberg; Var. β , Hall. l. c. im Thiergarten. Floret Martio, Aprili.

832. BRYUM, *pyriforme*, antheris erectis obovatis, calyptra subulata, surculis acaulibus, foliis ovatis muticis. Linn. Spec. 1580. Hall. 1832. Weis. P. c. 183. Neck. M. M. 197.

H. in areis hortorum in denen Siehausgärten; in aggeribus, & ad parietes rivulorum im Fischveyher- und Stübersgrund. Floret Martio, Aprili.

833.

833. BRYUM, extinctorium, anthera erecta oblonga minori, calypritis laxis æqualibus. Linn. Spec. 1581.

$\alpha.$ minus. *Dillen. H. M. 349. T. 45. f. 8. Hall. 1829.*
Weis. P. c. 185. Neck. M. M. 207. $\alpha.$.

$\beta.$ majus. *Dillen. H. M. 350. T. 45. f. 9. Hall. 1828,*
Weis. P. c. 187. $\beta.$ Neck. M. M. $\beta.$ 207.

H. $\alpha.$ ad muros urbis & cœmeterii; in rimis rupium am *Homberg* alibique frequens; $\beta.$ ad radices rupium am *Geißlichenberg*; var. maxima in muris pionerii frequens. Floret Martio, Aprili.

Suspicor Miii horni Var. *integrifoliam*, Clar. *Weis. P. c. 150.*
hujus Varietatem esse maximam; Sureculis 2 + 3 *pollicaribus, ramosis, semper sterilibus.*

834. BRYUM, subulatum, antheris erectis subulatis, surculis acaulibus. Linn. Spec. 1581. Hall. 1827.
Weis. P. c. 187. Neck. M. M. 194.

H. in cavis semitis hinter dem Schloß; in fissuris rupium am *Geißlichenberg*, alibique frequens. Floret Martio, Aprili.

835. BRYUM, rurale, antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis. Linn. Spec. 1581. Neck. M. M. 225. Hypnum. Hall. 1789. Weis. P. c. 210.

H. in sylvis ad truncos arborum passim. Floret Februar. Martio.

836. BRYUM, murale, antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, surculis simplicibus cæspitosis. Linn. Spec. 1581. Hall. 1825. Weis. P. c. 189. Neck. M. M. 196.

$\beta.$ minus, foliis non piliferis. *Hall. 1826. Weis. P. c. $\beta.$ 191.*
Neck. M. M. 197. Dillen. H. M. 356. T. 45. f. 15.

H. $\alpha.$ ad parietes hortorum; in muris, & rupium fissuris hinter dem Schloß, alibique; β ad terram glareosam vor dem Homberg. Floret Martio, Aprili.

837. BRYUM, scoparium, antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato. Linn. Spec. 1582. Neck. M. M. 223. Hypnum. Hall. 1777. Weis. P. c. 213.

H. in sylvis, ad truncos arborum putridos passim. Floret Februario, Martio.

838. BRYUM, undulatum, antheris erectiusculis, pendunculis subsolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ferratis. *Linn. Spec. 1582. Hall. 1823. Weis. P. c. 196. Br. phyllidifolium Neck. M. M. 203.*

H. in aggeribus humidis umbrofis *hinter dem Schloß in der Höhle; am Homburg;* in sylvis passim. Floret Februar. Martio.

839. BRYUM, pellucidum, antheris erectiusculis, foliis recurvis acutis, caule hirsuto. *Linn. Spec. 1583. Hall. 1824. Neck. M. M. 204.*

H. in paludosis sylvaticis ad pagum Erbach. Floret Octobri.

840. BRYUM, heteromallum, antheris erectis, foliis setaceis secundis. *Linn. Spec. 1583. Hall. 1807. Neck. M. M. 229. Hypnum. Weis. P. c. 215.*

H. ad terram in ericetis ad Hoerbach & Hirschberg. Floret autumno in ver usque.

841. BRYUM, tortuosum, antheris erectis, foliis setaceis imberbibus: arefactione retortis. *Linn. S. N. 702. Spec. 1583. Neck. M. M. 227. Hypnum. Hall. 1787.*

H. in rimis & cavernulis rupium, *im Thiergarten bei dem alten Haus* copiose. Floret autumno in ver usque.

842. BRYUM, truncatulum, antheris erectis subrotundis: operculo mucronato. *Linn. Spec. 1584. Hall. 1833. Weis. P. c. 191. Neck. M. M. 195.*

H. ad terram argillosam, locis humidis umbrosis, *am Homburg* frequens. Floret Aprili.

843. BRYUM, viridulum, antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-pagulis. *Linn. Spec. 1584. Hall. 1809. Weis. P. c. 193. Neck. M. M. 206.*

H. locis umbrosis argillosis ad terram, *am Homburg cum Phasco subulato* copiose. Floret primo vere.

844. BRYUM, hypnoides, antheris erectis, surculo erectiusculo, ramis lateralibus brevibus fertilibus. *Linn. Spec. 1584.*

a. majus

$\alpha.$ majus. *Dillen.* H. M. 372. T. 47. f. 32. *Morison.* *Hist. Oxon.* III. *Scat. XV.* *Tab. 5. ser. 3. f. 7. fig. optimis.* *Neck. M. M.* 226. *Hynum.* *Hall. 1780.* *Hypn. cuneif. a. Weis. P. c. 21A.*

$\beta.$ minus. *Dillen.* H. M. 368. T. 47. f. 27. *Linn. Flor. suec. II.* 1003.
var. $\beta.$ *Weis. P. c. 213.* $\beta.$

$\gamma.$ medium. *Dillen.* H. M. 371. T. 47. f. 31.

$\mathbf{H.}$ in sylvis; α , inter saxa ad terram *am Homberg*; β , ad rupes in monte *Galgenberg*; γ . in rupibus & ad terram *am Geistlichenberg*; *Homberg*, alibique copiose. Floret circa ver.

845. *BRYUM, verticillatum*, antheris erectis, pedunculis arefactione confertis, foliis piliferis, surculis fastigiatis. *Linn. S. N.* 702. *Spec. 1585.* *Hall. 1811?* (*potius Br. aestivum.*)
 $\mathbf{H.}$ in rupibus *im Beilstein.* Floret Aprili. \ddagger

c. *Antheris nutantibus.*

846. *BRYUM, argenteum*, antheris pendulis, surculis cylindricis imbricatis laevibus. *Linn. Spec. 1586.* *Hall. 1821.* *Weis. P. c. 199.* *Neck. M. M. 201.*

$\beta.$ viride. *Dillen.* H. M. 394. T. 50. f. 63.

$\mathbf{H.}$ α , in testis rupibus & muris; ad terram sabulosam *auf dem Hintersand*; in ambulaeris hortorum copiose; β , similibus in locis parcus. Floret hyeme.

847. *BRYUM, pulvinatum*, antheris subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. *Linn. Spec. 1586.* *Hall. 1822.* *Weis. P. c. 201.* *Neck. M. M. 200.*

$\mathbf{H.}$ in rupibus, ad muros antiquos passim. Floret primo vere.

848. *BRYUM, carneum*, antheris pendulis subglobosis, foliis acutis alternis. *Linn. Spec. 1587.* *Hall. 1834.* *Neck. M. M. 202.*

$\mathbf{H.}$ in pascuis uliginosis *in der Caltenbach*; ad terram humidam, & in ambulacris hortorum umbrosis *am Homberg*; *am Sieghause*, alibique parcus. Floret Aprili.

849. *BRYUM, simplex*, antheris nutantibus oblongis, foliis subulatis, surculo simplicissimo: medio

dio pedunculifero. *Linn. Spec. 1587. Hall. 1808. & 1813. Neck. M. M. 202.*
H. ad parietes rivulorum in pratis depresso hinter dem Homberg. Floret hyeme.

HYPNUM. G. P. 1195.

Anthera operculata. Calyptra laevis. Filamentum laterale, ortum e perichætio. S.N. 7c2.

a. *Frondibus pinnatis.*

850. HYPNUM, taxifolium, fronde simplicissima pinnata lanceolata basi pedunculifera. *Linn. Spec. 1587. Hall. 1775. Weis. P. c. 216. Neck. M. M. 151.*

H. in sylvis, locis umbrosis ad terram, circa Erbach florens copiose; in cavernulis rupium am Galgenberg, alibique sterile. Floret Octobri.

851. HYPNUM, denticulatum, fronde pinnata simplici: pinnis duplicatis, basi pedunculifera. *Linn. Spec. 1588. Hall. 1772. Neck. M. M. 154.*

H. in sylvis ad teram umbrosam humidam hinter dem Homberg, im Thiergarten, ad Erbach copiose. Floret Aprili.

852. HYPNUM, bryoides, fronde simplicissima pinnata lanceolata apice pedunculifera. *Linn. Spec. 1588. Hall. 1776. Weis. P. c. 217. Neck. M. M. 152.*

H. ad terram udam, locis sylvarum umbrosis, am Homberg, Galgen- & Geislichenberg frequens. Floret Februar. Martio.

853. HYPNUM, adiantoides, fronde pinnata ramosa erecta medio pedunculifera. *Linn. Spec. 1588. Hall. 1774. Neck. M. M. 153.*

H. in pratis paludosis hinter dem Homberg, alibique frequens. Floret Februario, Martio.

In hoc, taxifolio, & bryoideo Hypno, Frondis Folia latere superiore in duas laminas conduplicatas longitudinaliter, non vero ad apicem usque fissa. In hoc & taxifolio, Folia apice serrata, in bryoideo acuminata integerrima.

854. HYPNUM, complanatum, fronde pinnata ramosa: foliolis imbricatis acutis complicatis compressis. *Linn. Spec. 1588. Hall. 1771. & var. 1778. Weis. P. c. 218. Neck. M. M. 155.*

H. in

H. in sylvis, ad arborum truncos im Thiergarten; am Homberg, alibique copiosissime. Floret Aprili.

b. surculis vagis.

855. HYPNUM, rugosum, surculis vagis erectiusculis: foliis secundis recurvatis basi rugosis.

Linn. S. N. 703. Mantissa 131. Hall. 1735.

Hypn. lycopodioides. Neck. M. M. 168. a.

H. locis sylvaticis muscosis apricis am Homberg. Geistlichenberg; im Thiergarten frequens Floret rarius Aprili.

856. HYPNUM, undulatum, surculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis undulatis complicatis. Linn. Spec. 1589. Hall. 1770. Weis. P. c. 220. Neck. M. M. 156.

H. locis saxosis in sylvis, circa Höfbach, am Steinern Berg. Floret vix unquam.

857. HYPNUM, crispum, surculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis undulatis planis. Linn. Spec. 1589. Hall. 1769. Weis. P. c. 221. Neck. M. M. 153.

H. in rupe am Galgenberg gegen Burgk parcus sterilis; in nemorosis ad Erbach florens copiose. Floret Octobri.

858. HYPNUM, triquetrum, ramis vagis recurvis, foliolis ovatis recurvatis patulis. Linn. Spec. 1589. Hall. 1729. Weis. P. c. 222. Neck. M. M. 185.

H. in sylvis & pratis sterilibus vulgarissimum. Floret Aprili.

859. HYPNUM, rutabulum, ramis vagis subrepentibus, foliolis ovatis mucronatis imbricatis. Linn. Spec. 1590. Hall. 1730. Weis. P. c. 224. Neck. M. M. 178.

B. Operculis cuspidatis, Dillen. H. M. 297. T. 38. f. 30. *majus* & *minus*.

H. a. in pomariis ad arborum truncos ubique copiose, B. *majus*, in sylvaticis am Homberg; *minus*, an der Stadtmauer bey dem Haynuwinkelgen. Floret Februario, Martio.

860. HYPNUM, ruscifolium, surculo repente, ramis imbricatis, setiferis, foliis carinatis, capitulo subrotundo, incurvo, acuminato. Neck. M. M. 181. Hall. 1731? Weis. P. c. 225. Dillen. H. M. 298. T. 38. f. 31.

H. locis

H. locis saxosis aquofis unter der neuen Brücke; am Waffergaben, auf der Herrenwiese gegen Burgk über; alibique. Floret Martio.

Var. præcedentis?

c. *Surculis pennatis.*

861. *HYPNUM, filicinum*, surculis pennatis: ramulis distantibus, foliolis imbricatis incurvis acutis secundis. *Linn. Spec. 1590. Hall. 1766. Neck. M. M. 164. Weif. P. c. 228. a. spicatum.*

B. ramoſo-pinnatum. *Weif. P. c. 229. Hall. 1767. Dillen. H. M. 286. T. 36. f. 22.*

H. in paludosis passim, im Callenbachs- & Stübersgrund secus rivulos; *B.* in pratis udis auf der Weißgärberwiese. Floret Majo, Junio.

862. *HYPNUM, proliferum*, surculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Linn. Spec. 1590. Hall. 1764? Weif. P. c. 230. H. tamariſcifolium. Neck. M. M. 158.*

H. in sylvis ad Erbach; in pratis humidis auf der Herrenwiese alibique. Floret Martio.

863. *HYPNUM, parietinum*, surculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Linn. Spec. 1590. Hall. 1765. Weif. P. c. 232. Neck. M. M. 157.*

H. in sylvis ad terram, ubique copiosissime. Floret Aprili.

864. *HYPNUM, compressum*, surculo erecto, ramoso, ramis basi fetiferis, planis recurviusculis, stipite triplo brevioribus. *Neck. M. M. 159. Hall. 1742. Dillen. H. M. 312. T. 40. f. 47.*

H. in sylvarum locis humidis opacis, am Homberg frequens. Floret Aprili.

Nec distinctissima species; (*Neck. l. c.*) *nec H. cuspidati varietas;* (*Weif. P. c. 253.*) *sed potius Varietas est Hypni puri.*

865. *HYPNUM, prialongum*, surculis subpinnatis decumbentibus: ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis. *Linn Spec. 1591. Hall. 1758. Weif. P. c. 235. Neck. M. M. 174.*

H. ad

H. ad terram & truncos arborum hinter dem Schloß in der Höhle; in pomariis udis vor dem Homberg copiose florens. Floret Martio, Aprili.

366. HYPNUM, *crista castrensis*, surculis pinnatis: ramulis approximatis: apicibus recurvis. Linn. Spec. 1591. Hall. 1768. Weiß. P. c. 233. Neck. M. M. 165.

H. ad terram sterile in sylvis passim; in nemorosis ad Erbach fructificans, rupes operiens copiosissime. Floret autumno in ver usque.

367. HYPNUM, *abietinum*, surculis pinnatis teretiusculis remotis inæqualibus. Linn. Spec. 1591. Hall. 1762. Weiß. P. c. 236. Neck. M. M. 163.

H. in sylvis am Geistlichenberg; im Thiergarten frequens; semper fructificatione defititum. Floret - -

368. HYPNUM, *plumosum*, surculis pinnatis repentibus, ramis confertis, foliis imbricatis subulatis, antheris erectis. Linn. Spec. 1592. Weiß. P. c. 237. Neck. M. M. 173. var. *B. sericei*.

H. in sylvis ad arborum truncos; in Taxis am Geistlichenberg. Floret Aprili.

d. *Foliis reflexis*.

369. HYPNUM, *cupressiforme*, surculis subpinnatis, foliis secundis recurvis apice subulatis. Linn. Spec. 1592. Hall. 1737. Weiß. P. c. 238. Neck. M. M. 166.

H. in sylvis, ad arborum truncos passim. Floret Octobr. in ver usque.

370. HYPNUM, *aduncum*, surculis erectiusculo-subramolis, foliis secundis recurvis subulatis, ramis recurvatis. Linn. S. N. 704. Spec. 1592. Hall. 1736. Weiß. P. c. 240. Neck. M. M. 167.

H. in paludosis unter dem Sinner Hof, am Mühlberg. Floret Junio, Julio.

371. HYPNUM, *viticulosum*, surculis repentibus, ramis vagis teretibus, foliis patulis acuminatis. Linn. Spec. 1592. Hall. 1739. Weiß. P. c. 241. Neck. M. M. 169.

H. in sylvis, ad arborum truncos am Geistlichen Berg; am Homberg; alibique frequens. Floret Hyeine.

872. *HYPNUM squarrosum*, ramis vagis, foliis lan-

ceolatis complicato - carinatis quinquefariam
recurvatis. *Linn. S. N. 704. Spec. 1593.*

a. majus. Hall. 1732 ? Weis. P. c. 242. Neck. M. M. 171.

b. minus. Hall. 1733. Weis. P. c. 243.

H. a. in sylvarum locis udis passim; in pomariis am Sieghaus;
vor dem Homberg; alibique fructificans; b. similibus
in locis im Thiergarten. Floret Octobri in ver usque.

873. *HYPNUM lorcum*, surculis reptantibus, ramis
vagis erectis, foliis secundis, antheris subro-
tundis. *Linn. Spec. 1593. Weis. P. c. 244. Neck.*
M. M. 170.

H. in sylvis ad terram in der Höre; circa Breitscheid; im
Hirsberg ad Gundersdorf copiose. Floret Aprili.

c. Surculus dendroidibus, s. fasciculatis.

874. *HYPNUM dendroides*, surculo erecto, ramis
fasciculatis terminalibus simpliciusculis, an-
theris erectis. *Linn. Spec. 1593. Hall. 1747.*
Weis. P. c. 245. Neck. M. M. 187.

*H. in pratis sylvaticis udis im Fischweybergrund; in poma-
riis vor dem Homberg. Floret Octobri in ver usque.*

*Caulis palmaris, erectus, vestitus squamis obtusiusculis, adpresso.
Irona erecta, ramis subequalibus, simpliciusculis, teretibus,
erecto-patulis, arbustum exacte referens. Folia suberrata.
Pedunculi numerosi, fronde longiores. Anthera cylindracea,
erecta, calyptra ad pedunculum usque semitecta. Operculo
conico, erecto. Stylus ex pedunculo elongato antheram per-
forans, Pollenquo colligens, supra anthera orificium prominens,
operculo hinc agre decidente, interne affixus, fere uti in Bux-
baumia. Similem Stylum s. columnam in Pol. communi, &
aliis quidem, non vero supra Antheram prominentem, operculo-
que coherentes, vidi.*

875. *HYPNUM alopecurum*, surculo erecto, ramis
fasciculatis terminalibus subdivisis, antheris
subnutantibus. *Linn. Spec. 1594. Hall. 1748.*
Weis. P. c. 246. Neck. M. M. 186.

*H. in nemorosis ad Erbach, bey denen Steinkammern, arborum
truncos rupesque operiens copiosissime. Floret autumno.*

Caulis

Caulis 4 f. 5 - *pollicaris*, *obliquus*, *squamis vestitus acuminatis*, *patulis*, *albidus*. **Frons incurva**, *depressiuscula*: *ramis subdepressis*, *inaequalibus*, *superioribus subpinnatis*. **Folia ferrata**. **Pedunculi fronde breviores**, *incurvi*. **Antheræ ovales**, *oblique*: *Operculo rostrato*, *incurvo*.

f. *Surculis teretiusculis*.

376. HYPNUM, curtipedulum, surculis vagis teretibus, foliis ovaris acutis patulis, antheris pendulis. *Linn. Spec. 1594. Hall. 1740. Weis. P. c. 248. Neck. M. M. 177.*

H. in sylvis, ad arborum truncos am *Homburg*, alibique frequens. Floret Aprili.

377. HYPNUM, purum, surculis pinnato-sparsis subulatis, foliis ovatis obtusis conniventibus.

Linn. Spec. 1594. Hall. 1743. Weis. P. c. 249. Neck. M. M. 160.

H. in sylvis & pomariis passim. Floret Martio.

378. HYPNUM, riparium, surculis teretibus ramosis, foliolis acutis patulis distantibus. *Linn. Spec. 1595. Hall. 1746. Weis. P. c. 250. Neck. M. M. 184.*

H. in rivulis *bey der Lohmühle vor dem ebern Thor*, alibique rarius. Floret Septembri.

379. HYPNUM, cuspidatum, surculis vagis: apice foliis convolutis acuminato. *Linn. S. N. 704. Spec. 1595. Hall. 1741. Weis. P. c. 251. var. a. pungens, nec b. Neck. M. M. 163.*

H. in pratis & pomariis *hinter dem Homburg*, alibique vulgatissimum. Floret Mayo, Junio.

g. *Surculis confertis*.

380. HYPNUM, sericeum, surculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris erectis. *Linn. Spec. 1595. Hall. 1750. Weis. P. c. 254. Neck. M. M. 173. a.*

β. Hypn. strigosum. Neck. M. M. 179. Dillen. 327. T. 42. f. 62.

γ. Hypn. ramosum. Neck. M. M. 180. Hall. 1753. Dillen. 327. T. 42. f. 60.

H. ad trunco arborum & muros passim. Floret Martio, Aprili.

Folia striata, nervo carinali, superiora subferrata.

881. HYPNUM, *velutinum*, surculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris subnutantibus. *Linn. Spec. 1595. Hall. 1754. Neck. M. M. 172. Weis. P. c. 256.*

H. ad arboram trunco ubique. Floret Februario, Martio. Folia serrata, nervo carinali nullo.

882. HYPNUM, *serpens*, surculis repentibus, ramis filiformibus, foliis oblitteratis. *Linn. Spec. 1596. Hall. 1756. Et var. min. 1757. Weis. P. c. 257. Neck. M. M. 175.*

H. ad terram uadam & arborum radices, locis umbrosis passim. Floret Mayo & sequ.

883. HYPNUM, *sciuroides*, surculis erectis ramosis incurvatis. *Linn. Spec. 1596. Hall. 1749. Weis. P. c. 258. Neck. M. M. 175.*

β . *Hypn. palatinum*. *Neck. M. M. 182. Dillen. 320. T. 41. f. 55.*

H. in sylvis, pomariis, ad arborum trunco, alibique frequens; β in tecto ligneo domunculae *am Homberg*. Floret Octobri in ver usque.

884. HYPNUM, *myosuroides*, surculis ramosissimis: ramis subulatis utrinque attenuatis teretibus. *Linn. Spec. 1596. Hall. 1752. Weis. P. c. 259. Neck. M. M. 183. α .*

β . *Dillen. H. M. 316. f. 50. Hall. 1745. Neck. M. M. 183. β .*

H. in sylvis: α , *am Homberg*, & *Geistlichen Berg*; β . ad terram *im Beilstein*. Floret Aprili, Mayo.

Var. β , Antheris *erectis vix differt*.

FONTINALIS. G. P. 1190.

Anthera operculata. Calyptra sessilis, perichaetio inclusa. S.N. 699.

885. FONTINALIS, *antipyretica*, foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Linn. Spec. 1571. Weis. P. c. 261.*

Hypn.

Hypn. Hall. 1794. Hypn. *anctpyreticum*. Neck. M. M. 191.
H. in stagnis pratorum eorumque rivulis auf der *Ahr*; im
Wassergraben auf der Herrenwiese; in paludosis sylvaticis
im Hirschberg. Floret Autumno in ver usque.

886. FONTINALIS, minor, foliis ovatis concavis tri-
fariis acutis passim geminis, antheris termina-
libus. Linn. S. N. 699. Spec. 1571.

Hypn. Hall. 1795. Neck. M. M. 192. var. *praeed.* β.

H. similibus in locis auf der Herren Wiese, intra aquam fluen-
tem am Wehr. Hujus fructificationes nondum vidi.

BUXBAUMIA. G. P. 1188.

Anthera operculata, hinc membranacea. Ca-
lyptra caduca; intra operculum sacculus
pollinis. S. N. 699.

887. BUXBAUMIA, aphylla. Linn. Spec. 1570. Hall.
1728.

H. unico in loco in ericetis muscosis circa pagum Hirsch-
berg ratus. Primum lecta a Filio Herr. Paul. Floret
Februario, Martio.

C. A L G A E.

* Terrestres.

MARCHANTIA. G. P. 1198.

MASC. Calyx peltatus, subtus tectus Corol-
lis 1-petalis. Antheræ multifidæ.

FEM. Calyx sessilis, campanulatus, poly-
spermus. S. N. 707.

888. MARCHANTIA, polymorpha, calyce communi
decemfido. Linn. Spec. 1603.

α. major, Mich. N. G. T. I. f. 1. Dillen. H. M. 523. T.
76. f. 6. Hall. 1891. Weiß. P. c. 132. Neck. M. M. 114.

β. minor, Mich. N. G. T. I. f. 2. Dillen. H. M. 527. T. 77.
f. 7. Hall. 1892. α.

γ. octopartite, Mich. N. G. T. I. f. 5. Weiß. P. c. 133. β.

H. α. in pratis uidis ad rivos im Pulversgrund; β. ibidem
cum α; γ. locis uliginosis unter dem Sinnerhof alibiue.
Floret Mayo.

Pharm. HEPATICÆ FONTANÆ s. LICHENIS STELLATI Herba.

- 889. MARCHANTIA**, *hemisphaerica*, calyce communi quinquefido hemisphaerico, perichaetio nullo.
Linn. Spec. 1604. Hall. 1890. Neck. M. M. 118.

H. ad terram locis umbrosis humidis, in cavernulis rupium *am Galgenberg*, alibique rarius. Floret Majo.

- 890. MARCHANTIA**, *conica*, calyce communi quinqueloculari subovato. *Linn. Spec. 1604. Hall. 1889. Neck. M. M. 115.*

H. in nemorosis ad radices rupium circa *Erbach* copiosissime; *im Beilstein* rarius. *Filius.* Floret Majo.

JUNGERMANNIA. G. P. 1196.

MASC. pedunculatus, nudus. *Anthera 4.*
valvis

FEM. sessilis, nudus, seminibus subrotundis.
S. N. 705.

a. *Frondibus pinnatis secundis.*

- 891. JUNGERMANNIA**, *asplenoides*, frondibus simpliciter pinnatis: foliolis pinnatis ovatis subciliatis. *Linn. S. N. 705. Spec. 1597. Hall. 1868. Weis. P. c. 110. Neck. M. M. 133.*

B. Foliolis alternis minoribus. *Hall. I. c. B. Mich. T. 5. f. 1. 2.*
 H. in nemorosis udis ad *Erbach*; *im Hirschberg*; *am Homburg* alibique frequens. Floret Majo.

- 892. JUNGERMANNIA**, *viticulosa*, frondibus simpliciter pinnatis: foliolis planis nudis linearibus. *Linn. S. N. 705. Spec. 1597. Hall. 1869. Weis. P. c. 112. Neck. M. M. 134.*

H. in nemorosis udis *im Hirschberg* parcius. Floret Majo.

- 893. JUNGERMANNIA**, *polyanthos*, frondibus simpliciter pinnatis: foliolis integerrimis imbricatis convexis. *Linn. Spec. 1597. Hall. 1870. Weis. P. c. 113. Neck. M. M. 132.*

H. locis umbrosis udis, in sylvis circa *Hörbach am Steinernen Berg*; *im Hirschberg ad Gundersdorf*. Floret Aprili.

894.

- 894.** JUNGERMANNIA, *lanceolata*, frondibus simpli-
citer pinnatis lanceolatis apice floriferis, foli-
olis integerrimis. *Linn. Spec. 1597.* *Hall. 1871.*
Weis. P. c. 114. *Neck. M. M. 131.*
H. ad terram udam in sylvarum locis umbrosis, *im Hirsch-berg bey Gundersdorf*, parcus. Floret Aprili.
- 895.** JUNGERMANNIA, *bidentata*, frondibus simpli-
citer pinnatis apice floriferis, foliolis biden-
tatis. *Linn. Spec. 1598.* *Hall. 1877?* *Weis. P.*
c. a. major. 115. *Neck. M. M. 130.* *Dillen. H.*
M. 487. *T. 70, f. 11.*
B. bidentata minor. Hall. 1865? *Weis. P. c. 116.* *Dill. H. M.*
488. *T. 70, f. 12.*
H. in terra umbrosa humida, in sylvis ad *Erbach* alibique.
frequens. Floret Octobri.
- 896.** JUNGERMANNIA, *bicuspidata*, frondibus simpli-
citer pinnatis medio floriferis, foliolis biden-
tatis. *Linn. Spec. 1598.* *Hall. 1878.* *Weis. P.*
c. 117. *Neck. M. M. 129.* *Dillen. H. M. 488.*
T. 70, f. 13.
H. in sylvis *im Hirschberg ad Gundersdorf & Erbach.* Floret
Aprili.
Hujus Folia unico denique globulifera, semel vidi. Figura Dilleniana
cum nostra melius quam Micheliana convenit.
- 897.** JUNGERMANNIA, *quinquedentata*, frondibus pin-
natis ramosis apice floriferis, foliolis quinque-
dentatis. *Linn. Spec. 1598.* *J. trilobata. Weis.*
P. c. 118. *Neck. M. M. 132.*
H. sylvarum locis umbrosis uidis *am Hornberg;* *im Thiergarten;*
in scopulis & rupium rimis *am Galgenberg & Geistlichen-*
berg. Floret Aprili.
b. Frondibus pinnatis: pinnulis auriculatis superne tectis.
- 898.** JUNGERMANNIA, *nemorosa*, frondibus supra bi-
pinnatis apice floriferis, foliolis ciliatis. *Linn.*
Spec. 1598. *Hall. 1859.* *Weis. P. c. 121.* *Neck.*
M. M. 136.
H. in nemorofis circa *Erbach;* *im Breitscheider Wald;* Floret
Aprili.

- 299.** JUNGERMANNIA, *refupinata*, frondibus supra bipinnatis inferne floriferis; foliolis crenulatis imbricatis rotundis. *Linn. Spec.* 1599. *Neck. M. M.* 136.
H. in scopolis & rupium fissuris *am Galgenberg.* Floret vix unquam.
- 300.** JUNGERMANNIA, *albicans*, frondibus supra bipinnatis apice floriferis: foliolis linearibus recurvatis. *Linn. Spec.* 1599. *Weis. P. c.* 122. *Neck. M. M.* 135.
H. in nemorosis subudis *im Hirschberg* rarius. Floret Mayo.
- 301.** JUNGERMANNIA, *trilobata*, frondibus subtus bipinnatis, foliolis quadratis obsolete trilobis. *Linn. Spec.* 1599. *Hall.* 1866. *Neck. M. M.* 137.
H. in sylvis ad radices rupium *im Hirschberg* parcus. Floret Aprili.
- 302.** JUNGERMANNIA, *reptans*, frondibus subtus bipinnatis apice reptantibus, foliolis quadridentatis. *Linn. Spec.* 1599. *Hall* 1879. *Weis. P. c.* 119. *Neck. M. M.* 138.
H. ad radices truncorum putridorum in sylvarum umbrosis *im Hirschberg*; circa *Hörbach* copiose. Floret Aprili.
 c. *Frondibus imbricatis.*
- 303.** JUNGERMANNIA, *complanata*, furculis repentibus: foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus. *Linn. Spec.* 1599. *Hall.* 1860. *Weis. P. c.* 124. *Neck. M. M.* 142.
H. ad arborum truncos ubique copiosissime. Floret Martio, Aprili.
In hac Folia saepe in pollen defluens vidi.
- 304.** JUNGERMANNIA, *dilatata*, furculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Linn. Spec.* 1600. *Hall.* 1874. *Weis. P. c.* 126. *Neck. M. M.* 140.
H. in pomariis & sylvis, ad truncos arborum passim. Floret Martio.
- 305.** JUNGERMANNIA, *tamariscifolia*, foliis imbricatis serie duplice: superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo majoribus. *Linn. Spec.*

Spec. 1600. Hall. 1873. Weis. P. c. 128. Neck.

M. M. 141.

H. in sylvarum rupibus & truncis arborum; *am Homberg* alibique frequens. Floret Martio, Aprili.

906. *JUNGERMANNIA, ptatypbylla*, surculis procumbentibus subtus imbricatis, foliis cordatis acutis. *Linn. Spec. 1600. Hall. 1872. Weis. P. c. 125. Neck. M. M. 142.*

H. in sylvis ad trunco arborum; in rupibus *am Homberg*; *Geistliebenberg*; *im Thiergarten* copiose. Floret Aprili.

907. *JUNGERMANNIA, ciliaris*, surculis repentibus, foliolis duplicato-imbricatis; inferne auriculatis ciliatis. *Linn. Spec. 1601?*

H. in tecto ligneo semiputrido domunculae *am Homberg*; alihi nondum observata. Floret Aprili.

Jungermannia nostra vel nova, vel a Jungermannia ciliari plurimus notis diversissima. Cespites format densissimos, ambitus semipedales, pulvinatos, rubiginoso - ferrugineos, Hypno cypriformi primo intuitu simillimos. Frondes steriles vix pollitae transversum longa, ascendentes, subpinnatae, apicibus ramorum incrassatis, recurvis; supra convexae; subtus planiuscula, dentibus seu ciliis foliorum reflexis, villosa. Frondes florentes breviores, minus ramosa, semiconsumpta, erectiuscula, apice florifera, numeroissimis perichaetis aggregatis occultata, demum deliquescentes.

Foliola ordine duplici imbricata; supra convexa, se invicem semitegentia, recurva; superiora subquadrata, tri - s. quadripartita; inferiora lanceolata; utraque margine in numerosissimas lacinulas ciliares divisa; ob exiguitatem nondum observare posui, an sens auriculatae, nec ne. Perichaetia magnitudine & figura Jung. platyphylla, ventricosa, levia, non pilosa, subfusca, apice conniventia quadridentata. Pedunculi tetragonoi, politares, argentei. Anthera subglobosa subfuscata; lacinias debiscientibus 4 obtusis: Polline & villis subfuscis.

Ad Lichenastrum scorpioides pulchrum villosum Dillen. H. M. 481. T. 69. f. 3. accedit; at multo minor teneriorque est omnibus suis partibus.

d. *Surculis undique imbricatis: foliolis sparsis.*

908. *JUNGERMANNIA, trichophylla*, surculis teretibus, foliolis capillaceis æqualibus. *Linn. Spec. 1601. Hall. 1880. Weis. P. c. 130. Neck M. M. 144.*

H. ad terram humidam umbrosam, in sylvis frequens. Floret Aprili.

Foliola alterna usque ad basin fere tri - l. quadripartita, laciniis subulatis, incurvis, articulatis: articulis subglobosis. Perichaetia terminalia, longa, subteretia, apice quadrifida, setosa. Pedunculus semipollicaris: Anthera nigra.

e. Acaules frondibus simplicibus.

909. JUNGERMANNIA, *epiphylla*, acaulis, foliolo frondi innato. Linn. Spec. 1602. Hall. 1883. Weis. P. c. 106. Neck. M. M. 127.

H. ad parietes rivulorum in pratis udis sylvaticis hinter dem Homberg, im Stübersgrund; im Thiergarten alibique. Floret Aprili.

910. JUNGERMANNIA, *pinguis*, acaulis, fronde oblonga sinuata pingui. Linn. Spec. 1602. Hall. 1884. Weis. P. c. 107. Neck. M. M. 126.

H. similibus in locis cum praecedente; in rivulis: Frondibus confertis sterilibus copiosissime; ad terram uadum umbrosam in pomariis vor dem Homberg fructificans. Floret Aprili.

911. JUNGERMANNIA, *multifida*, acaulis, fronde bipinnatifida. Linn. Spec. 1602. Weis. P. c. 109. Neck. M. M. 129.

H. in pratis udis sylvaticis; secus rivulos ad latera perpendicularia hinter dem Homberg, im Stübers- und Gildnersgrund frequens. Floret Aprili.

912. JUNGERMANNIA, *furcata*, acaulis, fronde linearis-ramosa: extremitatibus furcatis obtusifuscis. Linn. Spec. 1602. Hall. 1885. Weis. P. c. 108. Neck. M. M. 128.

H. in sylvis ad truncos arborum passim. Floret Aprili. Frondes marginibus ciliatae, ciliis reflexis. Perichaetia & Antherae pilosa. In frondibus sterilibus & floriferis ex nervo medio suberas excrescent globuli hemisphaerici s. reniformes subhirsuti, in pollen destituentis.

913. JUNGERMANNIA, *pusilla*, acaulis fronde subpinnatifida: lobis imbricatis, perichaetio plicato. Linn. Spec. 1602. Hall. 1887.

H. ad terram humidam, & in cortice arborum dejecto semiputrido in nemorosis circa Erbach bey denen Steinkammern. Floret Aprili.

Frondes digitato-partita, lobis linearibus simplicibus, seu furcatis, obtusis, crassiusculis, planis, adscendentibus, nullo nervo distinctis: Perichaetia sapa gemina.

ANTHO-

ANTHOCEROS. G. P. 1201.

MASC. *Cal.* sessilis, cylindricus, integer.
Anthera subulata, longissima, 2-valvis.

FEM. *Cal.* 6-partitus. *Sem.* 3. S. N. 708.

914. ANTHOCEROS, punctatus, frondibus indivisis sinuatis punctatis. *Linn. Spec.* 1606. *Neck. M.*
M. 43.

H. in agris humidis hinter dem Schloß; in der Alzbach frequens; lectus a Filio *H. P.* 1770. Floret Octobri.

915. ANTHOCEROS, laevis, frondibus indivisis sinuatis laevis. *Linn. Spec.* 1606. *Hall.* 1893. *Neck.*
M. M. 44.

H. locis graminosis secus rivulos im Wiesengrund hinter dem Homberg; lectus 1771. Floret Octobri

Vereor ne sit (noster) Varietas precedentis. Frondes more Jung. pinguis terra incumbentes, gramine occultata, plane, sinuolobata, lobis semipollicem longis; supra levibus, nempe absque excrementis pulvrales uti in precedente, verrucis tamen frondi immersis, saepe ternis, subglobosis, atrocaruleis; transversis granulosis, atris. Antheræ longitudine digitis minoris, numerosissima. Feminos Flores nec in hoc nec in precedente huc usque reperire posui.

BLASIA. G. P. 1199.

MASC. ? *Cal.* cylindricus granis repletus.

FEM. ? *Cal.* nudus. Fruſtu subrotundo, foliis immerso, polyspermo. S. N. 707.

916. BLASIA, pusilla. *Linn. Spec.* 1605. *Hall.* 1857.

H. ad parietes rivulorum perpendiculares, horizontali direktione, im Wiesengrund hinter dem Homberg. Pulcherrima Plantula a me lecta 1770. & 1772, cum Floribus No. vembri.

RICCIA. G. P. 1200.

Cal. o. nisi cavitatem vesicularem intra folii substantiam. *Cor.* o. *Anthera* cylindrica, sessilis, germini imposita. *Pist.* *Germen* turbinatum. *Stylus* filiformis, antheram perforans. *Pericarp.* sphæricum, coronatum anthera emarcida. *Semina* hemisphærica, pedicellata, S. N. 708.

917.

- 917. RICCIA, crystallina, frondibus superficie papillosis.** Linn. Spec. 1605. Hall. 1896. Weis. P. c. 328.
Neck. M. M. 41.

H. ad terram humidam umbrosam, in sylvis *am Geistlichenberg rarius*; in nemorofis *bey denen Steinräumen circa Erbach* copiose. Floret autumno in ver usque.

- 918. RICCIA, minima, frondibus glabris bipartitis acutis.** Linn. Spec. 1605. Neck. M. M. 43.

H. in agris binor dem Schloß; alibique frequens.

Frondula exigua, plane, bi- l. 4- partite, nullo sulco supra exarata; demum per maturitatem superficie longitudinaliter rupra, capsule atra in lineam ordinata visui patent, ut in sequente, cuius varietas est junior?

- 919. RICCIA, glauca, frondibus glabris canaliculatis bilobis obtusis.** Linn. Spec. 1605. Hall. 1897. Neck. M. M. 42.

H. in anubilacris hortorum sabulosis umbrosis humidis passim. Floret Autumno.

LICHEN. G. P. 1202.

- MASC. Receptaculum subrotundum, planisculum, nitidum.**

- FEM. Farina foliis adspersa.** S. N. 708.

- 920. LICHEN, scriptus, leprosus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus.** Linn. Spec. 1606. Hall. 2079. Weis. P. c. 37. Neck. M. M. 45.

H. in cortice levii arborum, in sylvis passim.

- 921. LICHEN, geographicus, leprosus flavescentia, lineolis nigris mappam referens.** Linn. Spec. 1607. Hall. 2063. & senescens 2064? Weis. P. c. 38. Neck. M. M. 46.

H. in rupibus *am Homberg*, alibique vulgatissimus.

- 922. LICHEN, byssoides, leproso-farinaceus, petiis stipitatis subglobosis.** Linn. S. N. 709. Mantif. 133.

F. ad terram glareosam, locis umbrosis ad radices montis *Galgenberg* frequens. Floret Autumno.

Crusta cinereo-viridis, foliolis sublente constata sinuata-laciniosis, obscuris. Capitula subrotunda stipitata, ut in *L. ericetorum*, at *majora* plerumque ex pluribus *Tuberculis* subfuscis constructa, stipite longiore, crassioreque.

923. LICHEN, *vernalis*, leprosus albidus, tuberculis subrotundis ferrugineis. *Linn.* S. N. Tom. III. p. 234. *Hall.* 2070. *Dillen.* H. M. 126. T. 18. f. 4.
H. in cortice arborum putrescente, primo vere ubique frequens.
 Crusta granulosa cinerea s. albida, humore irrigata viridecens;
 Tuberula carnea, subglobosa, sessilia, carnea; demum con-
 vexa, subfuscata.
924. LICHEN, *lacteus*, leprosus albus, tuberculis concoloribus hemisphæricis. *Linn.* S. N. 709.
Mantiss. 132. *Hall.* 2071?
H. in rupibus am Homberg; am Stützelberg; bey dem Sän-
 uviesgen, alibique.
 Crusta exacte lactei coloris, senescens fusca: lineis concentricis mar-
 ginalibus; Tuberula conferta domum in pollen defluentia.
925. LICHEN, *rupicola*, leprosus albidus, tubercu-
 lis pallidis albo - marginatis. *Linn.* S. N. 709.
Mantiss. 132. *Hall.* 2060?
H. in rupibus, in montosis sylvaticis am Homberg; im Thier-
 garten alibique.
- 926 LICHEN, *pertusus*, leprosus: verrucis subte-
 sellatis laevigatis pertusis poro unio altero
 cylindrico. *Linn.* S. N. 709. *Mantiss.* 131.
Hall. 2053.
H. in rupibus arborumque corticibus passim; im Thiergar-
 ten & am Homberg frequens.
927. LICHEN, *rugosus*, leprosus albicans, lineolis
 simplicibus punctisque nigris confertis. *Linn.*
Spec. 1607. *Hall.* 2077. 2083. *Neck.* M. M. 46.
Weif. P. c. 41.
H. in sylvis, ad truncos arborum vulgatissimus.
928. LICHEN, *sanguinarius*, leprosus cinereo - vire-
 scens, tuberculis atris. *Linn.* Spec. 1607. *Hall.*
 2065. 2066. 2055. 2061. *Neck.* M. M. 48.
H. in rupibus truncisque arborum frequens,
929. LICHEN, *fuscoater*, leprosus fuscus, tuberculis
 atris. *Linn.* Spec. 1607. *Hall.* 2062? *Neck.* M.
 M. 49. *Weif.* P. c. 39?
H. ad scopulos, locis umbrosis in dem hohlen Weg hinter dem
 Schloß; am Stützelberg, alibique.

930. LICHEN, *calcarius*, leprosus candidus, tuberculis atris. *Linn. Spec. 1607.*? *Hall. 2058?* *Neck. M. M. 48.* *Weif. P. c. 40.*

H. in rupibus calcariis *am Homberg*; *bey dem Kalkofen*; *am Rebberg*, alibique.

Crusta crassa, *inequalis*, *lavis*, (*nostri*) *sulphurea*, *dein albida*, *rimosa*, *tessellata*, *decidua*. *Tubercula magnitudine Sem. Coriandri*, *crusta immersa*, *rufa*, *demum erumpentia atra*.

931. LICHEN, *cinerous*, leprosus, tuberculis nigris albo-marginatis. *Linn. S. N. 709.* *Mantiss. 132.* *Hall. 2059.*

H. in rupibus marmoreis copiose *am Homberg*.

932. LICHEN, *fagineus*, leprosus albus, tuberculis albis farinaceis. *Linn. Spec. 1608.* *Hall. 2086.* *Weif. P. c. 43.* *Neck. M. M. 50.*

H. in cortice Fagi aliarumque arborum passim.

933. LICHEN, *carpinoeus*, leprosus cinereus, tuberculis albidis rugosis. *Linn. Spec. 1608.* *Hall. 2088. 2091?* *Weif. P. c. 42.* *Neck. M. M. 47.*

H. in cortice arborum imprimis Carpini frequens.

934. LICHEN, *ericetorum*, leprosus candidus, tuberculis incarnatis. *Linn. Spec. 1608.* *Hall. 2042.* *Tuberculis fuscis 2043.* *Neck. M. M. 49.* *Weif. P. c. 44.*

H. inter muscos ad terram; in rupium cavernulis *am Galgenberg nach der Ahr* zu frequens.

Crusta granulosa, *nec foliacea*, *candida*, *humore irrigata cinereo-virens*. *Tubercula convexa*, *Agaricis Pileum referentia*, *carnea*, *dein fusa*, *stipite brevi*.

b. *Leprosi scutellati.*

935. LICHEN, *candelarius*, *crustaceus flavus*, *scutellis luteis*. *Linn. Spec. 1608.* *Hall. 2023?* *Weif. P. c. 46?*

H. ad corticem arborum in pomariis passim. *Hyeme impmissis pluvia vigens.*

Crusta sulphurea seu pallide flava, *tenerrima*, *subtus nivis*; *dum sicca* *Bysso candelari simillima*; *a qua facile distingui potest*:

a. *Crusta foliosa*: *Fronduis crassis*, *per longem lobatis*: *lobis* *sinuato-laciniatis*; *lacinias*, *erectis scutulis*, *obtusis*, *villosis*. b. *Scutellis planissimis*, *concoloribus*: *limbo plano farinaceo*.

In aliis individuis *Fronduæ observantur minores*. *Scutellis substituta*:

Foliolis

*Foliolis imbricatis minus laciniatis, margine in pollen defus-
tibus.*

936. LICHEN, *tartareus*, crustaceus ex albido - vi-
rescens, scutellis flavescentibus: margine albo.
Linn. Spec. 1608. Hall. 2051.
H. iu rupibus passim.

937. LICHEN, *pallescens*, crustaceus albicans, scutel-
lis pallidis. *Linn. Spec. 1608. Hall. 2024. Weis.
P. c. 47. Neck. M. M. 54.*
H. in truncis arborum; in parietibus ligneis im Thiergarten
frequens.

938. LICHEN, *subfuscus*, crustaceus albicans, scutellis
nigris: junioribus urceolatis cavis. *Linn. S. N.
710. Spec. 1609. Weis. P. c. 48. Neck. M.
M. 53.*

- α . Scutellis rufis albido - marginatis, *minor*. *Hall. 2049.*
 β . - - - - - *major*. *Hall. 2044.*
 γ . - - - - - nigris albido - marginatis. *Hall. 2056.*
 δ . - - - - - subfuscis - - - - - *Hall. 2047.*
 ϵ . - - - - - luteis - - - - - *Hall. 2050.*
2057. 2058. *Lich. ochroleucus* Neck. M. M. 52
H. α , β , δ , ϵ , in cortice arborum passim; γ , & ϵ , in rupibus.

939. LICHEN, *Parellus*, crustaceus albus, peltis
concavis obtusis pallidis. *Linn. S. N. 710.
Mantiff. 132. Hall. 2048. Neck. M. M. 50.*
H. in muris urbis, in rupibus am Homburg frequens.
c. *Imbricatus*.

940. LICHEN, *centrifugus*, imbricatus, foliolis ob-
solete multifidis laevibus albidis centrifugis,
scutellis rufo-fuscis. *Linn. S. N. 710. Spec. 1609.
Hall. 2015. Neck. M. M. 99. Weis. P. c. 54.*
H. in rupibus passim; am Geißlichenberg copiose.

941. LICHEN, *saxatilis*, imbricatus, foliolis simua-
tis scabris lacunosis, scutellis badiis. *Linn.
S. N. 710. Spec. 1609. Hall. 2011. Neck. M. M.
90. Weis. P. c. 55.*
H. in rupibus & cortice arborum ubique frequens; cum
scutellis sepiissime occurrit bey der oberen Walkmühle.

942. LICHEN, *omphalodes*, imbricatus, foliolis multifidis glabris obtusis incanis, punctis vagis eminentibus. *Linn. Spec. 1609. Neck. M. M. 99.*
H. in arborum cortice passim; in rupibus *am Homberg*, aliisque frequens.
943. LICHEN, *olivaceus*, imbricatus foliolis lobatis nitidis lividis. *Linn. Spec. 1610. Hall. 2014. Neck. M. M. 93. Weis. P. c. 58.*
H. in truncis arborum, & ad latera rupium ubique.
944. LICHEN, *crispus*, imbricatus, foliolis lobatis truncatis crenatis atro - viridibus, scutellis concoloribus. *Linn. S. N. 710. L. murorum. Neck. M. M. 85. Dillen. H. M. 139. T. 19. f. 23.*
H. ad terrain rupibus superfirataam *am Geistlichenberg*; ad latera rupium *bey dem Thiergarten* copiose.
945. LICHEN, *nigrescens*, gelatinosus membranaceus, exasperatus, convolutus, atroviridis, scutellis rubris. *Hall. 2037. Dillen. H. M. 138. T. 19. f. 20.*
H. in rupibus *am Geistlichenberg*; *am Thiergarten*; aliquique.
946. LICHEN, *cristatus*, imbricatus dentato - ciliatus, scutellis folio majoribus. *Linn. S. N. 710. Spec. 1610. Hall. 2039. Neck. M. M. 86. var. a. Dillen. H. M. 140. T. 19. f. 26. & var. b. Dillen. 140. T. 19. f. 25.*
H. in rupibus *am Geistlichenberg*; *B. am Thiergarten*; *am Galgenberg*.
947. LICHEN, *tremelloides*, frondibus erectis planis margine crispo lacinulato. Tremella *Lichenoides*. *Linn. Spec. 1625. Hall. 2032. Dillen. H. M. 145. 146. Tab. 19. f. 31. 32. 33. 34. & 35. Weis. P. c. 52. Neck. M. M. 87.*
H. ad terrain, aliis muscis plerumque intertextus, in sylva rum umbrosis passim.
- Scutellæ in minoribus varietatibus frequentiores; in majori seu Tremella *Lichenoides* Linn. Dill. f. 31. rariores. Hujus unicum specimen scutelliferum legi in sylvaticis ad pagum Burgk, Oetobri: Fronde margine minus ciliata, Scutellis numerosissimis rotundis discum sere obtegentibus, subpedunculatis, disco carneo, concavo, limbo albido sumido.

948. LICHEN, *pulcher*, gelatinosus viridis, exasperatus, undique concolor. *Hall. 2036. Dillen. H. M. 138. T. 19. f. 22.*

H. in rupibus & ad terram, in nemorosis circa Erbach, bey denen Steinkammern copiose. Octobri. Martio cum scutellis. Frondes imbricata, carnoса, gelatinosa, crassa, obtusa, subfinuata, pulcherrime e viridi carulescentes, subpellueida; steriles tuberculis immersis concoloribus fere obtecta; scutellifera planiores, tenuioresque, Scutellis numerosis, magnis, carnosis: Disco rufescente, limbo tumido, crenulato, concolore.

949. LICHEN, foliis pulposis, calcariis, glauco polline villosis, scutellis atris. *Hall. 2028. Mich. N. G. Ord. XXXVI. T. 54. f. 2. accedit, absque scyphis.*

H. in rupibus inter Br. apocarpum, am Geistlichen Berg frequens Octobri.

Frondes calcarea, crassa, dura, irrigatione vix emollienda, albidæ, Scutellæ atra, frondi immersa. Scyphi graciles quatunque lineas longi, pedunculati, ex ipsa frondis substantia, inter scutellas prodeunt.

950. LICHEN, foliis pulposis, calcariis, fuscis, imbricatis, scutellis nigris. *Hall. 2031. T. 47. f. 3. Dillen. H. M. 228. T. 30. f. 134. Mich. N. G. Ord. XXXVI. Tab. 54. f. 4?*

H. in rupibus am Geistlichen Berg, inter Brya, Octobri. Foliola exigua imbricata, fusca, humore irrigata virentia. Scutellæ immersa, numerosa, poro tantum in superficie conspicua.

951. LICHEN, orbicularis, fronde semipinnata, rotunde lobata, cinerea, scutellis nigris. *Hall. 2016. Neck. 88. Dillen. H. M. 177. T. 24. f. 71. & var. 72.*

H. in cortice arborum imprimis Carpini in hortis passim.

952. LICHEN, parietinus, imbricatus foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Linn. Spec. 1610. Hall. 2021. L. fulvus. Neck. M. M. 51.*

H. ad muros antiquos urbis & cæmeterii; in tectis schisteis passim.

Differat a L. candelario. & juniperino: Frondibus centrifugis, fulvis, durioribus, linearibus, calcareis, convexis, lobatis: lobis obtusissimis, incrassatis; Scutellis minoribus vix marginatis, fulvis. Hic semper rupestris; illi arboris fons.

953. LICHEN, *pbyfodes*, imbricatus: laciniis obtusis subinflatilis. Linn. Spec. 1610. Hall. 2018. Neck. M. M. 91. Weis. P. c. 57. male pro varietate Lich. saxatilis.

H. in cortice arborum, in tectis ligneis vor dem Homberg copiosissime; cum scutellis pedunculatis confertis im Thiergarten frequens.

954. LICHEN, *stellaris*, imbricatus: foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis. Linn. Spec. 1611. Hall. 2017. Neck. M. M. 89. Weis. P. c. 60.

H. in ramis arborum ubique.

955. LICHEN, fronde rotunde lobata, glauca, polleine concolore scabra, subtus hirta & attra. Hall. 2008. Mich. N. G. T 45. f. 1.

H. in cortice arborum, in denen Linden-Bäumen, auf dem Schießplatz copiose; in rupibus am Homberg frequens.

Frondes glauco-cinereae, non lacunosa, dum secca albida, eleganter lobata, lobis rotundis, sinuato-crenatis; supra ad oram levies, versus centrum furfure cinereo, demum sordide fusco roseo erecta; subtus radiculis simplicibus confertissimis astris hirta. Scutellas nondum vidi. Pollen furfuraceum, quo hoc & plerique Lichenes imbricari obrecti sunt, sellentis ope inspicitur, corpusculis constat stipitatis simplicibus, confertis, in hoc & centrifugo ramosis, arbusculam referentibus. Corpuscula hac ovata, subrotunda, vel claviformi figura variania, apice poro hiant, pollen impalpabile efflant, quo forte Lichenes propagantur. In Lichenibus crustaceis seu leprosis, similia corpustula plerumque claviformia, rarius ramosa, apice pollen exhalantia, intermixtis aliis organis pelvisformibus sessilibus, furfuracea scobe repletis, tenetis ope servantur.

956. LICHEN, viridis concolor, scutellis planis serratis. Hall. 2006. an L. Acetabulum Neck. M. M. 94?

H. in arborum cortice, in der Alzbach; vor dem Homberg; aliquique rarius.

Frondes imbricate virides, rugosa uti in L. caperata. Scutella numerosa, subpedunculata, magne: disco concavo badio, limbo crenulato cinereo, uti in L. saxatili.

957. LICHEN, ciliaris, foliaceus erectiusculus: laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis.

maris. Linn. Spec. 1611. Hall. 1980. Neck. M. M. 101. Weis. P. c. 62.

H. in cortice arborum passim, am Geistlichen - & Homberg; in sylvis frequens.

958. *LICHEN, hispidus*, fronde semipinnata canaliculata cinerea. *Hall. 2019. Dillen. H. M. 152. T. 20. f. 46.*

H. in cortice arborum, imprimis ramulorum, in pomariis ubique vulgarissimus.

Certe non est Var. praecedentis, plurimis notis diversissimus.

959. *LICHEN, pulmonarius*, foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra lacunosus; subtus tomentosus. *Linn. Spec. 1612. Hall. 1986. Neck. M. M. 108. Weis. P. c. 64.*

H. in sylvis ad truncos arborum passim.

Pharm. PULMONARIA ARBOREA Herba.

960. *LICHEN*, fronde obtuse lobata, inferne scabra, maculis rotundis varia. *Hall. 1989. Dillen. H. M. 216. T. 29. f. 114. Mich. N. G. Tab. 49. optimo. Ord. XXI. pag. 90.*

H. in sylvis ad radices rupium im Thiergarten, aliquaque frequens.

Frondium lobis obtusissimis, rotundatis, sinuato-laciniatis; supra glaucis, subtus lutescentibus, densissimis villosi; Scutellis carnosis, submarginatis, in frondes disco, non margine, sessilibus; as praecedente, satis hic Lichen se distinguere. Ceterum Frondes lacunosa, minus tamen tuberculata reticulata sunt, ex dura secca non coriacea tenaces, sed duriores, fragiliores, totaque alba evadunt. Scutella a Michelio accurate depicta, visu variores; in unico specimine tantum paucas vidi.

961. *LICHEN, furfuraceus*, foliaceus decumbens furfuraceus: laciniis acutis; subtus lacunosis atris. *Linn. Spec. 1612. Hall. 1976. Neck. M. M. 107. Weis. P. c. 65.*

H. ad arborum truncos & parietes Theriotrophei, ad usores in hortis vor dem obern Thor.

962. *LICHEN, farinaceus*, foliaceus erectus compressus ramosus: verrucis marginalibus farinosis. *Linn. Spec. 1613. Hall. 1981. Neck. M. M. 104. Weis. P. c. 66.*

Var. S. Dillen. H. M. T. 21. f. 57.

- H. ad arborum truncos in sylvis abunde, $\beta.$ in rupibus ~~am~~
Geistlichen Berg.
963. LICHEN, *calycaris*, foliaceus erectus linearis
ramosus lacunosus convexus mucronatus.
Linn. Spec. 1613 Hall. 1983. Neck. M. M.
106. Weiß. P. c. 67.
- H. ad arborum truncos, in pomariis sylvisque frequens.
964. LICHEN, *fraxineus*, foliaceus rectus oblongus
lanceolatus sublaciniatus lacunosus glaber, scutellis subpedunculatis. *Linn. Spec. 1614. Hall.*
1985. Neck. M. M. 105. Weiß. P. c. 72.
- H. ad arborum truncos in sylvis pomariisque frequens.
965. LICHEN, *prunastrum*, foliaceus erectiusculus la-
cunosus: subtus tomentosus albus. *Linn. Spec.*
1614. Hall. 1984. Neck. M. M. 103. Weiß.
P. c. 73.
- H. in cortice Pruni, aliarumque arborum, in pomariis syl-
visque copiosissime.
966. LICHEN, *juniperinus*, foliaceus laciniatus cri-
spus fulvus, peltis lividis. *Linn. Spec. 1614.*
Neck. M. M. 96.
- H. in arborum cortice passim.
967. LICHEN, *caperatus*, pallide viridis rugosus mar-
gine undulatus. *Linn. Spec. 1614. Hall. 2005.*
Neck. M. M. 95. Weiß. P. c. 74.
- H. in arboribus & ad saxa passim. Scutellæ rarissime.
968. LICHEN, *glaucus*, foliaceus depresso lobatus
glaber: margine crispo farinaceo. *Linn. Spec.*
1615. Hall. 2007. Neck. M. M. 100. Weiß.
P. c. 75.
- H. in arboribus im Thiergarten, alibiique; in tectis ligneis ~~am~~
Homberg rarius.
- e. *Coriacei.*
969. LICHEN, *resupinatus*, coriaceus repens loba-
tus, peltis marginalibus posticis. *Linn. Spec.*
1615. Neck. M. M. 81.
- H. in sylvis, inter lapidum acervos ~~am~~ *Homberg*, alibiique
frequens.
- Individua sterilia frequentiora: Frondes rigidiores, crassiores, mar-
gine adscendente flexuoso suberculata, in pollen destituta:
Tuber-

Tuberculis alius disco immersis concoloribus. Individua scutellifera rariora: frondes tenuiores, latiores, utrinque leves. Pelta in singulo frondis lobo sapius quinque: tres majores & duo laterales minores, orbiculata, submarginata, rufa, postice parti laciniarum adscendentium adnata.

970. LICHEN, venosus, coriaceus repens ovatus planus: subtus venosus villosus, peltis marginalibus horizontalibus. *Linn. Spec. 1615. Hall. 1993. Neck. M. M. 82. Weis. P. c. 82.*

H. ad terram im hohlen Weg, & in der Höhle hinter dem Schloß; in sylvis im Thiergarten alibiique frequens.

971. LICHEN, aphtosus, coriaceus repens lobatus obtusus planus, verrucis sparsis, pelta marginali adscendentente. *Linn. Spec. 1616. Hall. 1992. Neck. M. M. 80. Weis. P. c. 80.*

H. ad terram, in sylvis, passim; am. Homberg frequens.

972. LICHEN, caninus, coriaceus repens lobatus obtusus planus: subtus venosus villosus, pelta marginali adscendentente. *Linn. Spec. 1616. Hall. 1988. Neck. M. M. 79. Weis. P. c. 78.*

H. in sylvis ad terram, am. Homberg; im Thiergarten; alibiique.

973. LICHEN, horizontalis, coriaceus repens planus subtus avenius, peltis marginalibus horizontalibus. *Linn. S. N. 712. Mantiss. 132. Hall. 1991. Neck. M. M. 78.*

H. ad terram & radices rupium am. Geistlichen Berg copiose.

974. LICHEN, rufescens, fronde lobata obtusa avenia, margine liniata, subtus villosa: peltis subrotundis. *Neck. M. M. 79. Hall. 1990.*

H. ad terram in sylvis am. Beilstein; im Thiergarten; alibiique frequens.

Pelta postica parte verrucosa, verrucis viridibus. Frondes juveniles supra verrucosa, hinc L. aphtosus primis adfinit.

975. LICHEN, polydactylon, fronde oblonga, subtus venoso-villosa: marginibus subrevolutis adscendentibus. *Neck. M. M. 85.*

H. ad terram, similibus locis sylvaticis montosis, am. Homberg.

Var. praecedentis. Lichenes hi tres inter se plurimis notis convenientes, ob discum Frondis inferiorem semper plus minusve venosum, saxe villosum, LICH. canino. aphtosoque ita adfines, ut pro meritis variis haberi possint.

- 976. LICHEN, perlatus, coriaceus repens lobatus,**
glaber subtus ater, scutellis pedunculatis integris. *Linn. S. N. 712. Neck. M. M. 97. Dillen.*
H. M. 147. T. 20. f. 39.
H. in cortice arborum in pomario *bey der oberen Walckmaile* ; in saxis *am Geißlichen Berg* ; rarius.
L. glauco & saxatili caute distinguendus.
- 977. LICHEN, sylvaticus, coriacens repens laciniatus lacunolus,** peltis marginalibus adscendentibus. *Linn S. N. 712 Hall. 1987. L. polylobides. Neck 84. Mich. N. G. 84. T. 43. Dillen. H. M. 199. T. 27. f. 101.*
H. in sylvis, locis umbrosis ad radices & latera rupium in sylvula *auf der Steinseite* ; im Thiergarten copiose
Odor in secco Lichene nullus, humore irrigato, minosus, nauseans, nisi ingratisimus. Peltas in unico individuo tantum videt, terminalis, exigua. *L. camino quadruplo minores, rufas.*
- 978. LICHEN, saccatus, foliaceus repens subrotundus :** peltis depresso subtus saccatis. *Linn Spec. 1616. Hall. 1995. Neck. M. M. 83.*
H. ad terram in rupium rimis hinter dem Weizberg, lunker Hand nach dem Thiergarten zu copiosissime.
f. *Umbilicatum, squalens quasi fuligine.*
- 979. LICHEN, pustulatus, umbilicatus subtus lacunosus, furfure nigro adspersus.** *Linn. Spec. 1617. Hall. 1996. Neck. M. M. 75.*
H. in rupibus *am Galgen-Berg gegen Burgh* rarius.
g. *Scyphiferi.*
- 980. LICHEN, coeciferus, Scyphifer simplex integer-**
rimus, stipite cylindrico, tuberculis coecineis.
Linn. Spec. 1618. Hall. 1918. 1927. 1928. Neck. M. M. 57. Weiß. P. e. 90. v. f.
H. in ericetis & rupibus *am Homberg*, alibique.
Pharm. MUSCI PYXIDATI Herba;
- 981. LICHEN, cornucopoides, scyphifer simplex folio brevior, tuberculis coccineis.** *Linn. Spec. 1619. Hall. 1929. Neck M. M. 58. B.*
H. in ericetis *am Homberg*, in sylvaticis montibus *am Geißlichen- & Galgen-Berg* frequens.

982. LICHEN, *pyxidatus*, scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Linn. Spec.* 1619. *Hall.* 1912. 1923. *Neck. M. M.* 55. *Weiß. P. c.* 84. & 85. β .
H. in sylvaticis montosis sterilibus passim.
983. LICHEN, *fimbriatus*, scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindrico. *Linn. Spec.* 1619. *Hall.* 1915. 1916. *Neck. M. M.* 55. β . *Weiß. P. c.* 88. e
H. in sylvaticis sterilibus *am Galgen - Berg*; *am Homburg* frequens.
984. LICHEN, *gracilis*, scyphifer ramosus denticulatus filiformis. *Linn. Spec.* 1619. *Hall.* 1924. 1916. 1915. 1946. *Neck. M. M.* 56. *Weiß. P. c.* 93. h
H. in sterilibus montosis *am Galgen Berg*, *Rehberg* & *Homburg* infrequens.
985. LICHEN, *digitatus*, scyphifer ramosissimus, ramis cylindricis, calycibus integris nodosis. *Linn. Spec.* 1620. *Hall.* 1939. 1940. & β . var. *cornuta* 1910. *Neck. M. M.* 59. *Weiß. P. c.* 91.
H. in sterilibus montosis *am Homburg*, alibique; β . in rectis ligneis semiputridis frequens.
986. LICHEN, *cornutus*, scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus integris. *Linn. Spec.* 1620. *Hall.* 1903. & forte 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. *Neck. M. M.* 59. *Weiß. P. c.* 86. c.
H. in ericetis & ad truncos arborum putridos copiose pa-
- sim.
987. LICHEN, *deformis*, scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus dentatis. *Linn. Spec.* 1620. *Hall.* 1904. 1938.
H. in montosis sterilibus mucicosis *am Rehberg*, rarius,
h. *Fruticulosi*.
988. LICHEN, *rangiferinus*, fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. *Linn. Spec.* 1620.
 α . *alpestris*. *Hall.* 1957. *Weiß. P. c.* 95. ? *Lich. alpestris*.
 β . *sylvaticus*. *Hall.* 1956. S *Neck. M. M.* 68.
R 4 H. a.

- H. *a.* in montosis editoribus *am Galgenberg*; *Rehberg*; B. in sterilibus montosis ubique copiosissime.
- 989.** LICHEN, *uncialis*, fruticulosus perforatus, ramulis brevissimis acutis. *Linn. Spec. 1621. Hall. 1960.* *L. cernoides.* *Neck. M. M. 63.* var. *juniior.*
- H. in ericetis, inter *L. subulatum*, *am Galgen Berg*, infrequens.
- 990.** LICHEN, *subulatus*, fruticulosus subdichotomus, ramis simplicibus subulatis. *Linn. Spec. 1621. Hall. 1955.* *L. cornu cervi.* *Neck. M. M. 64.* B. *Weis. P. c. 97.*
- H. similibus locis sterilibus montosis passim.
- 991.** LICHEN, *paschalis*, fruticulosus solidus tectus foliolis crustaceis. *Linn. Spec. 1621. Hall. 1963.* *Neck. M. M. 66.*
- H. in sterilibus montosis *im Thiergarten*; unicum tantum specimen a Filio H. P. lectum: *Caulo & ramis lignosis solidis, intus non cavis; Tuberculis foliolisque puberulentis glomeratis fere toris obtectis*, possideo,
- 992.** LICHEN, *castaneus*, fruticosus, durus castaneus, surculis spinosis. *Hall. 1965. Dillen. H. M. 112. T. 17. f 31.*
- H. in ericetis montosis inter *L. subulatum am Homberg*; *Beilstein*, alibique copiose.
- Caulis biplicatus, ramosissimus, erectus, compresso-lacunosus, glaber, nitidus, spadicens, axillis non perforatis, interne medulla factus arachnoidea. Ramis copiosissimis, valde divisis & subdivisis, villosis; in secco, duris hispidis: in humido, mollissimis. Scutellæ in caulo & majoribus ramis terminales, rufa, marginata, radiatae: laciniulis setaceis confertis inqualibus. Callus basis saepe sanguineo-maculata; hinc l. islandico forte adhensus.*
- 993.** LICHEN, *quisquiliaris*, fronde cinerea, scabra, ramis brevibus acutis, scutellis nigerimis. *Hall. 2026. Mich. N. G. p. 78. T. 53. f. 8.*
- H. in rupium cavernalis, *am Geistlichen Berg*; alibique frequens, muscis intermixtus.
- Tenerrimi fruticuli, albidi, erecti, ramosissimi, ramulis acutis; sursum albido tectis. In aliis individualibus durioribus mitansque ramosus: Tubercula terminalia, conferta, atro-fusca.*
- i. *Filamentosæ.*
- 994.** LICHEN, *barbatus*, filamentosus pendulus subarticulatus

articulatus, ramis patentibus. *Linn. Spec. 1622,*
Hall. 1970. Neck. M. M. 71. Weis. P. c. 100.
H. in sylvis, in der Hörre frequens.

995. LICHEN, *jubatus*, filamentosus pendulus: axillaris compressis. *Linn. Spec. 1622. Hall. 1968.*
Neck. M. M. 72. Weis. P. c. 101.
H. in sylvis, ad arborum truncos in der Hörre; im Thiergarten frequens.

996. LICHEN, *lunatus*, filamentosus ramosissimus decumbens implicatus opacus. *Linn. Spec. 1623?*
Hall. 1967. Neck. M. M. 73. β.

H. in rupibus, segmentisque vetustis im Thiergarten, aliquo-

Nostr. ramosissimus; implexus, decumbens, fusco - ater, ramulis capillaribus hirsutis, per lenteam levibus; axillis compressis; tuberculisque exiguis ut in præcedente, cuius varietas est.

997. LICHEN, *pubescens*, filamentosus ramosissimus decumbens implexus nitidus. *Linn. Spec. 1623?*
Usnea nigra, seræ equinae facie, parum ramosa. Dillen. H. M. 67. T. 13. f. 11.

H. in rupibus, ericetis inque sylvis, non Homberg alioquin frequens.

Fila capillaria spithamea s. dodranalia subramosa, nigra, glabra, nitida, teretia, sagam equinam exalte referentia; soli obversa pellucida, purpurea, intus medulla candida farcta; exsiccata rigida linearia, planissima, spiraliter contracta, subviolacea. Rami pauci, breviores, remoti, patentissimi; quibus circumgyrando Hypna constringit, ut difficile separari queat. Filorum basis semper solitaria, frustulo ligni sed folio putrido, immo etiam ipsis Muscis, adnata.

998. LICHEN, *chalybeiformis*, filamentosus ramosus divaricatus decumbens implicato - flexuosus. *Linn. Spec. 1623. Hall. 1969. Neck. M. M. 73.*
H. in segmentis vetustis im Thiergarten rarius.

999. LICHEN, *birtus*, filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis. *Linn. Spec. 1623. Hall. 1973. Neck. M. M. 69. Weis. P. c. 101.*

H. in sylvis, ad arborés sepiem adque passim.

1000. LICHEN, *floridus*, filamentosus ramosus erec-

Etus, scutellis radiatis. Linn. Spec. 1624. Hall. 1972. Neck. M. M. 69. Weis. P. c. 102.
*H. in sylvis cum præcedente passim; in sepimentis vetustis
 im Thiergarten. Scutellis maximis ultra pollicem latis.*

BYSSUS G. P. 1208.

Lanugo aut Pulvis simplicissimus. S. N. 721.

a. *Filamentosæ.*

1001. BYSSUS, *Flos aquæ*, filamentis plumosis na-
 tantibus. *Linn. S. N. 721. Spec. 1637. Hall.*
 2113.

H. in omni aqua stagnante, superficie innatans.

1002. BYSSUS, *phosphorea*, lanuginosa violacea li-
 gnis adnascens. *Linn. Spec. 1638. Neck. M.*
M. 1.

H. in corticibus ramosis semiputridis arborum passim.

1003. BYSSUS, *velutina*, capillacea viridis: filamen-
 tis ramosis. *Linn. S. N. 721. Spec. 1638. Hall.*
 2101. *Neck. M. M. 2. Weis. P. c. 12.*

H. in terra humida umbrosa, in hortis passim.

1004. BYSSUS, *aurea*, capillacea pulverulenta, fru-
 ctificationibus sparsis, filamentis simplicibus
 ramosisque. *Linn. Spec. 1638. Hall. 2106.*
Neck. M. M. 1. Weis. P. c. 13.

H. in rupibus, mucos vestiens, inter Mn. hornum, & Lieb.
saccatum, am Weg nach dem Thiergarten zu.

1005. BYSSUS, *floccosa*, evanida floccosa nivea. *Leys.*
Fl. Hal. 1045. B. cellaris Weis. P. c. 18. Hall.
 2108.

H. in cellis ad dolia frequens.

1006. BYSSUS, *nigra*, velutina. *Hall. 2104. Dillen.*
H. M. 9. T. 1. F. 18.

H. in rupibus am Geistlichen Berg alibique frequens.

*Pulvilos format ambitu pollicares, aterrimos, pannum velutinum
 atrum exaltè referentes: Filamentis erectis confitas ramosissi-
 mis.*

b. *Pulverulenta.*

1007. BYSSUS, *antiquitatis*, pulverulenta atra. *Linn.*
Spec. 1638. Hall. 2081. Weis. P. c. 14.

H. in muris antiquis, & tectis schisteis passim.

1008.

1008. *Byssus, saxatilis*, pulverulenta cinerea rupes operiens. *Linn. Spec. 1638.* *Weis. P. c. 17.*
Lich. segestria. Neck. M. M. 113.
H. in saxis am Homberg, ubique frequens.
1009. *Byssus, candelaris*, pulverulenta flava lignis adnascens *Linn Spec. 1639.* *Hall. 2096.* Lichen.
Neck. M. M. 112. *Weis. P. c. 15.*
H. in cortice arborum, parietibus antiquis, Februario frequens.
1010. *Byssus, botryoides*, pulverulenta viridis. *Linn. Spec. 1639.* *Hall. 2089.* Lichen. *Neck. M. M. 111.* *Weis. P. c. 15.*
H. in terra humida umbrosa passim.
1011. *Byssus, incana*, pulverulenta incana, farinæ instar strata. *Linn. Spec. 1639.* *Hall. 2094.*
Weis. P. c. 16. Lichen. *Neck. M. M. 112.*
H. in cortice rimofo arborum, inque terra.
1012. *Byssus, lactea*, pulverulento - crustacea albissima. *Linn. Spec. 1639.* *Hall. 2093.* *Weis. P. c. 17.* Lichen. *Neck. M. M. 113.*
H. in arborum truncis, muscos vestiens.

• • *Aquaticæ.*

TREMELLA. G. P. 1204.

Fructificationes vix manifestæ, in corpore gelatinoso. S. N. 714.

1013. *TREMELLA, juniperina*, sessilis membranacea auriformis fulva. *Linn. Spec. 1625.* *Hall. 2260.*
H. in Junipero, aliisque lignis putridis primo vere am Homberg frequens.
1014. *TREMELLA, Nostoc*, plicata undulata. *Linn. Spec. 1625.* *Hall. 2041.* Lichen. *Weis. P. c. 29.*
Dillen. H. M. T. 10. f. 14.
B. Dillen, H. M. T. 10. f. 15.
1015. *Viridis membranacea undulato-plicata, semper fructifica-*
sione defituta. in pratis post pluvias, & inter muscos frequens; *B. Nigrescens gelatinosa, crassa, reticulato-plicata,*
fructificationibus sparsis conicis, in truncis arborum emortuis
passim. Floret hyeme.

1015.

1015. TREMELLA, *purpurea*, subglobosa sessilis solitaria glabra. Linn. Spec. 1626. Weis. P. c. 30. H. in arborum in primis Malii rami einoituis frequens.

ULVA. G. P. 1206.

Fructificationes in membrana diaphana. S. N. 719.

1016. ULVA, *granulata*, globosa farcta viridis. Linn. S. N. 720. Mant. 136. Spec. 1633. Tremella *globosa*. Weis. P. c. 28. Conferva Hall. 2123?

H. in agris humidis hinter dem Schlaß autumno; sphaerulis majoribus aggregatis, viridibus, farctis; pellucidis: ad ripas Dille auf dem Hinter-Sand, primo vere frequens.

CONFERVA. G. P. 1207.

Taberculae inæqualia in fibris capillaribus longissimis. S. N. 720.

a. *Filamentis simplicibus, equalibus, geniculis destitutis.*

1017. CONFERVA, *rivularis*, filamentis simplicissimis æqualibus longissimis. Linn. Spec. 1633. Hall. 2115. Neck. M. M. 3. Weis. P. c. 20. H. in rivulis auf der Herren Wiese; in der Dille frequens.

1018. CONFERVA, *fontinalis*, filamentis simplicissimis æqualibus digitis brevioribus. Linn. Spec. 1633. Hall. 2114. Neck. M. M. 4. Weis. P. c. 21. H. ad canarium oras aquas ducentium im Kallenbachs-Grund.

b. *Filamentis ramosis, equalibus.*

1019. CONFERVA, *bullosa*, filamentis æqualibus ramosis bullas aereas includentibus. Linn. Spec. 1634. Hall. 2120. Neck. M. M. 3. Weis. P. c. 22. H. in aquis stagnantibus, im quiden Weyer, elibique.

1020. CONFERVA, *canalicularis*, filamentis æqualibus basin versus ramosioribus. Linn. Spec. 1634. Hall. 2118. Neck. M. M. 5. Weis. P. c. 23. H. in rivulis canalibusque aquam vehentibus, bey der Papier- & Walckmühle frequens.

1021.

- 1021.** CONFERTA, *amphibia*, filamentis æqualibus ramosis, exsiccatione coëuntibus in aculeos. *Linn. Spec. 1634. Neck. M. M. 4. Weif. P. c. 24.*
H. in fossis bey dem Bockshayn; frequens.
c. Filamentis anastomosantibus.
- 1022.** CONFERTA, *reticulata*, filamentis reticulato-coadunatis. *Linn. Spec. 1635. Hall. 2119. Neck. M. M. 5. Weif. P. c. 24.*
H. in fossis aqua stagnante repletis, bey dem Sinner Hof.
d. Filamentis nodosis.
- 1023.** CONFERTA, *fluviaialis*, filis simplicissimis setiformibus rectis: geniculis crassioribus angulatis. *Linn. Spec. 1635. Dill. H. M. 39. T. 7. f. 47. et B. 48.*
H. a. unter der neuen Brücke; B. am Schützriemen, auf der Herrn Wiese, gegen Burgk über. Lapidibus sub aqua dense adnascens.
- 1024.** CONFERTA, *gelatinosa*, filis ramosis monili-formibus, articulis globosis gelatinosis. *Linn. Spec. 1635. Hall. 2124. Chara batracbosperma. Weif. P. c. 33.*
H. in scaturiginosis sylvaticis im Hirschberg ad Gundendorf frequens.
- 1025.** CONFERTA, *capillaris*, filis geniculatis simplicibus: articulis alternatim compressis. *Linn. Spec. 1636. Dillen. H. M. 25. Tab. 5. f. 25. A. et B. Neck. M. M. 8.*
H. in stagnis an der Dille bey dem Sinner Hof, rarius.
- 1026.** CONFERTA, *glomerata*, filamentis geniculatis, ramulis brevioribus multifidis. *Linn. Spec. 1637. Neck. M. M. 9. Weif. P. c. 25. a. Dillen. H. M. 28. T. 5. f. 31. & B. p. 27. T. 5. f. 28. & 29.*
H. a. in rivulis, unter dem Steg bey der obern Walckmühle; B. auf der Herrn Wiese.

Hic habes L. B. MUSCOS & ALGAS, quas decem annorum spatio, summo cum labore & molestia, in nostræ urbis regione vicinisque sylvis collegi, descripsi, & ad vivum accurate depicti;

pinxi ; Has, siquidem vires valetudine , dum haec scribo , summe infirmas restaurabit , & ulteriore lucis usum divina mihi concedet indulgentia , omnes ari incidere & cum descriptionibus sub Titulo : VEGETABILIA CRYPTOGAMICA ICONIBUS ILLUSTRATA , in lucem edere animus est.

D. F U N G I.

* Pileati.

AGARICUS. G. P. 1209.

Fungus horizontalis, subtus lamellosus. S N.

722.

a. *Stipitati . pileo orbiculato.*

1027. AGARICUS , Chantarellus , stipitatus , lamellis ramolis decurrentibus. Linn. Spec. 1639. Merulius Hall. 2326. Gled. Metb. Fung. 103. XII. H. in pratis sylvaticis am Rehberg, post pluvias autumno primoque vere frequens.
1028. AGARICUS , integer , stipitatus , lamellis omnibus magnitudine æqualibus. Linn. Spec. 1640. Hall. 2374. Gled. M. F. 106. XIV. H. in sylvis ad arborum radices im Thiergarten; autumno.
1029. AGARICVS , muscarius , stipitatus , lamellis di-midiatis solitariis , stipite volvato : apice dilatato , basi ovata. Linn. Spec. 1640. Hall. 2373. Gled. M. F. 82. I. H. in sylvis passim ; am Göldners - und Fischuruyer - Grund ; im Beilstein frequens.
1030. AGARICUS , dentatus , stipitatus , pileo convexo , lamellis basi mucrone dentatis. Linn. Spec. 1640. Hall. 2421 ? H. in sylvis ; im Thiergarten autumno.
1031. AGARICUS , deliciosus , stipitatus , pileo testaceo , succo lutescente. Linn. Spec. 1641. Hall. 2419. Gled. M. F. 101. XI. a. H. in montosis sylvaticis sterilibus am Homberg rarius ; am steinern Berg frequens.
1032. AGARICUS , piperatus , stipitatus , pileo planiusculo lactescente : margine deflexo , lamellis incarnato-pallidis. Linn. Spec. 1641. Hall. 2338. a) Pi-

2032. Pileo convexo-depresso, lamellis pallidis. *Linn. Flor. Suec.*
1195. α . *Gled. M. F.* 97. X. α .
2033. Pileo planiusculo disco conico, lamellis lividis *Linn. Flor. Suec.* 1195. β . *Gled. M. F.* 103. e.
- H. α . in pascuis & pratis in der Aue; vor dem Homberg; auf dem Schlüssel. β . ibidem rarius
2033. AGARICUS, *campesiris*, stipitatus, pileo convexo squamato albido, lamellis rufis. *Linn. Spec.* 1641. *Hall.* 2443. *Gled. M. F.* 145. XXI.
- H. in pascuis, pratis, ponariisque post pluvias Augusto & sequi. frequens.
2034. AGARICUS, *georgii*, stipitatus, pileo flavo convexo, lamellis albis. *Linn. Spec.* 1642. *Hall.* 2367. *Gled. M. F.* 117. e.
- H. in pascuis sylvaticis am Beilstein, abunde Septembri.
2035. AGARICUS, *violaceus*, stipitatus, pileo rimoso; margine violaceo tomentoso, stipite cærule-scente lana ferruginea. *Linn. Spec.* 1641. *Hall.* 2455.
- H. in pascuis sylvaticis circa Ockersdorf & Amdorf.
2036. AGARICUS, *cinnamomeus*, stipitatus, pileo sor-dide flavo, lamellis luteo rufis *Linn. Spec.* 1642. *Hall.* 2432.
- H. in pascuis sylvaticis am Rehberg, Octobri.
2037. AGARICUS, *mammopus*, stipitatus, pileo con-convexo acuminato griseo, lamellis convexis griseis crenatis, stipite nudo. *Linn. Spec.* 1642.
- H. in pascuis hinter dem Schloß; locis umbrosis, ad sepes.
2038. AGARICUS, *extinctorius*, stipitatus, pileo cam-paniformi albido lacero, lamellis niveis, stipite subbulboso subulato nudo. *Linn. Spec.* 1643. *Hall.* 2341. 2342. *Gled. M. F.* 130. XXVII. cum Var.
- H. in dumetis, sepibus, pascuis, & muscosis locis sylvari-cis passim.
2039. AGARICUS, *fimetarius*, stipitatus, pileo cam-pularato lacero, lamellis nigris lateraliter fle-xuosis, stipite fistuloso. *Linn. Spec.* 1643. *Hall.* 2357. *Gled. M. F.* 122. XXIV. α .
- H. in fimetis & ambulacris hortorum, intra extraque urbem frequens.

1640.

1040. AGARICUS, *campanulatus*, stipitatus, pileo campanulato striato pellucido, lamellis adscendentibus, stipite nudo. *Linn. Spec. 1643.*
H. in pratis *auf dem neuen Wiesen* frequens.
1041. AGARICUS, *fragilis*, stipitatus, pileo convexo viscidio pellucido, lamellisque luteis, stipite nudo. *Linn. Spec. 1643. Hall. 2425. & 2426.*
H. in hortorum ambulacris, & lignis semiputridis *auf dem Hinter-Sand*; rarius.
1042. AGARICUS, *umbelliferus*, stipitatus, pileo pliato membranaceo, lamellis basi latioribus. *Linn. Spec. 1643. Hall. 2346. Gled. M. F. 126. g. & 126. f.*
H. in foliis dejectis, rejectamentisque hortorum passim; *bey dem dicken Thurm*, alibique
1043. AGARICUS, *androsaceus*, stipitatus albus, pileo plicato membranaceo, stipite nigro. *Linn. Spec. 1644. Hall. 2351. Gled. M. F. 108. XV.*
H. in foliis dejectis, Pini strubilis, & inter muscos *am Homberg, im Thiergarten*, alibique.
1044. AGARICUS, *clavus*, stipitatus, pileo luteo, convexo striato, lameliis stipiteque albis. *Linn. Spec. 1644. Hall. 2370. Gled. M. F. 109. XVII. a.*
H. in graminosis muscosis umbrosis *vor dem Homberg am Winkel*, rarius Aprili.

b. Acaules.

1045. AGARICUS, *Quercinus*, acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Linn. Spec. 1644. Hall. 2330. Gled. M. F. 134. XXX.*
H. in arborum in primis Quercus truncis emortuis *in der Hirre* alibique frequens.
1046. AGARICUS, *Betulinus*, acaulis, coriaceus villo-sus: margine obtuso, lamellis ramosis anastomosantibus. *Linn. Spec. 1645. Merulius Hall. 2329.*
H. in caudicibus Betularum, aliquaque lignis, *auf dem Hintersand*.
1047. AGARICUS, *Alneus*, acaulis, lamellis bifidis pulverulentis. *Linn. Spec. 1645. Hall. 2333. Gled M. F. 134. XXXI.*
H. in arborum truncis-emortuis *in der Alzbach*, rarius.

BOLE-

- 1048.** AGARICUS, *cervinus*, petiolo bulboso, faro, pileolo per oram tuberculofo & striato.
Hall. 2401.
H. in rejectamentis coriariorum intra urbem. Octobri.
- 1049.** AGARICUS, *flavus*, totus striatus tenuissimus.
Hall. 2429.
H. in sterilibus montosis *am Homberg*. Octobri.
- 1050.** AGARICUS, *viscidus*, petioli carne flava, pileo plano, sordide luteo, lamellis albis. *Hall.* 2369.
H. in Pineto *in Hoffmanns Tannen*. Septembri.
- 1051.** AGARICUS, *murinus*, pileo ovato adtracto.
Hall. 2473.
H. in sterilibus muscosis *im Thiergarten*. Aprili.
- 1052.** AGARICUS, *cervinus annulatus* procerus exiguus. *Hall.* 2403.
H. in sylvaticis umbrosis *im Thiergarten*. Aprili.
- 1053.** AGARICUS, *violaceus*, petiolo gracili, pileo pulvinato. *Hall.* 2457.
H. in sylvis *am Homberg*. Octobri.
- 1054.** AGARICUS, annulo araneofso, pileo flavo, lamellis ex flavo fuliginosis. *Hall.* 2482.
H. in sylvis *am Homberg*. Octobri.
- 1055.** AGARICUS, petiolo procero gracilissimo, pileolo conico striato murino, lamellis albis. *Hall.* 2391.
H. in muscosis sterilibus *am Homberg*, inter Hypna. Julio.
- 1056.** AGARICUS, pileo pulvinato, leonino, centro fusco squamoso. *Hall.* 2360, an. Mich. N. G. T. 75. f. 4.
H. in foliis congestis putridis *am Homberg*. Octobri.
- 1057.** AGARICUS, infundibuli forma, cervinus lamellis albis. *Hall.* 2359. *Gled. M. F.* 119. b ?
H. similibus locis *am Homberg*. Octobri.
- 1058.** AGARICUS, petiolo gracili, praelongo, pileolo striato conico. *Hall.* 2345. f. 2347. *Gled. M. F.* 120. VI. f. 128. k.
H. inter Hypna *am Homberg*. Octobri.
- 1059.** AGARICUS, *cespitosus*, petiolo procero, fistuloso,
S

stuloso, pileo umbonato, striato, squamoso;
Hall. 2389.

H. ad arborum radices am Hornberg.

1060. AGARICUS, radice caudata, petiolo fistuloso procero, pileo umbonato, cinereo, striato, lamellis albis. Hall. 2388. Gled. M. F. 24. XXV.

H. locis umbrosis hinter dem Schloß Octobri.

1061. AGARICUS, albus, pileo hæmisphærico, ex-tarni, oris striatis. Hall. 2348. Gled. M. F. 20. c.

H. ad arborum cortices inter Lichenes imbric. post pluvias diurnas, toto fere anno frequens.

1062. AGARICUS, flavus, volvatus, annulo latissimo. Hall. 1430. Gled. M. F. 85. b.

H. in quisquiliis putrescentibus, auf dem Hinter-Sand. Octobri.

1063. AGARICUS, albus omnium minimus, pileolo hæmisphærico. Hall. 2349 Gled. M. F. 21. d.

H. in foliis putrescentibus autumno passim.

BOLETUS. G. P. 1210.

Fungus horizontalis, subtus porosus. S. N.
723.

a. Parasitici aculei.

1064. BOLETUS, *suberosus*, acaulis pulvinatus albus lœvis, poris acutis difformibus. Linn. Spec. 1645.
H. in arborum caudicibus am Hornberg; im Thiergarten; auf dem Hinter-Sand, alibique.

1065. BOLETUS, *fomentarius*, acaulis pulvinatus inæqualis obtusus, poris teretibus inæqualibus glaucis. Linn. Spec. 1645.

H. cum precedente, im Beilstein frequens.

1066. BOLETUS, *igniarius*, acaulis pulvinatus lœvis, poris tenuissimis. Linn. Spec. 1645. Hall. 2288. Gled. M. F. 78. XII.

H. ad arborum truncos antiquos, passim.

1067. BOLETUS, *versicolor*, acaulis: fasciis dicoloribus, poris albis. Linn. Spec. 1645. Hall. 2282. Gled. M. F. 68. b.

H. ad arborum truncos subemortuos, ubique vere & aequino frequens.

1068.

b. Stipitati.

- 1068.** BOLETUS, *viscidus*, stipitatus, pileo pulvinato viscido poris teretibus convexis immersis distinctis, stipite lacero. *Linn. Spec.* 1646.
H. in sylvis *bei dem Gädners* - & *Fischauer* - *Grund*. auctummo.
- 1069.** BOLETUS, *luteus*, stipitatus, pileo pulvinato subviscido, poris rotundatis convexis flavissimis, stipite albido. *Linn. Spec.* 1646. *Polyporus*.
Hall. 2301.
H. in sylvis *am Homberg*; *im Beilstein*, alibiique autumno copiosissime.
- 1070.** BOLETUS, *bovinus*, stipitatus, pileo glabro pulvinato marginato. poris compositis acutis: porulis angulatis brevioribus. *Linn. Spec.* 1646.
Hall. 2302. *Gled. M. F.* 63. L
H. in pascuis sylvaticis *im Pulvers* - & *Gädners* - *Grund* copiosissime. Octobri.
- 1071.** BOLETUS *subtomentosus*, stipitatus, pileo flavo subtomentoso, poris subangularis disformibus fulvis planis, stipite flavo. *Linn Spec.* 1647.
Hall. Polypor. 2311. *Gled. M. F.* 73. a ?
H. in montosis *im Homberg*. Aprili.
- 1072.** BOLETUS, *flabelliformis*, stipitatus coriaceus, poris tenuissimis, stipite laterali. *Leyser Hal.*
Hall. 2315. *Gled. M. F.* 80. d.
- ***
- 1073.** BOLETUS, petiolatus niveus, alveolis subtus quadrangulis. *Hall.* 2295.
H. in sylvaticis montosis *im Thiergarten*, primo vere.
- 1074.** BOLETUS, *sessilis*, carne secedente, mollis, sanguineus, crassus, obscure lobatus. *Hall.* 2315. *Gled. M. F.* 77. X ?
H. in truncis emoribundis *im Beilstein*. Septembri.
- HYDNUM. G. P. 1211.**
- Fungus horizontalis**, subtus echinatus. S. N.
724.
- 1075.** HYDNUM, *imbricatum*, stipitatum, pileo convexo imbricato. *Linn. Spec.* 1647. *Hall. Ecbinus* 2314. *S 2* H.

H. in Pinetis am Homberg; Beilstein, autumno.

- 1076.** HYDNUM, *repandum*, stipitatum, pileo convexo lævi flexuoso. *Linn. Spec.* 1647. *Hall.* 2325. *Gled. M. F.* 74. VI.

H. in sylvis am Homberg; im Thiergarten, copiose.

- 1077.** HYDNUM, *tomentosum*, stipitatum, pileo plano infundibuliformi. *Linn. Spec.* 1647.

H. in montosis muscosis am Homberg. Martio.

- 1078.** HYDNUM, *auriscalpium*, stipitatum, pileo dimidiato. *Linn. Spec.* 1648. *Hall.* 2321. *Gled. M. F.* 74. VII.

H. in sylvis aceriosis am Stützelberg; in Hoffmanns Tannen, rarius; im Thiergarten copiose. Strobilis Pini dejectis putrescentibus innascens. Novembr.

- 1079.** HYDNUM, *parasiticum acaule*, arcuato-rugosum tomentosum. *Linn. Spec.* 1648.

H. in arborum truncis am Beilstein frequens.

- 1080.** HYDNUM, *laciniatum*, ramiosus niveus, aculeis parallelis horizontalibus, unilateralibus. *Echinus Hall.* 2317. *Mich. N. G.* 122. *T.* 64. *f. 2. optime.*

H. in caudicibus arborum in der Hörre. *Filius.* Octobri.

Fungus allefissimus, elegans. Stipes crassus, carnosus, ramosissimus, rāmis subteretibus, divisīs & subdivisiis, apice bi f. trifidis obtususculis; Aculei numerosi, concolores horizontales, in stipite ramisque unilaterales.

PHALLUS. G. P. 1212.

Fungus supra reticulatus, subtus lavis. S.N.

724.

- 1081.** PHALLUS, *esculentus*, pileo ovaro celluloso, stipite nudo rugoso. *Linn.* 1648. *Boletus Hall.* 2247. *Gled. M. F.* 60. a.

H. in sylvis am Homberg rarius; in der Hörre copiose. Aprili.

- 1082.** PHALLUS, *impudicus*, volvatus stipitatus, pileo celluloso. *Linn. Spec.* 1648. *Hall.* 2248. *Gled. M. F.* 54. a. I. & B. 55. II.

- H. in sylvis α. im Thiergarten; β. in dumetis oben am Fischweyer-Grund. Septembri. α. Pileo spis clauso. β. Pileo apice pervio.

** Pileo

** *Pileo destituti.*

HELVELA. G. P. 1214.

Fungus turbinatus. S. N. 725.

1083. *HELVELA, mitra, pileo deflexo adnato lobato difformi.* Linn. Spec. 1649. *Boletus Hall.*

2246. Gled. M. F. 38. c.

H. in sylvis unter denen Tannen im Thiergarten rarius.

PEZIZA. G. P. 1215.

Fungus campanulatus, sessilis.

1084. *PEZIZA, lentifera, campanulata lentifera.* Linn. Spec. 1649.

a. *Cyathus sériceus, intus lèvis.* Hall. 2215. Gled. M. F. 137. I.

β. *Cyathus hirsutus intus striatus.* Hall. 2215. Gled. M. F. 138. a.

H. a. in terra glareosa, ex frustulo ligni sepulto; β. in truncis arborum semiputridis; auf dem Hinter - Sond. Octobri.

1085. *PEZIZA, minuta, campanulata lentifera stipitata.* an. Hall. 2338?

H. in Jungermanniæ platyphyllæ frondibus emarcidis, am Geißlichenberg. Octobri.

Omnium minima, vix lineare longa, Calycem hyalinum vinarium vulgo Kelchgläss dictum exactissime referens. Stipes semilineam longus, purpureus, basi orbiculata. Scyphus campaniformis, flavescent, membrana convexa clausus, qua decicante, intus totus semiisibus repletus. Semina magnitudine & figura sem. Papaveris singulari modo elastice dissiliunt, in laciniis radiantes debiscunt, lanamque niveam explodunt. Scypha vacuo persistente.

1086. *PEZIZA, punctata, turbinata truncata, disco punctato.* Linn. Spec. 1650. *Sphæria Hall. 2184.* Gled. M. F. 44. VII.

H. in stercore equino bovinoque. auf aem Schießplatz rarius.

1087. *PEZIZA, cornucopioides, infundibuliformis, disco patente fimbriato - punctato.* Linn. Spec. 1650. Hall. 2216.

H. in sylvaticis am Dollberg; in sepibus hinter dem Schloß; bey dem Klingelborn, infrequens.

1088. PEZIZA, *Acetabulum*, cyathiformis : extus angulata venis ramosis. Linn. Spec. 1650. Hall. 223. Gled. M. F. 42. VI.
H. in sylvaticis montosis *am Griflichen Berg*; *im Thiergarten*.
1089. PEZIZA, *cyathiformis* : margine obtuso erecto. Linn. Spec. 1651.
H. ad terram in sylvaticis umbrosis *im Beilstein*; circa Erbach frequens.
1090. PEZIZA, *cupularis*, globoſo - campanulata: in margine crenato. Linn. Spec. 1651. Hall. 221.
H. ad terram *hinter dem Schloß*, *in der Höhle*; *in sylvis im Hirschberg* copioſe.
1091. PEZIZA, *scutellata*, plana : margine convexo piloſo. Linn. Spec. 1651. Hall. 2242. Gled. M. F. 45. a.
H. in sylvis, inter muſcos ad terram *am Homberg*, alibi que frequens.
1092. PEZIZA, *cochleata*, turbinata cochleata. Linn. Spec. 1651. Hall. 2218?
H. locis umbrosis in sylvis *im Mühlberg*, rarius.
1093. PEZIZA, *Auricula*, concava rugosa auriformis. Linn. S. N. 725. Tremella *Auricula*. Spec. 1625. Hall. 2220 Gled. M. F. 39 III.
H. in caudicibus arborum, imprimis sambuci senio moribundis in pomariis paſſim. Octobri.
Pharm. FUNGE SAMBUCINI, f. *AURICULA JUDE*.
1094. PEZIZA, ſeſſilis. infandibuliformis, extus hirsuta, unibrina, intus nigerrima. Hall. 2219. T. 48. f. g. optime.
H. in caudicibus arborum *auf dem Hinter-Sand*; *vor dem oberen Thor*, *auf dem Zimmerplatz*; frequens.
- ***
1095. PEZIZA plana, flava breviffime petiolata. Hall. 2241.
H. in truncis putridis *im Schusters-Grund*. Octobri.
1096. PEZIZA humida, exilis, læte rubicunda. Hall. 2245.
H. in ligno putrefacente in Teſtis *am Homberg*. Octobri.
Schelleformis plana, sanguinea, marginata, ſeſſilis, bafi piloſa.

1097.

1097. PEZIZA nivea, infundibuliformis, brevissime petiolata. *Hall.* 2239. *Gled. M. F.* 46. c?
H. in truncis putridis passim.
1098. PEZIZA planissima, ex glauco nigricans. *Hall.*
2243.
H. similibus locis.
1099. PEZIZA plana, sessilis glauca, extus nivea. *Hall.* 2244.
H. in truncis putridis inter corticem. Var. *præced.*
1100. PEZIZA minima, petiolata, coccinea, hirsuta. *Hall.* 2240.
H. in ligno putrescente.
1101. PEZIZA plana, sessilis miniata, oris ciliatls. *Hall.* 2245. *Peziza minima lutea verna. Dill.*
cat. Giss. 195. *Gled. M. F.* 45. VIII.
H. ad terram in ambulacris hortorum frequens inter Brya,
Non est var. *scutellata*. *Scutellæ fulva, carnosa; sessiles, mar-*
ginata, limbo piloso tumido.
1102. PEZIZA minima alba, petiolata, scypho infundibuliformi. *Hall.* 2238. et forte 2237.
H. in virgultis siccis passim.

CLAVARIA. G. P. 1216.

Fungus lavis, oblongus, S. N. 725.

a. Indivisa.

1103. CLAVARIA, *pistillaris*, clavæformis simplicissima. *Linn. Spec.* 1651. *Hall.* 2203. *Gled. M. F.* 26. I.
H. in sylvis umbris im *Breitscheider Wald*; im *Thiergärtens*. Novembri.
1104. CLAVARIA, *militaris*, clavata integerima capite squamoso. *Linn. Spec.* 1652. *Hall.* 2204.
H. in sylvis in der Hörre; im *Hirschberg*, rarius.
1105. CLAVARIA, *ophioglossoides*, clavata integerima compressa obtusa. *Liun. Spec.* 1652.
Hall. 2206.
H. in sylvaticis inusciosis editioribus, oben am Beilstein, Octobri.

b. Ramosa.

1106. CLAVARIA, *digitata*, ramosa lignea nigra. *S 4* *Linn.*

*Linn. Spec. 1652. Sphaeria. Hall. 2193. Mich.
N. G. 104. T. 54. t. 4. s.*

*H. in columnis cariosis prope terram, in Horto meo annua-
tim provenit. Octobri.*

1107. CLAVARIA, *Hypoxylon*, ramoso - cornuta
compressa. *Linn. Spec. 1652. Sphaeria. Hall.
2194.*

*H. in truncis arborum ceduis, in pomariis umbrosis vor dem
Hornberg; am Hayn-Winkelgen, alibique frequens.*

1108. CLAVARIA, *Coralloides*, ramis confertis ra-
mosissimis inaequalibus. *Linn. Spec. 1652.
Hall. 2201. Gled. M. F. 31. III.*

*B. Clavaria, purpurea, corpore multifido, inaequali & ramo-
sissimo, in apices graciles terminato. Gled. M. F. 32. c.*

*H. in sylvis im Hirschberg frequens. B. in umbrosis aus der
Höhle hinter dem Schloß, in sylvis in der Horre frequens.*

*Colore pulcherrime puniceo. Ramis totis fructificatis omnibus exaffe-
ratis conicis concoloribus.*

1109. CLAVARIA, *fastigiata*, ramis confertis ramo-
sissimis fastigiatis obtusis luteis. *Linn. Spec.
1652.*

H. in sylvis im Thiergarten parvus.

1110. CLAVARIA, *muscoides*, ramis ramosis acumi-
natis inaequalibus luteis. *Linn. Spec. 1652.
Hall. 2199.*

*H. locis sterilibus muscosis, inter Lich. rangifer. am Horn-
berg, alibique frequens.*

LYCOPERDON. G. P. 2117.

*Fungus subrotundus, feminibus farinaceis
repletus. S. N. 726.*

a. Solida, subterranea absque radice.

1111. LYCOPERDON, *Tuber*, globosum solidum
muricatum, radice destitutum. *Linn. Spec.
1653. Hall. 2177.*

H. in sylvis, sub terra, circa arcem Beilstein. Grüter, Confit.

1112. LYCOPERDON, *Cervimum*, globosum solidiu-
sculum centro farinifero, radice instructum.
Linn. Spec. 1653. Sphaeria. Hall. 2191.

H. in

?

H. in sylvis montosis *im Beilstein*, a me ipso lectum; *bey dem Klingelborn rarius*; *im Ebersbacher Grund*, copiose.

Pharm. BOLETUS CERVINUS.

III 13. LYCOPERDON, totum exasperatum, petiolo cylindrico, capitulo sphærico. *Hall.* 2171.

Gled. M. F. 144. e

H. in sterilibus montosis *am Homberg*, Augusto.

b. *Palveralenta*, *radicata supra terram*.

III 14. LYCOPERDON, *Bovista*, subrotundum lacera-to-dehiscens. *Linn. Spec.* 1653.

a. laeve, **β. hispidum,** $\left\{ \begin{array}{l} \text{sessile vel stipitatum.} \\ \text{Hall. 2171. 2172.} \end{array} \right.$

Gled. M. F. 143. I. confer. varietates. & 144. e.

H. ad Terram **a.** in sylvis *im Thiergarten*, copiose. **β.** in pa-scuis montosis sterilibus *auf dem Homberg*, frequens. Figura & magnitudine valde ludit.

III 15. LYCOPERDON, *stellatum*, volva multifida pa-tente, capitulo glabro: ore acuminato denta-to. *Linn. Spec.* 1653. *Hall.* 2174. *Gled. M. F.* 152. b.

H. in montosis sylvaticis *am Geistlichen Berg*, rarius.

III 16. LYCOPERDON, *pedunculatum*, stipite longo, capitulo globoso glabro: ore cylindrico inte-gerrimo. *Linn. Spec.* 1654. *Hall.* 2170. *Gled. M. F.* 150. III.

H. in campis sterilibus fabulosis *auf dem Hinter-Sand*; *auf dem Schießplatz*, rarius.

III 17. LYCOPERDON, *minimum*, pedunculatum, sti-pite bulbose, capitulo subrotundo lævi, ore tubulo multifido.

H. in stipitibus Equiseti putrescentibus, in paludosis prope Sinn, frequens.

Funguli subaggregati, vix semilineam longi. Stipes basi bulbosus, -sanguineus, pellucidus. Capitulum ab initio globosum, minia-sum, centro annulari depresso, dein poro dehiscente, tubus adscendit brevis, margine multifidus, ex quo pollen purpureum evolat.

c. Parasitica, in farinam fatescentia.

III 18. LYCOPERDON, *variolosum*, parasiticum sessile subrotundum, cortice exteriore fulvo deci-

duo , farina atra compacta: Linn. S. N. T. III.
p. 234. *Lycogala*: Hall. 2142.. Gled. M. F.
161. III. a.

H. in arborum ramis emortuis dejectis , primo vere ubique
frequens.

1119. *Lycoperdon* , *pisiforme* , globosum scabrum:
ore perforato. Linn. S. N. 726?

H. in caudicibus arborum putrescentibus ; in pomariis vor
dem untern Thor. Novembri.

1120. *Lycoperdon* , *Epidendrum* , cortice farinaque
purpurea. Linn. Spec. 1654. Hall. 2173. Gled.
M. F. 150. IV.

H. in lignis putrescentibus , & ad Terram auf dem Hinter-
sand. Colore sanguineo, purpureo flavo fuscoque ludit.

1121. *Lycoperdon* , *epiphyllum* , aggregatum para-
siticum ore multifido lacero : pulvere fulvo.
Linn. Spec. 1655.

H. in pagina inferiore Foliorum Tussilaginis.

MUCOR. G. P. 1218.

Fungus vesiculis stipitatis S.N. 726.

a. Perennes.

1122. *Mucor* , *sphaerocephalus* , perennis stipite fili-
formi nigro , capitulo globoso cinereo. Linn.
Spec. 1655. *Trichia*. Hall. 2161.

H. in parietibus , & cortice arborum rimoso am Homberg , in
Conradi Garten.

1123. *Mucor* , *lichenoides* , perennis , stipite subu-
lato nigro , capitulo lenticulari cinereo. Linn.
Spec. 1655.

H. in corticibus arborum am Homberg.

1124. *Mucor* , *Embolus* , seta nigra , villo fusco.
Linn. Spec. 1655. *Embolus*. Hall. 2137.

H. in truncis arborum putrescentibus , bey dem Haynrich-
ckelgen.

1125. *Mucor* , *fulvus* , perennis pallidus , pileo
fulvo. Linn. Spec. 1655.

H. in arborum cortice , in pomario hinter dem Schloß bey dem
Ausfluß der Mühlbach.

1126.

1126. MUCOR, furfuraceus, perennis viridis, foliis furfuraceis, stipite filiformi, capitulo globo-
so. *Linn. Spec. 1655. Trichia. Hall. 2162.*

H. ad Terram, in frustulis ligni putrescentis, *am Geistlichen Berg* frequens.

1127. MUCOR, rufus, stipitatus, capitulo subrotun-
do rufo. *an. Trichia. Hall. 2163?*

H. in ligno putrescente rarius.

Stipes setaceus niger. Capitulum subrotundum, depresso, ru-
fum, superficie villosa. Rupta epidermide lana assurgit, evo-
lueque nivea, polline rufo.

1128. MUCOR, violaceus, stipitatus, capitulo len-
tiformi depresso.

H. in ligno putrescente.

Stipes lineam longus niger. Capitulum magnitudine & figura
lentis minoris, depresso; quod in centro debiscit in laciniis
radiantibus, pollen pulcherrime violaceum; lana albissima adha-
rens excutit.

b. Fugaces.

1129. MUCOR, Mucedo stipitatus capsula globosa.
Linn. Spec. 1655. Hall. 2147. Gled. M. F. 161. IV.

H. in variis putrescentibus, Pane, Plantis exsiccatis.

1130. MUCOR, leprosus, setaceus, seminibus radi-
calibus. *Linn. Spec. 1656.*

H. in truncis putredine excavatis, *am Homberg.* Octobri.

1131. MUCOR, glaucus, stipitatus, capitulo subro-
tundo aggregato. *Linn. Spec. 1656. Gled. M. F. 24. VI.*

H. in pomis putredine corruptis.

1132. MUCOR, lacteus, stipitatus, capitulo purifor-
mi oblongo lacteo.

Mucilago minima clava effigie, lacteum candorem simulans,
pediculo donata. *Mich. 216. no. 4. T. 96. f. 4. optime.*
Embolus. Hall. 2138.

H. in trunco putrescente *am Homberg* rarius. Novembri.

Substantia fungosa, fragilissima, mox contabescens, apice perfo-
rata.

1133.

- 1133. MUCOR, niveus, stipitatus, capitulo globoſa
niveo nitido. Lycogala. Hall. 2146.**
H. similibus in putrefcentibus.
*Stipes duas lineas longus, cinereus, striatus. Capitulum ni-
veum, dein glaucum, epidermide tenaci, liquamen flavum con-
tinens.*
- 1134. MUCOR, coccineus, stipitatus, capitulo sub-
rotundo. Trichia. Hall. 2164.**
H. in ligno putrido semisepulto am Homberg. Martio.
*Stipes lineam unam longus, nigricans. Capitulum magnitudi-
ne grani piperis, globoſum, eximie coccineum. Epidermis vi-
digito tacta infra medium circumciditur, & lana carneus ef-
surget, in formam Clava; pollen purpureum elastice ejaculari;
stipite cum volva hemisphaerica persistente.*
- 1135. MUCOR, pyriformis, stipitatus, capitulo py-
riformi purpureo. Trichia. Hall. 2167.**
H. in cavis cariosisque arboribus passim.
*Stipes solitarius, vel ex una basi multiplex. Capitulum pyrifor-
me, purpureum, nitidum, stipite longius. Cuticula in medio
transversim rupta, lana effurgit densa, pollinifera concolor,
conum simulans altitudine semipollucari.*
- 1136. MUCOR, pomiformis, substipitatus, capitulo
globoſo fulvo. Trichia. Hall. 2167.**
H. similibus in locis.
Capitula globoſa, aggregata, subfessilia. Lana & pollen fulvum
- 1137. MUCOR, crustaceus, stipitatus, spicis digita-
tis. Linn. Spec. 1656.**
H. in variis cibis corruptis.
- 1138. MUCOR, cespitosus, stipite ramoso, spicis
ternatis. Linn. Spec. 1656.**
H. in rejectamentis hortorum putrefcentibus.
- 1139. MUCOR, Erysiphe, albus, capitulis fuscis
sessilibus. Linn. Spec. 1656.**
H. in foliis Sonchi, Humuli Lamii.
- 1140. MUCOR, septicus, unctuosus flavus. Linn.
Spec. 1656. Fuligo. Hall. 2133. Gled. M. M.
160. d.**
H. in lignis putridis.

F I N I S.

Nota

Nota ad B. L.

Menda, quae irrepserunt B. L. eo magis excusabis, quia cum propriis negotiis implicatus, semperque tenui fuerim valetudine, & insuper homine hujus rei completa notitia instruto destituerer, ipsemet hasce paginas elaborare, meisque tantum oculis perlustrare coactus fui. Sequentia itaque pro tuo candore corrigas & emendes rogo:

ADDENDA ET EMENDANDA.

Pag. 5. n. 20. VER. *Acinifol.* Hall. 574. lege 547.
— 8. n. 31. *POLYCNEUM* adde: G. P. 53.

post n. 51. inseratur:

AGROSTIS, *Calamagrostis*, panicula incrassata, petalo exteriore toto lanato apice aristato, culmo ramoso. *Linn. Spec. 92.* (*Arundo. Hall. 1521.*)

H. in sylvaticis paludosis im Hirschberg ad Pagum Gundersdorf. Floret Julio.

Radix densa, fibrosa, arcte implexa. Culmi 4 f. 5 - pedales, in nostrate non ramosi, erecti, stricti, scabri, binodes: Geniculo unico juxta basin, altero in culmi medio. Folia radicalia sesqui- & bipedalia, duriuscula lata, albido viridia, basi involuta, utrinque, imprimis subrufa scaberrima. F. culinea, inferiora plura pramorsa seu emarcida, 2 f. 3 stricta, patentissima: Vaginis arctis, scabriusculis; Ligula oblonga, acuta, fissa. Panicula semipedalis, oblonga, ante & post florescen- tiam in spicaformam contracta; florens patens: Pedunculis ver- cillatis, strictis, ad angulum acutum discedentibus, basi in nodum callosum coalitis; Pedicellis brevissimis: Flosculis den- se confertis, subsecundis. Calyx uniflorus, glumis equalibus, subulatis, dorso hispidiusculis: exteriore angustiore mucronata, rufescens. Corolla membranacea, albida, basi lanata: pilis inaequalibus, calyce paulo brevioribus: Petalum exterius acuminatum, apice fiso, calyce dimidio minus; Aristam ex dorsi medio exserens rectam, crassie ubique aqualem, scabram, ca- dice brevioriem: Petalum interius duplo minus, apice bifidum. Nectaria duo lanceolata, basi callosa germen ambientia. Sta- mina longitudine corolla. Antheræ bifurca, ochroleuca. Ger- men subrosundum, Styli patentes, crassiusculi. Stigmata densa, plumis-

- plumulosa.* Semen *acuminatum*, corolla *adnatum*, lana *tin-*
etum, Arista *erecta* paulo longiore.
- Pag. 21. n. 56. lin. 12. VAR. A.G. lege: VAR. A.G.R. cet.
 p. 23. n. 59. ATRA *cespitosa* lin. 7. Epidermæ *plicata*
 cet. lege: *Epidermide plicata* & cet.
- p. 23. lin. 8. *armato* lege: *armata*.
- p. 29. lin. 2. Geniculi 3 f. 4, subcylindracei cet. lege: Geni-
 culis subcylindraceis cet.
- p. 34. n. 77. lin. 17. *brevissimi*, lege: *brevissimi*.
- p. 35. n. 79. lin. 15. pro *comprejac* lege: *compressas*.
- p. 36. n. 81. lin. 7. pro *levis*. Geniculi cet. lege: *levis*:
 Geniculis 4 f. 6, subglobosis, nudis.
- p. 38. n. 84. lin 6. Geniculis, 3, lege: Geniculis **3**,
- p. 44. n. 93. infra pro Variat. lege: Variat sine puncto,
- p. 46. n. 96. lin. 7. pro constans lege: constans c. p.
- p. 48. n. 93. lin. 10. *læthale* lege: *lethale*.
- p. 50. n. 101. MONTIA *fontana* addatur: H. in paludosis
 silvaticis im *Hirschberg* bey Gundsdorf.
- p. 54. post n. 120. CORNUS *mas*, inferatur: H. in sepibus
 ad pagum *Breidscheid*.
- p. 54. n. 122. lin. 7. pro Syst. NATH. III. 236. lege :
 Syst. NAT. T. III. 236.
- p. 73. lin. 36. *dragmas* lege: *drachmas*.
- p. 86. n. 258. LILIUM *Martagon* addatur: H. in dumetis
 am besten Geörgen-Berg im Winckel in der Hecke.
- p. 97. n. 291. adice: Pharm. VITIS I DAEAS Rob. (Bacca)
- p. 105. n. 325. Petala calyce duplo breviora lege: *dimidio*
breviora.
- p. 117. n. 380. ad ROSA M *semperfirrens*. Mea *umbellata* ni-
 hil aliud esse videtur:
- Aculei recurvi, in ramulis sub floribus numerosiores tenuio-
 res recti purpurascentes. Stipulae uti folia supra glabra,
 subitus marginibusque villoso - virides, glandulæ fusco pur-
 pureis undique adspersae, odoratae, odore pomorum. Pe-
 tricoli aculeati, glandulosi viscidæ. Foliola inferiora septena,
 superiora quina tantum, ovata, serrata, ferraturis subincisis.
 Flores singuli rami terminales subumbellati 3-5. 7. laterales.
 Sepius solitarii, pedunculi aculeis rectis hispidi, quorum incommu-
 dius, nudus, reliqui bracteati, bracteis duabus oppositis lan-
 ceolato-acuminatis, glandula incisis. Germen subglobosum.
 Aculeatum. Caiycis foliola pinnatifid. more canina. At
 omnia foliola, glandulis, stipitatis. Adspersa visco. Flos par-
 vus, Corolla qualèm dixi. Fructus subglobosus maturè nigri-
 cans, aculeatus. In asperis duris theriotrophæi Junio mense
 se hunc fruticem, cum floribus & fructu exsucco præceden-
 tis anni adhuc adhærente, reperi. Arbitror nostram um-
 b. illam,

bellatam, & *eglanteriam*, cum hac coalescere, & meras hujus esse varietates. Nom. specificum S. N. 348. R. semper-virentis satis ad hanc quadrat. Ob defectum Authorum, mihi impossibile est, in hoc frutice aliquid certi exactius determinare.

p. 197. n. 710 lin. 11. pro *inferiores*, lege: *inferiora*.

p. — n. 711. lin. 13. pro *acuta* lege: *acutæ*.

p. 258. n. 955 lin. 11. pro *hot* lege: *hic*.

p. 261. lin. 4. pro *duo* lege: *duæ*.

p. 272. infra pro *Bolle* - lege: 1048.



CLAVIS

Litterarum, quæ in iconibus occurunt, & quibus, ad partes fructificationis designandas utor & in posteris operibus, ad repetitio-nem vitandam, quoque utar.

a . . .	Calyx.
b . . .	Involucrum.
c . . .	Corollæ petalum c * valvula interior.
d . . .	Disci.
e . . .	Radii.
f . . .	Tubus f. unguis.
g . . .	Limbus f. Lamina.
h . . .	Vexillum.
i . . .	Alæ.
k . . .	Carina.
l . . .	Nectarium.
m . . .	Stamina.
n . . .	Germen.
o . . .	Stigma.
p . . .	Pericarpium.

q Dissepi-

q	:	.	.	.	Dissepimentum.
r	:	.	.	.	Loculamenta.
f	:	.	.	.	Semen.
t	:	.	.	.	Corona s. pappus:
u	:	.	.	.	Nux vel nucleus.
v	:	.	.	.	Receptaculum.
x	:	.	.	.	Arista.
y	:	.	.	.	Rachis.
z	:	.	.	.	Palea.
♂	:	.	.	.	Mas.
♀	:	.	.	.	Femina.
⚥	:	.	.	.	Hermaphroditus. Figuræ literis mediocribus notatae partium magnitudinem naturalem, literis majoribus vero, magnitu- dinem semper mediocriter auctam significant.
Cal. a. Cal. auctus A.					



INDEX.

I N D E X.

A.

<i>Acer</i>	772 - 774	<i>Aristolochia</i>	701	<i>Caltha</i>	416
<i>Achillea</i>	669 - 671	<i>Arnica</i>	651	<i>Campanula</i>	157-
<i>Aconitum</i>	412	<i>Artemisia</i>	636 - 637		163
<i>Acorus</i>	260	<i>Aruin</i>	702	<i>Cannabis</i>	761
<i>Acrostichum</i>	788	<i>Arundo</i>	94	<i>Cardamine</i>	522 - 526
<i>Actaea</i>	405	<i>Asarum</i>	353	<i>Carduus</i>	625 - 630
<i>Adoxa</i>	303	<i>Asclepias</i>	175	<i>Carex</i>	705 - 725
<i>Aegopodium</i>	221	<i>Asparagus</i>	257	<i>Carlina</i>	622
<i>Aesculus</i>	283	<i>Asperula</i>	118	<i>Carpinus</i>	741
<i>Aethusa</i>	207	<i>Asplenium</i>	798 - 802	<i>Carum</i>	217
<i>Agaricus</i>	1027 - 1063	<i>Astragalus</i>	570	<i>Caucalis</i>	494
<i>Agrimonia</i>	355	<i>Atriplex</i>	775 - 777	<i>Centaura</i>	672 - 674
<i>Agrostema</i>	348	<i>Atropa</i>	155	<i>Cerastium</i>	343 - 347
<i>Agrostis</i>	51 - 56	<i>Avena</i>	88 - 93	<i>Ceratophyllum</i>	734
<i>Aira</i>	58 - 62				735
<i>Ajuga</i>	443 - 446			<i>Chærophyl</i>	212 -
<i>Alchemilla</i>	121, 122	<i>Ballota</i>	464		215
<i>Alisma</i>	282	<i>Bellis</i>	643	<i>Chelidonium</i>	404
<i>Allium</i>	244 - 246	<i>Berberis</i>	240	<i>Chenopodium</i>	180 -
<i>Allopecurus</i>	43 - 45	<i>Betonica</i>	447		188
<i>Alpine</i>	232	<i>Betula</i>	730 - 731	<i>Chrysanthemum</i>	647 -
<i>Alyssum</i>	499, 500	<i>Bidens</i>	634 - 635		650
<i>Anagallis</i>	139	<i>Blafia</i>	916	<i>Chrysosplenium</i>	312
<i>Anemone</i>	417 - 419	<i>Boletus</i>	1064 - 1074		313
<i>Anerium</i>	219, 220	<i>Borago</i>	135	<i>Cichorium</i>	598
<i>Angelica</i>	205, 206	<i>Brassica</i>	515 - 517	<i>Ciræa</i>	24
<i>Anthemis</i>	666 - 668	<i>Bromus</i>	81 - 87	<i>Cistus</i>	406
<i>Anthericum</i>	252	<i>Briza</i>	64	<i>Clavaria</i>	1103 - 1110
<i>Antirrhinum</i>	488 -	<i>Bryonia</i>	744	<i>Clematis</i>	414
	493	<i>Bryum</i>	829 - 849	<i>Chinopodium</i>	472
<i>Anthoceros</i>	914, 915	<i>Bunium</i>	199	<i>Cnicus</i>	623
<i>Anthoxanthum</i>	25	<i>Bupleurum</i>	200	<i>Cochlearia</i>	501 - 502
<i>Anthyllis</i>	557	<i>Buxbaumia</i>	887	<i>Colchicum</i>	271
<i>Apium</i>	222, 223	<i>Byssus</i>	1001 - 1012	<i>Comarum</i>	399
<i>Aquilegia</i>	413			<i>Conferva</i>	1017 - 1026
<i>Arabis</i>	514			<i>Conium</i>	198
<i>Arctium</i>	624			<i>Convallaria</i>	247 - 251
<i>Arenaria</i>	324 -	<i>Calendula</i>	680	<i>Convolvulus</i>	145
	327	<i>Callitrichie</i>	2. 3.		146
				<i>Conyz</i>	639
				<i>Coreopsis</i>	676
				<i>Cornus</i>	120

C.

T

Cory.

INDEX.

<i>Corylus</i>	740	<i>Filago</i>	677 - 679	<i>Iris</i>	38	
<i>Crataegus</i>	371	373	<i>Fontinalis</i>	885. 886.	<i>Juglans</i>	739
<i>Crepis</i>	609	611	<i>Fragaria</i>	391. 392	<i>Juncus</i>	261-270
<i>Cucubalus</i>	332		<i>Fraxinus</i>	778	<i>Jungermannia</i>	891
<i>Cuscuta</i>	123		<i>Funaria</i>	548 - 550	<i>Juniperus</i>	- 913
<i>Cynoglossum</i>	137				<i>Juniperus</i>	768
<i>Cynosurus</i>	99					
<i>Cyperus</i>	33					

G.

D.		<i>Galeopsis</i>	452 - 455	<i>Lamium</i>	448 - 451
		<i>Galium</i>	110 - 117	<i>Lapifera</i>	621
		<i>Genista</i>	553 - 556	<i>Lathraea</i>	474
<i>Dactylis</i>	57	<i>Gentiana</i>	176 - 179	<i>Lathyrus</i>	561 - 563
<i>Daphne</i>	294	<i>Geranium</i>	533 - 542	<i>Leonna</i>	703. 704
<i>Datura</i>	147	<i>Geum</i>	397. 398	<i>Leontodon</i>	603. 606
<i>Daucus</i>	195	<i>Glechoma</i>	434	<i>Leonurus</i>	433
<i>Delphinium</i>	410	<i>Gnaphalium</i>	640 - 642	<i>Lepidium</i>	503
	- 411			<i>Leucojum</i>	241
<i>Dentaria</i>	521	<i>Gypsophila</i>	316	<i>Lichen</i>	920-1000
<i>Dianthus</i>	319-323			<i>Ligustrum</i>	4
<i>Digitalis</i>	486. 487			<i>Lilium</i>	258
<i>Dipsacus</i>	102. 103			<i>Limosella</i>	482
<i>Draba</i>	496			<i>Linum</i>	234 - 236
<i>Drosera</i>	237. 238			<i>Lithospermum</i>	132

H.

E.		<i>Hedera</i>	174	<i>Lolium</i>	97. 98
		<i>Hedysarum</i>	584	<i>Lonicera</i>	164. 165
		<i>Heracleum</i>	192	<i>Lotus</i>	592
		<i>Herniaria</i>	189	<i>Lunaria</i>	497
		<i>Hieracium</i>	613 - 620	<i>Lychnis</i>	349. 350
<i>Echium</i>	130			<i>Lycoperdon</i>	1111
<i>Elvela</i>	1083	<i>Hippuris</i>	1		- 1121
<i>Elymus</i>	96	<i>Holcus</i>	769. 770	<i>Lycopodium</i>	804
<i>Epilobium</i>	284-288	<i>Holosteum</i>	100		- 805
<i>Equisetum</i>	779-784	<i>Humulus</i>	762	<i>Lycopsis</i>	136
<i>Erica</i>	293	<i>Hydnnum</i>	1075-1080	<i>Lycopus</i>	23
<i>Erigeron</i>	654. 655	<i>Hyoscyamus</i>	148	<i>Lyismachia</i>	140-142
<i>Eriophorum</i>	37	<i>Hypericum</i>	593. 597	<i>Lythrum</i>	354
<i>Ervum</i>	587-598	<i>Hypnum</i>	850 - 884		
<i>Erythrinum</i>	510. 513	<i>Hypochaeris</i>	599 - 600		
<i>Evonymus</i>	168				
<i>Eupatorium</i>	633				
<i>Euphorbia</i>	357-362				
<i>Euphrasia</i>	475. 476				

I.

F.		<i>Jasione</i>	681	<i>Malva</i>	543 - 547
		<i>Ilex</i>	124	<i>Marchantia</i>	888 -
		<i>Impatiens</i>	686		890
<i>Fagus</i>	773	<i>Inula</i>	652. 653	<i>Marrubium</i>	465
<i>Festuca</i>	74 - 80			<i>Matricaria</i>	644-646

Medi-

I N D E X.

Medicago 585. 586

Melampyrum 478-

- 481

Melica 63

Mentha 435 - 439

Menyanthes 144

Mercurialis 766. 767

Mespilus 375

Milium 50

Mnium 812. 828

Monotropa 305

Montia 101

Mucor 1122-1140

Myagrum 498

Myosotis 138

Myosurus 239

Myriophyllum 732

- 733

P.

Panicum 39 - 42

Papaver 40c-403

Paris 304

Parnassia 233

Pastinaca 218

Pedicularis 494

- 495

Peucedanum 197

Peziza 1084-1102

Phalaris 48. 49

Phallus 1081. 1082

phascum 807. 808

Phelandrium 216

Philadelphus 364

Phleum 46. 47

Phyteuma 156

Picris 602

Pimpinella 224. 225

Pinus 742. 743

Plantago 106 - 108

Poa 65 - 73

Polycnemum 31

Polygala 551

Polygonum 295 -

302

Polypodium 789 -

797

Polytrichum 809 -

811

Populus 763 - 765

Potamogeton 126.

129

Potentilla 393 - 396

Poterium 736

Prenanthes 612

Primula 143

Prunella 469. 470

Prunus 365 - 370

Pteris 803

Pulmonaria 131

Pyrola 306 - 309

Pyrus 376. 377

Q.

Quercus 738

R.

Ranunculus 421 -

432

Raphanus 509

Reseda 356.

Rhamnus 166. 167

Rhinanthus 477

Ribes 169 - 173

Riccia 917 - 919

Rosa 379 - 385

Rubus 386 - 389

Rudbeckia 675

Rumex 273 - 281

S.

Sagina 125

Salix 745 - 759

Sambucus 228 - 230

Sanguisorba 109

Sanicula 191

Saponaria 317 -

318

Satureia 463

Saxifraga 314. 315

Scabiosa 104. 105

Scandix 208. 211

Schœnus 32

Scilla 256

Scirpus 34 - 36

Scleranthus 310

- 311

Scrophularia 483 -

485

Scutellaria 466

Sedum 334 - 339

Selinum 204

Sempervivum 363

Senecio 657. 662

N.

Narcissus 242. 243

Nardus 38

Nepeta 462

Nymphaea 408. 409

O.

Oenanthe 193

Oenothera 289

Ononis 558

Onopordum 631

Ophioglossum 785

Ophrys 696. 697

Orchis 687-695

Origanum 471

Ornithogalum 253 -

255

Oropanche 473

Orobus 559. 560

Osmunda 786. 787

Oxalis 351. 352

T 2

Sera-


I N D E X.

	T.	V.
Serapias	698 - 700	
Serratula	632	
Sherardia	119	Tanacetum 638
Silene	333	Teucrium 440 -
Sinapis	527	442
Sisymbrium	528 - 532	Thalictrum 415 Thlaspi 504 - 508
Sium	201 - 203	Thymus 467. 468
Solanum	153. 154	Tilia 407
Solidago	656	Tordylium 196
Sonchus	607. 608	Tomentilla 390
Sorbus	374	Tragopogon 601
Sparganium	726	Tremella 1013 - 1015
Spartium	552	Trifolium 571 - 583
Spergula	340 - 342	Triglochin 272
Sphagnum	806	Triticum 95
Spiraea	378	Trollius 420
Stachys	456 - 461	Tulipa 259
Staphylea	231	Turritis 518 - 520
Stellaria	328 - 331	Tussilago 663 - 565
Symphytum	134	Typha 727
Syringa	5	
		Vaccinium 290 - 292
		Valantia 771
		Valeriana 26. 29
		Verbascum 149 - 151
		Verbena 22
		Veronica 6 - 20
		Viburnum 226. 227
		Vicia 564 - 569
		Vinca 152
		Viola 682 - 685
		Viscum 760
		U.
		Ulmus 190
		Urtica 728. 729
		Utricularia 21



Myriophyllum
strictum

T. I.



Leers Sculpsit. & delineavit


pecus sphaeroides
agrestis
cum sphaeroides
securi foliatis.

T.II.

F.3.



F.6.



Lycopodium spicatum
aggregatum
var. longipalpus
var. condensatum

T.II.



Melica nutans.

Velutina nutans.
stipa myriam.


T. II.




Lehrs delineat et sculpsit.


Digitized by Google


I.3.



I.5.








Digitized by Google

distichia
ciliolata
lanceolata
olidia

TVL.



Lycopodium distichum

Digitized by Google




Lorodendron ciliatum

15.





E.4




Lectio de lira et strigis










Locusta delin. sculps.



*Leens delin exsculptis*

*Lion d'Or & Sculpt.*



Leers delineavit & sculpsit.



