






11

1.





CAROLI ALLIONII
FLORA
PEDEMONTANA

Tomus secundus

THE ALBANY

NEW YORK

1850

1850

FLORA PEDEMONTANA

S I V E

ENUMERATIO METHODICA

STIRPIUM INDIGENARUM PEDEMONTII

A U C T O R E

CAROLO ALLONIO

IN ARCH. TAUR. PROF. BOT. EM., HORT. PUBL., ET MUS. HER. NAT. DIR. PRIM.,
R. SCIENT. TAUR. ACAD. SOCIO, ET THESAUR. PERP., NECHON ACAD. BONON.,
LUGD., ET MADRID.; SOCIET. BASIL., BEROL. NAT. CUR., PHYSICO-BOT. FLOR., GOTT.,
LOND., LUND., PATRIOT. MEDIOL., MONSP., R. MEDIC. PARIS., PATAV., &c. SOCIO

TOMUS SECUNDUS.



AUGUSTAE TAURINORUM

EXCUDEBAT IOANNES MICHAEL BRIOLUS
R. SCIENTIARUM ACADEMIAE IMPRESSOR ET BIBLIOPOLA

MDCCLXXXV.



REPRODUCED FROM THE ORIGINAL

CLASSIS VI

UMBELLIFERÆ

I. UMBELLIS SIMPLICIBUS

ASTRANTIA. LINN. *gen.* n. 290. *syst.* n. 324. TOURN. *tab.* 166.

Involucrum universale polyphyllum magnum. Calyx quinque-dentatus persistens. Flores masculi, & hermaphroditi. Semina non alata quinque costata, sed membrana transversim plicata tecta. Semina, si hac membrana, quæ facile separabilis est, exuantur, ad Ligustici semina accedunt.

1280. **A**STRANTIA major.

ICON. TAUR. Vol. VII. *tab.* 91.

Astrantia foliis quinquelobis, lobis trifidis. LINN. *spec.* p. 339. HALL. *hist. tom.* 1. n. 790.

Astrantia floribus pedunculatis, seminum angulis denticulatis. SCOP. *Fl. Carn.* p. 337. n. 3.

Astrantia nigra. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 306.

Astrantia major corona floris purpurascens, aut alba. TOURN. *inn.* 314.

Helleborus niger Saniculæ folio. BAUH. *pin.* 186.

Sanicula foemina quibusdam, aliis Helleborus niger. BAUH. *hist.* III. p. 638.

Loc. In pratis alpinis, & subalpinis abunde. PERENNIS.

1281. ASTRANTIA minor.

ICON. TAUR. Vol. VII. *tab.* 90.

Astrantia foliis digitatis serratis. LINN. *spec.* p. 340. HALL. *hist. tom.* 1. n. 791.

Astrantia floribus pedunculatis, seminum angulis alato plicatis. SCOP. *Fl. Carn.* p. 337.

n. 4. ed. 2. n. 305.

Helleborus minimus alpinus Astrantiae folio. BOCC. *rar.* p. 10. *tab.* 5. f. 3.

Helleborus niger Saniculæ folia minor. BAUH. *prodr.* p. 57.

Loc. In pascuis alpium editiorum. PERENNIS.

SANICULA. LINN. *gen.* n. 289. *syn.* n. 323. TOURN. *tab.* 173.

Involucrum universale fere pentaphyllum trilobatum, aut certe dentatum, partiale fit quinquefoliis lanceolatis. Semina oblonga hirta, & aspera calyce proprio coronata.

1282. **S**ANICULA europaea.

ICON. TAUR. Vol. VII. *tab.* 89.

Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. LINN. *spec.* p. 339.

Sanicula foliis radicalibus trilobatis, lateralibus lobis bipartitis, umbellis globosis. HALL. *hist. tom.* 1. n. 737.

Caucalis (sanicula offic.) flosculis omnibus sessilibus, umbellis subcapitatis, subternis.

CRANTZ. *fac.* 3. ed. 2. p. 228. *class. umbell.* p. 109.

Astrantia floribus sessilibus, seminibus oculatis. SCOP. *Fl. Carn.* p. 336. n. 1.

Astrantia diaspensia. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 304.

ALLTONII *Fl. Pedem.* Tom. II.

A

CLASSIS VI. PLANTÆ

Sanicula officinarum, LAM. *Fl. Fran.* tom. 3. p. 402.

Loc. In sylvis montium, & collium. *PERENNIS*.

VIR. Magnam a vetustis etiam temporibus nominis celebritatem habuit in officinis *SANICULA*, atque habita fuit pro eximio vulnerario, commendata etiam ad sanguinis fluxum cohibendum, vulnere consolidanda, atque ulcera sananda. Quamvis tantum non emineant vulnerariae qualitates, quantum de eadem dicere sunt, non contemnenda tamen *SANICULA* est, cujus virtutes plurimum accedunt ad illas, quas *Bugulae* assignavimus; validius fortasse abstergit *SANICULA*: ejus decocto cum addito praesertim melle utiliter colluuntur aphtae, ulcerave oris. Ea vero, quae tradita sunt de viribus, & usu *Bugulae*, commode huc referri possunt.

ERYNGIUM. LINN. *gen.* n. 287. *syn.* n. 321. *TOURN.* tab. 173.

Calyx communis pentaphyllus, foliolis acutis rigidis longissimis; flosculi in thalamo paleaceo aggregati. Germen sub flore positum pentaphyllo coronatum.

Petala introscum flexa. Semina duo latere plano contigua.

1283. *ERYNGIUM* maritimum.

Eryngium foliis radicalibus subrotundis plicosis spinosis, capitulis pedunculatis, paleis tricuspidatis. LINN. *syn.* 12. p. 202.

Eryngium involucri foliaceis ovatis longitudine capituli. GOU. *hort.* 130. n. 1.

Eryngium foliis radicalibus subrotundis cartilagineis, serris spinosis, involucri latius angulosis spinosis. CRANTZ. *class. umbell.* p. 118.

Eryngium maritimum. BAUH. *pin.* 386.

Eryngio maritimo. MATTH.

Off. Eryngium maritimum.

Loc. In sabulo ad maris litus. *PERENNE*.

VIR. Similem cum *ERYNGIO compestri* proprietatem diureticam habet.

1284. *ERYNGIUM* alpinum.

Eryngium foliis radicalibus cordatis oblongis, costulis pinnatifidis, capitulis subcylindricis. LINN. *spec.* p. 337.

Eryngium foliis radicalibus petiolatis cordatis, involucri pinnato, ciliato. HALL. *hist.* tom. 1. n. 736.

Eryngium foliis radicalibus subrotundis cartilagineis, serris spinosis, involucri latius angulosis spinosis. CRANTZ. *class. umbell.* 118.

Eryngium alpinum caeruleum, capitulis diplocl. BAUH. *pin.* p. 386. *TOURN.* *inst.* p. 327.

Eryngium alpinum laetis foliis, magno copie oblongo caeruleo. BAUH. *hist.* III. 88.

Loc. Copiose in pratis Pralugnan, & alla Giperia dell' Argentera ad originem fluminis Duranc. *PERENNE*.

1285. *ERYNGIUM* campestre.

Icon. TAUR. Vol. VII. tab. 87.

Eryngium foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato-lanceolatis. LINN. *syn.* 12. p. 202.

Eryngium foliis semipinnatis, pinnis pinnatis, pinnulis lobatis spinosis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 735.

Eryngium foliis amplexicaulibus pinnato-laciniosis, involucri fere subulatis, capitulis longioribus. CRANTZ. *fasc.* 3. ed. 2. p. 229. *class. umb.* p. 119.

JACQ. *Fl. Austr.* tab. 155.

Eryngium involucri subulatis, capitulo longioribus. GOU. *hort.* 130. n. 2.

Eryngium vulgare. BAUH. *pin.* 386.

Eryngio montano. MATTH.

Off. Eryngium vulgare.

Loc. Nil in pascuis sterilibus aridis frequentius. *PERENNE*.

VIR. Radix *ERYNGII campestris* inter aperientes radices enumeratur, soletque ingredi apozemata aperientia, quae praescribuntur ad vias renum aperientias, atque lotium pellendum. Praeter principium subacre, & leviter aromaticum praebet etiam instar affinium diureticarum stirpium per combustionem salem

alkalinum fixum. Blande exstimulat, & resolvit, lotique secretionem promovet. Licet non spernendas utilitates asferre possit, minime tamen existimamus in hydropo, & graviori urinae suppressione sufficere, neque eam habere efficaciam, ut sola viscerum obstructions possit reserare.

HYDROCOTYLE. LINN. *gen. n.* 388. *syn. n.* 322. TOURN. *tab.* 173.

Umbella parva simplex irregularis. Involucrum retraphyllum; petala integra vix irregularia. Semina plana semiorbiculata.

1186 **HYDROCOTYLE** vulgaris.

Icon. TAUR. Vol. VII. tab. 88.

Hydrocotyle foliis peltatis, umbellis quinquefloris. LINN. *spec. p.* 338.

Hydrocotyle foliis rotundis emarginatis, petiolis centralibus, umbellis fastigiatis. HALL. *hist. tom. 1. p.* 362. n. 812.

Ranunculus aquovicus. BAUH. *hist. III. p.* 781. LOR. *ic.* 387.

Hydrocotyle vulgaris. TOURN. *inst. p.* 328.

Loc. Circa lacum d'Avignons, & secus flumen Sangon in agro Javenensi, aliisque locis, quae a pura aqua irrigantur, & ad fontium scaturigines praesertim occurit. *PERENNIS.*

ECHINOPHORA. LINN. *gen. n.* 292. *syn. n.* 326. TOURN. *tab.* 423.

Involucrum universale paucorum foliorum. Partiale monophyllum multifidum germina includens. Calyx proprius quinqueidentatus. Flores radiati, petalis inaequalibus. Semina sessilia coronata in involucre indurato.

1187 **ECHINOPHORA** spinosa.

Echinophora foliolis subulato-spinosis integerrimis. LINN. *spec. p.* 344. CRANTZ. *class. umbell. p.* 255.

Caucalis coule lignosa, foliolis subulato-spinosis integerrimis. ROY. *lugdb.* 96. SAUV. *monsp.* 258.

Pistium mariuum spinosum. BAUH. *pin.* 282.

Echinophora foliis decompositis. WACH. *ult.* 200.

Crithum spinosum. DOD. *pempt.* 705.

Loc. Frequens ad litus maris Nicaeensis. *PERENNIS.*

II. UMBELLIS COMPOSITIS

A. MARGINATÆ.

1. ALA NON MEMBRANACEA.

TORDYLIUM. LINN. *gen. n.* 293. *syn. n.* 327. TOURN. *tab.* 170.

Semen planum compressum, margine crenulato.

1188 **TORDYLIUM** maximum.

Icon. TAUR. Vol. VII. tab. 105. & Vol. XVIII. tab. 63.

Tordylium umbellis conferis radiatis, foliolis lanceolatis inciso-serratis. LINN. *spec. p.* 345.

Tordylium foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, seminis limbo levi. HALL. *hist. tom. 1. n.* 812.

Caucalis major semine minus pulchro hirsuto. BAUH. *hist. III. p.* 85.

Tordylium. RIV. *pent.* 1.

Loc. Ad sepes, & in dumetis frequens. *ANNUUM.*

PASTINACA. LINN. *gen.* n. 314. *syn.* n. 359. TOURN. *tab.* 170.

Flores non radiati, sed aequales fertiles, petalis integris. Semen subrotundum compressum striatum planum, vix emarginatum.

1189. PASTINACA opoponax.

ICON. TAUR. Vol. XXVII. *tab.* 55.

Pastinaca foliis bipinnatis, foliolis obliquescordatis, petolis paleaceo-svigosis, GOV. *illustr.* p. 19. *tab.* 13. & 14.

Pastinoca foliis bipinnatis, LINN. *spec.* p. 376.

Selinum (opoponax). CRANTZ *class. umbell.* p. 63.

Pastinaco foliis bipinnatis. GER. p. 254. n. 2.

Pastinaco altissimo. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 469.

Laserpitium (chironium) *foliis oblique cordatis, petalis hirsutis*, LINN. *spec.* p. 359.

Loc. Uelinae, & in agro Nicaeensi locis umbrosis, & montanis rupestribus.
PERENNIS.

1190. PASTINACA sativa.

Pastinaca foliis simpliciter pinnatis, LINN. *spec.* p. 376.

Selinum (pastinaca) *foliis pinnatis lanceolatis, basi semitrilobis*. CRANTZ *fasc.* 3. *ed.* 2. p. 161. *class. umbell.* p. 62.

Pastinaca foliis pinnatis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 808. GER. p. 254. n. 2.

Pastinaca sylvestris latifolia. BAUH. *pin.* 155.

Pastinaca germanica sylvestris quibusdam ellaphoboscum, BAUH. *hist.* III. p. 145.

Pastinaca domestica. MATTH.

OFF. *Pastinaca sativa* s. *Ellaphoboscum*.

VERN. *Pastonaje*.

LOC. Abunde ubique in pratibus. BIENNIS.

VIR. *Sylvestris*, & spontanea PASTINACA originem dedit PASTINACÆ sativæ, quæ in hortis ad usum culinarum colitur. Spontanea radix dura est fortiter odorata, subacris, & sub-aromatica: sativæ autem radix succosa est longe obasior, evidenter subdulcis cum aliqua aromatica gratia, & gratum alimentum suppeditat. Verum saccharum ex radice PASTINACÆ eductum est. Principia autem non modo habet nutrientia, sed saponacea, incidentia, & stimulantia, diuresim potissimum moventia. Haec vis extimulans potentior est in PASTINACA sylvestri. Ubi aperiendum sit, & praesertim locii secretio promovenda, non modo suadent Medici harum radicum diaeteticum usum, sed juscula parant cum incoctis radicibus. Decoquant etiam cum radice Glycirizæ, & commendant in morbis renum, & vesicae, qui blanda abstergentia, & demulcentia exposculant: si vero agatur de remediis a calculosa saburra expediendis, aliis etiam radicibus aperientibus radices PASTINACÆ adjungunt. In faucium asperitate, & tussi similiter eadem decoctio prodest, quam lenire diximus incommoda renum, & vesicae. Quamvis annosae radices PASTINACÆ sylvestris calefaciant, ac insignem acrimoniam explerent, iis tamen non esse tribuendi videntur mali effectus, qui de iisdem narrantur. Semina acris, & aromatica sunt, mucum incidunt, & diuresim pellunt speciatim adhibita in calculo renum; sed acris, aromatica, calefacientia non sine magna circumspectione praescribenda sunt ad calculum propellendum, dum autem dolores maxime urgent, minus opportuna esse videntur.

HERACLEUM. LINN. *gen.* n. 307. *syn.* n. 343. TOURN. *tab.* 170.

Flores radiati. Semen planum ovale striatum, vix emarginatum.

1191. HERACLEUM branca ursina.

ICON. TAUR. Vol. XV. *tab.* 37.

Heracleum foliis hirsutis pinnatis, pinnis quinquefidis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 809.

Heracleum bronco ursina offic. CRANTZ *class. umbell.* p. 57.

Heracleum (spondylium) foliolis pinnatifidis laevibus, floribus radiatis. LINN. *syn.* 12. p. 210.

Spondylium vulgare hirsutum. BAUH. *pin.* 157.

Spondylium quibusdam, sive branca ursina germanica. BAUH. *hist.* III. p. 160.

Spondylium branca. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 335.

Spondylium foliis angustioribus. RIV. *tab.* 5.

Sfondilio. MATTH. DOD. *pempt.* 304.

8. *Heracleum* (Panaces). DOD. *pempt.* 305.

Loc. Ubique in sylvis, & in pratis vulgaris est praecipue montanis. *BIENNE.*

VIR. *Brancae ursinae* folia scopo emolliendi commendata sunt, sed licet mucilaginosum quid habeant, non tamen acrimonia carent, quæ in cortice caulis, ramorum, & pedunculorum tanta est, ut causticam naturam exerant. Sub cortice in petiolis praesertim, & pedunculis continetur substantia farinosa saccharum continens. In Lithuania ex farina hujusmodi alimentum, & spiritum ardentem extrahunt, Cerevisiam etiam parant: sed hi usus ab aliis nationibus negliguntur. Radix certe acris extimulans est pene caustica, cortice praesertim non denudata, suasque veras utilitates præbere potest, etsi nullo apud nos adhuc in usu sit.

1292. *HERACLEUM* elegans.

Heracleum angustifolium. JACQ. *Fl. Austr.* *tab.* 175. *hort. vind.* p. 117. *tab.* 2. f. 1.

Heracleum elegans. CRANTZ. *fac.* p. 155. *tab.* 2. f. 1.

Spondylium multifidifolio alpinum. BOCC. *mus.* p. 141. *tab.* 99.

Loc. Ubique in pratis alpium, & ad rivulos aquarum. *PERENNE.*

FERULA. LINN. *gen.* n. 305. *syn.* n. 340. *TOURN.* *tab.* 170.

Semen magnum oblongo-ovatum quinque-striatum, cinctum ala magna, solida non membranacea.

1293 *FERULA* communis.

Icon. *TAVR.* Vol. XV. *tab.* 89.

Ferula foliolis linearibus longissimis simplicibus. LINN. *spec.* p. 355.

Ferula foemina Plinii. BAUH. *pin.* 148.

Loc. In agro *Nicaensi* nascitur. *PERENNIS.*

1294. *FERULA* nodiflora.

Icon. *TAVR.* Vol. XVII. *tab.* 110.

Ferula foliolis appendiculatis, umbellis sessilibus. LINN. *syn.* 12. p. 209. *CRANTZ.* *class. umbell.* p. 72.

JACQ. *Fl. Austr.* *append.* *tab.* 5.

Libanotis ferulae folio, & semine. BAUH. *pin.* 158.

Panax asclepium ferulae facie. LON. *ic.* 783.

Loc. Ad vineas in collibus *Unellae*, sed longe frequentior in agro *Derionensi*, praesertim in valle *Sisfora*. In monte *Toet* comitatus *Nicaensis* observavit *Cl. BELLARDI.* *PERENNIS.*

PEUCEDANUM. LINN. *gen.* n. 302. *syn.* n. 336. *TOURN.* *tab.* 169.

Semen vix gibbum tristriatum ovatum ad stylum emarginatum, explanatum in marginem membranaceum non pellucidum.

1295 *PEUCEDANUM* officinale.

Peucedanum foliis quinq̄ies tripartitis filiformibus linearibus. LINN. *syn.* 12. p. 208.

Selinum peucedanum officinale. CRANTZ. *class. umbell.* p. 60.

Peucedanum majus italicum. BAUH. *pin.* 149. BAUH. *hist.* III. p. 2. 36. *TOURN. inst.* 318. *LOB. ic.* 782.

Loc. In valle *Segusii* prope *Vajes*, atque in comitatu *Nicaensi* supra *Tenda*. *TERRANEUS* in montibus *Liguriae.* *PERENNE.*

ALLIONI Fl. Pedem. Tom. II.

B

VIR. Extat in officinis nostratibus Syrupus de PEUCEDANO dictus, qui plerumque ex radice Silaris montani elicitus est. PEUCEDANI radici virtutes eximiae balsamicæ, & pectorales tribuuntur, ac magna in hoc remedio fiducia ponitur. Non alias autem proprietates habere videtur, quam aperientes, & fortiter mucum incidentes. In cachexia igitur, asthmate humido, & ad menses pellendos in foeminis pituitosis deduci in usum medicinale potest. Dosis radices ex aqua decoctæ est a drachmis duabus ad unciam semissem.

1196. PEUCEDANUM alsaticum.

Peucedanum foliolis pinnatifidis: lacinulis trifidis obtusiusculis. LINN. spec. p. 334.

Selinum foliis quadruplicato pinnatis, nervis canaliculatis. HALL. hist. tom. 1. n. 798.

JACQ. Fl. Austr. tab. 70.

Selinum alsaticum caule folioso ramis ramosis virgatis. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 159.

Daucus alsaticus. BAUH. prodr. 77. HALL. opusc. 318.

Umbellifera alsatica magna, umbella parva sublutea. BAUH. hist. III. 106. RAJ. hist. 414.

Oreoselinum pratense cicutæ folio. TOURN. inst. 318.

Loc. Ad vias, & sepes in collinis, & montanis apricis frequens. PERENNE.

1197. PEUCEDANUM minus.

Peucedanum foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis: lacinulis linearibus oppositis, caule ramosissimo parulo. LINN. mant. alt. p. 219.

Loc. Nascitur in valle Safera, & supra Tenda; Cl. BELLARDI inter la Ghiandola, & la Scarena. PERENNE.

2. ALA MEMBRANACEA, ET PELLUCIDA.

ANETHUM. TOURN. inst. 317. tab. 169.

Flores aequales, petalis integris, involucrium nullum. Semina ovalia vix gibba, dorso tristriato, margine cincto brevi ala membranacea.

1198. ANETHUM graveolens.

Anethum fructibus compressis. LINN. spec. p. 377.

Anethum hortense. BAUH. pin. 147.

Anethum. BAUH. hist. III. part. 2. & 6.

Aneto. MATTH.

Off. Anethum.

VERN. Anet.

Loc. TERRANEUS observavit ad maris litus prope Unelliam. ANNEUM.

VIR. Tota planta peculiari odore foetet, sed tamen aromatico, ita ut etiam in condiendis cibis recipiatur. Herba tota contrita, & applicita aliquam vim habet subanodynâ, & resolventem. Semina acria sunt, aromatica, oleumque æthereum continent; juvant propterea ad flatus discutiendos, doloresque spasmodicos leniendos. Extat in officinis oleum per infusionem paratum, quo sæpe infansium abdomen ad tormina imi ventris in ejusdem doloribus flatulentis illinitur. Olei autem destillati, sive essentiae ANETHI guttae aliquot aquae appropriatae instillantur in colica, & singultu. Sed cavendum maxime est, ne hujusmodi medicamentum exhibeatur iis in morbis, quos sustinet causa rheumatica phlogistica, aliave naturæ, ut dicitur, calidæ. Infusum seminum ad eosdem usus adhibetur.

SELINUM. LINN. *gen. n.* 300. *sys. n.* 334. *TOURN. tab.* 169.

Florum petala cordata. Involucrum duplex universale, & parziale.

Semina dorso tristriata, striis eminentibus, & subalatis, margine alato ala magna membranacea.

1299 SELINUM *imperatoria*.

ICON, *TAUR. Vol. XIV. tab.* 2.

Selinum foliis latis tripartita divisis. CRANTZ. *fasc. 3. ed. 2. p.* 174. *class. umbell. p.* 61.

Imperatoria (ostutium). LINN. *spec. p.* 371. HALL. *hist. tom. 1. n.* 803.

Imperatoria major. BAUH. *pin.* 156. GARID. *aix. tab.* 54.

Imperatoria. BAUH. *hist. III. p.* 137.

Imperatoria. MATTH.

Off. Imperatoria.

Loc. Ubique in pratis nostris alpinis subhumidis, & ad rivulos praecipue. *PERENNE.*

VIR. Samme acris, & aromatica radix est, majoremque principiorum actuosorum copiam tenet, si autumnus post absolutam fructificationem, aut primovere decerpta sit; agit principiis gummosis, & resinosis, acribus, aromaticis, olei etiam aetheri copiam aliquam continentibus. Humores incidit, & solvit, valde solide exstimulat, calefacit, atque virtutes etiam habet antisepticas, utiles iis in casibus, in quibus opportunum est vires excitare, atque instaurare. Masticata radix sialagogum praebet utile in infarctu setoso, in morbis serosis capitis, nec non in linguae debilitate, stomachi actionem excitat, si praesertim iners mucus sit incidendus, actioque fibrarum excitanda. Nec immerito laudatur ad menses pellendos in cachecticis, & pituitosis foeminis, immo clysteribus ex radicis *Imperatoriae* infuso paratis vis tribuitur partum promovendi, inerti utero ad actionem excitato. In febris quotidianis, tertianis anomalis autumnalibus, atque ipsa quartana febre commendanda non est usus radicis *Imperatoriae*, qua humores inciduntur, vasa aperiuntur, atque principium aliquod putridum viscidum lymphae inhaerens, quod solet hujusmodi febres sustinere, non modo a vinculis liberatur, sed aliqua ratione emendatum naturae viribus deinde expellitur. Ad vermes necandos etiam dicitur conferre; utilem certo expertus sum in febris indolis peticularis sub larva catharralis, aut quotidianae febris procedentibus, in quibus acris, aromatica alexipharmaca, incidentia, & sudorifera remedia saepe requiruntur. Hujusmodi radix, ut planum est, principia habet exstimulantia, & carminativa: in flatibus idcirco, atque morbis flatulentis suas etiam praestat utilitates, sed habenda semper est ratio causae proximae morbificae, & eadem cum calefaciente natura hujusce radicis comparanda. Aliquam habet quoque vim ad urinam ciendam, ideoque hydropi dicitur succurrere. Hac super re puto non vere inter diuretica esse recensendam, neque lotii suppressionem radice *Imperatoriae* posse superari; commendo autem in hydropie incipiente ex cachexia, quae acris aromaticis exstimulantibus curanda sit. Radix *Imperatoriae* datur in substantia a drachma una ad drachmas duas, aut per infusionem ex aqua decoquitur a drachmis duabus ad drachmas sex.

1300. SELINUM *sylvestre*.

Selinum foliis ovato-lanceolatis, semine oblongo. CRANTZ. *fasc. 3. ed. 2. p.* 177. *class. umbell. p.* 62.

Angelica foliis aequalibus ovato-lanceolatis serratis. LINN. *spec. p.* 361.

Angelica foliis duplicato-pinnatis ovatis serratis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 806.

JACQ. *Fl. Austr. tab.* 152.

Angelica sylvestris major. BAUH. *pin.* 155. DOD. *pempt.* 318.

Angelica sylvestris magna vulgarior. BAUH. *hist. III. p.* 144.

Angelica salvatica. MATTH.

Off. Angelica sylvestris.

Loc. Ad rivulos, & fossas in agro *Pedemoniano* abunde. *BIENNE.*

VIR. Ad Angelicam arangelicam accedit *SELINUM sylvestre*, non eam tamen habet olei aetheri quantitatem, minusque aromatica est. Principiis agit magis fi-

xis, tamen acribus, & aromaticis. Succedaneum haberi potest *Angelicae*; minus valet vi carminativa, neque adeo penetrantes particulas tenet: urinam evidentius promovet, potenter humores incidit. Utiliter radice hujus *Angelicae* cum emolumento usus sum in cachexia, serosis tumoribus, hydropse incipiente, & chlorosi pueritosarum foeminarum. Proficit etiam in quotidianis, & intermittentibus anomalis febribus. Datur in substantia a drachma una ad duas, in infuso ab uncia semisse ad unam. Licet tota planta activa sit, ex radice tamen medicina elicienda, eaque primo vere, aut autumno est effluenda.

1301. SELINUM cervaria.

Icon, TAUR. Vol. XIV. tab. 32.

Selinum foliis duplicato-pinnatis pinnulis semibilobis circumscissatis. HALL. hist. tom. 1. n. 804.

Selinum foliis cartilagineis inferne appendiculatis, circumscissatis, serris denticulatis. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 167. tab. 3. f. 1. class. umbell. p. 59.

Athamania foliis pinnatis decussatis, inciso angulatis seminibus nudis. LINN. syst. 12. p. 207.

Selinum cervaria. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 331.

Selinum cervaria. VILL. prosp. p. 26.

Oreoselinum apiifolio majus. TOURN. inst. 318. GARID. Aix. tab. 72.

Daucus montanus apiifolio major. BAUH. pin. 150.

Cervaria. RIV. tab. 12.

Libanotis altera quorundam, aliis Cervaria nigra. BAUH. hist. III. p. 165.

Loc. Ad oras sylvarum locis saxosis sterilibus, collinis, & montanis. PERENNE.

VIR. Non solet haec a Medicis adhiberi, sed efficaciam suam promittit; acris enim, odorata, aromatica radix est, a qua possint virtutes aperientes, incidentes, carminativas expectari.

1302. SELINUM oreoselinum.

Icon, TAUR. Vol. XXII. tab. 90.

Selinum foliolis cossu-refraxis divaricatis, caule aequali subnudo. CRANTZ. fasc. 5. ed. 2. p. 169. class. umbell. p. 59.

Selinum foliis triplicato-pinnatis, angulis divisionum obtusis. HALL. hist. tom. 1. n. 803.

Athamania foliolis divaricatis. LINN. spec. p. 352.

Selinum oreoselinum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 330.

Apium montanum folio ampliore. BAUH. pin. 153.

Oreoselinum. CLUS. hist. 195.

Apium montanum nigrum. BAUH. hist. III. p. 104.

Loc. In pascuis siccis collium, & montium, atque etiam ad planitiem descendit. PERENNE.

VIR. Quamvis haec planta in usum recepta non sit, suas tamen utilitates promittit, totaque planta non modo gustu acris, & aromatica est, sed & habet magnam volatilis odoris aromatici fragrantiam; aequum idcirco est, ut *Oreoselini*, & *Cervariae* stirpes Medici experiantur.

1303. SELINUM palustre.

Icon, TAUR. Vol. XIX. tab. 19.

Selinum sublaetescens leve, foliis quadruplicato-pinnatis linearibus. HALL. hist. tom. 1. p. 355.

Selinum sublaetescens radice unica. LINN. spec. p. 350.

Selinum (Tysselinum) *umbellae retusae radiis asperis.* CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 170. class. umbell. 59.

Seseli palustre lactescens acris, foliis faeniculaceis sapore fervido. BAUH. hist. III. p. 188.

Selinum palustre. CRANTZ. fasc. p. 172. tab. 4. f. 1.

Loc. In paludosis la Marsaja, & ad lacum di Vivron. BIENNE.

1304. *SELINUM argenteum*.
Icon. TAUR. Vol. XXVIII. tab. 3.
Selinum petiolis argenteis, & viridibus, striis linearis, semine alis latis albidis. CRANTZ.
fasc. 3. p. 43. tab. 14. f. 2.
Loc. Pedemontii indigena. PERENNE.
1305. *SELINUM Carvifolia Chabraei*.
Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 65.
Selinum foliis multiplicibus radicalibus circa costam decussatis. CRANTZ. fasc. 3. tab. 3. fig. 2. Class. umbell. p. 62.
Selinum foliarum vaginis, & foliorum segmentis longissimis. Id. ibid.
Peucedanum carvifolia foliis circa costam decussatis, caulinis longissimis, & multiformibus. VILL. prosp. p. 25.
Carvifolia Chabraei. Sup. icon. p. 389.
Carvifolia. VAILL. tab. 5. f. 2.
Loc. In pratis alpium non infrequens, atque etiam in pratis Nicaeensis occurrit, imo in sylvis collum, & pascuis subhumidis agri Taurinensis circa la Veneria frequenter vidit Cl. BELLARDI. BIENNE.
1306. *SELINUM pseudo-carvifolia. CRANTZ.*
Selinum foliis triplicato-pinnatis, pinnis latiusculis simplicibus, & trifidis. HALL. hist. tam. 1. p. 356. n. 802. tab. 20.
Selinum (carvifolia) caule sulcato acutangulo-involucro universali caduco, pistillis fructibus-reflexis. LINN. spec. p. 350.
Selinum carvifolia. LINN. JACQ. hort. vindob. tab. 16.
Selinum caule alato, foliolis bifidis, & trifidis. LINN. Gou. 221.
Laserpitium selinaides. SCOP. Fl. Carn. 1. p. 198.
Angelica tenuifolia. Riv. pen. tab. 18.
Selinum foliolis pinnatis laciniatis. GMEL. Sib. 1. p. 204. tab. 43.
Angelica tenuifolia. RUPP. fl. Jen. p. 277. DILL. Giss. 127.
Loc. Secus fossas in pratis humidis praesertim ad alpium radices. PERENNE.

THAPSIA. LINN. gen. n. 323. syst. n. 358. TOURN. tab. 171.

Flores aequales, petalis integris lanceolatis, involucrium nollum. Semen oblongum tristriatum magna ala cinctum, quae supra, & infra ampliter truncata est, & emarginata.

1307. **T***HAPSIA villosa.*
Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 28.
Thapsia foliolis dentatis villosis basi coudunatis. LINN. spec. p. 375
Thapsia latifolia villata. BAUH. pin. 148. TOURN. inst. 323.
Thapsia quarundam hirsuta, & aspera Cicutae folio, flore luteo, semine lato, aliis Sceli peloponensiacum. BAUH. hist. III. part. 2. n. 35.
Loc. In agro Nicaensi. PERENNIS.

3. ALA MARGINALI, ET DORSALI

ANGELICA. LINN. gen. n. 309. syst. n. 344. TOURN. tab. 167.

Semen alatum duabus alis marginalibus dorso tristriato, striis alatis abscissis.

1308. **A***NGELICA arcangelica.*
Icon. TAUR. Vol. XIV. tab. 51.
Angelica foliorum impari lobato. LINN. spec. p. 360. CRANTZ. class. umbell. p. 65.
Angelica foliis duplicato-pinnatis, ovato-lanceolatis serratis. HALL. hist. tom. 1. n. 807.
Angelica sativa. BAUH. pin. 155. GARID. aix. tab. 32.
Angelica major. DOD. pempt. 318.
ALLIOTTI Fl. Pedem. Tam. II.

Angelica domestica. MATTH.

VERN. Angelica.

Loc. Sponte in umbrosis subhumidis sylvis collium *Tourinensium*. *BIENNIS.*

VIR. Tota planta activa principia continet, quæ copiosiora sunt in radice, & præsertim ejus in corice. Convenit principiorum qualitate cum radice *Imperatoriae*, non adeo fortasse acris est, majoremque habet principii aromatici volatilis quantitatem. Viribus hæ plantæ conveniant, sed in febris catharralibus mali moris, ac ubi sudor movendus sit, anteponitur radix *ANGELICÆ*, ad incidendum vero præfertur radix *Imperatoriae*. Magnam certe vim habet ad minima vasa aperienda, atque in iis paralyseos speciebus, quæ non producuntur ex nervorum resolutione, sed ex viscoso humore in cellulari membrana hærente, & medullarem nervorum substantiam comprimente plurimum profuisse observavi. Caules etiam teneriores edules sunt, ex aqua leviter decocti nec insuaves, utilesque in pinitosis, & rheumaco imbecillitate. Quæ de *Imperatoriae* radice dicta sunt, eadem intelligenda de *ANGELICA*, cujus semina carminativa sunt. Modus, & dosis adhibendi non differunt.

1309. *ANGELICA* *levisticum*.

ICON. TAUR. XXIII. tab. 66.

Ligusticum foliis multiplicibus, foliis superne incisitis, floribus luteolis. CRANTZ. *fasc. 3. ed. 2. p. 196. class. umbell. p. 80.*

Ligusticum foliis multiplicibus, foliis superne incisitis. LUNN. *spec. p. 359.*

Angelica montana perennis Paludapii folio. TOURN. *inst. 313.*

Angelica Paludapii folio. LAM. *Fl. Franc. 2. 111. p. 451.*

Ligusticum vulgare an Libanotis ferulis Theophrasti. BAUH. *pin. 157.*

Ligusticum vulgare foliis apii. BAUH. *hist. III. 2. 122.*

Ligusticum. LON. *adv. p. 313.*

OFF. *Ligusticum*, s. *Levisticum*.

Loc. Hanc plantam *Alpicolæ* nostri colunt: spontaneam habent *Ligures* inter *Scyonam*, & *Genuam* observante LOBELJO. *PERENNIS.*

Obs. Semen alatum est ala laterali membranacea, atque tres costas in dorso habet subalatas, quarum duæ laterales majores sunt.

VIR. Caules teneri, & folia edulia sunt, *Liguresque* instar *Apii graveolentis* edunt. Tota planta odore quodam aromatico fragrat, ac haberi potest inter stirpes aromaticas, carminativas, calefacientes, resolventes, & speciatim emmenagogas; laudaturque potissimum ad foetus, & secundinae expulsionem promovendam: hunc in finem clysterum materiam præbet ex aqua decocta. Semina instar aliarum umbelliferarum carminativa sunt.

1310. *ANGELICA* *Razulii*.

Angelica foliis bipinnatis, foliolis lanceolatis, serratis decurrentibus. GOU. *illustr. p. 13. tab. 6.*

Panax alpina obuli laciniatis foliis. BOCC. *tab. 99.*

Angelica aquatica angustifolia pyrenaica foliis cannabinæ creticae. SCHOL. *Bot. 167.*

Loc. Cl. BELLARDI reperit in pratis *Gratsonej superiaris*, & in pratis di *Viù ultra Suram*. *PERENNIS.*

1311. *ANGELICA* *verticillaris*.

Angelica foliis divorticatisimis, foliolis ovatis serratis, conle pedunculis verticillato.

LINN. *man. alt. 217. JACQ. Hort. Vindob. tab. 130.*

Imperatoria nodiflora. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p. 417.*

Loc. Secus torrentes provinciae *Aquensis*, & *Dertonensis*. *BIENNIS.*

LASERPITIUM. LINN. *gen.* n. 306. *syn.* n. 341. TOURN. *tab.* 172.

Involucrum duplex, semina instructa duabus alis dorsalibus,
& duabus marginalibus.

1313. LASERPITIUM latifolium.

Laserpitium foliolis cordatis inciso-serratis. LINN. *spec.* p. 356. HALL. *hist. tom.* 1. n. 792.

JACQ. *Fl. Austr.* tab. 146.

Laserpitium foliis latioribus lobatis. MORIS. *umb.* p. 28.

Libanotis latifolia altera, seu vulgarior. BAUH. *pin.* 157.

Libanotis Theophrasti quorundam Seseli Æthiopicum Matthioli cervaria olba. BAUH. *hist.* p. 164.

Loc. In sylvis montanis ubique abunde. *PERENNE.*

VIR. Non sine amaritie acris aromatica planta in usum haud venit, licet sensibilia principia virtutes promittant; quantum quidem ex analogia conjicere licet, videtur inter aromatica extimulantia emmenagoga, atque aperientia sudorifica sedem suam mereri posse.

1313. LASERPITIUM gallicum.

Laserpitium foliolis cuneiformibus furcatis. LINN. *spec.* p. 537. CRANTZ *fasc.* III. ed. 2. p. 188.

Laserpitium trifurcatum. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 415.

Laserpitium gallicum. BAUH. *pin.* 156. GARID. *aix.* tab. 58.

Laserpitium e regione Massiliæ allotum. BAUH. *hist.* III. p. 157.

Loc. Locis siccis secus mare Nicaeense, & in ejus provincia ad torrentem Poillon, nec non secus viam inter Tenda, & l'Escarens, ac in valle fluminis Stura prope Demont. *PERENNE.*

VIR. Inusitata fere planta est. Dicitur calefacere, abstergere, & diuresim movere. Quantum quidem sensuum judicio conjicere licet, existimo LASERPITIUM gallici radicem Sileris montani radici posse equiparari.

1314. LASERPITIUM selinoides.

Laserpitium foliolis pinnatifidis connatis: laciniis suboppositis, nervis petiolisque hispidis. CRANTZ. *fasc.* III. p. 182.

Laserpitium herbaceo-asperum, seminum alis dorsalibus nonnunquam semialatis. CRANTZ p. 182.

Laserpitium foliolis lanceolatis integerrimis extimis coalitis. LINN. *spec.* p. 357.

Laserpitium prutenicum. HALL. *hort. Gott.*

Laserpitium gallicum. JACQ. *enum.* Vind. 118. SCOP. *Fl. Carn.* 1. p. 196.

Laserpitium daucoides prutenicum, viscoso semine. BREYN. *cent.* 167. tab. 84.

Laserpitium minus. Riv. *tab.* 23.

Loc. In dametis, & sylvis ad alpium radices non infrequens, abunde circa la Torre di Lucerna. *BIENNE.*

1315. LASERPITIUM Halleri.

Laserpitium foliis triplicato-pinnatis, lobulis lanceolatis. HALL. *hist. tom.* 1. p. 353. n. 795. tab. 19. CRANTZ. *class. umbell.* p. 67.

Panax asclepium semine folioso. BAUH. *pin.* 158.

Laserpitium hirsutum. LAM. *Fl. Franc.* p. 1228.

Panaces asclepium alterum Dalechampi. LUGD. p. 740.

Loc. Copiosissime in pratis montis Cenisii, neque infrequenter in alpiis cotiis, & Sabaudia. *PERENNE.*

DESCR. LASERPITIUM Halleri differt a Ligustico *serulaceo* foliis quadripinnatis, non tripinnatis, pinnularum segmentis brevioribus, & confertioribus sursum erectis conniventibus, asperiusculis, & subtiliter in costa, & adversa foliorum parte pilosis. Caules plerumque simplices esse solent. Umbella densissima. Involucrum

utriusque folia simplicia sunt, & latiora. Petioli foliorum in Ligustico *fernaceo* semiteretes, supra explanati; in *LASERPITIO Halleri* teretes, & striati, striis albis, & viridibus. Fructus in *LASERPITIO Halleri* certe quatuor alas habet, duas marginales, & duas dorsales, ideoque ad *LASERPITII* genus omnino pertinet.

SILER. CRANTZ. *class. umbell.* p. 68. TOURN. *tab.* 171.

Differt a *Laserpitio* dorso non duas tantum, sed plures alas ferente.

1316 SILER montanum.

Icon. TAUR. Vol. XIV. *tab.* 74.

Siler foliis integris glabris longe ellipticis, sine aculeatis. CRANTZ. *fasc.* 3. *ed.* 2. p. 185. *class. umbell.* p. 68.

JACQ. *Fl. Austr.* *tab.* 145.

Laserpitium foliis duplicato-pinnatis, pinnulis integerrimis lanceolatis simplicibus, & serratis. HALL. *hist.* *tom.* 1. p. 353. n. 794.

Laserpitium foliis ovatis lanceolatis integerrimis petiolatis. LINN. *spec.* p. 357.

Laserpitium montanum. LAM. *Fl. Franc.* *tom.* 3. p. 415.

Laserpitium quod sessili officinarum. BAUH. *pin.* 162.

Seseli, sive Siler montanum vulgare. BAUH. *hist.* III. p. 168.

Ligustico. MATTH.

Off. *Siler montanum.*

Loc. Ad radices alpiam, præcipue e rupium fissuris locis præcipitibus frequens prodit. *PERENN.*

VIR. Succum resinosum aromaticum copiosum fundit vulnerata radix. Simile actuum principium, sed parcius tota planta continet, quæ fortiter odotata, & aromatica est. Radix masticata scialagogum consuit. Solet apud nos ad Syrupi de Peucedano compositionem recipi, atque licet aliarum emollientium, nec non pectoralium etiam succi in hujusmodi remedii compositionem veniant, major tamen pars pertinet ad *SILERIS montani* radicem. Hic Syrupus apud nos usitatus est in morbis pectoris: certo magna præstitit in suppuratis ex pituita, quæ in pulmombus congestionem fecerit, atque ex hac causa Phrysicis utilissimus exiit. Non convenit in rassi ex acri, aut salso humore irritante, aut phlogosim faciente, neque opportunus est, si febris adsit, si sputa tenuia, aut spumosa sint. Urinam etiam blande promovet. Solet ex cochleari hujusmodi Syrupus exhiberi partitis vicibus unciatum duarum, aut trium ad summum pondere intra nichemerum. Profuit quoque podagricis, quando materia podagrica ad pulmones delata sputa crassa, & flava suppuratum mentientia protulit.

B. NON MARGINATÆ.

1. COSTIS SUBALATIS.

LIGUSTICUM. LINN. *gen.* n. 308. *synt.* n. 343. TOURN. *tab.* 165.

Involacrum duplex: semina ex ovato-acuminata intus plana quinque costata costis subalatis minime rostrata.

1317 LIGUSTICUM meum.

Icon. TAUR. Vol. VII. *tab.* 99.

Ligusticum foliatis capillaribus. CRANTZ. *fasc.* 3. *ed.* 2. p. 189. *class. umbell.* p. 82.

JACQ. *Fl. Austr.* *tab.* 303.

Meum athamanticum. HALL. *hist.* *tom.* 1. n. 761.

Athamania (Meum) foliatis capillaribus seminibus glabris stratis. LINN. *spec.* p. 353.

Aethusa meum. LINN. *synt.* *ed.* 13. p. 237.

Seseli meum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 352.

Daucus meum. CLUS. hist. 198.

Meum foliis anethi. BAUH. pin. 148.

Meum vulgare, & *branca ursina*. BAUH. hist. III. part. 2. p. 11.

Loc. In pascuis alpinis di Viù, Vinadiensis, & parvi montis Cenisii, aliisque non rarum. PERENNE.

1318. *LIGUSTICUM mutellina*. Tab. 60. fig. 2.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 86. f. 2. 3. 4. & Vol. XXIV. tab. 4.

Ligusticum foliis acute multifidis, caule subnudo. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 198. class. umbell. p. 82.

Phellandrium (mutellina) caule subnudo, foliis pinnatis. LINN. syn. 12. p. 213.

Seseli foliis duplicato-pinnatis, pinnulis semipinnatis, lobulis lanceolatis. HALL. hist. tom. 1. n. 763.

Seseli caule vix ramoso, umbella purpurea pinnulis acute multifidis. HALL. Helv. 431. JACQ. vindob. 123.

Phellandrium alpinum umbella purpurascens. TOURN. inst. 307.

Meum alpinum umbella purpurascens. BAUH. pin. 148.

Mutellina. BAUH. hist. III. p. 66.

Loc. in alpinis pratis di Viù frequens, atque iis alpiis, quae inde versus Sabaudiam, & Helvetiam protenduntur. PERENNE.

DESCR. Folia radicalia, petiolata, petiolo tereti longitudine foliorum inus sulcato. Folia bipinnata, pinnulis sessilibus. Pinnulae omnes iterum pinnatae sunt, pinnulis confluentibus. Pinnulis primis ad petiolum prodeuntibus modo bifidis, trifidis, modo quadrifidis. Pinnulae postremae, sive foliorum segmenta linearia acuto fine cum spinula. Sulco omnia percurruntur, splendide virent in inferiori potissimum parte. Pinnulae omnes similes plane lineares. Caulis nudus, striatus, firmus erectus, rotundus, ut tota planta glaber, supra medium semel, aut iterum bifidus, ad caulis divisionem folium unicum petiolo usque ad pinnularum in cavam vaginam ramum amplexante amplificato, quae viridis est striata, margine membranaceo albicante. Folium hoc simile radicalibus, sed pinnulis plerisque simplicibus perfecte linearibus, & longioribus. Rami singuli umbellam gerunt, cujus involucrum universale nullum est. Pedunculi umbellas sustententes vix unciales interioribus brevioribus angulati, striati, firmi, erecti. Involucra partialia, minima, dimidiata, foliolis linearibus longitudine pedunculorum exterius positis. Numero plerumque variant a n. 7. ad 13. Umbellularum flores variant similiter a n. 8. ad 12. circiter. Foliorum sapor acris aromaticus. Flores omnes fertiles. Petala dilute albido-purpurascensia, praesertim in exteriori parte. Petala non quidem emarginata, sed apice ad anteriorem partem inflexo. Antherae didymae ex luteo-virentes, staminibus duobus brevioribus, stamina filiformia. Styli duo filiformes albi, qui continuo elongantur, & persistunt. Fructus *LIGUSTICI*, sed immaturus alas foliaceas exhibet, quae in maturo fructu fere disparent.

1319. *LIGUSTICUM ferulaceum* N. Tab. 60. fig. 1.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 73. Vol. XVII. tab. 102.

Laserpitium dauricum. JACQ. hort. vindob. cent. 3. tab. 38.

Loc. Nascitur in alpiis Vinadiensis loco dicto *le Barricade*. PERENNE.

DESCR. Caules cubitales, striati, statim ramosi; tres vero, aut bini solent ex caule rami ad magnos angulos divergentes produci. Rami primi, deinde unum, aut duos ramos ferunt minus divergentes. Hi rami floriferi nunc nudi, nunc unum folium habentes, atque ita se habere solent laterales. Caules striati Angelicae odore, firmi, glabri, medulla farcti. Folia ad ramorum ortum nascuntur. Folia caulina petiolum habent semiamplexicaule membranaceum, ora albente, ubi pinnulas accipere incipiunt, striatum ex tereti triangulare, inus sulcatum, qui sulcus per mediam pinnulam porrigitur. Folia trippinnata primis, & secundis pinnulis petiolatis, petiolo, ut diximus, subtriangulo sulcato. Primariae pinnulae solent esse numero septem, aut octo, secundae quinque, ita tamen, ut pinnarum par unum continuata serie deficiat in ALLIUM Fl. Pedem. Tom. II.

pinnis minoribus secundis, tertiarum prima, & secunda sex pinnulis componitur, eademque ratione in sequentibus pari uno pinnularum deficiunt. Ultimæ pinnulae alternatim, aut pinnasim dentibus ad medium nervum, cum quo confluent, secantur, dentibus linearibus acutis; extremum quartæ pinnulae modo acute bifidum, modo trifidum, modo simplex est. Quartarum pinnularum dentes, modo simplices, modo bifidi, quandoque etiam trifidi. Tota planta glaberrima, niſiſe virens. Subſtantia foliorum ſucculenta, dentes erecti, foliorum facies expansa. Florum petala cordata, alba, profunde incisa, antherae didymae, albescentes. Petalum unum paullo majus est. Involucrum universale ex foliolis, quorum petiolum membranaceum est, ora albicante, viride, profunde trifidum, & viride ad instar extremarum pinnularum, alias bifidum, quandoque accedit unicum par pinnularum, deinde producto nervo trifidum fit. Folia involucri universalis ab octo ad duodecim. Umbellae quindecim plerumque erectis, angulatis, striatis pedunculis innixae. Involucrum parziale ex ſimilibus foliis, ſimili numero, ſed ſaepe ſimplicibus, aut tantum bidentatis. Floſculi viginti circiter. Styli perſiſtentes, divergentes, reflexi primum albi, dein rubentes. Semina magna ovalia, gibba, tribus coſtis ſubalatis in dorſo percuſa.

1310. *LIGUSTICUM pyraeum.*

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 90.

Ligusticum foliis quadruplicato-pinnatis, foliolis aristatis integris multifidisve. GOU. illustr. p. 24. tab. 10. f. 2.

Ligusticum pyraeum amplissimo, tenuique folio. Tourn. inst. 323.

Ligusticum ferulaceum. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 453.

Ligusticum seguerii foliorum segmentis glabris viridissimis, caule ramis brevior. VILL. prosp. p. 25.

Loc. In alpinis Valdensium legit Thomas PRIM. PERENNE.

1311. *LIGUSTICUM silaus.*

Peucedanum (silaus) foliolis pinnatifidis: laciniis oppositis, involucri universalis diphylo. LINN. spec. p. 354.

Peucedanum foliis triplicato-pinnatis, nervo distinctis lanceolatis imparibus trilobatis. HALL. hist. tom. 1. n. 797.

Selinum (silaus) caule folioso, ramis ramosis virgatis. CRANTZ. class. umbell. p. 61. fasc. 3. ed. 1. p. 18.

Seseli (pratense) pinnis pinnatifidis planis ovato-lanceolatis. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 209. tab. 6. fig. 1.

JACQ. Fl. Austr. tab. 15.

Laserpitium selinoides. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 325.

Seseli selinoides. JACQ. Enum. Vindob. p. 227.

Siler alterum proterense. DOD. pempt. 2. l. 5. c. 14.

Seseli pratense. Riv. tab. 37.

Seseli pratense montpeluocum. LON. ic. 738.

Seseli primum pratense. MORIS. umb. p. 17.

Peucedonum pratense. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 469.

Ligusticum silaus. VILL. prosp. p. 25.

Angelica pratensis opii folio. Tourn. inst. 313.

Seseli pratense, silaus forte Plinii. BAUH. pin. p. 162.

Loc. In pratis montanis non infrequens est. PERENNE.

1312. *LIGUSTICUM Peloponnesiacum.*

Ligusticum foliis multiplicato-pinnatis, foliolis pinnatis incisis. LINN. spec. p. 360. CRANTZ. class. umbell. p. 81.

Cicutario laifolia foetida. BAUH. pin. 161.

Seseli peloponnesense Math. seu cicutorio quibusdam. BAUH. hist. III. p. 184. CAM. epit. 514.

Loc. In Comitatu Nicosensi circa Sorsello, & la Giandola. Cl. BELLARDI affirmat nasci in sylvis soli expositis di Vlu. PERENNE.

DESCR. Involucrum universale ex quinque, aut sex foliolis, quorum alia lanceolata integerrima, alia simillima foliolis caulinis. Involucrum parviale ex duobus, aut tribus foliolis lanceolatis, integerrimis, petala sordide pallida, unco intus inflexo. Stamina alba. Antherae didymae. Umbellae terminales flores habent stylis instructos, atque semina praebent; laterales, & inferiores stylis carentes abortiunt. Semen glabrum, oblongum non rostratum, profunde sulcatum, sive striatum, ut in Ligusticis.

1323. *LIGUSTICUM austriacum* tab. 43.

ICON. TAUR. Vol. XV. tab. 2.

Ligusticum foliis bipinnatis, foliulis confluentibus incisus integerrimis. LINN. *spec.* p. 360.

Laserpitium foliis bipinnatis confluentibus anteriori nerva fusulosa. CRANTZ. *fasc.* 3. ed. 2. p. 197. *Class. umbell.* p. 81. *sub Ligustica.*

Ligusticum peloponesiacum. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 338.*

JACQ. *Fl. Austr.* tab. 151.

Seseli alpinum, seu montanum primum Clusii, folio splendente, flosculis albis. BAUH. *hist. III. part. 2. p. 168.*

Seseli montanum, cicutae folio glabrum. BAUH. *pin.* 161.

Seseli primum montanum pannonicum L. CLUS. 2. 193.

Loc. In Sabaudiae alpinis non rarum, frequens in monte Cenisio, atque in alpinis di Viù, & Lante, & in pratis supra Fenestrelles. *BIENNE.*

1324. *LIGUSTICUM simplex* tab. 71. fig. 2.

Ligusticum (mutellinoides) foliis pinnatis, pinnis decussatis linearibus, umbellae radiis alterne trifidis, caule simplici. VILL. *praep.* p. 25. tab. 8. f. 3.

Laserpitium (simplex) scapo nudo aphylo simplici foliis pinnatis multifidis acutis linearibus umbella semiglobosa. LINN. *rust.* 12. p. 210. *man.* 56.

Laserpitium foliis triplicato-pinnatis, pinnulis lanceolatis, involucri semitridis. HALL. *hist.* n. 796.

Loc. In editioribus pratis alpium frigidiorum saepius occurrit. *PERENNE.*

CONIUM. LINN. *gen.* n. 299. *syn.* n. 333.

Flores flosculosi fertiles, involucrum duplex. Petala apice inflexo emarginata,

Fructus subglobosus. Semina intus plana quinquecostata,
costis subalatis repando-crenatis.

1325. *CONIUM maculatum.*

ICON. TAUR. Vol. XXIV. tab. 72.

Conium seminibus striatis. LINN. *spec.* p. 349.

Cicuta. HALL. *hist. tom. 1. n. 766.*

Cariandrum (cicuta offic.) caule maculato fortidum. CRANTZ. *fasc.* 3. ed. 2. p. 211.

Cicuta (officinalis) foetens, caule maculato. CRANTZ. *class. umbell.* p. 98.

JACQ. *Fl. Austr.* tab. 156.

Conium (cicuta) seminibus striatis. NEKER *tom. 1. p. 142.*

Cicuta major. TOURN. *inst.* p. 306. BAUH. *pin.* 160.

Loc. Nihil ad vias, & fossas, & sepes vulgatus in agro Pedemontano. *ANNUA.*

Viz. Cicutae universa planta scatet principio quodam virulento narcotico, quod lenes humores potenter resolvit, fibrarum irritabilitatem minuit, & nervos peculiariter afficit. Eam non habet virulentiam stimulantem, quae inest Sramonio, & Belladonnae, neque etiam comparari potest cum Hyosciamo, & Opio propter vim narcoticam, neque, ut nonnullae narcoticae stirpes, gangrenose diruit sanguinis constitutionem. Interim & a vetustissimis temporibus inter venena recensita est, cujus usum sequuntur anxietas, stupor, vertigo, mentis alienatio, secretionum suppressio, atque etiam paralysis &c. Quae omnia virulentiam vim demonstrant. Nonnisi igitur ad externos usus adhibita olim cicuta est ad duros, difficilesque tumores resolvendos, atque familiare semper Medicis extitit praesidium in obstructionibus praesertim hepatis, & lienis emplastrum de cicuta cum

gummi ammoniaco. Nuperis autem temporibus post experimenta, quæ suscepit Cl. STORCK commendatum est extractum cicutæ inus datum non modo ad scirrhos, & cancri curationem, verum etiam ad plures morbos difficiles superandos, uti amaurosim, catharactam incipientem, hydropem, asthma, mensium suppressionem, scorbuti, & luis venereæ quædam producta superanda, & obstructions, tumoresve fere omnis generis vincendos; tantas porro virtutes refellunt Cl. Virorum experimenta, ego libere dicam quid viderim, & quid sentiam. Nullam cancri curationem apud nos fecit extractum cicutæ sive Taurinensis, sive Vindobonensis, veras scrophulas, & verum scyrrum non superavit; vidi certe profuisse in obstructionibus imi venis, quæ aliis remediis non cessabant, in contumaci rheumatismo, in dolore capitis periodico nervorum spasticas convulsiones inferente, in glandulis induratis, in asthmate ex lenio umore in pulmonibus hærente, in mensium suppressione ex simili causa. Puto in amaurosi, & catharacta minime juvare posse si nervorum adsit debilitas; atque summam utilitatis cicutæ consistere in ea vi, quæ potest partium sensibilitatem imminuere, atque efficaciter vasa expedire humores potenter, & sensim sine sensu resolvendo. In scorbuticis hominibus humorum resolutionem scorbuticam promovet; cancerosum autem, & venereum vitium non emendat. Suspectum mihi remedium est, si vis fibræ torpeat, aut humores ad gangraenosam resolutionem inclinent. Hydrops, si ab obstructionibus sustineatur, levamen ab usu cicutæ habere poterit propter sublatam causam. Ratio dandi cicutam nostris probata temporibus est in extracto, quod leni igne parandum est, ne activæ volatiles particulae avolent. Initium fieri solet a granis aliquot, quæ dosis continuo sensim sine sensu adaugetur; usque dum commodè ferat æger; augenda autem dosi non est, si quædam ex propriis phaenomenis afferat, atque usque dum natura iterum bene assueverit, major ejus dosi est drachma una, quam susinere aegri solent: sunt qui etiam unciam unam intra nocturnum dederint, sed horum animosum exemplum insequendum non consulerem.

2. COSTIS SIVE STRIIS NUDIS.

a. Fructu subrotundo.

CORIANDRUM. LINN. gen. n. 318. syst. n. 333. TOURN. tab. 168.

Flores radiantes, disco saepe aboriente. Petala cordata; involucri duplex.
Fructus bilocularis loculis monospermis, ovatus, aut didymus.

1326 CORIANDRUM sativum.

Coriandrum fructibus globosis. LINN. spec. p. 367. HALL. hist. 1. n. 764.

Coriandrum (sativum) fructibus globosis calyce instructis. CRANTZ fasc. 3. ed. 2. p. 210.

Coriandrum majus. BAUH. pin. 158.

Coriandrum. CAM. epit. p. 523.

Loc. Cl. BELLARDI legit ad sepes in agro di Sciolye. ANNUM.

1327. CORIANDRUM testiculatum.

Coriandrum fructibus didymis. LINN. spec. p. 367.

Coriandrum minus testiculatum. BAUH. pin. p. 158. TOURN. inst. p. 316.

Coriandrum minus, odorum. BAUH. hist. III. part. 2. & 91.

Coriandrum alterum minus odorum. LOB. ic. 706.

Loc. Passim in agris Comitatus Nicaensis, Uneliæ, & in valle Sinfora. ANNUM.

PHELLANDRIUM. LINN. *gen. n.* 315. *sys. n.* 350. TOURN. *tab.* 161.

Flores flosculosi fertiles. Involucrum universale nullum. Petala cordiformia inaequalia. Fructus subrotundus calyce persistente, & stylo coronatus. Semen ex ovato-acutum, intus planum obiter quinque-striatum.

1328 **PHELLANDRIUM** aquaticum.

ICON. TAUR. Vol. XVIII. *tab.* 1.

Phellandrium foliorum ramificationibus divaricatis. LINN. *spec. p.* 366. CRANTZ. *fasc.* 3. *ed.* 2. *p.* 200.

Phellandrium fallis refractis. HALL. *hist. tom.* 1. *n.* 757.

Ligusticum phellandrium. CRANTZ. *class. umbell. p.* 83.

Phellandrium. DOD. *pempt.* 591. TOURN. *ins.* *p.* 306.

Cicutaria palustris tenuifolia. BAUH. *pin.* *p.* 161.

Phellandrium, vel Cicutaria agastica quarundam. BAUH. *hist. III. part.* 2. 183.

Oenanthe Phellandrium. LAM. *Fl. Franc. tom.* 3. *p.* 432.

Loc. Circa lacus, & aquas stagnantes frequens est. *ANNUUM.*

VIR. PHELLANDRII semina in pulverem trita, & drachmae unius, aut alterius pondere exhibita ducuntur ulcera cancrosa sanare, atque etiam febres intermittentes tollere, quod non crediderim. Ego quidem nullas observationes habeo, neque hanc assertionem aliorum observationibus fulcire possum.

PIMPINELLA. LINN. *gen. n.* 328. *sys. n.* 363. TOURN. *tab.* 163.

Flores subradicati fertiles. Involucrum nullum. Petala cordata. Fructus subrotundus, aut subovatus. Semina intus plana, paullisper acuminata, dorso gibbo tricostrato.

1329 **PIMPINELLA** saxifraga.

Pimpinella fallis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus. LINN. *spec. p.* 378.

JACQ. *Fl. Austr. tab.* 395.

Pimpinella rasundifolia. SCOP. *Fl. Carn.* 1. *p.* 209.

Tragoselinum minus Pimpinella minar. TABERN. *ic.* 88.

Tragoselinum fallis ovatis, pinnis ovatis. HALL. *hist. tom.* 1. *n.* 786.

Tragoselinum minus. LAM. *Fl. Franc. tom.* 3. *p.* 447. TOURN. 309.

Pimpinella pinnis subrotundis circumscissis. BOHEM. *lips.* *p.* 202.

Pimpinella saxifraga minar. BAUH. *pin.* *p.* 160. MORIS. *umbell. p.* 13. *tab.* 5.

Loc. In pratis, & pascuis siccis ubique abunde. *PERENNIS.*

1330. **PIMPINELLA** magna.

ICON. TAUR. Vol. XIII. *tab.* 35.

Pimpinella foliolis omnibus lobatis: impari trilobo. LINN. *man. alt.* *p.* 219.

Pimpinella fallis pinnatis, foliolis lanceolatis serratis acutis. GER. *prov.* 255.

Pimpinella major. JACQ. *Fl. Austr. tom.* 4. *p.* 50. *tab.* 396.

Pimpinella major fallis pinnatis, foliolis cordatis, impari trilobo. HUDS. *fl. angl.* *p.* 110. *n.* 1.

Pimpinella saxifraga major umbella candida. BAUH. *pin.* 159.

Pimpinella (major) fallis pinnatis, foliolis petiolatis ovato-acuminatis, duplicato-dentatis: intimis duobus, imparique trilobis, caeteris deorsum auriculatis. GOV. *illustr.* *p.* 20.

Loc. In pinguibus alpium pratis passim. *PERENNIS.*

VIR. PIMPINELLA saxifraga, & magna viribus conveniunt. Hisce stirpibus inest principium quoddam acre aromaticum inhaerens substantiae resinosae. Sive folia, sive radix masticata hialagogum constituunt, atque linguam fortiter vellicant. Oleum caeruleum haec planta praebet, a quo praesertim est virtus deducenda. Licet soleat in usum recipi radix, non minori tamen pretio habenda folia sunt.

PIMPINELLA humores solvit, vasa extimulat, & aperit; adhibetur utiliter in ALLIUM *Fl. Pedem. Tom. II.*

asthmate humido, in mensium suppressione, in hydropse incipiente. In febris etiam cathartalibus multis laudibus effertur. Apud Germanos frequenter in usu est essentia PIMPINELLÆ. Radix utilius in menstruo vinoso, quam in aquoso decoquitur ab uncia una ad duas, aut etiam tres.

1331. PIMPINELLA pumila.

Pimpinella umbellis numerosissimis simplicissimis, compositisque. JACQ. vind. 127. & Fl. Austr. tab. 49.

Seseli umbellis numerosissimis compasitis, simplicibusque. LINN. syst. 12. p. 215.

Apium (pumilum) umbellulis paniculatum, foliis ternatis linearibus. CRANTZ. class. umbell. p. 102.

Apium (pumilum) umbellulis paniculatum, foliis linearibus peucedani. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 213.

Seseli (pumilum). CRANTZ. class. umbell. p. 94.

Tragoselinum pumilum. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 448.

Seseli petioli ramiferis, membranaceis oblongis integris foliis linearibus sulcatis petioli longitudine. GER. prov. p. 253.

Selinum montanum pumilum Clusii, foliis foeniculi, aut Peucedani, flare albo semine Selini. BAUH. hist. III. part. 2. p. 17.

Tragoselinum caule crasso sulcato divaricato, foliis multifidis capillaribus. HALL. hist. helv. n. 788.

Oreoselinum sertium. TABERN. herb. part. 1. p. 343.

Saxifraga montana minor foliis Peucedani. MORIS. hist. 2. p. 274.

Selinum montanum pumilum. CLUS. hist. p. 200.

Daucus montanus, multifida folia, Selini semine. BAUH. pin. 150.

Foeniculum minimum parvum. TOURN. inst. 311. SEGU. veran. tom. 2. p. 18.

Loc. Frequens in valle Bardonache, & valle Macra, atque minime rara in saxosis apricis secus flumina, & torrentes. *BIENNIS*.

1332. PIMPINELLA peregrina.

Pimpinella foliis radicalibus pinnatis crenatis summis cuneiformibus incis. LINN. spec. p. 378.

Apium peregrinum. CRANTZ. class. umbell. p. 101.

Apium peregrinum, foliis subrotundis. BAUH. pin. 153.

Daucus vertius dioscoridis. COLUMN. ceph. t. p. 108. tab. 109.

Loc. Cl. BELLARDI in sterilibus Nicaeensis ab portum di Limpia. *PERENNIS*.

AETHUSA. LINN. gen. n. 317. syst. n. 351. TOURN. tab. 160.

Flores flosculosi fertiles. Involucrum universale nullum: Petala cordata, inaequalia.

Fructus subrotundus. Semen ovatum intus planum maxime gibbum quinque-costatum.

1333. AETHUSA cynapium.

Aethusa cynapium. LINN. spec. p. 367. HALL. hist. tom. 1. n. 765.

Coriandrum (cynapium) caule distorto, involucellis dimidiatis pendulis. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 211.

Cicuta minor, petroselina similis. BAUH. pin. 160.

Cicutaria fatua. LOR. ic. 280. NECKER. tom. 1. p. 146.

Loc. Vulgaris ad sepes praesertim hortorum. *ANNUA*.

Vix. Petroselino similis AETHUSA facile per errorem obsonia, atque acetaria ingreditur, acris autem & virulenta planta est, quae stomachum male afficit, atque non modo anxietatem, cardialgiam, singultum, strangulatum, veniginem, & delirium excitat ex male affecto ventriculo, sed & reliquo systemati nervoso inimica est stuporem, atque terrorem inferens: non modo autem cavendum est, ne pro petroselino commendatur, verum etiam pro Cicuta majori adhibeatur, quum ejusdem resolventes proprietates non habeat, est hucusque usus internus AETHUSAE, sive Cicutae minoris, quodsi incaute deglutita fuerit cita medela posita est in usu evacuantium primum emeticorum, deinde purgantium, atque deinceps in usu demulcentium, atque lenientium.

APIUM. LINN. *gen. n.* 329. *yst. n.* 364. TOURN. *tab.* 160.

Flores flosculosi fertiles. Involucrum vel nullum, vel paucorum foliorum.

Petala integra inflexa aequalia. Fructus subrotundus minimus.

Semen ovatum intus planum dorso tenuissime striato.

1334 **APIUM graveolens.**

ICON. TAUR. Vol. XXIII. *tab.* 90.

Apium foliis caulinis cuneiformibus. LINN. *yst.* 12. p. 217.

Apium foliis pinnatis, pinnis trilobatis. HALL. *hist. tom.* 1. p. 248. n. 784.

Apium foliis infimis quinatis-pinnatis, caulinis summis ternatis subsessilibus. NEKER. *tom.* 1. p. 152.

Seseli graveolens. SCOP. *Fl. Carn. ed.* 2. n. 360.

Apium graveolens. CRANTZ. *fasc.* 3. ed. 2. p. 215.

Apium palustre, s. Apium officinarum. BAUH. *pin.* p. 154.

Apium vulgare ingratius. BAUH. *hist. III. part.* 2. 100.

Apio palustre. MATTH.

OFF. *Apium.*

VERN. *Seleri.*

LOC In fossis aquarum agri *Nicaensis. BIANNE, & ANNUM.*

VIR. Spontanea planta cuidam acrimoniae aromaticae adjungit insignem amaritatem, per culturam plurimum dulcescit, atque summa radix cum tenuis foliis edulis est; hic cibus convenit pituitosis hominibus: blanda enim acrimonia aromatica stomachi actionem excitat, atque loti secretionem promovet. Radix recensetur inter aperientes, quae stimulo dyuresim cient.

AMMI. LINN. *gen. n.* 297. *yst. n.* 331. TOURN. *tab.* 159.

Flores subflosculosi fertiles. Involucrum duplex pinnatifidum. Petala cordata inflexa

inaequalia. Fructus exiguus subrotundus. Semen intus planum dorso tenuius striato.

1335 **AMMI majus.**

Ammi foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis superioribus multifidis linearibus. LINN. *spec.* p. 349.

Apium Ammi involucri pinnatifidis laciniis foliorum, caulis solis lanceolatis. CRANTZ. *fasc.* 3. ed. 2. p. 217. *class. umbell.* p. 103.

Ammi majus. BAUH. *pin.* p. 159. TOURN. *int.* p. 304.

Ammi vulgare, majus, latioribus foliis, semine minus odore. BAUH. *hist. III. part.* 2. 27.

OFF. *Ammi.*

LOC. Secus vias. atque in arvis non infrequens est. *ANNUM.*

VIR. Semina habentur ut carminativa, sed alia longe praestantiora existunt.

SESELI. LINN. *gen. n.* 322. *yst. n.* 357.

Flores flosculosi fertiles. Involucrum parziale polyphyllum, universale vix ullum, aut ullum. Petala cordata reflexa. Fructus subrotundus, aut ovatus.

Semen ovatum acuminatum, intus planum gibbum quinque-costatum.

1336 **SESELI segetum.**

Seseli segetum. CRANTZ. *class. umbell.* p. 91.

Sison (segetum) foliis pinnatis, umbellis cernuis. LINN. *spec.* p. 362.

Sium terrastric umbellis rarioribus. MORIS. *ox.* 3. *sect.* 9. *tab.* 5. f. 6.

Sium foliis pinnatis, umbellis cernuis. HALL. *hist. tab.* 1. n. 779.

LOC. Rarius inter segetes agri *Pineroliensis* reperta. *ANNUM.*

1337. SESELI annuum.

Seseli petialis rameis membranaceis ventricosis emarginatis. LINN. spec. p. 373. JACQ. vind. 225, & Fl. Austr. tab. 55.

Seseli (bienne) caule erecto admodum folioso. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 24. class. umbell. p. 93.

Seseli foliis linearibus triplicato-pinnatis &c. HALL. hist. rom. 1. n. 762.

Pimpinella tenuifolia. RIV. pentap. irr. tab. 82.

Foeniculum sylvestre annuum tragoselini odore umbella alba. VAILL. paris. 54. tab. 9. f. 4. Libanosis tenuifolia germanica. BAUH. pin. 158.

Loc. Nascitur in monte S. Michaelis, & in collibus Montisferrati, atque comitatus Nicaensis frequens est. ANNUUM.

1338. SESELI glaucum.

Seseli petialis ramiferis membranaceis oblongis integris: foliolis singularibus, binatisque canaliculatis laevibus, petiolo longioribus. LINN. spec. p. 372.

JACQ. Fl. Austr. tab. 144.

Seseli (osseum) caule alto ramosa patente, geniculis ossis, ramis, & semine stris argenteis. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 207.

Seseli petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliolis filiformibus, petiolo longioribus. GER. p. 253. n. 3.

Foeniculum sylvestre glauco folia. TOURN. inst. 311.

Loc. In collibus aridis agri Nicaensis frequens est. PERENNE.

1339. SESELI hippomarathrum.

Seseli involucrellis carnato-monophyllis. LINN. syst. 12. p. 215. JACQ. vind. p. 224. & Fl. Austr. tab. 143. SCOP. Fl. Carn. 1. p. 221.

Seseli articulatum. CRANTZ. fasc. pag. 205. tab. 5. f. 1. & 2.

Hippomarathrum. RIV. pent. irr. tab. Kram. el. p. 82.

Saxifraga pannonica. CLUS. hist. 196.

Loc. Frequens in provincia Canapicensi. PERENNE.

1340. SESELI tortuosum.

Seseli caule rigido, foliolis linearibus fasciculatis. LINN. spec. p. 373.

Foeniculum tortuosum. BAUH. hist. III. part. 2. 16. TOURN. inst. p. 311.

Seseli massiliense, foeniculi folio. BAUH. pin. 161.

Seseli massiliense, folio foeniculi crassiore. LOB. ic. 785.

Loc. Inter Lucerame, & la Scarena ad rupes. PERENNE.

1341. SESELI elatum.

Seseli caule filiformi rigido, foliis biterminatis, foliis teretibus, fructibus scabris. GOV. illustr. p. 16. tab. 8.

Seseli caule elongato, geniculis callosis, foliis bipinnatis: primis linearibus distantibus. LINN. syst. 12. p. 215.

Apium montanum folia tenuiare. BAUH. pin. 153.

Loc. In pascuis sterilibus, & saxosis montium, atque etiam alpium passim adinventur. BIENNE.

OENANTHE. LINN. gen. n. 314. syst. n. 349. TOURN. tab. 166.

Flores radiati, disco sterili. Petala inaequalia. Fructus ovarus, calyce insigni quinqueidentato persistente coronatus. Semen ovarum non acuminatum striatum, intus planum.

1342. OENANTHE fistulosa.

Oenanthe stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis. LINN. spec. p. 365. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 201.

Oenanthe aquatica. BAUH. pin. 162. TOURN. inst. p. 313.

Oenanthe, sive filipendula aquatica. BAUH. hist. III. part. 2. n. 191.

Loc. Circa lacum *S. Michaelis Eporediae*, necnon circa oppidum *Arve* in *Sabaudia*,
atque ad fossas prope lacum *de la Magdelaine* legit *Ignatius MOLINERI*. *PERENNIS*.

1343. *OENANTHE* globulosa.

Icon. TAUR. Vol. XI. tab. 96.

Oenanthe fruticulus globosis. LINN. spec. p. 365. GOU. illustr. p. 18.

Oenanthe lusitanica semine crassiore globoso. TOURN. inst. p. 313.

Loc. In herbidis, & subhumidis agri *Nicaeensis*. *PERENNIS*.

1344. *OENANTHE* crocata.

Icon. TAUR. Vol. XXV. tab. 2.

Oenanthe foliis omnibus multifidis obtusis subaequalibus. LINN. spec. p. 365. JACQ. hort.

Vindob. cent. 3. tab. 55.

Oenanthe chaerophylli foliis. BAUH. pin. 163.

Oenanthe cicutae fœcie, succo viroso erocant. LOB. adv. 326. Act. Angl. 1747. n.

480. p. 235. tab. 3.

Loc. Circa lacum *S. Michaelis* prope *Eporediam*. *PERENNIS*.

VIR. Haec *OENANTHE*, sicuti etiam fistulosa veneni suspitione non caret.

1345. *OENANTHE* pimpinelloides.

Oenanthe foliolis radicalibus cuneatis fissis caulinis integris linearibus longissimis emaculatis. LINN. spec. p. 366.

JACQ. Fl. Austr. tab. 394.

Oenanthe foliis radicolibus ovatis incisis, caulinis integris linearibus longissimis simplicioribus. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 201.

Oenanthe apii folio. BAUH. pin. 162. TOURN. inst. p. 312.

Oenanthe, sive filipendula monspesulana folio apii. BAUH. hist. III. p. 2. n. 190.

Oenanthe aquatica pimpinellae saxifragae divisura. PLUK. olm. 268. tab. 49. f. 4. non bona.

Enanthe. II. MATTH.

Off. *Oenanthe*, 2. *Filipendula tenuifolia*.

Loc. Passim locis subhumidis, & graminosis in comitatu *Nicaeensi*. Inter *Aqui*, & *Toriona* non infrequenter esse adnotavit *Ignatius MOLINERI*. In *Liguriae* etiam pratis occurrit. *PERENNIS*.

SMYRNIUM. LINN. gen. n. 325. syst. n. 360. TOURN. tab. 168.

Flores flosculosi, disci saepe abortivi. Involucrum nullum. Petala acuminata.

Fructus subrotundus magnus ex duobus seminibus carinatis, dorso subrotundis,

& tribus costis obtusis, & veluti funiculis percurso, interiori facie

veluti triangulari, neque idcirco tota plana, & contigua.

1346. *SMYRNIUM* olusatrum.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 45.

Smyrniolum foliis caulinis ternatis petiolatis serratis. LINN. spec. p. 376.

Smyrniolum Maubiioli. TOURN. inst. p. 316.

Hippocastinum Theophrasti, vel Smyrniolum Dioscoridis. BAUH. pin. 154.

Macerone quibusdam, Smyrniolum semine magno nigro. BAUH. hist. III. part. 2. 126.

Smirno. MATTH.

Loc. Abunde circa thermas *Vinadii*. *BIENNE*.

1347. *SMYRNIUM* nodiflorum. tab. 72.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 23.

Ligusticum nodiflorum foliis cordatis profunde serratis acutis, caule romis verticillato, umbellis inordinatis numerosissimis. VILL. prosp. p. 25. tab. 23. f. 2.

Angelica alpina ad nodos florida. TOURN. inst. 313. MISC. TAUR. tom. 5. p. 802. 90.

ALLIONI Fl. Pedem. Tom. II.

F



Loc. Abunde in sylvis, proximisque pratis *Vinadii*, & *Volderii*. Abunde etiam circa *Tenda*, *Limone*, & *Bobbio*, in valle *Segusino*, nec non etiam di *Viâ*. *PERENNIS*.

DESCR. Caules digiti, & ultra crassitie, tripedales, laeves, striati, brachiati, subnudi. Juxta ramorum longitudinem, atque in ipso caule duo, tres, aut quatuor etiam unciales pedunculi radiatim nascuntur umbellas sustinentes. Ad pedunculum ortum adest foliolum integrum lanceolatum: ramos etiam umbellae terminant, similiter nascentes. Involucrum universale monophyllum, lineare, aristatum simile foliolo, quod subjectum est pedunculis umbellas gerentibus. Umbellae partiales tres, aut quatuor, cum flore uno solitario in medio umbellae, atque triflorae, aut quadriflorae sunt. Petala herbacei coloris unguibus gracilibus instructa, unco inflexo cordata. Filamenta longitudine petalorum antheras albescentes didymas sustinent. Styli albicantes brevissimi. Solent terminales umbellulae semina maturescere. Semina incurva dorso potius costato, quam striato, nigra, magna, non acuminata. Petioli foliorum rotundi, striati per firmam, brevemque vaginam nascuntur. Petiolus in tres dividitur, quorum medius longior est, quilibet petiolus sustinet folia tria petiolata exovatis lanceolata, profundius dentibus incisa, modo aristatis, modo minime. Venosa glabra subtus pallescentia folia sunt. Ex forma seminis media planta est inter *SMYRNUM*, & *LIGUSTICUM*, sed ad *SMYRNUM* potius videtur accedere.

b. *Fructu oblongo*

BUPLEURUM. LINN. *gen.* n. 291. *yst.* n. 323. *TOURN.* tab. 163.

Flotes flosculosi fertiles flavi aequales, atque folia in nostris omnibus integra hoc plantae umbelliferae genus satis distinguunt. Semina autem in variis speciebus varia, oblonga, ovata, aut ex ovatis acuminata, costata, aut simpliciter striata sunt.

1348 *BUPLEURUM* rotundifolium.

Icon. TAUR. Vol. VII. tab. 92.

Bupleurum involuclis universalibus nullis, foliis perfoliatis. LINN. *spec.* p. 340.

Bupleurum caule brachiato ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis amplexicaulis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 767.

Bupleurum foliis ovatis perfoliatis. CRANTZ. *fasc.* 3. ed. 2. p. 202.

Bupleurum perfoliotum rotundifolium annuum. *TOURN.* *ins.* p. 310.

Perfoliata vulgarissima, s. arvensis. BAUH. *pin.* 277.

Perfoliata simpliciter dicta annua vulgaris. BAUH. *hist.* III. part. 2. 198.

Perfoliatum vulgatus flore luteo, folio umbilicata. LOR. p. 171.

Perfoliata. MATTH.

Loc. LOBELIUS in Sabaudiae segetibus. BOCCONE in Sabaudiae montibus adnotavit. TERRANEUS in *Ueliae* agris. In agris collium calidiorum, uti *Manisferrati*, comitatus *Nicaeensis*, & *Liguriae* passim nascitur. *ANNUUM*.

VIR. *BUPLEURO* rotundifolio, & falcato tributae sunt vires eximiae vulnerariae, ita ut valeant etiam in herniis juvare, sed recentiores non immerito tantam efficaciam expunxerunt. In usum hisce temporibus non veniunt, neque videmur hae stirpes ultra vim aliquam adstrictoriam valere, quae certe in pluribus stirpibus longe efficacior est.

1349. *BUPLEURUM* falcatum.

Bupleurum involuclis pentaphyllis ocutis, universali subpentaphyllo, foliis lanceolatis, caule flexuoso. LINN. *spec.* p. 341.

Bupleurum foliis radicalis petiolatis elliptico-lanceolatis, coulinis falcatis, caule flexuoso. HALL. *hist.* tom. 1. n. 776.

JACQ. *Fl. Austr.* tab. 158.

Bupleurum (falcatum) foliis petiolatis falcato-ellipticis ocutis. CRANTZ. *fasc.* 3. p. 203.

Bupleurum folio subrotundo, sive vulgarissimum. BAUH. *pin.* 278. *TOURN.* *ins.* p. 309.

Auriculo leporis umbello lutea. BAUH. hist. III. part. 2. 200.

Bupleurum angustifolium. TABERN. ic. 672.

Loc. Circa Arcem Exilliarum. PERENNE.

1350. *BUPLEURUM longifolium.*

Bupleurum involucrellis pentaphyllis ovatis, universoli subpentaphyllo, foliis amplexicaulibus. LINN. spec. p. 341.

Bupleurum foliis imis petiolatis ovatis, superioribus amplexicaulibus ovato-lanceolatis.

HALL. hist. tom. 1. n. 768.

Bupleurum montanum latifolium. TOURN. inst. p. 310.

Perfoliata montana latifolia. BAUH. pin. p. 277.

Perfoliata montana. CAM. hort. 120. tab. 38.

Loc. TERRANEUS, & BOYERON in Sabaudia legerunt. PERENNE.

1351. *BUPLEURUM stellatum.*

Icon. TAUR. Vol. VI. tab. 95.

Bupleurum involucrellis coudunatis, universali triphylo. LINN. spec. p. 340.

Bupleurum foliis gramineis involucre peculiari octies marginato. HALL. hist. tom. 1. n. 771. tab. 18.

Loc. Ad rupes, & in pratis alpium ubique frequens. PERENNE.

1352. *BUPLEURUM ranunculoides.*

Icon. TAUR. Vol. VII. tab. 96. 97.

Bupleurum involucrellis pentaphyllis lanceolatis longioribus, universali triphylo, foliis caulinis lanceolatis. LINN. spec. p. 342. GOU. illustr. p. 8.

Bupleurum montanum gramineo folia. TOURN. inst. p. 310.

Perfoliata alpina angustifolia minima, vel Bupleurum angustifolium pyrenaicum. BAUH. pin. p. 277. prodr. 130.

Perfoliata minor foliis gramineis. BAUH. hist. III. p. 199.

Loc. Nihil in pascuis alpium frequentius: etiam ad summa ascendit. PERENNE.

1353. *BUPLEURUM angulosum.*

Bupleurum involucrellis pentaphyllis articulis, universali triphylo-ovato, foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis. LINN. spec. p. 341.

Bupleurum foliis radicolibus gramineis, caulinis ovato-lanceolatis amplexicaulibus, cotyledibus umbellarum quinquefoliis. HALL. hist. tom. 1. n. 770.

Bupleurum (angulosum) foliis lanceolato gramineis, caulinis cordatis ocutis, caule basi ramoso. VILL. prosp. p. 23. tab. 6. f. 3.

Bupleurum alpinum angustifolium majus. TOURN. inst. p. 310.

Perfoliata alpina angustifolia major, sive folio anguloso. BAUH. pin. 277. prodr. 129.

Loc. In subalpinis, & alpinis ad vias, & dumeta passim occurrit. PERENNE.

1354. *BUPLEURUM odontites.*

Icon. TAUR. Vol. VII. tab. 94.

Bupleurum involucrellis pentaphyllis acutis, universali triphylo, staculo centrali aliore, ramis divaricatis. LINN. spec. p. 342.

Bupleurum caule brachiato, involucri utrisque pentaphyllis aristatis. HALL. hist. tom. 1. p. 344. n. 772.

Bupleurum foliis linearibus, involucrellis pentaphyllis, aristas rigidis. SCOP. Fl. Carn. p. 329. n. 1.

Perfoliata minor angustifolia, Bupleuri folio. BAUH. pin. 277.

Perfolium angustifolium montanum. COL. port. 1. p. 247.

Bupleurum divaricatum. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 410.

Auriculae leporis affinis, odontitis lutea Valerandi, & Dalechampi. BAUH. hist. III. part. 2. 201.

Loc. In pascuis sterilibus collium minime rarum est. ANNUUM.

1355. BUPLEURUM semicompositum.

Bupleurum umbellis compositis, simulque simplicibus. LINN. spec. p. 342.

Bupleurum caule herbaceo, foliis lanceolatis, umbellis axillaribus, terminalibusque, seminibus scabris. GOU. illustr. p. 9. tab. 7. f. 1.

Loc. Circa Villafranca in sterilibus versus Saisi Ospice. ANNUUM.

DESCR. BUPLEURUM semicompositum licet proximum BUPLEURO odonitii, ab eo tamen plurimis notis differt. Magnitudine minus est, rami in Odonitii magis divaricati, & fere ad angulum rectum. Caules in Odonitii evidenter striati, in altero laeves vix striati. Folia in Odonitii linearia sessilia, acuminata, in semicomposito ex lineari principio in ovatam aut ellipticam formam abeuntia cum spinula. Involucrum universale in Odonitii ex quinque inaequalibus foliis: Involucrum parziale ex quinque similibus, sed aequalibus foliis: involucri partialis folia post florescentiam connivent. Tum involucri partialis, tum universalis foliola transparentia sunt tribus nervis insignibus viridibus, & inter nervos transversis locis viridibus percursa. Involucrum parziale patentissimum florescentiae tempore. Flores umbellarum saepius undecim. Umbellae quatuor, aut quinque, aut sex, innixae radiis inaequalibus, interioribus brevioribus. Centralis umbella sessilis esse solet. Petala lutea unco inflexo. In semicomposito folia involucri partialis viridia, striata, non transparentia, oris laevissime subhirsutis. Petala florum longe minora, albicantia fere, floribus fere sessilibus, centrali aliquantulum pedunculo pateoitis autem maturis fructibus. Fructus subhirsuti. Involucrum universale fit ex quinque foliolis inaequalibus similibus foliis involucri partialis, sed longioribus. Radii umbellarum vix longiores sunt involucro universali, cum in Odonitii multo longiores sint. Flores in BUPLEURO semicompositi singulis umbellis quinque, aut sex.

1356. BUPLEURUM Gerardi.

ICON. TAUR. Vol. XXVII. tab. 61.

Bupleurum involucris, & involucellis pentaphyllis, foliolis lineari subulatis. GER. flor. galloprov. p. 233. cum icon.

JACO. Fl. Austr. tab. 236.

Loc. In sterilibus, & arvis macilentis agri Taurinensis, & Canapiciensis frequens est, uti etiam in valle Maurianensi circa S. Jean, & S. Michel. ANNUUM.

1357. BUPLEURUM junceum.

Bupleurum caule erecto paniculato, foliis linearibus, involucris triphyllis, involucellis pentaphyllis. LINN. spec. p. 343.

Bupleurum caule ramosissimo, umbellis petiolatis, involucris pentaphyllis petiolo brevioribus. HALL. hist. com. 1. n. 775.

Bupleurum floribus solitariis, & umbellatis. GER. p. 234. n. 9.

Bupleurum annuum angustifolium. BOTT. monsp. TOURN. inst. 309. ENUM. NIC. p. 192.

Bupleurum minus angustifolium monspeliense. RAJ. hist. 474.

Loc. Habitat in agro, & comitato Nicaensi: rarius quidem, sed tamen identidem secus et agros advenitur in Liguria, Monseffrato, atque Astensi provincia. LAURENTIUS TERRANEUS in Sabaudia collegit. ANNUUM.

1358. BUPLEURUM tenuissimum.

Bupleurum umbellis simplicibus alternis pentaphyllis subtrifloris. LINN. spec. p. 343.

Bupleurum caule ramosissimo, umbellis alaribus paucifloris, involucris pentaphyllis lanceolatis, petiolis longioribus. HALL. hist. com. 1. n. 774.

Bupleurum tertium minimum. COL. ecphr. 1. p. 85. tab. 247. MORIS. hist. 3. p. 300. 1. 9. tab. 14. f. 4.

Bupleurum angustissimo folio. BAUH. pin. p. 278. TOURN. inst. p. 310.

Auricula leporis minima. BAUH. hist. III. part. 2. 201.

Loc. In agro Nicaensi. ANNUUM.

FOENICULUM. TOURN. *ins.* p. 311. *tab.* 164.

Flores flosculosi fertiles. Involucrum nullum. Petala aequalia integra. Fructus ovato-oblongus. Semen oblongum, parum gibbum, nihil arcuatum, intus planum, dorso quinque costatum.

1359 FOENICULUM officinale.

Icon. *TAUR.* Vol. XXVII. *tab.* 110.

Anethum fructibus ovatis. LINN. *spec.* p. 377.

Ligusticum foenic. offic. foliis linearibus longis. CRANTZ. *class. umbell.* p. 82.

Foeniculum dulce majore albo semine. BAUH. *hist. II. part.* 2. & 4.

Foeniculum dulce. BAUH. *pin.* 147.

Foeniculum, s. Maratrum vulgare dulce. LOB. *ie.* 775.

Finocchio. MATTH.

VERN. *Fenoi.*

Loc. Circa *Pinerolium*. In comitatu *Nicaeensi*, & in provincia *Uncliat.* PERENNE.

VIR. Semina acria, aromatica, oleum aethereum habentia propter vim carminativam multi sunt, praesertim in colica flatulenta, atque morbis ex stomachi imbecillitate, quae flatibus originem praebent.

CARUM. LINN. *gen.* n. 327. *yst.* n. 362. TOURN. *tab.* 160.

Involucrum utrumque deest. Petala cordata aequalia incisa. Semina ovalia, profunde striata, intus plana.

1360 CARUM Bunius.

Icon. *TAUR.* Vol. XIX. *tab.* 59.

Carum umbellis septemfidis, foliis radicalibus bipinnatis linearibus, caulinis subteraceis.

LINN. *yst.* 12. *addend.* p. 733.

JACQ. *hort. vindob.* *tab.* 198.

Daucus petroselinii, vel Coriandri folio. BAUH. *pin.* 150.

Saxifraga montana minor petroselinii, seu Coriandri folio. MORIS. *hist.* 3. p. 274. t. 2. *tab.* 2. f. 16.

Seseli bunius, foliis pinnatis incisis, caulinis setaceis decompositis. VILL. *prosp.* p. 24.

Loc. In vineis *Savorgii* Cl. DANA; circa *Lucerame*, & secus flumen *le Chison* in valle *Fenestrellarum* etiam provenit, atque, observante Cl. BELLARDI, non infrequens est locis sterilibus prope *Moutiers*, aliisque locis calidioribus *Tarantasiac.* ANNOUUM.

1361. CARUM carvi. LINN. *spec.* p. 378.

Icon. *TAUR.* Vol. XV. *tab.* 85.

Apium (carvi offic.) pinnis conjugatis circa eorum se se decussantibus. CRANTZ. *fasc.* 3. ed. 2. p. 218. *class. umbell.* p. 102.

Seseli Carum. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 361.

JACQ. *Fl. Austr.* *tab.* 393.

Carvi. TOURN. *ins.* p. 306.

Cuminum pratense, Carvi officinarum. BAUH. *pin.* 158.

Seseli Carum. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 435.

Seseli Carum. VILL. *prosp.* p. 24. GER. 255. DOD. 299.

VERN. *Carovin.*

Loc. Ubique in pratis montanis, & alpium. BIENNE.

VIR. Semina CARVI conveniunt vi carminativa aromatica cum seminibus foeniculi: majorem adhuc continent oleosi principii quantitatem, atque Alpicolis familiarem medicinam constituunt in morbis flatulentis. Menses etiam cient, atque utiliter adhibentur praesertim iis in foeminis, in quibus ob facilem nervorum spasmus menses subsistunt, ac parcius fluunt.

BUNIUM. LINN. *gen. n.* 868. *syn. n.* 332. TOURN. *tab.* 161.

Flores aequales fertiles. Petala aequalia cordata, apice reflexo. Fructus ovali-longior, fere cylindricus. Semina subtiliter striata, nuda. Radix carnosio-tuberosa.

- 1362 **BUNIUM** bulbocastanum. LINN. *spec. p.* 349.
Ligusticum bulbocastanum involucri setaceis, radice bulbosa. CRANTZ. *class. umbell. p.* 83.
Bunium bulbo glabro. SAUV. *manusp.* 256.
Bulbocastanum majus, folio Apii. BAUH. *pin.* 162. TOURN. *inst.* 307.
Nucula terrestris. LOR. *hist.* 429. MORIS. *hist. sec. 9. tab. 2. p.* 474. *fig. 5.*
Enanthe I. MATTH.

Loc. In pascuis, & agris montanis. *PERENNE.*

VIR. Radices apud Alpicolas ex aqua decoctae comeduntur.

1363. **BUNIUM** minus.

Bunium foliis uniformibus, involucri polyphylo, fructibus subcylindricis, apice crassioribus, stylis reflexis deciduis. GOU. *illustr. p.* 10.

Bulbocastanum minus saxatile peucedani folio. TOURN. *inst. p.* 307.

Cyminum bulbosum. COL. *ecphr. p.* 2. 20.

Loc. In editioribus montibus *Ligurioe. PERENNE.*

SISON. LINN. *gen. n.* 311. *syn. n.* 346. TOURN. *tab.* 162.

Involucrium utrumque adest, sed paucifolium. Petala cordata aequalia. Fructus ovato-oblongus, sed minor in praecedentibus. Semina subtiliter striata.

CARUM, BUNIUM, & SISON affinia adeo genera sunt, ut aegre distingui possint.

- 1364 **SISON** Amomum.

ICON. TAUR. Vol. XXI. tab. 34.

Sison foliis pinnatis, umbellis erectis. LINN. *spec. p.* 362.

Seseli Amomum. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n.* 355.

Cicuta Amomum. CRANTZ. *class. umbell. p.* 96.

Sium aromaticum, Sison officinarum. TOURN. *inst. p.* 308.

Sison, sive officinarum Amomum. BAUH. *hist. III. part. 2. 107.*

Sison, quod Amomum officinis nostris. BAUH. *pin.* 154.

Sison aromaticum. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 458.

Loc. Ad sepes in provincia *Casalensi*, & *Dertiosensi*, nec non in comitatu *Nicaeensi.*

BIENNE, & ANNUUM.

ÆGOPODIUM. LINN. *gen. n.* 330. *syn. n.* 365.

Flores exteriores inaequales, interiores aequales, petalis profunde cordatis.

Involucrium utrumque deest. Semina magna oblonga convexa, profunde striata, nuda.

- 1365 **ÆGOPODIUM** Podagraria.

ICON. TAUR. Vol. XIV. tab. 55.

Ægopodium foliis caulinis summis ternatis. LINN. *spec. p.* 379.

Ligusticum foliis caulinis summis ternatis, radice repente. CRANTZ. *fac. 3. ed. 2. p.* 200. *class. umbell. p.* 83.

Podagraria. RIV. *tam. 4. HALL. hist. 2. n.* 759.

Ægopodium foliis inferioribus biternatis sensilibus, caulinis superioribus ternatis. NEKER. *tam. 1. p.* 153.

Seseli ægopodium. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n.* 359.

Angelica sylvestris minor, sive erratica. BAUH. *pin.* 155.

Angelica sylvestris repens. BAUH. *hist.* III. p. 145.

Loc. Ad sepes admodum frequens, & in pratis umbrosis vulgaris planta est.
PERENNE.

CRITHMUM. LINN. *gen. n.* 303. *syn. n.* 337.

Flores aequales, fertiles. Semen ovale, intus planum, tota superficie cohaerens, dorso tribus obscuris costis percurso.

1366 CRITHMUM maritimum.

Crithmum foliis lanceolatis carnosis. LINN. *spec. p.* 354.

JACQ. *hort. vindob. tab.* 187.

Crithmum maritimum foeniculum minus. BAUH. *pin.* 288.

Crithmo L. MATTH.

OFF. *Crithmum*, s. *foeniculum maritimum*.

Loc. In muris vetustis Comitatus *Nicasensis*, *Uncliae*, & locis calidioribus vallis *Saforae*, & ad rupes mari proximas; etiam in muris Castellorum, in collibus calidioribus *Taurinensium*, *Atensium*, & *Montisferrati* occurrit. PERENNE.

C. FRUCTU LONGO SUBCYLINDRICO.

SIUM. LINN. *gen. n.* 310. *syn. n.* 345. TOURN. *tab.* 162.

Flores aequales fertiles. Petala aequalia cordata. Fructus oblongo-ovatus.

Semina ovata, leviter striata, intus plana, calyce minimo coronata.

1367 SIUM latifolium.

Sium foliis pinnatis umbella terminali. LINN. *syn. n.* 345. p. 211.

Sium foliis pinnatis argute dentatis, umbellis erectis. HALL. *hist.* 1. n. 777.

Coriandrum (latifolium) caule argute angulato, foliis laevibus pinnatis serratis. CRANTZ. *fasc. 3. ed. 2. p.* 212.

JACQ. *fl. austr. p.* 42. *tab.* 66.

Sium latifolium. BAUH. *pin.* 154.

Sium. RIV. *pent.* 78.

Loc. In agro *Vercellensi* ad aquas lente fluentes minime rarum vidit CL. BELLARDI.
PERENNE.

1368 SIUM angustifolium.

Sium foliis pinnatis umbellatis axillaribus pedunculatis, involucri universali pinnatifido. LINN. *spec. p.* 1672.

JACQ. *fl. Austr. tab.* 67.

Sium berula. GOU. *fl. monsp. p.* 218.

Sium erectum. HUDS. *angl. p.* 103.

Sium minus. RIV. *pent. irr. tab.* 78.

Sium foliis radicalibus ovatis pinnatis dentatis, caulibus appendiculatis, umbellis alaribus. HALL. *hist. Helv. n.* 778.

Sium erectum umbella brevi, seu pastinaca aquatica. RAS. *hist. p.* 444.

Apium sium. CRANTZ. *fasc.* 215.

ORD. *Flor. Dan. tab.* 247.

Loc. Ad lente fluentes aquas, & fontium scaturigines in agro *Pedemontano* passim occurrit. PERENNE.

1369 SIUM nodiflorum.

Sium foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus. LINN. *spec. p.* 361.

Sium foliis radicalibus ovatis pinnatis dentatis, caulibus appendiculatis, umbellis alaribus. HALL. *hist.* 1. n. 778.

Seseli nodiflorum. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n.* 353.

Sium aquaticum procumbens ad alas floridum. MORIS. *hist.* 3. p. 283. t. 9. tab. 5. f. 3.

Cicuta nodiflora. CRANTZ. *class. umbell.* p. 97.

Sium repens. JACQ. *fl. Austr.* tab. 260.

Loc. Cl. BELLARDI prope Sospello ad muros subhumidos. *PERENNE.*

1370. SIUM falcaria.

Sium foliolis linearibus decurrentibus connatis. LINN. *spec.* p. 362.

Sium foliis firmis serratis pinnatis, nervo folioso latelescente. HALL. *hist.* 1. n. 782.

JACQ. *fl. Austr.* tab. 257.

Seseli foliis serratis decurrentibus connatis. CRANTZ. *fasc.* 3. ed. 2. p. 208.

Seseli falcaria. SCOP. *fl. Carn.* ed. 2. n. 354.

Eryngium arvense foliis serratis. BAUH. *pin.* 386.

Cichium umbelliferum. BAUH. *hist.* III. p. 195.

Falcaria. RIV. *tab.* 47.

Loc. Circa Candiolo, & in agro Nicaensi. *PERENNE.*

MYRRHIS. HALL. *hist.* tom. 1. p. 329. TOURN. *tab.* 266.

Semina longa striata, stylo superstitie longo rostrata.

1371. MYRRHIS odorata.

ICON. TAUR. Vol. VII. *tab.* 106.

Myrrhis foliis triplicato-pinnatis mollibus, seminibus sulcatis maximis. HALL. *hist.* 1. 753.

Scandix (odorata) seminibus sulcatis angulatis. LINN. *spec.* p. 368.

Myrrhis odorata. SCOP. *fl. Carn.* ed. 2. n. 341.

Chaerophyllum odoratum. CRANTZ. *class. umbell.* p. 75.

Myrrhis major, vel Cicutaria odorata. TOURN. *inst.* 315.

Chaerophyllum odoratum. LAM. *fl. franc.*, tom. 3. p. 439.

Myrrhis magno semine longo sulcato. BAUH. *hist.* III. part. 2. p. 77.

Loc. In pinguibus pratis alpium Vinadii, & Valderii abunde, uti etiam Fenestrelarum, & circa Limone. *PERENNIS.*

VIR. Graia, & suaviter odorata planta est anisum spirans, quae apud Alpicolas in obsoniis recipitur. lidem utuntur hac MYRRHIDE ad status discutiendos, menses pellendos, & lac augendum in nutricibus. Neglecta in officinis plania est, quae caeterum vires carminativas, & resolventes promittit utiles extituras in colica flatulenta, & tympanite. Extus applicata dicitur (ex Alpicolarum observatione) lac in mammis coactum resolvere.

1372. MYRRHIS hirsuta.

ICON. TAUR. Vol. VII. *tab.* 102. & Vol. XXII. *tab.* 96.

Chaerophyllum caule aequali, foliolis incisus acutis, fructibus biaristatis. LINN. *syn.* 12. p. 214.

Myrrhis radice praelonga, foliis triplicato-pinnatis acutis, seminibus cylindricis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 751.

JACQ. *fl. austr.* *tab.* 148.

Chaerophyllum caule aequali, seminum striatorum corniculis maxime distantibus. CRANTZ. *fasc.* 3. ed. 2. p. 144.

Scandix hirsuta. SCOP. *fl. Carn.* ed. 2. n. 350.

Chaerophyllum cicutaria. VILL. *prosp.* p. 26.

Cicutaria alba, & rubra. LUGD. 789.

Myrrhis palustris latifolia alba. TOURN. *inst.* p. 315.

Cerefolium latifolium hirsutum album, & rubrum. MORIS. *hist.* 3. p. 3041. 9. *tab.* 19. f. 6.

Myrrhis palustris. RIV. *pent.* *tab.* 50.

Myrrhis broccenbergensis foliis Myrrhidis italicæ, flore albo, radice crassa nigra. BAUH. *hist.* III. par. 2. p. 78. BAUH. *pin.* p. 160.

Seseli montanum cicutæ folio subhirsutum. BAUH. *pin.* 161. Mapp. *alt.* 208.

Cicutaria latifolia hirsuta. BAUH. *hist.* III. part. 2. p. 182.

Loc. Vulgare est in alpihus. *PERENNIS.*

1373. MYRRHIS aurea.
Chaerophyllum caule aequali, foliolis incisis, seminibus coloratis sulcatis mucicis. LINN. syst. 12. p. 214.
Cerofolium foliis hirsutis patulis cordatis, seminibus obscure striatis. HALL. hist. tom. 1. n. 749.
 JACQ. Fl. Austr. tab. 64.
Myrrhis perennis albo minor, foliis hirsutis, semine aureo. MORIS. class. umbell. 282.
 RUPP. jen. 3. p. 282. tab. 5. TOURN. inst. p. 315.
 Loc. In sylvis umbrosis, & pratis Fenestellarum, atque vallis S. Martini, PERENNIS.
1374. MYRRHIS bulbosa.
Chaerophyllum caule geniculis tumida, basi hirsuto. LINN. syst. 12. p. 214.
 JACQ. Fl. Austr. tab. 65.
Myrrhis radice bulbosa, caule inferius hirsuto, superne levi, foliis triplicato-pinnatis acute incisis. HALL. hist. 1. n. 752.
Myrrhis caule inferius hirsutissima, superne glabra. WILL. disp. p. 7.
Myrrhis foetens. RIV. tab. 49.
Cicutaria pannonica. CLUS. hist. 200.
Cicutaria odorata bulbosa. BAUH. hist. III. part. 1. p. 183.
Cicutaria bulbosa. BAUH. pin. 161.
 Loc. In sylvis inter flumen Sangan, & Moncalieri, ANNUA.
1375. MYRRHIS temula.
Chaerophyllum caule scabra, geniculis tumidis. LINN. spec. p. 370.
Myrrhis foliis hirsutis, lacinis obtusis, caule geniculata. HALL. hist. tom. 1. n. 750.
Chaerophyllum caule maculato scabro, geniculis tumidis, umbellis floridis delineatis. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. n. 190.
 JACQ. Fl. Austr. tab. 65.
Chaerophyllum flosculis marginalibus monochinis, centralibus obaristis. NEKER. tom. 1. p. 147.
Chaerophyllum sylvestre. BAUH. pin. 152.
 Loc. Ad sepes, oras sylvarum, & in dumeris vulgare, locis tamen calidioribus agri Pedemoniani, ANNUA.
1376. MYRRHIS pecten veneris.
Icon. TAUR. Val. VII. tab. 101.
Scandix seminibus rostro longissimo. LINN. syst. 12. p. 212.
Myrrhis semine cornu longissimo. HALL. hist. tom. 1. n. 754.
Chaerophyllum (pecten veneris) minimum fructu evidentius rostro. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 189. class. umbell. p. 75.
 JACQ. Fl. Austr. tab. 263.
Scandix seminibus subulatis. GER. p. 251. n. 2.
Scandix semine rostrata vulgaris. TOURN. inst. p. 326. BAUH. pin. 152.
Pecten veneris. BAUH. hist. III. part. 2. p. 71.
 Loc. Ubique inter segetes. ANNUA.
1377. MYRRHIS australis.
Scandix seminibus subulatis hispidis, floribus radicatis, caulibus laevibus. LINN. spec. p. 369.
Chaerophyllum australe. CRANTZ. class. umbell. p. 76.
Scandix semine rostrata italica. BAUH. pin. p. 78.
 Loc. In agris collium Nicaensium, ANNUA.

3. COSTIS TECTIS VILLO, AUT SETIS.

LIBANOTIS. HALL. *hist. tom. 1. p. 325.*

Involucrum ex foliis integris; semina striata, villo tecta, non setis rigidis, aut uncinatis.

1378 LIBANOTIS montana. tab. 62.

Icon. TAUR. Vol. XVIII. tab. 47. & 48.

Libanotis foliis triplicato pinnatis, pinnulis primis decussatis, umbellis globosis. HALL. *hist. tom. 1. n. 744.*

Athamania (libanotis) foliis bipinnatis planis, umbella hemisphaerica, seminibus hirsutis. LINN. *yst. 12. p. 207.* GOV. *illustr. p. 12.*

Libanotis montana foliis bipinnatis planis inferne subalbicomibus, umbellis involucrellis interruptis. CRANTZ. *class. umbell. p. 106.*

JACQ. *Fl. Austr. tab. 392.*

Libanotis Rivinione. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 316.*

Libanotis minor, apii folio minor. BAUH. *pin. 157. prodr. 77.*

Daucus montanus pimpinellae saxifragae hircinae folio. FLUK. *alm. 129. tab. 173. fig. 1. Riv. tab. 37.*

Loc. Ad oras sylvarum in pascuis, & in pratis macilentis locis collinis, montanis, ac subalpinis frequenter obvia est. BIENNIS.

1379. LIBANOTIS cretensis.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 86. f. 1.

Libanotis foliis hirsutis triplicato-pinnatis, lobulis profundissime bipartitis. HALL. *hist. tom. 1. n. 745.*

Athamania (cretensis) foliis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis. LINN. *spec. p. 352.*

Libanotis (daucus creticus offic.) CRANTZ. *fasc. III. ed. 2. p. 219.*

Libanotis cretensis. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 314.*

Libanotis rupestris ejusdem n. 315. tab. 9.

JACQ. *Fl. Austr. tab. 62.*

Daucus cretensis verus dioscoridis. LOB. *p. 323.*

Ligusticum alpinum multifido, longoque folio, sive montanus, umbella candida. BAUH. *pin. p. 150.*

Daucus creticus semine hirsuto. BAUH. *hist. III. p. 56.*

Libanotis hirsuto. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p. 498.*

Dauco primo. MATTH.

Off. *Daucus creticus.*

Loc. E rupium fissuris locis apricis montanis, & alpinis. PERENNIS.

Vit. *Dauco cretensis* semina acria sunt, aromatica, & aperientia: vix tamen in usum veniunt.

DAUCUS. LINN. *gen. n. 296. yst. n. 330.* TOURN. *tab. 261.*

Involucrum universalis folia profundissime pinnatifida. Umbella per aetatem connivens contracta. Semina ovalia, costata, aut striata, tecta setis rigidis uncinatis.

1380 DAUCUS catota.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 94.

Daucus seminibus hispidis, petiolis subius nervosis. LINN. *spec. p. 348.*

Daucus involucri cavis communibus pinnatis, peculiaribus lineari-lanceolatis. HALL. *hist. 1. n. 746.*

Caucalis (daucus offic.) involucri pinnatifidis. CRANTZ *fasc. 3. ed. 2. p. 227.*

Caucalis (carota) CRANTZ. class. umb. p. 113.

Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis. BAUH. pin. 151.

Daucus vulgaris. TOURN. 307. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 430.

Loc. In pratis ubique. BIENNIS.

VIR. DAUCUS sativus, sylvestris varietas esse videtur: utriusque radices omnino conveniunt odore, & sapore. Sativi autem radices longe crassiores sunt, carnosae, succulentae, saporis suavis leviter aromatici, bonumque alimentum suppeditant. Blande humores incidunt, abstergunt, atque urinam pellunt, & in cibo iis commendantur, qui cachectici scorbutici sunt, aut calculo obnoxii. Verum etiam saccharum ex DAUCI radice obtinetur. Multis laudibus elatus est succus ex rasa radice expressus, ulceribusque cancerosis impositus. Dolores cancri mitigatos vidi, atque prae aliis medicamentis terribile hoc malum haud fuisse hocce remedio exasperatum. Nondum autem licuit observare huiusmodi ulcera fuisse coarctata, aut ad sanationem perducta. Curationes, quae jactantur, cancerorum huiusmodi succo sanatorum, ad alia ulcera non vere cancerosa pertinent. Conducit in oris ulceribus succus tantillo mellis conjunctus, utilisque exiturus esse videtur in similibus internarum partium excoriationibus. Radices DAUCI *sylvestris* inter extimulantia, aperientia, & diuretica recenseri merito possunt. Semina commendantur ad calculum pellendum, atque eorumdem infusum vinosum datur ad febres intermittentes tollendas, huiusmodi remedii genus non sua carebit utilitate in iis febribus intermittibus minoris vehementiae, & inordinatis, quas non raro tollunt calefacientia aromatica ante paroxysmum exhibita. Semina DAUCI in substantia dantur a drachma semisse ad drachmam unam, in infuso a drachma una ad drachmas tres. Ex flosculo centrali carnosus pulchrum obscure-fuscum colorem Carmin eliciebat Franciscus PEYROLERI cum additamento succi limonum.

1381. *DAUCUS mauritanicus* tab. 61. fig. 1.

Icon. TAUR. Vol. XVII. tab. 48.

Daucus seminibus hispida, flosculo centrali sterili carnoso, receptaculo communi haemisphaerico. LINN. spec. p. 348.

Caucalis hispanica. CRANTZ. class. umbell. p. 113.

Daucus hispanicus umbella maxima. TOURN. inst. p. 308.

Pastinaca tenuifolia sylvestris umbella majore. BAUH. pin. 151.

Pastinaca tenuifolia sicula hirsuta crispa. MORIS. hist. 3. p. 305. tab. 13. f. 3.

Loc. In pratis agri Nicaeensis. BIENNIS.

1382. *DAUCUS hispanicus*.

Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 65.

Daucus seminibus aculeatis, centrali sterili nullo caule nitido. GOU. Illustr. p. 9.

Daucus gummiifer N. MISC. TAUR. tom. 5. p. 30. n. 104.

Daucus lucidus gummiifer. TOURN. 308. BOCC. mus. tab. 20.

Loc. In agro Nicaeensi. BIENNIS.

DESCR. Caulis totus pilis hirtus. Folia ex vagina non emarginata viridi ramum excipiente. Rami etiam asperi. Caulis tripedalis ramosus, ramis alternis, umbella terminali. Folia lucida supra plana, subter asperiuscula. Foliola pinnatifida, segmentis duorum, aut trium parium aristatis. Umbellulae aequales sine flore centrali carnosum. Umbella de more gentis contracta post florescentiam. Folia involucri universalis petiolo plano membranaceo bis trifida: partialis vero profunde trifida. Semen ut in DAUCO Carota, sed majus.

CAUCALIS. HALL. *hist. rom.* 1. p. 323. TOURN. *tab.* 171.

Involucrum ex foliolis non pinnatifidis, sed integris paucifolium, quod interdum deest. Semina striata, aut costata tecta aculeis, aut setis rigidis uncinatis.

1383. **CAUCALIS** grandiflora.
Icon. TAUR. Vol. XIV. *tab.* 58.
Caucalis involucris singulis pentaphyllis, foliolo unico duplo majore. LINN. *syn.* 12. p. 205.
Caucalis umbellis planis, petalis extremis, & involucris maximis. HALL. *hist. rom.* 1. n. 740.
Caucalis petalis extimis maximis. CRANTZ. *class. umbell.* p. 110. fasc. 3. ed. 2. p. 324.
Caucalis umbella conferta, petalis duobus exterioribus, involucellis longioribus maximis. GER. p. 237. n. 6.
Caucalis involucro regulari pentaphyllo, petalo exteriore maximo. SCOP. *Fl. Corn.* p. 327. n. 1.
Daucus grandiflorus. SCOP. *Fl. Corn.* ed. 2. n. 308.
JACQ. Fl. Austr. *tab.* 54.
Caucalis arvensis echinata magno flore. TOURN. *inst.* p. 323. BAUH. *pin.* 152.
Lappula canaria, flore pulchro magno albo. BAUH. *hist.* III. part. 2. p. 79.
Loc. Passim in arvis collinis. ANNUA.
1384. **CAUCALIS** latifolia.
Caucalis umbella universalis trifida, partialibus pentaspermis, foliis pinnatis serratis. LINN. *syn.* 12. p. 205.
JACQ. hort. vindob. *tab.* 128.
Caucalis involucris, & involucellis pentaphyllis, foliis pinnatis. GER. *prov.* 237.
Caucalis arvensis echinata latifolia. TOURN. *inst.* 323. BAUH. *pin.* 152. GARID. *tab.* 23.
Lappula canaria latifolia, & Caucalis. BAUH. *hist.* III. part. 2. p. 80.
Echinophora 4. major pleiophylles purpurea. COL. *part.* 1. 97.
Loc. In arvis collium calidiorum Monisferrati, & cominatus Nicaeensis: circa Segusium, & Augustam Praetariam etiam nascitur. ANNUA.
1385. **CAUCALIS** leptophylla.
Caucalis involucro universalis subnullo, umbella bifida, involucellis pentaphyllis. LINN. *syn.* 12. p. 205.
Caucalis lacinis foliorum perangulis, seminum uncis rigidis. CRANTZ. *fasc.* 3. ed. 2. p. 225.
Caucalis involucro universalis nullo, involucellis pentaphyllis, umbella bifida, seminibus hispidis. GOU. *Fl.* 285.
Caucalis arvensis echinata parvo flore, & fructu. TOURN. *inst.* 323. BAUH. *pin.* 152.
Caucalis procumbens. RIV. *pent.*
Lappula canario, flore minore tenuifolio. BAUH. *hist.* III. p. 20.
Loc. Inter segetes collium frequens. ANNUA.
1386. **CAUCALIS** maritima.
Caucalis umbella bifida, umbellulis dispermis, involucris semine brevioribus linearibus. GOU. *h.* p. 135. n. 1.
Caucalis pumila maritima. BAUH. *pin.* 153.
Caucalis involucro universoli diphylla, partialibus pentaphyllis. GER. *galloprov.* p. 237. *tab.* 10.
Loc. In agro Nicaeensi. ANNUA.
1387. **CAUCALIS** nodiflora.
Icon. TAUR. Vol. XIV. *tab.* 59.

Tordylium (nodosum) umbellis simplicibus sessilibus, seminibus exterioribus hispidis.

LINN. spec. p. 346.

JACQ. Fl. Austr. app. tab. 24.

Caucalis nodosa. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 313.

Caucalis nodiflora. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 424.

Caucalis nodosa echinato semine. BAUH. pin. 153. prodr. 80.

Loc. Ad limites agrorum, & in pascuis saxonis collium calidiorum Montisferrati, & comitatus Nicoensis frequens planta est. ANNUA.

1388. CAUCALIS anthriscus.

Tordylium (anthriscus) umbellis confertis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. LINN. spec. p. 346.

Caucalis foliis duplicato-pinnatis, nervo multoties laevioribus. HALL. hist. tom. 1. n. 741.

Caucalis laciniis foliorum laeis, seminibus ovatis, aculeis rectis. CRANTZ. class. umbell. p. 3. fasc. 3. ed. 2. p. 226.

Caucalis anthriscus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 311.

Caucalis semine aspero, flouculis rubentibus. BAUH. pin. 153. prodr. 80.

Loc. Vulgaris ad sepes, & dumeta locis praesertim collinis, & montanis. ANNUA.

1389. CAUCALIS nodosa.

ICON. TAUR. Vol. VII. tab. 104.

Scandix seminibus subcylindricis hispidis, caule hispido, geniculis tumidis. LINN. spec. p. 369.

Chaerophyllum nodosum. CRANTZ. class. umbell. p. 76.

Myrrhis nodosa annua, semine aspero. MORIS. H. R. Bles. 288.

Chaerophyllum sylvestre alerum, geniculis tumetibus. TOURN. inst. p. 314.

Myrrhis nodosa. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 441.

Loc. In vineis, & sterilibus comitatus Nicaeensis, & Liguriaë minime rata est. ANNUA.

1390. CAUCALIS aequicolorum.

Scandix (anthriscus) seminibus ovatis hispidis, corollis uniformibus, caule laevi. LINN. spec. p. 368.

Caucalis vaginis lanuginosis, foliis triplicato pinnatis, seminibus rostratis. HALL. hist. tom. 1. n. 743.

Caucalis scandix. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 312.

Chaerophyllum anthriscus. CRANTZ. umbell. p. 76.

JACQ. Fl. Austr. p. 214. tab. 154.

Myrrhis sylvestris seminibus asperis. BAUH. pin. 160.

Myrrhis sylvestris aequicolorum. COL. ecphr. 1. p. 110. tab. 112.

Loc. Cl. BELLARDI in muris prope Mancrivello, & Borgomasino. ANNUA.

4. SEMINIBUS LAEVIBUS, SIVE NON STRIATIS.

CHÆROPHYLLUM. HALL. hist. tom. 1. p. 323. TOURN. tab. 166.

Semina longa laevia rostrata.

1391. CHÆROPHYLLUM sylvestre.

ICON. TAUR. Vol. XX. tab. 57.

Chaerophyllum caule striato, seminibus umidiusculis. LINN. spec. p. 369. NEKER. p. 144.

Cereseolum foliis acute dentatis triplicato-pinnatis glabris, nervis hirsutis. HALL. hist. tom. 1. n. 748.

JACQ. Fl. Austr. tab. 149.

Chaerophyllum caule sulcato, seminibus laevibus non striatis nigris. CRANTZ. fasc. 3. ed. 2. p. 192. class. umbell. p. 77.

Chaerophyllum sylvestre. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. 218.

Chaerophyllum sylvestre perenne Cicuto folio. TOURN. inst. p. 314.

ALLONNI Fl. Pedem. Tom. II.

Myrrhis sylvestris seminibus laevibus. BAUH. pin. p. 160.

Loc. in pratis montanis, PERENNE.

DANAA.

Character consistit in fructu didymo ex seminibus binis subrotundis non striatis, atque nucleum liberum non continenteibus.

1392 **DANAA** aquilegifolia. Tab. 63.

Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 66.

Ligusticum (Lobellii) foliis biernotis, foliolis incis, lacinulis obovatis lanceolatis, coule pauciflora. VILL. prosp. p. 24.

Ligusticum alterum Belgarum. LOB. obs. 447. Icon. 786. Lugd. 744.

Loc. Nascitur frequens in saxosis apricis collium *Taurinensium*, atque subalpinorum montium. PERENNIS.

DESCR. Radix ex tribus, aut quatuor majoribus teretibus radicibus composita, sat longis, & parum fibrosis. Folia ad radicem plura: caulis autem subnudus erectus parum ramosus, ramis nudis: umbellae terminales. Caulis striatus viridis teres glaber. Ad ramorum ortum aut foliolium unicum, quandoque foliolium profunde trifidum. Folia petiolo insident tereti, & striato palmaris circiter longitudinis, quod deinde in tres petiolos uncialis longitudinis dividitur, medio petiolo longiori. Hi petioli in tres alios breves petiolos explanatos dividuntur, & subfoliaceos, quorum quilibet suum foliolium gerit; horum quodlibet profunde ad petiolum trifidum est, sive tria alia foliola sustinet: laterales bilobi, aut etiam trifidi, medio profunde trifido, lobi omnes inciduntur dentibus modo tribus, modo quatuor, qui ovati sunt cum spinula. Dentium numerus in lateralibus minor esse solet, profundiores in medio segmento. Folia glabra sunt, atque subrus nervis veluti reticulata. Involucrum universale octophyllum ex foliolis linearibus, aristatis, inaequalibus, pariale saepius triphyllum ex foliolis similibus. Umbellularum pedunculi firmi sunt, rotundi, unciales, & ultra. Umbellulae quindecim. Radii umbellularem viginti circiter. Flos albus. Petala unguibus brevissimis instructa ex ovata forma in caudam abeunt linearem, emarginatam, quae tota intra florem ad unguem ortum inflectitur. Stamina extensi petali longitudinem metiuntur. Antherae didymae albicantes. Sryli duo distincti divergentes. Fructus globosi, veluti didymi ex duobus seminibus in apice paullisper acuminati. Hujusce plantae semina immatura lineis viridibus loco striarum notantur, quae in maturo semine evanescent. Semina nigra sunt, & laevia nitida, cum autem summam maturitatem acquisiverint, rugas aliquot contrahunt. Propter defectum omnem striarum, seminumque laevitatem peculiare genus haec planta mereri nobis visa est, quam libentissime inscribo nomini *Cl. DANAA* olim mei discipuli, nunc in meum locum successi, ut benevolentiae, & existimationis, qua egregium hunc virum prosequor, publicum testimonium reddam.

CLASSIS VII

PLANTÆ FLORE PENTAPETALO, NEC GYMNODISPERMÆ.

I. STAMINIBUS CONNEXIS.

GERANIUM. LINN. *gen.* n. 746. *syn.* n. 832. *TOURN.* tab. 142.

Calyx in nostris pentaphyllus. Stamina decem. Sigmata quinque. Capsulae quinque circa communem axem positae, caudatae, monospermae.

PEDUNCULIS MULTIFLORIS.

1393. GERANIUM ciconium.

Icon. Taur. Vol. V. tab. 59.

Geranium pedunculis multifloris pentandris, foliis pinnatis pinnatifidis obtusis. LINN. *spec.* p. 952.

Geranium petiolis multifloris, foliis pinnatis, pinnis latescensibus 2 dentatis, alterne maximis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 946.

JACQ. *hort. vindob.* tab. 18.

Geranium pedunculis submultifloris, calycibus pentophyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis, pinnatifidis obtusis. BURM. *ger.* p. 29. n. 28.

Geranium apulum alterum odoratum coriandrifolio. COL. *part.* 1. p. 135. *ENUM. NIC.* p. 185.

Geranium coriandrifolio odoratum. BAUH. *pin.* 319.

Loc. Nicaeae ad semitas, & quandoque etiam in collibus calidioribus agri Pedemontani. ANNUUM.

1394. GERANIUM cicutarium.

Icon. Taur. Vol. V. tab. 62.

Geranium petiolis multifloris, caule procumbente, foliis duplicato-pinnatis, pinnis acute incisitis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 944.

Geranium pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisitis obtusis, caule ramoso. LINN. *syn.* 12. p. 454.

Geranium pedunculis multifloris, foliis pinnatis duplicato-incisitis: filamentis fertilibus tuberculatis, seminibus nudis. NEKER. *tam.* 2. p. 290.

Geranium pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis incisitis obtusis. BURM. *ger.* p. 31. n. 33.

Geranium ciculae-folia minus, & supinum. BAUH. *pin.* 319.

Loc. Nascius ubique in pascuis, & ad vias locis macilentis vulgarissimum. ANNUUM.

1395. GERANIUM moschatum.

Icon. Taur. Vol. V. tab. 63.

Geranium pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisitis, caule donibus pinnatifidis. LINN. *spec.* p. 951.

Geranium petiolis multifloris, caule diffusa, foliis ovatis pinnatifidis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 945.

JACQ. hort. vindob. tab. 35.

Geranium cicutæ folio machatum. BAUH. pin. 319.

Geranium moschatum folio ad Myrrhidem accedente majus, & varius. BAUH. hist. III. p. 479.

Loc. Nicaeae reperitur. *ANNUUM.*

1396. *GERANIUM malacoides.*

ICON. TAUR. Vol. XIV. tab. 100.

Geranium pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis cordatis sublobatis. LINN. spec. p. 932.

Geranium pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis lobatis, petalis inaequalibus. GER. p. 432. n. 3.

Geranium pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis cordatis sublobatis. BURM. ger. p. 32. n. 34.

Geranium folia altheae. BAUH. pin. 318.

Geranium malvaceum. BAUH. hist. III. p. 472.

Loc. Circa Nicaeam oritur. *ANNUUM.*

1397. *GERANIUM maritimum.*

Geranium pedunculis subrisfloris, floribus pentandris, foliis cordatis incisicrenatis scabris, caulibus procumbentibus. LINN. syn. 12. p. 454.

Geranium pusillum maritimum, altheae, seu Britannicae folio. PLUCK. phyt. 31. f. 4.

Geranium minimum procumbens, foliis betonicae. MORIS. hist. 2. p. 512. s. 5. tab. 35. fig. 10.

Geranium pusillum, lupinum, maritimum altheae, aut betonicae folio, nostras. RAJ. hist. p. 1056. TOURN. inst. p. 268.

Loc. Secus vias Nicaeae ad loca mari proxima. *ANNUUM.*

PEDUNCULIS BIFLORIS.

1398. *GERANIUM macrorrhizon.*

ICON. TAUR. Vol. V. tab. 61.

Geranium pedunculis bifloris, calycibus inflatis, petalis integris, pinillo longissima, scapo dichotomo. LINN. syn. 12. p. 455.

Geranium botrychioides odoratum. BAUH. pin. 318.

Geranium botrychioides alterum. DOD. pempt. 63.

Loc. In monte Cenisio nasci dicitur: supra Tendam observavit Ignatius MOLINERL. *PERENNE.*

1399. *GERANIUM phaeum.*

ICON. TAUR. Vol. X. tab. 56. 69.

Geranium pedunculis salutaris oppositifoliis, calycibus subaristatis, caule erecto, petalis undulatis. LINN. syn. 12. p. 455.

Geranium foliis rugosis hirsutis semispilobis, lobis dentatis, petalis serratis acuminatis. HALL. hist. tom. 1. n. 934.

Geranium pedunculis bifloris, foliisque alternis, calycibus subaristatis, caule erecto. BURM. ger. p. 19. n. 11.

Geranium montanum fuscum. BAUH. pin. 318.

Geranium phaeum flore reflexa. BAUH. hist. III. p. 471.

Loc. Crescit in lapidosis umbrosis alpinis, & subalpinis. In Sabaudia frequentius. Felix VALLE secus viam observavit, quae ab Exilles ducit ad Chaumont. *PERENNE.*

1400. *GERANIUM palustre.*

ICON. TAUR. Vol. V. tab. 57.

Geranium pedunculis bifloris longissimis declinatis, foliis quinque lobis incisicrenatis, petalis integris. LINN. spec. p. 954.

Geranium caule diffusa, foliis rugosis semiquinquelobis, lobulis trifidis, floribus sparsis, petalis integerrimis. HALL. hist. tom. 1. n. 933.

Geranium batrachoides palustre, flore sanguineo. DELL. hort. elik. p. 160. tab. 174.

Loc. Ad lacum montis Cenisii legi hanc *Geranii* speciem. *PERENNE.*

1401. GERANIUM nodosum.

ICON. TAUR. Vol. V. tab. 58.

Geranium pedunculis bifloris, petalis emarginatis, foliis caulinis trilobis integris serratis, summis subsessilibus. LINN. syst. 12. p. 455.

Geranium nodosum. BAUH. pin. 318.

Geranium magnum folio trifido. BAUH. hist. III. 478.

Loc. In umbrosis sylvis *Taurinensibus*: in montanis, & subalpinis frequens admodum est. *PERENNE.*

1402. GERANIUM sylvaticum.

Geranium pedunculis bifloris, foliis subpelatis quinquelobis inciso-serratis, caule erecta, petalis emarginatis. LINN. spec. p. 954.

Geranium caule erecto, foliis rugosis septulobis, lobis acute serratis, petalis emarginatis. HALL. hist. tom. 1. n. 932.

Geranium pedunculis bifloris, foliis petalis inciso-serratis, caule erecta. BURM. ger. p. 20. n. 12.

Geranium batrachoides folia aconitii. BAUH. pin. 317.

Geranium batrachoides aliud folio aconitii nitente Clusii. BAUH. hist. III. p. 476.

Loc. In saxosis umbrosis alpium, præcipue ad earum radices; in sylvis umbrosis alpinis, & in pascuis etiam lætioribus editiorum alpium, uti circa thermas *Vindobenses* in valle di *Lemse*: in pratis supra arcem *Fenestrellarum* frequenter occurrunt. *PERENNE.*

1403. GERANIUM pratense.

Geranium pedunculis bifloris, foliis subpelatis multipartitis rugosis acutis, petalis integris. LINN. syst. 12. p. 455.

Geranium caule erecto, foliis rugosis hirsutis multifidis, lobis trifidis lobatis semipinnatis, floribus umbellatis. HALL. hist. tom. 1. n. 931.

Geranium pedunculis bifloris, foliis petalis multipartitis rugosis pinnato-lacinatis acutis. BURM. ger. p. 21. n. 16.

Geranium batrachoides. BAUH. hist. III. p. 475.

Geranio IV. MATTH.

Geranium 3. batrachoides majus. CLUS. hist. 2. p. 100.

Loc. Abunde in montanis, & subalpinis. *PERENNE.*

VIR. Propter vim vulnerariam commendatur *GERANIUM prænse*. Acidum principium, atque oleosam substantiam videtur continere. Apud nos in usum minime venit, sed tamen & ipse odor vires medicinales promittit, quum aliquid terebenthinacei principii videatur ostendere.

1404. GERANIUM robertianum.

ICON. TAUR. Vol. V. tab. 60.

Geranium pedunculis bifloris, calycibus pilosis decem-angulatis. LINN. spec. p. 955.

BURM. de Geran. n. 18.

Geranium foliis duplicato pinnatis, pinnis ultimis confluentibus, calycibus striatis hirsutis. HALL. hist. tom. 1. n. 943.

Geranium foliis tri-quinquepartito-pinnatifidis, caulibus decumbentibus: calyce piloso decangulati. NEKER. tom. 2. p. 291.

Geranium robertianum primum. BAUH. pin. 319.

Geranium robertianum murale. BAUH. hist. III. p. 480.

Geranio V. MATTH.

Loc. Ad sepes, & semitas in umbrosis collinis, & montanis ubique. *BIENNE.*

VIR. Evidenti, & valido principio acido instructum est GERANIUM robertianum, sed præterea salinas oleosas particulas habet, quibus aliquantum abstergit, & resolvit. Extus adhibitum vulnerariam vim habet, utilem ad vulnenum sanationem, & oris ulcera consolidanda. Dicitur etiam profuisse in ipso cancro, si ejus decoctione cancerosum ulcus ablatur, atque herba contrita eidem imponatur: at quod ad cancrum pertinet, certiora experimenta desiderantur. In mictu cruento, & mensium immodico fluxu, si causa morbum sustinens sit fibrarum laxitas, & debilitas, opportunum, & efficax remedium est.

1405. GERANIUM lucidum.

Geranium pedunculis bifloris, calycibus pyramidalis angulatis elevato-rugosis, foliis quinquelobis rotundatis. LINN. spec. p. 935.

Geranium foliis subrotundis, semiquinquelobis, lobis obtusis, calycibus transversim rugosis. HALL. hist. tom. 1. n. 942.

Geranium lucidum saxatile. BAUH. pin. 318.

Geranium lucidum. BAUH. hist. III. p. 481.

Loc. Ex agro Nicaeensi passideo. *ANNUUM.*

1406. GERANIUM molle.

Icon. TAUR. Vol. V. tab. 65. 66.

Geranium pedunculis bifloris, foliisque floralibus alternis, petalis bifidis, caule erectiusculo, calycibus mucicis. LINN. syst. 12. p. 455.

Geranium foliis mollissimis hirsutis reniformibus semiquinquefidis, lobis semitripartitis obtusis. HALL. hist. tom. 1. n. 939.

Geranium foliis infimis semi-multipartitis, lacinii linearibus tri-quadrifidis, calycibus exaristatis. NEKER. tom. 11. p. 291.

Geranium columbinum villorum petalis bifidis purpureis. VAILL. bot. tab. 15. f. 3.

Loc. Ad vias hoc etiam advenitur, sed præcipue locis ruderalis. *ANNUUM.*

VIR. Inter adstringentia, & vulneraria enumeratur, atque in alvi fluxu etiam disenterico laudatur. Similes proprietates habent GERANIUM columbinum, & pusillum, sed in usum vix venite solem, quoniam aliae suppetant plantae ceteriores vires habentes.

1407. GERANIUM columbinum.

Icon. TAUR. Vol. V. tab. 64.

Geranium pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinque-partito-multifidis, arillis glabris, calycibus aristatis. LINN. syst. 12. p. 455.

Geranium caule procumbente, foliis quinquepartitis, lobis trilobis, lobulis trifidis. HALL. hist. tom. 1. n. 938.

Geranium foliis quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis calyce longioribus, seminibus arillatis. NEKER. tom. 2. p. 292.

Geranium pedunculis bifloris, foliis quinque-partito-multifidis, lacinii acutis, capsulis glabris, calyce aristatis. BURN. ger. p. 26. n. 22.

Loc. In agris, & ad semitas in agro Pedemoniano uberrime. *ANNUUM.*

1408. GERANIUM pyrenaicum.

Icon. TAUR. Vol. XXIII. tab. 32.

Geranium pyrenaicum. LINN. mant. p. 97.

Geranium pedunculis bifloris, foliis multifidis, lacinii obtusis inaequalibus, petalis bifidis. GER. p. 434. n. 12. tab. 16.

Geranium montanum rotundifolium perenne flore purpureo majore. BOCC. mus. p. 81. tab. 72.

Geranium columbinum perenne pyrenaicum maximum. TOURN. inst. p. 268.

Loc. In alpinis di Tenda, & circa Segusium lectum est. BOCCONE in alpinis Sebuddias crescere scripsit. *PERENNA.*

1409. GERANIUM dissectum.

Geranium pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villosis. LINN. spec. p. 936.

Geranium caule erecto, foliis quinquelobis, lobis trifidis acutis. HALL. hist. tom. 1. n. 937.

Geranium pedunculis bifloris, foliis quinquepartito multifidis, caule glabra erectiusculo.

BURM. Ger. p. 21. n. 15.

Geranium columbinum majus foliis imis usque ad pediculum divinis. VAILL. bot. paris. tab. 15. fig. 2.

Geranium gruinale folio tenuiter diviso. BAUH. hist. III. p. 474.

Loc. In umbrosis, atque praesertim ad sepes, & vias in agro Pedemoniano occurrit. ANNUUM.

1410. GERANIUM pusillum.

Geranium pedunculis bifloris, petalis emarginatis, caule depresso, foliis reniformibus palmatis linearibus acutis. LINN. syst. 12. p. 456.

Geranium foliis hirsutis semisepulobis, lobis semitrilobis obtusis. HALL. hist. tom. 1. n. 940.

Geranium pedunculis bifloris, petalis bifidis, caule prostrato, foliis reniformibus palmatis, lacinis linearibus acutis. BURM. Ger. p. 27. n. 23.

Geranium columbinum majus flore minore caeruleo. VAILL. bot. tab. 15. f. 2.

Geranium Malvaefolium. SCOP. Fl. Carn. 2. p. 37. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 18.

Loc. Nascur in macilentis ad vias. ANNUUM.

PEDUNCULIS UNIFLORIS.

1411. GERANIUM sanguineum.

Icon. TAYR. Vol. V. tab. 67.

Geranium pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis. LINN. spec. p. 938.

Geranium pedunculis unifloris, foliis sepulobis, petalis bifidis. HALL. hist. tom. 1. n. 930.

Geranium sanguineum maximo flore. BAUH. pin. 318.

Geranium sanguineum, s. Haematodes crassa radice. BAUH. hist. III. p. 478.

Off. *Geranium sanguineum, s. Haematodes sanguinaria.*

Loc. In sylvis collum Taurinensium, & ad rupes diffractas in subalpinis, & montanis frequens est. PERENNE.

Via. In hoc GERANIO praesertim eminet vis vulneraria, & adstringens, quod non solum adhibetur pro externo usu, sed intrus datur confidenter in sanguinis, & seri fluxibus coercendis. Tota planta utilis est, sed radices praesertim anteponuntur. In hujusce plantae usu eae cautela servandae sunt, quas alias monuimus servandas esse in usu adstringentium medicamentorum.

SIDA. LINN. gen. n. 747. syst. n. 837. TOURN. tab. 25.

Polyanthera. Calyx quinquefidus; stylus multifidus. Fractus ex loculis in capitulum, aut capsulam coadunatis.

1412. SIDA abutilon.

Sida foliis subrotundo-cordatis indivisis, pedunculis folio brevioribus, capsulis multilocularibus, corniculis bifidis. LINN. spec. p. 963.

Abutilon foliis tomentosis cordatis petiolatis, siliculis bicornibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1075.

Abutilon. DOD. pempt. 656. TOURN. inn. p. 99.

Althaea Theophrasti flore luteo. BAUH. pin. p. 326.

Althaea Theophrasti, flore luteo, quibusdam Abutilon. BAUH. hist. II. p. 958.

Loc. Circa pagos, & urbes frequens. Cl. BELLARDI reperit in vineis di Borgomasino. ANNUA.

HIBISCUS. LINN. gen. n. 756. syn. n. 846.

Polyanthera. Calyx exterior octophyllus, vel ultra, interior monophyllus campanulatus quinquefidus. Stylus quinquefidus. Fructus utplurimum acuminatus quinquelocularis quinquevalvis.

1413. **HIBISCUS** trionum.

Icon. TAUR. Vol. XXV. tab. 40.

Hibiscus foliis tripartitis incisus, calycibus inflatis. LINN. spec. p. 981.

Alcea vesicaria. BAUH. pin. p. 317.

Alcea peregrina solisæqua. LOB. ic. 656.

Ketmia trionum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 862.

Loc. Ignatius MOLINERI in arvis Novariæ, & flumini Ticino interjectis. *ANNUUM*.

MALVA. LINN. gen. n. 751. syn. n. 841. TOURN. tab. 23. 24.

Polyanthera. Calyx exterior triphyllus, interior semiquinquefidus; stylus multifidus. Capsulæ monospermæ axi communi circumpositæ.

1414. **MALVA** rotundifolia.

Icon. TAUR. Vol. V. tab. 102. 107.

Malva caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. LINN. syn. 12. p. 460. HALL. hist. rom. 2. n. 1070. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 143.

Malva vulgaris flore minore, folio rotundo. BAUH. hist. 2. p. 549.

Malva sylvestris folio rotundo. BAUH. pin. 314.

Malva. MATTH.

Off. *Malva vulgaris flore minore*.

VERN. Riondella.

Loc. Nihil ad semitas frequentius. *ANNUA*.

1415. **MALVA** parviflora.

Malva caule paulo, foliis angulatis, floribus axillaribus sessilibus glomeratis, calycibus glabris patentibus. LINN. spec. p. 969.

Malva annua rotundifolia, floribus omnium minimis albis pentapetalis verticillatis genicula ambientibus. MORB. hist. 2. p. 521.

Malva tingiana, flore caeruleo parva. PLUK. phyt. 44. f. 2.

Loc. In comitatu Nicaeensi. *ANNUA*.

1416. **MALVA** nicaeensis. †

Malva caule piloso decumbente herbaceo, foliis subcordatis quinquelobis, lobis acutis, pedunculis erectis.

Loc. Novam hanc MALVÆ speciem primus reperit Cl. BALLARDI in agro Nicaeensi prope portum di Limpia. *ANNUA*.

DESCR. Caules decumbentes vix ramosi, virides, aliquantum striati. Folia longe petiolata, quinqueloba: lobi rotundati in inferioribus foliis, in sequentibus lanceolati, crenato-dentati, stipula lanceolata ad originem petiolorum. Flores axillares sæpius quatuor, pedunculis erectis semuncialibus nudis subæqualibus. Calyx connivens. Flores dilute rubri, calyce paullo majores, petalis emarginatis. Caules, petioli, pedunculi, & calyx longiusculo villo barbati. Folia subtilissime, & lævissime hirsuta. Differt a rotundifolia foliis acute lobatis non cordatis, floris colore, magnitudine, & pedunculis in rotundifolia inæqualibus, interdum etiam foliosis. In parviflora præter eadem foliorum discrimina calyx patens est, & glaber; flores ad axillas conglomerati, non sparsi.

1417. **MALVA** sylvestris.

Malva caule erecto herbaceo, foliis septem lobatis acutis, pedunculis, petiolisque pilosis. LINN. spec. p. 969.

Malva caule erecto, foliis lobatis, lobis serratis quinis, & septenis. HALL. hist. tom. 2. n. 1069.

Malva foliis quinquelobis serratis obtusis, calycum foliolis exterioribus subtrifidis. NEKER. Tom. 2. p. 294.

Malva sylvestris folio sinuato. BAUH. pin. 314.

Malva vulgaris flore majore, folio sinuato. BAUH. hist. II. p. 949.

Off. *Malva vulgaris* flore majore.

VERN. Riondella.

Loc. Ad hortorum sepes, & loca rudrata ubique. ANNUA.

VIR. MALVÆ omnes relaxant, & emolliunt, & mitissimam mucilaginem continent non sine principio aliquo acido attemperante. Usitatissima apud nos est MALVA sylvestris, & solet materiam emollientium clysterum præbere, quorum usus frequens est sive ad alvum excitandam, sive ad dolores, & cruciatus intestinorum sedandos; non minori frequentia in fotibus, cataplasmate, & balneis MALVA Medici utuntur ad tumores emolliendos, tensas partes relaxandas, & dolores mitigandos. Intus ex aqua, aut jure decocta folia MALVÆ prosunt in raucedine, faucium asperitate, tussi sicca, atque ea, quæ ex lymphæ acris irritatione proficiscitur. Faciliorem etiam alvum reddunt emolliendo, & lubricando. Cardialgia, quæ comitem habet fibrarum tensionem, aut ex acris humoris irritatione nascitur, sive illa intra cavum ventriculi sit, sive vasis ejusdem contineatur, usu stimulantium stomachicorum, & corroborantium ingravescit, ope autem MALVÆ mitescit. Urinae ardorem in gonorrhæa, & mingendi cruciatus sublevar MALVA multi faciendâ in renum doloribus, & vesicæ tenesmo ex calculi, aut acrium particularum irritatione producto. Folia sunt leviter ex aqua decoquenda: nam diutina ebullitio viscidiorum mucilaginem excitat, quæ gravis stomacho esse solet. Flores tenuiorem substantiam suppeditant, qui pro usu interno foliis præferuntur.

1418. MALVA alcea.

ICON. TAUR. Vol. V. tab. 68.

Malva caule erecto, foliis scabris trilobatis, lobis lateralibus bipartitis, medio tripartito, & quinque-partito. LALL. hist. tom. 2. n. 1071.

Malva caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis. LINN. spec. p. 971.

Alcea vulgaris major. BAUH. pin. 316.

Alcea vulgaris. CLUS. hist. 2. p. 25.

Alcea. MATTH.

Off. *Alcea vulgaris.*

Loc. Ad fossas, & semitas viarum, & dumeta, sive in agro Pedemoniano, sive in collibus frequens est. ANNUA.

VIR. MALVA deficiente hæc etiam adhibetur, sed minori pretio habetur.

1419. MALVA moschata.

ICON. TAUR. Vol. XVI. tab. 106.

Malva caule erecto, foliis radicalibus reniformibus incisis, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. LINN. syst. 12. p. 461.

Malva foliis radicalibus reniformibus incisis, caulinis quinquepartitis, pinnis dentatis. HALL. hist. tom. 1. n. 1072.

Malva folio rotundo laciniato. BAUH. pin. 316.

Malva montana, sive alcea rotundifolia laciniata. COL. ecphr. 1. p. 148. tab. 147.

Loc. CL. DANA reperit copiose provenientem in apricis sylvis Garzii, & præcipue loco dicto il præ d' i fior. In montibus etiam Nicaensibus provenit. Ego vidit circa thermas Vinadii. CL. BELLARDI inter Tenda, & Limon, & Ignatius MOLINERI abunde legit in Sabaudia circa S. Ugo. PERENNIS.

ALCEA. LINN. *gen. n.* 750. *syst. n.* 840. TOURN. *tab.* 25.

Differt a Malva calyce exteriori semisexfido.

1420. **ALCEA** rosea.

Icon. TAUR. Vol. XIV. *tab.* 8. & Vol. V. *tab.* 102. 103. 105.

Alcea foliis sinuato-angularis. LINN. *spec. p.* 966.

Malva rosea folio subrotundo. BAUH. *pin.* 315.

Malva hortensis. DOD. *pempt.* 652.

Loc. In comitatu Nicaeensi. BIENNIS.

VIR. Haec etiam planta Malvæ proprietates habet, sed minorem præbet mucilaginosæ substantiæ quantitatem. In gingivis ex scorbutica affectione dolentibus, & relaxatis cum alumine adhibitam laudat GARIDEL.

LAVATERA. LINN. *gen. n.* 752. *syst. n.* 842.

Differt a Malva calyce exteriori trifido, non triphylo.

1421. **LAVATERA** arborea.

Lavatera caule arboreo foliis septem-angularibus tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. LINN. *spec. p.* 972.

Malva caule arboreo, foliis obtusis palmatis plicatis. HALL. *gort.* 120.

Althaea maritima arborea veneta. TOURN. *inn.* 97.

Malva arborea veneta dicta parvo flore. BAUH. *pin.* 315.

Malva arborea. BAUH. *hist. II. p.* 952.

Malva III. MATTH.

Loc. Reperitur ad rupes litoris Nicaeensis. BIENNIS.

VIR. MALVÆ sylvestris, & rotundifoliæ vices supplere potest.

1422. **LAVATERA** olbia.

Lavatera caule fruticoso, foliis quinquelobo-hastatis, pedunculis solitariis. LINN. *syst.* 12: *p.* 461.

JACQ. *hort. vindob.* *tab.* 73.

Lavatera acutifolia. LAM. *fl. franc.*, *tom.* 3. *p.* 137.

Althaea frutescens, folio acuto, parvo flore. BAUH. *pin.* 316.

Althaea arborea Olbiae in Gallo Provincia. LOB. *ic.* *p.* 553.

Loc. Nicaensem agrum inhabitat. FRUTEX.

1423. **LAVATERA** thuringiaca.

Icon. TAUR. Vol. XXI. *tab.* 87.

Lavatera caule herbaceo, fructibus denudatis, calycibus incis. LINN. *syst. p.* 461.

JACQ. *fl. austr.* *tab.* 311.

Althaea thuringiaca. CAM. *hort.* *p.* 12. *tab.* 6.

Althaea thuringiaca grandiflora. DILL. *p.* 9. *tab.* 8. *f.* 8.

Althaea pannonica secunda. CLUS. *hisp.* *p.* 23.

Althaea flore majore. BAUH. *pin.* 316.

Loc. In Comitatu Nicaeensi. BIENNIS.

1424. **LAVATERA** trimestris.

Icon. TAUR. Vol. XIV. *tab.* 67. & Vol. XVII. *tab.* 87.

Lavatera foliis glabris, caule scabro herbaceo, pedunculis unifloris, fructibus orbiculo tectis. LINN. *spec. p.* 974.

JACQ. *hort. vindob.* *tab.* 72.

Lavatera grandiflora. LAM. *fl. franc.*, *tom.* 3. *p.* 137.

Malva folio vario. BAUH. *pin.* 315. *prodr.* 137.

Loc. In Olivetis Villafrancae Nicaeensis reperitur. ANNUA.

1425. *LAVATERA maritima*.

Icon. TAUR. Vol. XVI. tab. 19.

Lavatera caule fruticoso lanato, foliis cordato-orbiculatis quinquelobis obtusis crenatis, pedunculis unifloris, stipulis setaceis deciduis. GOU. III. p. 46. tab. 21. f. 2.

JACQ. hort. vindob. tab. 74.

Althaea frutescens, folio rotundiore incano. BAUH. pin. 316.*Althaea arborescens.* BAUH. hist. 955.Loc. Ad rupes litoris, & agri *Nicaeensis* abunde. *PERENNIS*.*ALTHÆA*. LINN. gen. n. 749. syst. n. 839.Differt a *Malva* calyce exteriori plusquam quinquefido.1426. *ALTHÆA officinalis*:

Icon. TAUR. Vol. V. tab. 70.

Althaea tomentosa herbacea caule erecto, foliis cordato-lanceolatis obsolete trifidis. HALL. hist. tom. 2. n. 1074.*Althaea foliis cordato-ovatis ongulatis crenatis, pedunculis suberifloris.* GOU. hort. 345. n. 1.*Althaea foliis simplicibus tomentosis.* LINN. spec. p. 966.*Althaea Dioscoridis, & Plinii.* BAUH. pin. 315. TOURN. inst. 97.*Althaea, sive bismalva.* BAUH. hist. II. p. 954.*Altea.* MATTH.Off. *Althaea*, *Hibiscus*, *Bismalva*, & *Malvaviscus*.VERN. *Altea*, s. *Avisch*.Loc. In pratis subhumidis, & ad fossas in agro *Pedemontano* rara minime est. In Comitatu *Asiensis*, & *Monteferrato* frequentior. *PERENNIS*.*Vir.* Proprietates similes habet cum *Malva*, sed mucilaginem viscidiorum habet, uberioresque, ac *Malva* etiam utilior est ad acrimoniam obvolvendam, & abrasum mucum resituendum in morbis potissimum intestinorum, renum, ac vesicæ urinariæ. Extrane in officinis tabellæ, atque pasta de *ALTHÆA*, quarum usus frequentissimus est in faucium asperitate, & tussis stimulo leniendo.1427. *ALTHÆA cannabina*.

Icon. TAUR. Vol. V. tab. 69.

Althaea foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis. LINN. spec. p. 966.

JACQ. fl. austr. tab. 101.

Alcea cannabino. BAUH. pin. 316.*Alcea Pentaphylli folio, vel Cannabina.* BAUH. hist. II. p. 958.Loc. In agro *Pedemontano* passim oritur ad fossas, ad sepes, & dumeta. *PERENNIS*.1428. *ALTHÆA hirsuta*.

Icon. TAUR. Vol. XXIV. tab. 16.

Althaea foliis inferioribus subcordatis inciso-crenatis, caeteris trifidis. GOU. hort. p. 346. n. 3.*Althaea foliis trifidis piloso-hispidis supra glabris, pedunculis solitariis glabris.* LINN. syn. 12. p. 459.

JACQ. hort. vindob. 125. fl. austr. tab. 170.

Althaea foliis radicalibus reniformibus, caulinis palmatis trilobis, & quinquelobis, coryctibus hispidis. HALL. hist. tom. 2. n. 1073.*Althaea foliis trifidis piloso-hispidis.* CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 144.*Alcea hirsuta.* BAUH. pin. 317. TOURN. inst. 98.*Alcea villosa.* BAUH. hist. II. p. 1067.Loc. Inhabitat rupes, & colles Comitatus *Nicaeensis*: rarius observata est in nonnullis collibus apricis *Taurinensibus*, & *Asiensibus*. In aridis *Montisferrati*, atque Provinciae *Dertionensis* frequentem esse adnotavit Ignatius MOLINERI. *ANNUA*.

II. STAMINIBUS PARTIM CONN. SIVE POLYADELPHIA

HYPERICUM. SCOP. introd. n. 1250. TOURN. tab. 131.

Calyx expansus profundissime quinquefidus. Petala quinque patula elliptica.

Stamina quamplurima, in nostris parum connata. Tubae tres in nostris.

Fructus autem conicus trilocularis polyspermus.

1429. *HYPERICUM perforatum.*

Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis, pellucido-punctatis. LINN. spec. p. 1105.

Hypericum (officinatum) calyce integro, caule ancipiti ramosissimo, foliis confertis pellucido-punctatis. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 99.

Hypericum caule terete alato ramosissimo, foliis ovatis perforatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1037.

Hypericum floribus trigynis, petalis uno latere crenatis, caule ancipiti. SCOP. fl. carn. p. 310. n. 3. ed. 2. n. 944.

Hypericum vulgare. TOURN. 154. LAM. fl. franc., tom. 3. p. 151.

Hypericum vulgare. BAUH. pin. 179.

Hypericum vulgare, seu perforata caule rotundo, foliis glabris. BAUH. hist. III. p. 381. DOD. pempt. 76

Hyperico. MATTH.

Off. *Hypericum*, seu perforata.

Loc. Ubique frequens in agro Pedemontano. *PERENNE.*

VIR. Hoc *Hypericum* solet apud nos in usum medicinale venire, sed & aliae

HYPERICI species similia principia possident, similesque praebent utilitates.

Hujus generis stirpibus, praeter acidum aliquod principium, abunde inest substantia resinosa terebinthinacea. Inter vulneraria eminet *HYPERICUM*: ad vulnera consolidanda conducit, atque etiam in ambustis utile est: in internis ulceribus revera auxilium praebere videtur vi abstergente balsamica; passim in renum, & pulmonis ulceribus etiam commendatur. Quod ad ulcus renum pertinet, haec infirmitas non solet utilitatem recipere a balsamicis calefacientibus, quae salibus urinae juncta nimium solent laesas partes irritare, & lacerare. In phthisi pulmonali caute etiam admodum adhibenda est, si morbus ex salsa destillatione veniat, eaque non conquieverit, aut sanguinis spatium consequatur propter vasorum erosionem: neque etiam opportunum est, si phthisis jam provecta sit, atque febricula cum acris calore procedat orta ex materia pulverulenta resorpta, eo enim in caso nocent omnia balsamica calefacientia; multo etiam minus apta medicina esse poterit, si jam humores colliquari incipiant. Non puto esse remedium, cui credas, in febris interminantibus. Tota planta utilis est; sed extremitates florentes praesertim eligi solent.

1430. *HYPERICUM montanum.*

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 105. f. 1.

Hypericum floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis glabris. LINN. syst. 12. p. 510.

Hypericum (elegantissimum) CRANTZ.

JACO. hori. vindob. p. 167.

Hypericum foliis ovatis per oram punctatis, calycibus lanceolatis serratis globuliferis. HALL. hist. tom. 2. n. 1042.

Androsæum bifolium glabrum perfoliatum, non perforatum. MORIS. p. 1. s. 5. tab. 6. f. 9.

Androsæum campoclaresense. COL. ecphr. p. 73. icon. 74.

Androsæum montanum minus. BOCC. mus. p. 50.

Androsæum excellentius dictum, seu magnum. LOR. adv. p. 173.

Loc. Ad oras sylvarum locis montanis, & collinis, nec non sylvis minime opacis vulgare. PERENNE.

1431. *HYPERICUM quadrangulum*.

Icon. TAUR. Vol. XXIII. tab. 37.

Hypericum floribus trigynis, caule quadrato herbaceo. LINN. spec. p. 1104.

Hypericum caule quadrangulare, foliis ovatis perforatis punctatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1038.

Hypericum calyce integra, foliis marginis punctatis, caule quadrato herbaceo. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 98.

Hypericum ascyron dictum caule quadrangula. BAUH. hist. III. p. 382.

Ascyron. MATTH.

Loc. In dumetis, & umbrosis sylvis montium, & collium, tum etiam secus fossas, & puras fluentes aquas in agro Pedemoniano. PERENNE.

1432. *HYPERICUM hirsutum*.

Icon TAUR. Vol. XXIII. tab. 36.

Hypericum floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus. LINN. spec. p. 1105.

Hypericum calyce serrato glanduloso, foliis pedicellatis perforatis, caule tereti villosa. CRANTZ. fasc. 2. p. 62.

Hypericum villosum, calyce serrato, foliis perforatis. HALL. Helv. 361.

Hypericum androsæum dictum. BAUH. hist. III. p. 382.

Hypericum villosum erectum, caule raiundo. TOURN. inst. 255. SEGUIER. veron. 1. p. 451.

Loc. Ad sepes, & dumera, & ad oras sylvarum, tum in Taurinensibus, tum in subalpinis montibus abunde. PERENNE.

1433. *HYPERICUM maculatum*. tab. 83. fig. 1.

Icon. TAUR. Vol. XVIII. tab. 91.

Hypericum (maculatum) calyce floribus, foliis caule maculatis. CRANTZ. stirp. austr. fasc. 2. p. 98.

Hypericum alpinum magna flore, nigris punctis insignita. SCHOL. botan. p. 41. & BASS. comm. Bon. 4. p. 196. tab. 3.

Hypericum (androsæmifolium) caulibus teretibus diffusis, ciliis calycinis eglandulosis, foliis ovatis patensibus. VILL. prosp. p. 44.

Loc. In pratis alpinum non infrequens, abunde in monte Cenisia. PERENNE.

DESCR. Ex una radice, quae plures minores, iterumque fibrosas radices demittit, & quarum defectu evidenter differt ad *HYPERICO Ferdinandi* BASSI, oriuntur caudiculi plures palmares, ad imum rubentes erecti firmi, primum subrotundi, deinde parum compressi, lateribus utrinque in aciem extenuatis, sive nervulo aciformi percurti, & transparentes. Folia opposita sessilia praeter medium nervum duobus utrinque aliis, aut tribus subtus percurta. Folia non hirsuta, subtus pallescens, transparentia, non perforata, omnino ovata, non acuminata, obtusa, imo leniter emarginata: subtus ad marginem foliorum series una punctulorum nigrorum; haec puncta ad marginem utique sunt, sed in ipso margine non existunt. Ex alis foliorum utrinque ramuli simplices; Folia autem inferiora maculis rubensibus notantur supra, & infra. Ramuli superiores floriferi, & triflori, aut biflori; summus caulis solet esse quinqueflorus. Calyx pentaphyllus, glaber, foliolis ovato-acutis, bracteola una prope calycem. Flos patens, calyce multoties major: petala elliptica, lineata, non denticulata, staminibus duplo longiora circiter; filamenta lutea, antherae luteae didymae. Calyx, & petala inferius confertis maculis nigris notata. Foliola calycis striata, nulla existunt ornamenta foliacea. Fructus tricapsularis, laevis, viridis, in apice rubens.

1434. *HYPERICUM tomentosum*.

Hypericum floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, foliis semiamplexicaulibus, flexuosis tomentosis, caulibus prostratis. LINN. spec. p. 1106. GOU. monsp. 402.

ALLIUNII Fl. Pedem. Tom. II.

M

Hypericum supinum tomentosum minus, & monspeliacum. BAUH. pin. 279.

Hypericum supinum tomentosum alterum. CLUS. hist. 2. p. 181.

Loc. Ad fontes, rivulos, & aqueductus in agro Nicaensi. PERENNE.

1435. *HYPERICUM barbatum.*

Hypericum (Richetii) caulibus erectis, teretibus; floribus terminalibus; calicum foliolis ciliatis eglandulosis; foliis ovatis cauli appressis. VILL. prosp. p. 44.

Hypericum barbatum. JACQ. fl. austr. tab. 259.

Loc. In pratis alpinis humidis in monte Cenisio passim advenitur. PERENNE.

1436. *HYPERICUM humifusum.*

Icon. TAUR. Vol. XXV. tab. 27.

Hypericum floribus trigynis, axillaribus solitariis, caulibus ancipitibus prostratis filiformibus, foliis glabris. LINN. spec. p. 1105.

Hypericum caule prostrato, foliis ovatis, calycibus serratis punctatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1039.

Hypericum minus supinum, vel supinum glabrum. BAUH. pin. 279.

Hypericum minimum supinum. BAUH. hist. III. p. 384.

Hypericum (Lionardi) minimum erectum bienne, foliolis calycinis obtusis, inaequalibus saepe quaternis. VILL. prosp. p. 45. tab. 29. fig. 3.

Hypericum minimum septentrionale. LOB. icon. 400.

Loc. In collibus Taurinensibus ad vias abunde, & in agro Nicaensi ad rupes, sylvas etiam incolit; copiose circa Giaveno. Cl. BELLARDI locis uliginosis agri Canapiciensis non infrequens esse observavit. ANNUUM.

1437. *HYPERICUM crispum.*

Hypericum foliis trigynis, foliis sessilibus lanceolatis, basi undulato-dentatis, caule tereti. LINN. mant. p. 106.

Hypericum folio brevior. BAUH. pin. 279.

Hypericum crispum triquetrum, & cuspidato folio. BOCC. mus. 2. p. 31. tab. 12.

Loc. In monte Cenisio. PERENNE.

1438. *HYPERICUM nummularium.*

Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 95. fig. 2.

Hypericum floribus trigynis: calycibus serrato-glandulosis, foliis cordato-orbiculatis glabris. LINN. spec. p. 1106.

Hypericum nummulariae folio. BAUH. pin. 279. prodr. 130.

Androsæum nummulariae folio. BOCC. mus. 2. p. 134. tab. 91.

Loc. Paulus BOCCONE nasci adnotavit in montibus Carthuziae majoris inter Gratiapolim, & Chamberium. Cl. amicus noster DELA TOURETTE misit in Chamberiensi Provincia lectum prope les Echelles in monte de la Grouse. BOYERON in herbario suo habet ibidem fortasse lectum. In Hortum Regium Taurinensem intulit PIERUS MOLINERI ex Sabaudia. PERENNE.

1439. *HYPERICUM Coris.*

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 1.

Hypericum foliis linearibus quaternis, calyce serrato, densibus glanduliferis. HALL. hist. tom. 2. n. 1040.

Hypericum floribus trigynis: calycibus serrato-glandulosis, foliis subverticillatis. LINN. spec. p. 1107.

Hypericoides, Coris quorundam. BAUH. hist. III. p. 384.

Coris lutea. BAUH. pin. 280.

Loc. In aridis, & siccis collibus Nicaensibus vulgaris: neque desideratur in agro Pedemoniano locis subalpinis, aut alpinis maxime apicis, & saxosis meridiano sole percussis. Circa Segusium frequentissimum. PERENNE.

ANDROSÆMUM. TOURN. *inst.* 251. *tab.* 128.

Differt ab Hyperico fructu baccato polyspermo, seminibus triplici placenta affixis.

1440 **ANDROSÆMUM officinale.***Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 105. fig. 2.**Hypericum floribus trigynis, fructibus baccatis, caule fruticoso oncupiti.* LINN. *yst.* 12 p. 509.*Androsoemum maximum frutescens.* BAUH. *pin.* 280.*Hypericum bocciferum.* LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p. 157.**Androsoemum.* DOD. *pempt.* 78.*VERN. Erba d' la Tajuro, o sia d' l' feu.**Loc.* Vulgare est secus fossas, & rivulos in agro *Nicoeensi*, in Comitatu *Avensi*, *Montesferro*, imo etiam in collibus calidioribus *Tourinensibus*. CL. DANA vidit etiam supra Oppidum *Barge*, eundo versus *Mombac*. CL. BELLAROI circa *Pinerolo*, *Piozasso*, & *Cumigno*. PERENNE.*VIR.* ANDROSEMI qualitates cum Hyperico conveniunt. Efficacius adhuc vulnerarium est, atque ad ambusta utilissimum.CROTON. LINN. *gen. n.* 960. *yst. n.* 1083. TOURN. *tab.* 423.

Flores in eadem planta sexu distincti. Mari calyx quinqueedentatus: corolla pentapetala: stamina decem ad quindecim. Foeminae calyx pentaphyllus: corolla nulla: styli tres bifidi. Capsula trilocularis trisperma.

1441 **CROTON tinctorium.***Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 8.**Croton foliis rhombeis repandis, capsulis pendulis, coule herbaceo.* LINN. *spec. p.* 1435.*Heliotropium tricoctum.* BAUH. *pin.* 253.*Heliotropio minore.* MATTH.*OFF. Heliotropium tricoctum.**Loc.* In agro *Nicaeensi* frequens. ANNUUM.*VIR.* Ex hac stirpe paratur ad usum tinctorium *Tournesol* Gallorum.III. STAMINIBUS OMNIBUS
LIBERIS

A. GYMNOSPERMÆ.

RANUNCULUS. LINN. *gen. n.* 619. *yst. n.* 699. TOURN. *tab.* 149.

Calyx deciduus pentaphyllus. Stamina plurima. Petala saepius quinque, sed omnia squama neciarifera ad unguem instructa. Semina plurima nuda in capitulum congesta.

1442 **RANUNCULUS lingua.***Icon. TAUR. Vol. X. tab. 25.**Ranunculus caule erecto romoso, foliis ensiformibus subterratis.* HALL. *hist. tom. 2. n.* 1181.*Ranunculus foliis lanceolatis, coule erecto.* LINN. *spec. p.* 773.*Ranunculus longifolius palustris major.* BAUH. *pin.* 34.*Ranunculus longifolius maximus lingua.* BAUH. *hist. III. p.* 865.*Ranunculus foliis lanceolatis, capitulo squamato.* CRANTZ. *fasc. 2. ed. 2. p.* 120.*Ranunculus longifolius.* LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 189.

Loc. Ad fossas aquarum in agro *Vercellensi* frequens, neque desideratur circa *Taurinum* secus *Padum*, & in paludibus di *Barge*, & *Envie*. Abunde etiam circa lacus di *Candia*, *Vivione*, & *Avigliana*. *PERENNIS*.

1443. *RANUNCULUS flammula*.

Ranunculus caule declinato, foliis elliptico-lanceolatis subserotis. *HALL. hist. tom. 2. n. 1182.*

Ranunculus foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. LINN. spec. p. 772.

Ranunculus foliis subintegerrimis, calycibus perianthyllis coloratis, floribus hexapetalis. NEKER. tom. 1. p. 238.

Ranunculus longifolius, palustris minor. BAUH. pin. 180.

Ranunculus longifolius, olliis flammula. BAUH. hist. III. p. 264.

Loc. Ad oras lacuum *Canapiciensium*. *Bartholomæus CACCIA* in valle *Ulcensi*. *PERENNIS*.

Obs. Varietatem reperit *Cl. BELLARDI* circa *Majon* caule erecto, foliis omnibus denticulatis, & floribus minoribus instructam.

1444. *RANUNCULUS reptans*.

ICON. TAUR. Vol. XVII. tab. 92. f. 1.

Ranunculus foliis linearibus, caule repente. LINN. spec. p. 773.

Ranunculus caule reptante, foliis linearibus fasciculatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1183.

Loc. Locis inundatis ad oras lacuum. *PERENNIS*.

1445. *RANUNCULUS plantagineus* *N. tab. 76. fig. 1.*

ICON. TAUR. Vol. IV. tab. 78. & Vol. XIV. tab. 16. f. 1.

Ranunculus radicibus fasciculatis, imo caule reticulato, foliis graminis. HALL. hist. tom. 2. n. 1180.

Ranunculus (pyrenæus) foliis linearibus indivisis, caule erecto striato subbifloro. LINN. mant. alt. p. 248. JACQ. miscel. 1. p. 150. tab. 18. f. 1.

Ranunculus foliis linearibus, caule subnudo, radice fasciculata comosa. GER. prov. 384.

Ranunculus amplexicaulis. GOU. Illust. p. 34.

Ranunculus pyrenæus albo flore. CLUS. append. alter. auct.

Ranunculus pyrenæus, foliis sublongis non lacinatis, albo flore. BAUH. hist. III. app. 264.

Loc. In summis pascuis alpinis non infrequens est. Abunde provenit in utroque monte *Cenisio*. *PERENNIS*.

1446. *RANUNCULUS ficaria*.

Ranunculus foliis cordatis angulatis petiolatis, caule uniflora. LINN. syst. 12. p. 378.

Ficaria. HALL. hist. n. 1160.

Ranunculus foliis radicalibus glabris cordato-subrotundis angulatis, s. integerrimis, pedunculis unifloris. NEKER. tom. 1. p. 237.

Ranunculus calycibus triphyllis cuculatis. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 120.

Ficaria. DILL. nov. pl. gen. tab. 5.

Ranunculus vernus rotundifolius. Tourn. inst. 286.

Chelidonia rotundifolia minor. BAUH. pin. 167.

Scrophularia minor, s. Chelidonium minus vulgo dictum. BAUH. hist. III. p. 468.

Chelidonia minore. MATTH.

Off. *Chelidonia minor*, *Scrophularia minor*, aut *Ficaria*.

Loc. In pratis irriguis, & ad sepes, atque etiam agris collium, montiumque frequentissimus, *PERENNIS*.

Vir. Misc antiscorbuticum esse expertus affirmo: si planta nondum flores explicaveris, deprædicaur adversus hæmorrhoides.

1447. *RANUNCULUS Thora*.

ICON. TAUR. Vol. XIX. tab. 15.

Ranunculus foliis inferioribus subrotundo-reniformibus crenatis, floribus lanceolatis, integerrimis, caule inferne nudo. JACQ. obs. bot. 1. p. 25. tab. 3.

- Ranunculus foliis reniformibus subtilioribus, caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule subbifloro.* LINN. spec. p. 775. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 119. JACQ. vind. p. 249. & fl. austr. tab. 442.
- Ranunculus foliis duris venosis reniformibus rotunde crenatis: convexitate retusa, acutis serratis.* HALL. hist. tom. 2. n. 1178.
- Thora valdensis.* DOD. purg. p. 322. hist. p. 443. LOB. adversar. p. 263.
- Aconitum pardalianches* 1. 2. *Thora major.* BAUH. pin. 184.
- Aconitum pardalianche falso.* MATTH.
- Off. Phora,* s. *Thora.*

Loc. J. BAUH. in alpinis *Allobrogum.* LOBELIUS in celsioribus *Sabaudie* alpinis, & *Val. d'Angroigne.* Ex alpinis *Vinadiensibus* habeo. Abunde oritur in monte *Le Tournaire*, nec non in pascuis alpinis *Valdensibus* circa *Pralles.* Incolis dicitur *Tora fœa*, & hujus veneni maximam vim apprimere norunt. Provenit etiam in summis pratis alpinis *di Cogne*, & *Challand.* PERENNIS.

FOLIIS DISSECTIS, ET DIVISIS

1448. RANUNCULUS auricomus.

- Ranunculus foliis radicalibus reniformibus crenatis-incisis, caulinis digitatis linearibus, caule multifloro.* LINN. spec. p. 775.
- Ranunculus foliis radicalibus integris, & semitrilobatis rotunde crenatis, caulinis multipartitis linearibus integerrimis.* HALL. hist. tom. 2. n. 1177.
- Ranunculus foliis radicalibus reniformibus longe petiolatis, caulinis digitatis sessilibus.* CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 112.
- Ranunculus nemorosus, seu sylvaticus folio rotundo.* BAUH. pin. 178.
- Ranunculus rotundifolius vernus sylvaticus.* BAUH. hist. III. p. 887.
- Loc. In *Pedemonte* lectum teneo. *Bartholomæus CACCIA* commemorat inter stirpes vallis *Ulcienis.* PERENNIS.

1449. RANUNCULUS polymorphus N. tab. 82. fig. 2.

- Loc. Circa urbem *Casaleensem* lectum attulit Cl. GIAVELLI. PERENNIS.
- Obs. Unicum, & siccum exemplar habeo hujusce RANUNCULI, atque illud etiam imperfectum a reliquis huc usque notis distinguendum, foliis radicalibus subrotundis *Thoræ* similibus, magnis in ambitu dentibus incisis, longissime petiolatis, caulinis sessilibus digitatis, foliolis integerrimis. Fructus RANUNCULI.

1450. RANUNCULUS aconitifolius.

- ICON. TAUR. Vol. IV. tab. 71. & Vol. XXVI. tab. 28.
- Ranunculus foliis omnibus quinatis lanceolatis, inciso-serratis.* LINN. spec. p. 776. CRANTZ. fasc. 2. p. 86.
- Ranunculus caule ramoso multifloro, foliis venosis quinquelobis, lobis rhomboideis acutis acute serratis.* HALL. hist. tom. 2. n. 1164.
- Ranunculus montanus aconitifolio albus, flore majore.* BAUH. pin. 182.
- Ranunculus flore albo alpinus major.* BAUH. hist. III. p. 860.
- Aconitum baurachoides.* LOB. adv. p. 300.
2. *Ranunculus montanus aconitifolio albus, flore minore.* BAUH. pin. 182.
- Ranunculus albus simpliciflore.* BAUH. hist. III. p. 859.
- Ranunculus IV.* CAM. epit. p. 383. CLUS. hist. 236.
- Loc. In sylvis alpinis, & subalpinis ubique copiose. In pratis etiam alpinis irriguis obviam venit. PERENNIS.

1451. RANUNCULUS rupefolius. tab. 67. fig. 1.

- ICON. TAUR. Vol. IV. tab. 77.
- Ranunculus caule unifloro, foliis imbricatis pinnatis, pinnis lobatis, lobis obtuse palmatis.* HALL. hist. tom. 2. n. 1165.
- Ranunculus foliis supradecompositis, caule simplicissimo unifolio unifloro, radice tuberosa.* LINN. spec. p. 777.

Ranunculus (*rutae-folius*) foliis pinnatim decompositis, caule unifloro. VILL. prosp. p. 50.

Ranunculus præcox 1. *rutae-folio*. CLUS. hist. p. 232.

Ranunculus rutaceo folio, flore suave rubente. BAUM. pin. 181.

Loc. In summis jugis alpium prope nivem deliquescentem pertinentibus ad vallem di Fenesvella, & utrumque montem Cenisium reperitur, idemidemque obviam venit. PERENNIS.

DESCR. Radix ex variis longis teretibus radicibus albis, modo simplicibus, modo ramosis, ex qua radice tria, aut quatuor plerumque folia petiolis imbricatis, & cavis, qui postquam ab invicem discesserunt, integerrima rotunda evadunt. E latere foliorum radicalium nascuntur scapi teretes virides uniflori, folium unum, alterumve habentes. Folia composita glauca primum pinnatis petiolatis: pinnae habent unum par pinnarum cum impari. Quodlibet foliolum profunde trifidum, segmentis inaequaliter tridentatis, aut quadridentatis, medio segmento profundius, & fere aequaliter trifido: pinna impar amplior est, postrema pinna solitaria, neque accessorias pinnulas habet. Flos planus: petala alba emarginata: unguis phoeniceus. Foveola unguibus petalorum insculpta cum squamula nectarifera. Antherae didymae, virides. Strygma cava vix uncinata. Calycis pentaphylli foliola ovata, cava, flore minora, dilute viridia. Capitulum sphaericum seminibus ovatis, ita tamen ut utrinque modice extent sub duro tegmine, semen occultantes. Strygma breve uncinatum persistens.

1452. *RANUNCULUS glacialis*.

Icon. TAUR. Vol. IV. tab. 76. & Vol. XV. tab. 59. fig. 1. 2.

Ranunculus foliis pulposis repetito trilobatis, calycibus villosis. HALL. hist. tom. 2. n. 1166.

Ranunculus calycibus hirsutis, caule bifloro, foliis multifidis. LINN. spec. p. 777.

Ranunculus caule bifloro, calyce hirsuto. LINN. fl. lapp. 233. tab. 3. f. 1.

Ranunculus manianus purpureus calyce villosio Felicia Plateri. BAUM. hist. III. p. 862.

VERN. Carlina.

Loc. Ubique in alpium frigidiorum cacuminibus ad nivem deliquescentem. PERENNIS.

Vir. Alpicolae nostri hujusce plantae decocto utuntur ad sudorem movendum.

1453. *RANUNCULUS Columnae* N. tab. 67. fig. 3. & 4.

Icon. TAUR. Vol. XVII. tab. 92. fig. 3. 4.

Ranunculus alter saxatilis asphodeli radice. COL. cap. 140.

Ranunculus alpinus Apii folia, flore albo magno. PONT. camp. 117. SEGU. Veron. tom.

1. p. 490. tab. 12. f. 2. 3.

Ranunculus (Seguierii) foliis orbiculatis multifidis; caule prostrato ad genicula nodoso. VILL. prosp. p. 50. tab. 32.

Loc. In montibus di Limone loco dicto *Vermelina* locis lapideis apricis ex diffracto lapide calcareo; supra Carlin A. DANA. PERENNIS.

DESCR. Radix ex longis succulentis teretibus fibris, in unum caput collectis. Folia radicalia aliquot ad imum caulem vaginantia, oris vaginae convolutis, petiolum biunciale, semiteretes, sulcatum praebent. Folia circumscriptione rotunda, atrovirentia, glabra, splendentia, saporis acris, & caustici succulenta, ad petiolum usque quinquefida, sive potius pediculus in quinque divisiones abit, quarum duae inferiores breviores sunt: partiale petiolum in folium explanatur bis trifidum; foliola ovata, aut elliptica cum acumine; foliola lateralia aut foliolo, aut lobo aucta esse solent. Caulis, qui brevis est, & ad sui originem fusce livet, ramos breves porrigit, sive pedunculos multifloros. Hi supra totam plantam elati sunt, teretes, virides, pilosi. Calycis foliola concava, margine albo, acuta, viridia, ovata. Flos lacteus, amplius: petala ex triangulo cordata, margine laeviter crenulato cum squamula nectarifera, alba, magna; antherae luteae. Duplicem iconem damus eo quod folia modo parcius, modo profundius secta diversam formam exhibeant.

1454. *RANUNCULUS nivalis*.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 68. f. 2. Vol. XV. tab. 59. f. 3. & Vol. XVIII. tab. 85.

*Ranunculus calyce hirsuto, coule unifloro, foliis radicalibus palmatis: caulinis multipar-
titis sessilibus.* LINN. spec. p. 778. fl. lapp. tab. 3. f. 2.

Ranunculus caule unifloro; foliis glabris reniformibus, semiquinquelobis. HALL. hist. tom.
2. n. 1168.

JACQ. Fl. Austr. tab. 325.

*Ranunculus subhirsutus, coule subunifloro, foliis radicalibus palmatis, caulinis multipar-
titis sessilibus.* CRANTZ. fasc. 2. p. 92. tab. 4. f. 4. ed. 2. p. 116.

Ranunculus minimus alpinus luteus. HALL. hist. 3. p. 861. f. 2.

Ranunculus saxatilis magno flore. BAUH. prodr. 96. SCHEUCHZ. it. alp. 1. 46. SEGU.
suppl. p. 213.

Loc. In pratis, & pascuis alpium frequens. *PERENNIS*.

1455. *RANUNCULUS alpestris*.

Ranunculus uniflorus foliis lobebus semirilobis rounde serratis, caulinis lingulatis.

HALL. hist. 2. n. 1167.

*Ranunculus foliis radicalibus subcordatis obtusis tripartitis, lobis trilobatis, caulino lan-
ceolato integerrimo, coule subunifloro.* LINN. spec. p. 778.

Ranunculus foliis trilobis, lobis obtusis, coule unifloro. SCOP. Fl. Carn. p. 563. n. 4.
ed. 2. n. 679.

JACQ. fl. austr. tab. 110.

Ranunculus foliis subovandis splendentibus semirifidis, petolis cordatis albis. CRANTZ.
fasc. 2. p. 88. ed. 2. p. 113.

Ranunculus alpinus humilis folio subovando. SEGU. p. 489. tab. 12. fig. 1.

Loc. Prope collem la fenestra, & in monte Cenisio obviam venit. VALLE in monte
Clot de Brun prope le Vallon. Cl. DANA in monte Relegà versus Tendam. In
summis alpihus di Ceresole etiam nascitur. Ignatius MOLINERI in jugo Col dell'
Ors supra Gioveno. *PERENNIS*.

1456. *RANUNCULUS Bceyninus*.

Ranunculus alpinus receptaculo lanuginoso. CRANTZ. stirps. austr. fasc. 2. p. 115. tab.
4. f. 2.

Loc. Cl. DANA in alpihus Augustae Praetoriae. *PERENNIS*.

1457. *RANUNCULUS bulbosus*.

Icon. TAUR. Vol. IV. tab. 74.

Ranunculus radice subovanda, foliis hirsutis semirilobis, lobis petiolatis, acute serratis.

HALL. hist. tom. 2. n. 1174.

*Ranunculus colycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto multifloro, foliis com-
positis.* LINN. syst. 12. p. 379.

Ranunculus colycibus retroflexis, radice simplici globosa. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 114.

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotundo. BAUH. pin. 179.

Ranunculus tuberosus major. BAUH. hist. III. p. 417.

Ranunculo quinto. MATTH.

Off. *Ranunculus tuberosus*, s. *bulbosus*.

Loc. Ad semitas, & secus prata ubique copiose. *PERENNIS*.

1458. *RANUNCULUS repens*.

Icon. TAUR. Vol. IV. tab. 67. & 73.

Ranunculus coule repante radicato, foliis semirilobatis circumserratis, lobis petiolatis.

HALL. hist. tom. 2. n. 1173.

Ranunculus calycibus potulis, pedunculis sulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis.

LINN. syst. 12. p. 379.

Ranunculus pratensis repens hirsutus. BAUH. pin. 179.

Ranunculus repens, flore luteo simplici. BAUH. hist. III. p. 419.

Loc. Frequentissime in pratis subhumidis. *PERENNIS*.

1459. *RANUNCULUS* acris.

Icon. *Taur.* Vol. IV. tab. 69.

Ranunculus calycibus parvis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis, summis linearibus. LINN. spec. p. 779.

Ranunculus foliis hirsutis semirilobatis, lobis lateralibus bipartitis, foliis caulinis semirilobis. HALL. hist. tom. 2. n. 1169.

Ranunculus foliis inferioribus tri-quinque & parvis-multifidis, superioribus lineari-lanceolatis sessilibus subintegerrimis. NEKER. tom. 1. p. 239.

Ranunculus Napellifolius. CRANTZ. fasc. 2. p. 90.

Ranunculus pratensis erectus acris. BAUM. pin. 178.

Ranunculus rectus non repens flore simplici. BAUM. hist. III. p. 416.

VERN. Giaccaria.

Loc. In pratis ubique. PERENNIS.

VIR. *RANUNCULI* pene omnes caustici acres, & escarotici sunt. Cutim primum rubefaciunt, deinde etiam vesicam excitant. Potentius id facit *RANUNCULUS* sceleratus. Thera tantam habet urentem acrimoniam, ut inter venena potentissima recenseri debeat.

1460. *RANUNCULUS* polyanthemus.

Ranunculus calycibus parvis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. LINN. spec. p. 779.

Ranunculus caule ramoso, multifloro, foliis semisepilobis, lobis tridentatis acutis. HALL. hist. tom. 2. n. 1171.

Ranunculus polyanthemus simplex. LOB. ic. 666.

Ranunculus sylvestris. TABERN. ic. 42. hist. 117.

Loc. In sylvis caeduis Taurini non infrequens. PERENNIS.

1461. *RANUNCULUS* sceleratus.

Ranunculus foliis inferioribus palmatis, summis digitatis, fructibus oblongis. LINN. spec. p. 776.

Ranunculus foliis laevibus semirilobatis rotunde serratis, fructu ovato. HALL. hist. tom. 1. n. 1175.

Ranunculus fructu oblongo impatientie. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 111.

Ranunculus palustris apii folia laevia. BAUM. pin. 180.

Ranunculus palustris flore minimo. BAUM. hist. III. p. 858.

Ranunculo v. MATTH.

OFF. Apium risus, s. *Ranunculus palustris*.

Loc. Nihil ad fossas frequentius. ANNUUS.

1462. *RANUNCULUS* lanuginosus.

Icon. *Taur.* Vol. XVII. tab. 92. f. 2. & Vol. XXVI. tab. 82.

Ranunculus ramentosus, calycibus retriflexis, foliis radicalibus tripartitis, lobis incisis, caulinis multi-partitis sessilibus. GER. Fl. Gallopr. 387. n. 14.

Ranunculus calycibus parvis, pedunculis teretibus, caule, petiolisque hirsutis, foliis trifidis lobatis crenatis holosericeis. LINN. sys. 12. p. 379.

Ranunculus caule foliosa ramoso erecto, foliis semirilobatis serratis hirsutissimis, vaginis sericeis. HALL. hist. tom. 2. n. 1172.

Ranunculus foliis tripartitis acute sinuatis lanuginosis. CRANTZ. fasc. 2. p. 96. n. 15. ed. 2. p. 118.

Ranunculus foliis radicalibus quinquefidis, caulinis trifidis hirsutis. BOHEM. Lips. p. 183. n. 440.

Ranunculus foliis trilobis hispidis, calycibus parvis, caule multiflora tereti. SCOP. Fl. Carn. p. 564. n. 5. ed. 2. n. 691.

Ranunculus montanus lanuginosus, foliis ranunculi pratensis repentis. BAUM. pin. 182.

Ranunculus magnus valde hirsutus, flore lutea. BAUM. hist. III. p. 417.

B *Ranunculus montanus subhirsutus lousfolius.* BAUM. prodr. 96.

Loc. Locus lapidosus, & montanis ad oras sylvarum non infrequenter occurrit. PERENNIS.

1463. *RANUNCULUS arvensis*.
Icon. TAUR. Vol. IV. tab. 75.
Ranunculus seminibus aculeatis, foliis tripartitis, lobis longe petiolatis bipartitis, & tri-
partitis, acuta incisus. HALL. hist. tom. 2. n. 1176.
Ranunculus seminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. LINN. spec.
p. 780.
Ranunculus echinatus. CRANTZ. fasc. 2. p. 95. n. 13.
Ranunculus arvensis echinatus. BAUH. pin. 179.
Ranunculus sylvestris 3. DOD. pempt. 427.
Loc. In agro Pedemoniano frequens. ANNuus.
1464. *RANUNCULUS muricatus.*
Ranunculus seminibus aculeatis, foliis simplicibus lobatis obtusis glabris, caule diffuso.
LINN. spec. p. 780.
Ranunculus palustris echinatus. BAUH. pin. 180. prodr. 95.
Ranunculus creticus echinatus latifolius. ALP. exat. 263. tab. 262.
Loc. In agro Nicaeensi. ANNuus.
1465. *RANUNCULUS parviflorus.*
Icon. TAUR. Vol. XXIV. tab. 65.
Ranunculus seminibus muricatis, foliis simplicibus laciniosis acutis hirsutis, caule diffu-
so. LINN. spec. p. 780.
Ranunculus hirsutus annuus flore minimo. PLUK. alm. 311. tab. 55. f. 1.
Loc. Uneliae, & in Comitatu Nicaeensi in arvis subhanidis. ANNuus.
1466. *RANUNCULUS parvulus.*
Ranunculus hirtus, foliis trilobis incisus, caule erecto subuniflora. LINN. mant. p. 79.
Ranunculus foliis radicalibus, & caulinis, inferioribus trilobis crenatis, summis trifidis,
dentatis, caule bifloro erecto. GOU. monsp. 270.
Ranunculus arvensis parvus, folio trifido. BAUH. pin. 179.
Ranunculus minimus apulus. COL. ecphr. 314. tab. 316.
Loc. In arvis circa Pianezza, Druent, & in agro Taurinensi loco dicto la Mol-
nette. ANNuus.
1467. *RANUNCULUS hederaceus.*
Ranunculus foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente. LINN. spec. p. 781.
Ranunculus aquaticus hederaceus luteus. BAUH. pin. 180.
Loc. In montibus Bugellensibus. PERENNIS.
1468. *RANUNCULUS aquatilis.*
Icon. TAUR. Vol. XXIII. tab. 67.
Ranunculus foliis submersis capillaceis, emersis petiolatis. LINN. syn. 12. p. 380.
Ranunculus foliis natantibus petiolo-multipartitis, immersis capillaceis: nectariis subulatis.
NEKER. tom. 1. p. 342.
Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis imis capillaribus, supremis reniformibus or-
biculatis palmatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1163.
Ranunculus aquaticus, folia rotundo, & capillaceo. BAUH. pin. 180.
Ranunculus aquatilis. DOD. pempt. 387.
Loc. Ubique in aquis lente fluentibus, aut etiam stagnantibus. PERENNIS.
1469. *RANUNCULUS peucedanifolius N.*
Ranunculus caule fluitante, foliis capillaceis longissimis, lacinis pa-
ralellis. HALL. hist. tom. 2. n. 1161.
Ranunculo, seu Polyanthemo aquatico, albo affine, Millefolium maritimum fluitans.
BAUH. hist. III. p. 782.
Loc. Ad lacus, & fossas, & lente fluentes aquas. PERENNIS.

CORRIGIOLA. LINN. gen. n. 340. syst. n. 375.

Calyx pentaphyllus. Stamina quinque. Semen triquetrum, nudum, unicam calyce contentum.

1470 CORRIGIOLA littoralis.

ICON. TAUR. Vol. XXVIII. tab. 13.

Corrigiola foliis lanceolatis. GOU. hort. monsp. 155. n. 1.

Corrigiola. LINN. spec. p. 388. HALL. hist. tom. 1. n. 842.

Polygonifolia per terram sparsa folio scarpioidis. RAJ. & TOURN. pl. paris. p. 127.

BAUH. hist. III. p. 379.

Loc. Locis arenosis mari proximis. ANNUA.

POTENTILLA. LINN. gen. n. 559. syst. n. 634. TOURN. tab. 153.

Calyx decemfidus segmentis alternis minoribus. Stamina plurima. Semina nuda, plurima, affixa receptaculo exsucco glabro, aut papposo.

FOLIIS PINNATIS

1471 POTENTILLA fruticosa.

ICON. TAUR. Vol. XXVI. tab. 12.

Potentilla foliis pinnatis, caule fruticosa. LINN. spec. p. 709.

Pentaphylloides rectum fruticosum eboracense. MORIS. hist. 2. p. 193. s. 2. tab. 23. f. 5.

TOURN. inn. p. 298.

Pentaphylloides rectum frutescens. WALTH. hort. 95. tab. 17.

Loc. Locis apricis in montibus l' Inferno dictis ad Tendam pertinentibus collegit Ignatius MOLINERI. FRUTEX.

1472. POTENTILLA anserina.

ICON. TAUR. Vol. III. tab. 59.

Potentilla foliis bipinnatis serratis caule repente, pedunculis unifloris. LINN. syst. 12. p. 350.

Fragaria caule repente, foliis pinnatis serratis, subtus tomentosis, petiolis unifloris. HALL. hist. tom. 2. n. 1126.

Pentaphylloides argenteum allatum, s. Potentilla. TOURN. inst. 298.

Potentilla, s. Argentina. BAUH. hist. II. p. 398.

Potentilla. BAUH. pin. 321.

Argentina vulgaris. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 119.

Potentilla. MATTH.

Off. Potentilla, Argentina, aut Anserina.

Loc. In submontanis arenosis pratorum Pedemontii, & vallis Augustae Praetoriae quandoque occurrit. Legi circa le Tavernette. Frequenter autem est in Sabaudia, quam in Pedemontia. Abunde circa Belleville. PERENNIS.

1473. POTENTILLA multifida.

Potentilla foliis bipinnatis, segmentis integerrimis distantibus, subtus tomentosis, caule decumbente. LINN. spec. p. 710.

Fragaria foliis subtus tomentosis pinnatis, pinnis primis pinnatis, ultimis simplicibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1125.

Loc. In summo jugo la Vanoesa. PERENNIS.

1474. POTENTILLA rupestris.

ICON. TAUR. Vol. III. tab. 60.

Potentilla foliis pinnatis alternis, foliolis quinque ovatis crenatis, caule erecto. LINN. spec. p. 711.

Fragaria foliis pinnatis alternis, pinnis septenis subrotundis serratis. HALL. hist. tom. 2. n. 1127.

Potentilla foliis pinnatis ovatis incisus, caule erecto. SCOP. Fl. Carn. p. 573. n. 3.

JACQ. fl. austr. tab. 114.

Pentaphylloides erectum, BAUH. hist. II. p. 398.

Quinquefolium fragiferum, BAUH. pin. 326.

Loc. In pratis non irriguis frequens. PERENNIS.

1475. *POTENTILLA supina*.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 61.

Potentilla foliis pinnatis caule dichotomo decumbente, LINN. spec. p. 711.

JACQ. fl. austr. tab. 406.

Argemina supina, LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 1119.

Pentaphyllum supinum quorundam, *Potentillae* facie, CLUS. hist. 2. p. 107.

Loc. In collibus Taurinensibus legit Petrus CORNALLA. ANNUA.

FOLIIS DIGITATIS

1476. *POTENTILLA recta*.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 69.

Potentilla foliis septenatis lanceolatis serratis utrinque subpilis, caule erecto, LINN. spec. p. 711.

Fragaria (recta) foliis septenis, quinatisque serratis utrinque pilosis, caule erecto corymboso, CRANTZ. fast. 2. ed. 2. p. 79.

Fragaria caule erecto, foliis quinis, & septenis acute serratis, HALL. hist. tom. 2. 1121.

JACQ. fl. austr. tab. 383.

Quinquefolium rectum luteum, BAUH. pin. 325.

Quinquefolium rectum majus, BAUH. hist. II. p. 397.

Quinquefolium alterum vulgare, DOD. pempt. 116.

Loc. Circa Taurinum secus Padum occurrit non procul a Regio Valensino, & generatim in Pedemonio, & Liguria valde frequens. PERENNIS.

1477. *POTENTILLA argentea*.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 67.

Potentilla foliis quinatis cuneiformibus incisibus subius tomentosius, caule erecto, LINN. spec. p. 712.

Fragaria (argentea) foliis quinatis cuneiformibus, & cuneiformiter incisibus, subius tomentosius, caule firmo erecto, CRANTZ. fast. 2. ed. 2. p. 73.

Fragaria caule erecto, foliis quinatis apice serratis subius tomentosius, HALL. hist. tom. 2. n. 1124.

Quinquefolium folio argenteo, BAUH. pin. 325.

Pentaphyllum erectum, foliis profunde sectis, subius argenteis flore luteo, BAUH. hist. II. p. 398.

Cinquefoglio bianco, MATTH.

Loc. Ad muros, & ad vias in ruderalis, & saxosis ubique in agro Pedemoniano. PERENNIS.

1478. *POTENTILLA hirta*, tab. 71. fig. 1.

Potentilla foliis septenatis, quinatisque cuneiformibus incisibus pilosis, caule erecto hirta, LINN. syst. 12. p. 251.

Potentilla foliis cuneiformibus incisibus pilosis: radicolibus septenis, caulibus quinatis, caule hirta erecto, GER. Fl. Gallopr. p. 468. n. 5.

Potentilla (pilosa) erecta, foliis quinatis profunde serratis hirsutis, supremis serratis pedunculis viscosis, VILL. prosp. p. 47.

Quinquefolium montanum erectum hirsutum luteum, BAUH. pin. 135.

Loc. Sponte nascitur circa la Morra, atque in Comitatu Nicaensi, Cl. BELLARDE collegit in pascuis saxosis circa la Veneria. PERENNIS.

DESCR. Folia radicalia apud nos quinata, longe periolata, pedunculo semivertici sulcato, foliola supra obscure virentia, glabra, nitida, in aversa facie, atque ora longis pilis ciliata. Folia ex angusto primum triangulariter expansa, deinde in ovata formameducta, profundis, & obtusis dentibus dentata, dentibus singulis majore pilo terminatis extremi folii impar dens constanter

reliquis minor. Caulis erectus, rubens, firmus, asper, etiam pilosus, nudus, his, aut ter dichotomus. Calyx de more gentis. Foliola exteriora fere linearia, quae in *POTENTILLA verna* ovata sunt. Totâ planta longis villis hirsuta; petala aurea, cordata, emarginata, calyce majora. Antherae didymae, luteae. Ad divisiones ramorum stipulae profunde bifidae, quibus insident folia primum ternata, deinde simplicia, sed dentibus acutioribus instructa.

1479. *POTENTILLA aurea.*

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 65.

Potentilla foliis radicalibus quinatis serratis acuminatis, caulinis ternatis, caule declinato. LINN. spec. p. 712. JACQ. Vind. p. 245.

Fragaria caule reclinato, foliis quinis serratis, oris sericis. HALL. hist. tom. 2. n. 1122. tab. 21.

Quinquefolium minus repens aureum. ibid. tab. 21.

Fragaria (aurea) foliis radicalibus quinatis splendidibus, ora argentea, petalis maculatis. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 77.

Potentilla foliis margine sericis acute serratis, radicalibus quinatis, caulinis ternatis, caule declinato. GER. fl. gallopr. p. 468. n. 6.

Quinquefolium minus repens alpinum aureum. BAUH. pin. 325.

Loc. in pratis alpium editiorum saepe occurrit. PERENNIS.

1480. *POTENTILLA opaca.*

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 66.

Potentilla foliis radicalibus quinatis cuneiformibus serratis, caulinis suboppositis, ramis filiformibus decumbentibus. LINN. spec. p. 713.

Fragaria caule suberecto, foliis quinis septenis serratis obtusis. HALL. hist. tom. 2. n. 1120.

Potentilla foliis hirsutis dentatis radicalibus quinatis, caulinis ternatis, caule hirsuto decumbente. GER. p. 468. n. 7.

Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum. BAUH. pin. 325.

Potentilla (opaca) foliis quinis, septenisve crenato-incisis oblongis hirsutis, caule ramoso erectiusculo. VILL. prosp. p. 47.

Loc. Locis aridis, & in pascuis sterilibus Pedemontanis ubertime. PERENNIS.

1481. *POTENTILLA verna* tab. 24. fig. 2.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 65. & Vol. XII. tab. 64. f. 3.

Potentilla foliis radicalibus quinatis acute serratis reclusis, caulinis ternatis, caule declinato. LINN. spec. p. 712.

Fragaria caule decumbente, foliis quinatis serratis subhirsutis. HALL. hist. tom. 2. n. 1119.

Quinquefolium minus repens alpinum aureum. BAUH. pin. 325.

Pentaphyllum alpinum splendens aureo flore. BAUH. hist. II. p. 398.

Fragaria (villosa) foliis radicalibus quinatis obtuse, & alte serratis, floralibus suboppositis trifidis, petalis maculatis. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 75. tab. 1. fig. 2.

Potentilla foliis hirsutis demotis, radicalibus quinatis, caulinis ternatis, caule hirsuto decumbente. GER. Fl. Gallopr. p. 468. n. 7.

B. *Potentilla (incerta) foliis ternatis, & quinatis serratis hirsutis, petalis ovatis, vix calyce majoribus.* VILL. prosp. p. 46.

Pentaphyllum montanum minus luteo tormentillae flore cineraceum. BARR. icon. 709.

Loc. Frequentissima in pratis alpium, & in alveis fluminum extra alpes. PERENNIS.

Obs. Varietatem, quam BARELLIERI indicavit, & *Incertae* nomine designat Cl. VILLARS ea est, quam nostra Icon exhibet. Hujusmodi planca pro locorum diversitate variat magnitudine foliorum, numero dentium, hirsutis; pene etiam calva est, ita ut alia planta videatur. In agro Taurinensi secus Duriam vidit Cl. BELLARDI.

1482. *POTENTILLA caulescens.*

Icon. TAUR. Vol. XF. tab. 64. fig. 4.

Potentilla foliis quinatis apice connivenibus serratis, caulibus multifloris decumbentibus, receptaculis hirsutis. LINN. syst. 12. p. 331. JACQ. viad. p. 146. & fl. austr. tab. 129.

Fragaria foliis ovatis apice serratis, aris sericis, pappo placenta langissimo. HALL. hist. tom. 2. n. 1123.

Fragaria petiolis, & foliis quinatis, caule erecto minaribus, flore albo. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 78.

Quinquefolium umbellatum album foliis in apice tridentatis. SEGUIER. veran.

Quinquefolium album majus. BAUH. prodr. 129. caulescens. BAUH. pin. 315.

Loc. E scopulis Vinadiensibus prope la Madonna del Vallon habeo. Nascitur etiam à la Taule ad rupes. Legi circa Feneestrelles: supra Tendam, & Termignan etiam occurrit: incolit abrupta, & saxosa alpium loca soli exposita. PERENNIS.

Obs. POTENTILLA clusiana JACQ. fl. austr. tab. 116. mihi non videtur a caulescente LINN. distinguenda.

1483. POTENTILLA alba.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 68.

Potentilla foliis quinatis apice conniventibus serratis, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis. LINN. spec. p. 713.

Fragaria (alba) petiolis, & foliis quinatis caule procumbente fere altioribus, flore albo. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 78.

Potentilla nitida. SCOP. fl. carn. ed. 2. n. 624.

JACQ. fl. austr. tab. 115.

Quinquefolium album minus alterum. BAUH. pin. 125.

Quinquefolium album TRAGI.

Loc. In pascuis ad oras sylvarum tum in collinis, tum in montanis locis: alpes non ascendit. PERENNIS.

1484. POTENTILLA valderia tab. 14. fig. 1.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 64. fig. 1.

Potentilla foliis septenatis obovatis serratis tomentosis, caule erecto, petalis calyce brevioribus, receptaculis lanatis. LINN. spec. p. 714.

Potentilla lanata. LAM. fl. franc. tom. 3. p. 646.

Loc. Frequens in saxosis alpium Vinadii, & Valderii, uti etiam supra Tendam. PERENNIS.

DESCR. Radix crassa, & rubra est, fracta tenax, & multiceps. Haec capita porrigunt innumera folia longe petiolata, & caules plures suberectos, aut aliquantulum reclinatos. Folia sunt ex ampla stipula petiolata, petiolis hirsutis. Foliola sunt obovata, serrata, firma, sericeo-incana, venosa, & subius nervosa, quina, sena, aut septena. Caules subnudi, plerumque palmares, versus summum ramosi, ramis corymbum florum sustentibus. Folia caulina, quinata, & stipulis brevius hamatis insidentia. Folia ad originem ramorum subjecta, ternata. Petala diluissime sulphurea, aut alba, conniventi plerumque calyce minora. Receptaculum lanuginosum. Tota planta sericeo-incana est, caulibus, & petiolis evidenter subhirsutis.

1485. POTENTILLA reptans.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 94.

Potentilla foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. LINN. syst. 12. p. 251.

Fragaria foliis quinatis serratis, petiolis unifloris, caule reptante. HALL. hist. tom. 2. n. 1118.

Quinquefolium majus repens. BAUH. pin. 315.

Pentaphyllum, s. Quinquefolium vulgare repens. BAUH. hist. II. p. 397.

Cinquefoglie. MATTH.

Off. Quinquefolium, s. Pentaphyllum.

VERN. Cinfeut, s. erba sinchena.

Loc. Secus muros, & ad vias secus fossas vulgaris. PERENNIS.

VIR. POTENTILLA principio acido scatent, atque adstringunt. *POTENTILLA anserina* vitibus adstringentibus modice abstergentes adiungit. Habetur inter vulnerarias, & commendatur in nimio mensium fluxu, atque ad alvum solutam susendam. *POTENTILLA reptans* non infrequenter a Medicis adhibetur. Magnam habet aestimationem apud rusticos ad febres intermittentes tollendas. Tota planta similem efficaciam habet, sed radix potentius agit. *Quinquefolio* Medici utuntur iis in morbis, in quibus adstringentia locum habere possunt. In febribus intermittentibus utiliter datur succus expressus ab uncis duabus ad uncias quatuor aliquot horis ante accessionem. In iis potissimum convenit febribus intermittentibus, quæ cum quodam bilis aestu conjunguntur. Perinde ac succus plantaginis tollit febres intermittentes. Utilis etiam est generatim in febribus paroxysmalibus præscriptio stirpium amararum corroborantium cum additione *Quinquefolii*, aliarumque stirpium stipticarum, quo connubio obtinetur medicamentum cortici peruviano analogum, atque ipsi etiam anteponendum, si merus sit ex usu remedii multum tonici, valideque humores malæ indolis intra minima vasa genitis.

1486. *POTENTILLA rubens.*

Fragaria (rubens) foliis quinatis angustis cuneiformibus, & cuneiformiter serratis pilosis, caulibus filiformibus rubentibus. CRANTZ. fasc. 2. p. 75.

Potentilla (rubens) foliis quinatis, & septenatis, caule suberecto, petalis parvis cordatis. VILL. prosp. p. 46.

Loc. Nascitur in calidioribus collibus *Liguria*, & *Montisferrati*: in vineis, & ad vias locis apricis saxosis, & argillaceis. *PERENNIS.*

DESCR. Caules ex una radice plures, nudi, suberecti, flexuosi, altera parte rubentes, longis pilis instructi. Folia quinata, splendide, & obscure virentia, glabra; subius in costa pilosa. Stipulae de more gentis caulem amplexantes, petiolatum commune educunt, quod foliolis brevius est, & colligit foliola quinque longa, gracilia, cuneiformia, cuneiformiter, & profunde dentata. Stipularum pagina inferior maxime pilosa est, foliorum quinaxorum stipulae habent utrinque additum dentem unum. Folia sub ramis ternata sunt cum stipulis simpliciter bifidis. Rami in summo dichotomi. Stipulae ibi duae oppositae cum foliis, ut ita dicam, connatae duo paria dentium habent, quorum primum longius est. In dichotomia positus flos longius pedunculatus. Calyx decem segmentis, alternis minoribus, hirsutus. Flos magnus luteus. Perala cordata calyce majora. Antherae luteae, compressae, bisulcae, subovatae, stamina antheris longiora.

FOLIIS TERNATIS

1487. *POTENTILLA nitida.*

Potentilla foliis subternatis tomentosis conniveni-*tridentatis*, caulibus unifloris, receptaculis lanatis. LINN. syst. 12. p. 351.

JACQ. fl. austr. app. tab. 25.

Heptaphyllum argenteum alpinum trifoliatum Sabaudum. BOCC. mus. 2. p. 20. tab. 9.

Trifolium alpinum argenteum, persici flore. BAUH. pin. 328. PON. Bald. 222.

Comaroides alpina argentea sericea, persici flore. SEGU. Ver. 1. p. 497.

Loc. Nascitur in *Sabaudiae* montibus, ubi etiam vidit *BOCCONE* loco cit. in saxorum rimis montis *Petit son dicti*, eandemque stirpem in *Sabaudia* legit *BOYERON. PERENNIS.*

1488. *POTENTILLA norvegica.*

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 64.

Potentilla foliis ternatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus. LINN. spec. p. 715.

Fragaria foliis ternatis hirsutis, caulibus tripartitis, stipulis ovato-lanceolatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1115.

Loc. In alpinis montis *Silvii.* *ANNUA.*

1489. *POTENTILLA grandiflora.*

Potentilla foliis ternatis densatis utrinque subpilosis, caule decumbente foliis longiore. LINN. spec. 715.

Potentilla foliis ternatis sericeis, coule declinata, petalis calycem longe superantibus.

HALL. *hist. som.* 2. n. 1114. tab. 21.

Fragaria helvetica nana. PARK. *Theatr.* p. 357.

Fragaria sverilis amplissimo folia, & flore, petalis cordatis. VAILL. *paris.* 55. tab. 10. fig. 1.

Potentilla foliis ternatis dentatis, caule superiore dichotoma, petalis caule duplo longioribus. GER. *fl. gallopr.* p. 469. n. 10.

Potentilla grandiflora. SCOP. *fl. carn. ed.* 2. p. 363. tab. 22.

Fragario grandiflora. LAM. *fl. franc. som.* 3. p. 112.

Loc. In pascuis saxosis alpium frequens: ubetrimè circa thermas Volderii, & Vinadii. **PERENNIS.**

SIBBALDIA. LINN. *gen.* n. 354. *yst.* n. 389.

Differt a *Potentilla* staminibus quinque, & seminibus quinque.

1490 **SIBBALDIA** procumbens.

Icon. *Taur.* Vol. XIV. tab. 38. f. 3.

Sibbaldia foliatis tridentatis. LINN. *yst.* 12. p. 227.

Fragaria foliis ternatis reuatis tridentatis flore calyci œquali pentastemone. HALL. *hist.* 2. n. 1116.

Fragario sylvestri affinis planta flore luteo. SIBB. *scot.* 2. p. 25. tab. 6. fig. 1. OED. *dan.* 106. 32.

Pentaphylloides fruticosum minimum procumbens flore luteo. PLUK. *alm.* 184. tab. 212. f. 3.

Pentaphyllum minimum alpinum nigrum crispum, profunde dissectum. BOCC. *mus.* p. 18. 2.

Loc. Ubique in summis alpiis. **PERENNIS.**

FRAGARIA. LINN. *gen.* n. 558. *yst.* n. 633. *TOURN.* tab. 152.

Flos *Potentillæ*, sed semina receptaculo baccato eduli-deciduo insidentia.

1491 **FRAGARIA** vesca.

Icon. *Taur.* Vol. III. tab. 57.

Fragaria flagellis reptantibus. LINN. *yst.* 12. p. 349.

Fragaria foliis ternatis, flagellis reptans. HALL. *hist. som.* 2. n. 1112.

Fragaria flagellis reptantibus, fructu eduli. CRANTZ. *fasc.* 2. ed. 2. p. 81.

Potentilla foliis ternatis, fructibus baccatis, stolonibus reptantibus. GER. p. 470. n. 12.

Potentilla vesca. SCOP. *Fl. Carn. ed.* 2. n. 625.

Potentilla flagellis reptans, foliis ternatis. BOREM. *lips.* p. 423.

Fragaria vulgaris. BAUR. *pin.* 326.

Fragaria. MATTH.

VERN. Frata.

Loc. Ubique in montibus, & collibus ad oras sylvarum. **PERENNIS.**

VIR. FRAGARIÆ fructus edules sunt, grate acidi, atque attemperantes. Universa planta acidum, adstringens principium possidet, quod copiosius in radice reperitur cum quodam sale alkalino fixo. Urinas pellit non modo tubulos renales irritando, sed etiam earum tonum augendo. Hujusmodi remediis genus maxime opportunum est, si ex debili fibrarum actione, aut aestu sanguinis lotii secretio imminuta sit. Pro circumstantiarum varietate radici **FRAGARIÆ** aut attemperantia, aut validiora exstimulantia adjungi solent. In minori morbo radices **FRAGARIÆ** sufficere possunt ad lotii separationem urgendam. Contemnendum remedium non est in ictero, si praesertim abstergentia, aut resolventia una adjungantur. In morbis renum ex calculo etiam commendantur hujusce plantae radices. Non puto quidem calculum solvere, sed blande potest illum urgere, ac tonum fibrarum firmando ejusdem generationem etiam antevertere.

1492. FRAGARIA sterilis.

Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 30.

Fragaria caule decumbente, ramis floriferis laxis. LINN. syst. 12. p. 350.*Fragaria caule prostrato, foliis ternatis rebus sericeis.* HALL. hist. tom. 2. n. 1113.*Fragaria sterilis.* BAUH. pin. p. 327. TOURN. inst. 296.*Fragaria non fragifera, vel non vesca.* BAUH. hist. II. 395.*Fragaria sylvestris, minime vesca, s. sterilis.* LOR. ic. 698.*Fragaria sterilis, seu minime vesca hirsuta minime incana.* MORIS. hist. 2. p. 186.

1. 2. tab. 19. f. 5.

Loc. Ad rupes, & muros locis subhumidis in territorio Bugellensi, & montibus Montis regalis. PERENNIS.

COMARUM. LINN. gen. n. 563. syst. n. 638.

Flos Potentillae, sed petala calyce minora. Receptaculum seminum ovatum, spongiosum, persistens.

1493 COMARUM palustre.

Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 38. f. 4.

Comarum palustre. LINN. spec. p. 718.*Fragaria foliis pinnatis, petalis lingulatis minimis.* HALL. hist. tom. 2. n. 1128.*Fragaria (palustris) foliis pinnatis subhirsutis, petalis minimis.* CRANTZ. fasc. 2. p.

11. ed. 2. p. 71.

Potentilla palustris. SCOP. fl. carn. ed. 2. n. 617.*Potentilla calyce colorato, petalis majori.* BOHEM. Lips. 415.*Argentina rubra.* LAM. fl. franc., tom. 3. p. 120.*Quinquefolium quarium.* DOD. pempt. 167.*Quinquefolium palustre.* CAM. epit. 762.

Loc. Ad oras lacuum; uberius circa lacum di Candia, & Vivrone. Ignatius MOLINERI prope Belleville in Sabaudia. PERENNIS.

CARYOPHYLLATA. TOURN. inst. 294. tab. 151.

A superioribus differt seminibus caudatis, sive arista geniculata instructis.

1494 CARYOPHYLLATA urbana.

Icon. TAUR. Vol. VIII. tab. 30.

Geum floribus erectis, fructibus globosis villosis, aristis uncinatis nudis, foliis lyratis.

LINN. syst. 12. p. 352.

Geum foliis pinnatis, pinna ultima trilobata, floribus parvis, tubis adnatis. HALL. hist.

tom. 2. n. 1130.

Geum floribus erectis, fructu globoso, aristis uncinatis nudis. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2.

p. 69.

Geum fructu globoso, calyceibus insidente, aristis uncinatis nudis caudatis. SCOP. Fl.

Carn. p. 571. n. 1.

Caryophyllata urbana. SCOP. fl. carn. ed. 2. n. 628.*Caryophyllata floribus erectis, seminibus uncinatis.* BOHEM. Lips. p. 180. n. 433.*Caryophyllata vulgaris.* TOURN. 294. LAM. fl. franc., tom. 3. p. 122.*Caryophyllata vulgaris.* BAUH. pin. 321. OFF.*Cariofillata.* MATTH.

Loc. Ad sepes, & sylvas ubique frequens in agro Pedemontano. PERENNIS.

VIR. Radices CARYOPHYLLORUM odorem spirant, subadstringentes, tonicæ, & laetiviter aromaticæ sunt, aique contrayervæ ipsi substitui posse dicuntur. Principia quidem similia habent, sed longe imbecilliora. Stomachi vires erigunt, ac menses ex laxitate fibrarum parcius fluentes promovent; contemnendæ etiam minime sunt ad pertinacem alvi fluxum cohibendum, quem fibrarum debilitas sustineat. Sicca radix drachmarum duarum pondere solet ex aqua decoqui, recens autem duplo majori dosi adhibetur: in substantia, sive in pulverem trita dari potest a scrupulo uno ad drachmam unam.

1495. CARYOPHYLLATA rivalis.

Icon. TAUR. Vol. XI. tab. 17.

Geum floribus nutantibus, fructu oblongo, aristis plumosis tortis. LINN. syst. 12. p. 352.

SCOP. fl. carn. p. 372. n. 3.

Geum foliis pinnatis, pinnis acutis extrema maxima trilobata: floribus connatis nutantibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1129.*Caryophyllata rivalis.* SCOP. fl. carn. ed. 2. n. 629.*Caryophyllata aquatica.* LAM. fl. franc., tom. 3. p. 123.*Caryophyllata aquatica nutante flore.* BAUH. pin. 321.*Caryophyllata aquatica flore rubro striato.* BAUH. hist. II. p. 398.

Loc. In pratis spongiosis, & secus fossas in montanis, & subalpinis. PERENNIS.

1496. CARYOPHYLLATA montana.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 60. f. 2.

Geum flore inclinato solitario, fructu oblongo: aristis villosis rectis. LINN. spec. p. 717.

CRANTZ. fasc. 2. p. 6.

Geum foliis pinnatis extrema maxima rotunde cordata. HALL. hist. tom. 2. n. 1131.*Caryophyllata montana.* SCOP. fl. carn. ed. 2. n. 630. LAM. fl. franc., tom. 3. p. 121.

JACQ. fl. austr. tab. 371.

Caryophyllata alpina lutea. BAUH. pin. 322.*Caryophyllata montana flore magno luteo.* BAUH. hist. II. p. 398.*Caryophyllata montana.* MATTH.

Loc. In pascuis montanis, & alpinis abunde provenit ubique. PERENNIS.

1497. CARYOPHYLLATA reptans.

Geum foliis uniformibus incis, alternis minoribus, flagellis reptantibus. LINN. spec. p. 717.*Geum foliis pinnatis trilobatis incis, flagellis reptans.* HALL. hist. tom. 2. n. 1132.*Caryophyllata alpina apii folio.* BAUH. pin. 322.*Caryophyllata alpina tenuifolia incana longius radicata.* BOCC. mus. p. 160. tab. 128. BARR. obs. 589. ic. 400.*Caryophyllata reptans.* LAM. fl. franc., tom. 3. p. 122.

Loc. Vidi in saxosis ad descensum montium Arbriez, & Col de la Croix versus vallem Quairas, & in monte Cenisio, Assiette, & Montveran. PERENNIS.

B. ANGIOSPERMÆ.

1. CALYCE NULLO

ACONITUM. LINN. gen. n. 603. syst. n. 681. TOURN. tab. 239. 240.

Petala quatuor, inferiora ferme orbiculata, quintum superius cucullatum quasi galeatum. Ex parte superiori thalami oriuntur pedunculi duo, qui bina nectaria quasi cochleata sustinent, & sub petalo superiori recondunt stamina declinata filamentis planis. Fructus constat ex tribus, vel quinque vaginis univalvibus. Semina angulosa, vel rugosa.

1498. ACONITUM lycoctonum.

Icon. TAUR. Vol. XXV. tab. 29.

Aconitum foliis hirsutis semitrilobis, lobis duplicato-trifidis. HALL. hist. tom. 2. n. 1200.*Aconitum foliis palmatis multifidis villosis.* LINN. spec. p. 750.

JACQ. fl. austr. tab. 380.

Aconitum lycoctonum. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 132.*Aconitum lycoctonum luteum.* BAUH. pin. p. 183. TOURN. inst. 424.*Aconitum folio platani, flore luteo pallente.* BAUH. hist. III. p. 652.*Aconitum lycoctonum luteum majus.* DOD. pempt. 439.*Napellus flore luteo.* RIV. irreg. pentapet. tab. 134.*Aconitum secundo.* MATTH.

ALLIONI Fl. Pedem. Tom. II.

Q

Off. *Aconitum lycoctonum*.

Loc. In sylvis montanis, subalpinis, atque etiam collinis vulgare est. *PERENNE*.

1499. *ACONITUM* Napellus.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 89.

Aconitum foliorum lacinii linearibus, supernis latisioribus linea exaratis. LINN. spec. p. 751.

Aconitum caule simplici, apica densa, petiolis unifloris, casside breviter mucronata. HALL. hist. rom. 2. n. 1197.

JACQ. fl. austr. tab. 381.

Aconitum Napellus. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 131.

Aconitum caeruleum, seu Napellus. BAUH. pin. p. 183. TOURN. inst. 425. GARID. Aiz. tab. 2.

Aconitum magnum purpureo flore, vulgo napellus. BAUH. hin. III. p. 655.

Napellus verus. LOB. hist. 387.

Aconitum napellus, foliorum ambitu circinnato, segmentis linearibus, apicis pedunculis simplicibus. VILL. prosp. p. 49.

Napello. MATTH.

Off. *Napellus*.

VEN. *Napel*.

Loc. Ad oras sylvarum locis umbris, & alpinis frigidis non infrequens. *PERENNE*.

1500. *ACONITUM* Cammarum.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 78.

Aconitum floribus subpentagynis, foliorum lacinii cuneiformibus incisae acutis. LINN. spec. p. 751.

JACQ. fl. austr. tab. 424.

Aconitum caule ramoso paniculato, petiolis multifloris, cassidis mucrone longiori. HALL. hin. rom. 2. n. 1198.

Napellus flore majore. RIV. tab. 129.

Aconitum lycocotium tauricum. CLUS. hist. 2. p. 95.

Aconitum violaceum, seu napellus. BAUH. pin. p. 183. TOURN. inst. p. 425.

Aconitum napello simile, sed minus caeruleum praecocius. BAUH. hin. III. 656.

Aconitum paniculatum. LAM. fl. franc., tom. 3. p. 646.

Loc. In sylvis umbris montium, & alpium frequentissime. *PERENNE*.

Vir. *ACONITI* genus virulentum est venenis accensendum, & licet aliqua species dicatur sine nocumento pro cibo assumpta, prudentis non erit incertis experimentis rem hanc fidere. Inter venena acuta, quae stomachum, atque intestina male afficiunt, atque convulsiones inde gignunt, locum habet *ACONITUM*, quod & majoribus animalibus certo necem inulit. *ACONITUM Cammarum* illud est, quod *Napelli* nomine in usum internum deducere ausus est CL. STORCH, maximaeque efficaciae esse scripsit in pertinaci rheumatismo, ischiade, glandulis induratis, amaurosi, aliisque morbis ex summe glutinosa, & viscida puvita ortis. Datur extractum *ACONITI* cum Saccharo commixtum, primis diebus dosi, quae minor uno grano est: eam usque ad grana quatuor, & ultra augeri posse putat idem Clar. Auctor. Summae acrimoniae, maximumque resolvens esse non diffitemur: videmus etiam in desperatis, & consumacibus morbis periculosa, & temeraria remedia esse tenenda, sed semper suadebimus thyrones intra minorem dosim, si necessitas ad hoc remedium cogat, se continere, atque confidemus celeberrimi STORCHII remedium commendabimus, quando aliorum clarissimorum viroium observata ipsius effectus confirmabant.

1501. *ACONITUM* Anthora.

Icon. TAUR. Vol. XXIII. tab. 87.

Aconitum floribus pentagynis, foliorum lacinii linearibus. LINN. spec. p. 751.

JACQ. fl. austr. tab. 381.

Aconitum foliis linearibus profundissime tripariis, lateralibus lobis bipariis incis, mediis duplicato-trilobatis. HALL. hist. rom. 2. p. 93. n. 1199.

Anihora, seu *Aniuhora*. CAMER. epis. p. 837.

Aconitum salusiferum, seu *Anihora*. BAUH. pin. p. 184. TOURN. inst. 423. ROBERT. ic. 10.

Aniuhora flore luteo Aconiti. BAUH. hist. III. 660.

Aniuhora. LOB. adv. p. 264.

Anihora zedoaria, *Aconitum salusiferum*. TABERN. ic. 119.

Anihora. MATTH.

OFF. *Anihora*, sive *Amithora*.

Loc. LOBELIUS, & Joannes BAUHINUS alpium *Sabaudiae* indigenam dicunt. Inter rupes locus apricus, & subalpinis praesertim frequentissima planta est. *PERENNE*.

Via. *Anihorae* radix immerito habita est pro *ACONITI* antidoto. Sunt qui commendunt, & dederint ad febres intermittentes tollendas granorum duodecim, atque etiam quindecim pondere. Ipse dedi in febris quotidiana, & contumaci intermittente. Nullam utilitatem obtinui, vomitum, atque alvum excuavi non sive aliquo cruciatu intestinorum; puto igitur cum affinitus suspectam plantam esse, quae multo minorem venenatam acrimoniam habeat.

DELPHINIUM. LINN. gen. n. 602. syst. n. 681. TOURN. tab. 241.

Petala quatuor oblonga patentia, quinque supremum oblongum in calcar posterius extensum, quod vaginae in mudum continet. Nectarium monophyllum, aut diphyllum, peraloideum. Fructus vel ex una, vel tribus vaginulis univalvibus constat, quae semina angulosa continent.

1502. **DELPHINIUM** *consolida*.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 112.

Delphinium nectaris monophyllum, caule subdiviso. LINN. spec. p. 748. CRANTZ. fasc. 2. p. 118.

Delphinium uniliquum, caule brachiato diffuso, floribus sparsis. HALL. hist. tom. 2. n. 1203.

Delphinium nectario monopetalo. BOHEM. fl. lips. p. 225. n. 541.

Delphinium nectaris acuminatis subcurvatis pedunculo longioribus, foliis lineari-pinna-tifidis. NEKER. tom. 1. p. 233.

Delphinium segetum. LAM. fl. franc., tom. 3. p. 325.

Delphinium segetum flore caeruleo. TOURN. inst. 426.

Consolida regalis arvensis. BAUH. pin. 142.

Consolida arvensis flore minore. BAUH. hist. III. part. 1. p. 210.

Loc. Non infrequens est inter stipulas in agro *Pedemontano*. Frequentissima in agris calidiorum collium *Taurinensium*. *ANNUUM*.

1503. **DELPHINIUM** *peregrinum*. tab. 25. fig. 3.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 92.

Delphinium nectaris diphyllum, floribus solitariis, foliis multipartitis, foliolis lineari-acuminatis. ENUM. NIC. p. 200. MISC. TAUR. tom. 2. p. 71. tom. 5. p. 89.

Delphinium nectaris diphyllum, corollis enneapetalis, foliis multipartitis obtusis. LINN. syst. 12. p. 371.

Loc. Circa *Nicaeam* nascitur. *ANNUUM*.

1504. **DELPHINIUM** *elatum*.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 63. & Vol. XV. tab. 55.

Delphinium nectaris diphyllum, labellis bifidis apice barbatis, foliis incisis, caule erecto. LINN. spec. p. 749.

Delphinium uniliquum, foliis semiquinquelobis acutis serratis, petalis interioribus quaternis barbatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1201.

Delphinium perenne montanum villosum aconitifolio. TOURN. inst. 426.

Aconitum caeruleum hirsutum flore Consolidae regalis. BAUH. pin. 183.

Aconitum caeruleum, calcar magno. BAUH. hist. III. p. 857.

Loc. Nascitur in *Alpe Sea*, *Grascaval*, atque in valle *Augustae Praetoriae*; etiam circa thermas *Vindenses* in umbrosis saxosis minime rarum est: secus viam la *Travera* dictam abunde occurrit. *PERENNIS*.

1505. *DELPHINIUM* *Staphysagria*.

Delphinium nectaris tetraphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis, lobis obtusis. LINN. *syst.* 12. p. 371.

Staphysagria. BAUH. *pin.* 324.

Staphysagria. DOD. *pempt.* 366.

Off. *Staphysagria*.

Loc. Repertus *Nicaeae*, *TERRANEUS* nasci affirmat in sylva ad *Clavasio* conspectum sua. *ANNUUM*.

VIR. *DELPHINII* genus *Acanis* proximum veneni etiam suspicione non caret; harum stirpium semina contraria, & in pulverem redacta pediculos enecant, si eo cum subsantia aliqua oleosa subacro pars illa, quam molesta haec animalcula obsident, confricetur. *Staphysagriae* semina potentius agunt, atque ad hunc usum remedium est usitatum *unguentum de Staphysagria*.

AQUILEGIA. LINN. *gen.* n. 605. *syst.* n. 684. *TOURN.* *tab.* 242.

Styli quinque: corolla pentapetala aequalis: nectaria quinque corniculata inter petala.

Capsulae quinque distinctae, polyspermae.

1506. *AQUILEGIA* *viscosa*.

Aquilegia caule subnudo subunifloro, foliis ternatis, foliis subtililobis sessilibus. GOV. *fl. monsp.* p. 267. n. 2. *hort.* 21. LINN. *syst. nat. ed.* 11. *tab.* 1. p. 372. *mant.* p. 77.

Aquilegia hirsuta, flore viscoso. *TOURN.* *inst.* 428. *MAGN. bot. monsp.* p. 26. *hort.* 21.

Loc. Semel in umbrosis alpinis *Garrexii* dictis t præ d' Galt vidit Cl. DANA, & Cl. BELLARDI invenit in alpinis *Tendae*, & *Vindii*. *PERENNIS*.

1507. *AQUILEGIA* *vulgaris*.

Icon. TAUR. *Vol. IV.* *tab.* 2. 26. & *Vol. XV.* *tab.* 15.

Aquilegia nectaris incurvis. LINN. *spec.* p. 752.

Aquilegia foliis trilobatis, lobis petiolatis tripartitis subrotundis, obtuse dentatis. HALL. *hist. tam.* 2. n. 1195.

Aquilegia sylvatica. BAUH. *pin.* 244. *GARID.* *tab.* 8.

Aquilegia flore simplici. BAUH. *hist.* III. p. 484.

Aquilegia. DOD. *pempt.* 181.

Aquilegia. MATTH.

Off. *Aquilegia*, sive *Aquilina*.

Loc. Ubique in montanis, & etiam alpinis ad sylvas, & irrigua umbrosa frequens. *PERENNIS*.

VIR. *AQUILEGIÆ* semina laudata sunt in ictero, & ad variolas propellendas. Radix ad calculum pellendum; herba ipsa habita est pro amiscorbutico, & florum tinctura commendata in gingivarum laxitate. Fateor autem omnino mihi suspectam plantam esse ex affinium plantarum venenata qualitate, neque principia illa videre, ex quibus hasce utilitates liceat augurari.

1508. *AQUILEGIA* *alpina* *tab.* 66.

Icon. TAUR. *Vol. IV.* *tab.* 1. & *Vol. XV.* *tab.* 15.

Aquilegia foliis trilobatis tripartitis linearibus, caule paucifloro. HALL. *hist. tam.* 2. n. 1196.

Aquilegia nectaris recis, petalo lanceolata brevioribus. LINN. *spec.* p. 752.

Aquilegia montana magno flore. BAUH. *pin. prodr.* 75. *hist. tom.* III. p. 484. *TOURN.* *inst.* 428.

Loc. Nascitur in umbrosis, & humidis montis *Cenisii*, & *Pralugnan*, alpinis di *Lemje*, in monte *Rosa*, atque supra *Fenestrellas*. *PERENNIS*.

DESCR. Color floris caeruleus. Apices petalorum ex luteo virent. Nectariorum cornu incurvum. Petala ex ovatis lanceolata. Antherae lineares, fusco-virides, bisulcatae sulco lutescente. Germina quinque. Styli quinque stigmatibus incurvis. Nectariorum anterior pars dilutius caerulea est. Petalorum ungues inius albescentes, extus caerulei inter nectaria, atque infra eadem nascuntur. Stamina ampla, & crassa basi ex receptaculo infra embryonem nascuntur filiformia. Germina subhirsuta. Petala una tertia parte cornu nectariorum superant, si considerentur integra nectaria, & petala fere ejusdem longitudinis sunt. In utraque *AQUILEGIA* petioli, & adversa foliorum facies laeviter subhirsuta. Folia *AQUILEGIAE* alpinæ tenera, longe minora: foliola in vulgari trifida, in alpino vero ternata, sive unum sessilium pinnatorum foliorum par habent cum impare petiolato; impar folium trifidum est, medio segmento iterum trifido, lateralibus bifidis medio segmento, & lateralium superiorum iterum trifido, sive tridentato: pinnatorum foliolorum forma eadem, sed tantum bifida sunt, dentes omnes subrotundi. In *AQUILEGIA* vulgari petioli bis trifidi, foliis omnibus petiolatis: in alpina tandem folia lateralibus sessilia non petiolata, foliola profundius secta.

NIGELLA. LINN. *gen. n.* 606. *syst. n.* 685. *TOURN. tab.* 134.

Corolla pentapetala, aequalis, plana; nectaria octo bilabiata intra corollam. Stamina plurima. Styli quinque, sive decem. Capsulae quinque, s. decem connexae.

1509 *NIGELLA* damascena.

Icon. TAUR. Vol. IV. tab. 27.

Nigella flaribus involuero foliata cincta. LINN. *spec. p.* 753.

Nigella flore foliis nidulata. CRANTZ. *fasc. 2. ed. 2. p.* 133.

Nigella caerulea. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 312.

Nigella angustifolia flore majore simplici coerulea. BAUH. *pin.* 145.

Melanthium sylvestre. MATTH. & LOB. *ic.* 471.

Loc. Agri Nicaeensis familiaris planta est, quam tamen in arvis collium *Tourinensium* etiam legit Cl. *BELLARDI. ANNUA.*

1510. *NIGELLA* arvensis.

Icon. TAUR. Vol. XXVII: tab. 96.

Nigella pusillus quintis, petalis integris, capsulis turbinatis. LINN. *spec. p.* 753.

Nigella flore nudo, siliquarum cornubus longissimis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1194.

Nigella flore foliis nuda. CRANTZ. *fasc. 2. ed. 2. p.* 132.

Nigella arvensis cornuta. BAUH. *pin.* 145. *GARID. aix. tab.* 69.

Melanthium selvasica secundo. MATTH.

Off. *Melanthium sylvestre*, s. *Nigella sylvestris.*

Loc. In agris sterilibus provinciae *Alexandrinae*, & *Dertonensis* frequens; lecta etiam est in agro *Taurinensi. ANNUA.*

Vin. Semina *NIGELLÆ arvensis* inutilia prorsus sunt, neque habent eam aromaticam gratiam, quam habent semina *NIGELLÆ sativæ* olim pro ciborum condimento adhibita, & laudata ad urinam pellendam: sed haec etiam exsoleta nostris temporibus sunt, quum omni visulentia carere non judicentur.

HELLEBORUS. LINN. *gen. n.* 622. *syst. n.* 702. *TOURN. tab.* 144.

Corolla pentapetala, aequalis, persistens; nectaria plura bilabiata intra corollam. Stamina plurima. Capsulae plures rectiusculae, distinctae, polyspermae.

1511 *HELLEBORUS* hyemalis.

Helleborus flare folio insidente. LINN. *spec. p.* 783. *HALL. hist. tom. 2. n.* 1191.

JACQ. Fl. Austr. tab. 202.

Helleborus ranunculoides praecox flare luteo. MORIS, *ox. tab.* 11. *sect. 12. tab.* 2. *f.* 4.

Acanthium hyemale. CAM. *epit.* 818.

ALLIONI Fl. Pedem. Tom. II.

R

Aconitum unifolium bulbosum. BAUH. pin. 193. GARID. aix. tab. 3.

Loc. In collibus *Taurinensibus* prope *Eremum*. Copiosissime nascitur in vinetis, & collibus *Montisregalensis* provinciae, & *Liguriae*. *PERENNIS*.

1512. *HELLEBORUS niger.*

Helleborus scapo subdifloro subnudo, foliis pedatis. LINN. *lyst.* 12. p. 381.

Helleborus nectariis obsculatis, filamentis staminum duplo brevioribus. SCOP. *Fl. Cern.*

356. n. 2. ed. 2. n. 696.

JACQ. *Fl. Austr.* tab. 301.

Helleborus foliis pedatis, flore roseo. CRANTZ. *fasc. II.* p. 122. ed. 2. p. 133.

Helleborus niger. LON. *adv.* p. 304.

Helleborus niger legitimus. CLUS. *hist.* p. 275.

Elleboro nero. MATTH.

Off. *Helleborus niger legitimus.*

Loc. In valle *Augustae Praetoriae*, & ad *Jovis* montis fastigia provenire adnotavit LOBELIUS. In *Montisferrati* collibus, & *Nicaeae* frigidioribus montibus reperitur. *PERENNIS*.

Vir. Hic est verus *HELLEBORUS niger* officinarum. Ab Antiquis adhibitus *HELLEBORUS niger* alia planta est, observante *Cl. TOURNEFORT*, qui locum natalem *HELLEBORI* antiquorum perlustravit. Duae aliae species cum nigro viribus convenientes apud nos crescunt in Europa frequentes, quae sunt *HELLEBORUS viridis*, & *foetidus*. Credibile etiam est diversos effectuum gradus, qui *HELLEBORI nigri* exhibitionem variis in regionibus sunt consecuti, non modo diversae praeparationi, sed & dissimili speciei *HELLEBORI* insumti tribuendus esse. *Viridis* potentius agit, quam *niger*: omnium actuosissimus est *foetidus*, atque illum propter summam, quam habet, violentiam non sine ratione Medici pertimescunt. Similia principia habent hujusmodi species, atque haec per universam plantam diffusa sunt. Soler autem in usum medicinalem recipi radix. Extrus applicita *HELLEBORINA* substantia cutim rubefacit, naribus attractus pulvis sternutationem vehementissimam ciert, odor ipse *HELLEBORI foetidi* virulentus est, caput male afficit, atque erithinus est. Folia, aut radix degustata saporem nauseosum, & amarum gignunt, linguae ardoris sensum imprimunt, ea veluti stupore prehensa: spasmodici etiam nervorum motus per eorundem communicationem excitantur. Intus vero incaute assumpta sine convenienti praeparatione *HELLEBORINA* substantia in stomacho dolorem excitat, vomitum, anxietatem, pulsus debilitatem, extremorum perfrigerationem, balbutiem, mentis alienationem, convulsiones, ac ipsam etiam mortem affert. Caeterum non modo vomitum producit, verum etiam cum magnis torminibus potenter alvum movet. Haec autem phenomena ostendunt *HELLEBORUM nigrum* particulas habere summe acres, & deleterias, quae statim ventriculum, atque intestina vehementer lacerant, adeoque hasce sensibiles partes afficiunt, ut nervi in spasmodicos motus conjiciantur, solidaeque ipsae partes vulnerentur. Vis posita est in principio gummoso, & resinoso: postremum in minori copia est. Utraque arcte adeo inter se cohaerent, sed aqua ipsa acris principia extrahere potest; volatiles porro particulae acerrimae eae sunt, ex quibus proficiscitur praesertim vis deleteria; hisce particulis spoliatus *HELLEBORUS niger* longe minus actuosus redditur quoad vim deleteriam: aptas tamen vires adhuc retinet ad vomitum, & alvum movendam. Si parca dosi exhibitus sanguinis vias subeat, agit tamquam efficax deobstruens, & aperiens, viscidos humores potenter solvens, atque specifica quadam vi ad hepar deductus ejusdem vasa expedit, crassamque bilem urger ad inersin: ea propter a veteribus habitus est inter purgantia maxime opportuna ad humores atro-bilares evacuandos. Ab omni antiquitate laudatus est in mania, speciatim illa, quae ab atra bile originem suam habet, diciturque juvare non modo viscera imi ventris expediendo, verum etiam resides in cerebro humores solvendo, atque ad circuitum propellendo. Juvat etiam *HELLEBORUS* in mensium suppressione consumaci nata ex viscida, tenacique pituita, in viscerum imi ventris infartibus, in asthmate humido, leucophlegmatia, & hydropse ex simili cau-

sa progenitis; ego ipse vidi epilepsiam HELLEBORO nigro sanata. Hujusce radix (cujus flos alendus etiam setaceis inservire efficaciter possunt) in substatia datur a granis decem ad grana triginta; in infuso autem a drachma semisse ad drachmam unam, similisque fere est dosis foliorum ejusdem: violenti autem effectus, qui talem usum HELLEBORI nigri sunt consecuti, fecerunt, ut prudentiores Medici consueverint deinde in usum deducere extractum ex radice paratum, quod exhibere solent a granis quinque ad grana duodecim. Hoc autem ea ratione parant repetita infusione, & evaporatione, ut fiat deperditio volatiliū virulentarum particularum. Celebres nostris temporibus pilulae tonicae CL. BACHER pro basi habent extractum HELLEBORI nigri, probataeque efficaciae sunt in iis morbis, in quibus HELLEBORUM nigrum commendavimus. Licet propter diligentem praeparationem, atque castigatam dosim confiderent unque adhiberi illae possint, attamen & suas cautelas exposulant: neque similia valida medicamenta danda sunt iis, quibus viscera laesa sunt, aut metus est humoris in abscessum ituri, aut si agatur de homine maxime sensibili, cujus nervi facile convellantur. Opportunum etiam erit exigua primum dosi HELLEBORUM nigrum experiri, eamque sensim sine sensu pro aegrorum tolerantia adaugere.

1513. HELLEBORUS viridis.

Icon. TAUR. Vol. IV. tab. 80.

Helleborus caule multifloro folioso, foliis digitatis. LINN. spec. p. 784.

Helleborus foliis multipartitis serratis, caule paucifloro. HALL. hist. tom. 2. n. 1192.

Helleborus foliis digitatis, flore viridi. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 134.

Helleborus nectariis obconicis, filamentis staminum triplo brevioribus. SCOP. Fl. Carn. p. 556. n. 1. ed. 2. n. 697.

JACQ. Fl. Austr. tab. 106.

Helleborus niger hortensis flore viridi. BAUH. pin. 185. GARID. aix. tab. 46.

Veratrum nigrum alterum. DOD. pempt. 385.

Helleborus niger vulgaris flore viridi, vel herbaceo, radice diuturna. BAUH. hist. III. p. 636.

Elleboro nero seconda. MATTH.

Loc. Ad radices montium Tourinensium in sylvis, & alibi frequens. PARENTH.

1514. HELLEBORUS foetidus.

Icon. TAUR. Vol. IV. tab. 81.

Helleborus caule multifloro folioso foliis pedatis. LINN. spec. p. 784.

Helleborus caule ramoso multifloro, foliis multipartitis serratis, stipulis ovato-lanceolatis coloratis. HALL. hist. tom. 2. n. 1193.

Helleborus niger foetidus. BAUH. pin. 185. GARID. aix. tab. 48.

Helleborus niger sylvestris adulterinus hyeme florens. BAUH. hist. III. p. 880.

Veratrum nigrum. DOD. pempt. 386.

Loc. Abunde ad vias, & lapidosa in tota valle Sturae Cuneensis. TERRANEUS in valle Tanari. In valle Augustae Praetoriae frequens est; neque in aliis vallibus calidioribus alpium desideratur. Etiam in collibus Tourinensibus supra la Madonna del Pilone legit Cl. BELLARDI. PARENTH.

CALTHA. LINN. gen. n. 623. syst. n. 703. TOURN. tab. 145.

Corolla pentapetala, patens, decidua. Stamina plurima: nectaria nulla: germina quinque ad decem. Capsulae totidem bicarinatae, polyspermae.

1515. CALTHA palustris. LINN. spec. p. 784. HALL. hist. tom. 2. n. 1188.

Icon. TAUR. Vol. IV. tab. 82.

Caltha palustris, Caltha omnium. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 136.

Populago palustris. SCOP. Fl. Carn. 1. p. 404. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 323.

Caltha palustris flore simplici. BAUH. pin. 276.

Caltha palustris. BAUH. hist. III. p. 470.

Populago flore majore. TOURN. inst. 273.

Loc. Ad fontium scanutignes, & rivulos fluentium aquarum in montanis. *PERENNIS*.
Viz. Acrimonia caustica Ranunculis proxima plania suspecta est.

2. CALYCE MONOPHYLLO.

SAXIFRAGA. LINN. *gen. n.* 494. *yst. n.* 334. *TOURN. tab.* 129.

Calyx quinquefidus persistens. Sramina decem. Styli duo. Capsula unilocularis, birostris, polysperma.

FOLIIS INDIVISIS, CAULE SUBNUDO.

1516 *SAXIFRAGA* Aizoon. JACQ. *Fl. Austr. tab.* 438.

Saxifraga foliorum ora cartilaginea serrata, petalis paucifloris, petalis punctatis. HALL. *hist. helv. num.* 978.

Saxifraga foliis radicalibus in orbem positis serratis cartilagineis. LINN. *Fl. Lapp. p.* 140. *tab. 2. f. 2.*

Saxifraga sedifolio angustiore serrato. TOURN. *ins. 252.* SEG. *ver. 1. p.* 448. *tab. 9. f. 1.*

Aizoon serratum. CORD. *hist. p.* 92.

Cotyledon minor foliis oblongis serratis. BAUH. *pin. 285. prodr. 133.*

Cotyledon media foliis oblongis serratis. BAUH. *pin. 285.*

Sedum serratum. BAUH. *hist. p. 3. p.* 689.

n. Saxifraga foliis subrotundis serratis. TOURN. *ins. 252.*

Cotyledon minor foliis subrotundis serratis. BAUH. *pin. 285.*

Cotyledon minus sedifolio montana. LOB. *adv. p.* 165.

Loc. Ad rupes alpinas, & montanas ubique. *PERENNIS*.

1517. *SAXIFRAGA* Cotyledon N.

Saxifraga foliorum ora cartilaginea, caule triplicato ramosa, petalis immaculatis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 977.

Saxifraga sedifolio, flore alba multiflora. TOURN. *ins. 252.*

Sedum serratum, flore alba multiflorum. DOD. *pempt. 1163.*

Loc. In rupibus Augustae Praetoriae prope la Sala positis, & in valle Siaræ loco dicto le Barricade. *PERENNIS*.

Obs. Accurate hanc plantam descripsit HALLERUS. Pro varietate superioris habet LINNÆUS, sed mihi distincta species videntur ramis repetito ramosis, petalis immaculatis longioribus, foliis mollioribus, & versus suam originem magis contractis, atque loco natali: in horto culta suum diversum habitum conservavit.

1518. *SAXIFRAGA* mutata.

Saxifraga foliorum ora cartilaginea rarissime dentata, petalis maculosis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 979. *tab. 16.* & SEGU. *tom. 3. p.* 199.

Saxifraga foliis radicalibus aggregatis lingularis cartilagineo-serratis, caule racemosa foliosa. LINN. *spec. p.* 370.

Geum alpinum majus viscarum hirsutum, foliis oblongo-rotundis atro-rubentibus, & croceis floribus. SCHEUCHZ. *it. 2. p.* 134.

Loc. Thomas PRIM legit in alpidibus di Fenearelle. *PERENNIS*.

1519. *SAXIFRAGA* androsacea.

Icon. *TAUR. Vol. XII. tab. 93. f. 4.*

Saxifraga foliis hirsutis ellipticis, & triidentatis, caule paucifloro. HALL. *hist. tom. 1. n.* 984.

Saxifraga foliis lanceolatis obtusis pilosis, caule nudo bifloro. LINN. *spec. p.* 371.

JACQ. *fl. austr. tab.* 389.

Saxifraga pyrenaica. SCOP. *fl. carn. ed. 2. n.* 498.

Saxifraga foliis lanceolatis obtusis pilosis, caule subbiflora. GER. *p. 413. n.* 7.

Saxifraga alpina habitu androsacea villasa. HALL. *comm. Norimb. 1706. tab. 1. f. 3.*

Loc. In summis saxosis jugis nive deliquescente irriguis, uti Col du Pis, Albergion, Col de l'Orsera, le Vailon, la Turraz, in monte Ceniso, Assiette. *PERENNIS*.
 Oss. Cauliculus non modo biflorus, sed etiam triflorus, aut 4florus est. Folia saepius bidentata, sed & tridentata, aut quadridentata occurrunt.

1520. SAXIFRAGA cuneifolia.

Saxifraga foliis cuneiformibus obtusissimis repandis, caule nudo paniculato. LINN. spec.

p. 574.

Saxifraga foliis petiolatis obtusis, caule fragili nudo ramoso. HALL. hist. tom. 1. n. 974.

Geum foliis cuneiformibus, obtusis, coule paniculato nudo. GER. p. 424. n. 2.

Saxifraga cuneifolia. SCOP. fl. carn. ed. 2. p. 291. tab. 13. f. 1.

Geum folio subrotundo minimo. TOURN. inst. 251.

Cotyledon altera olim. MATTH. BAUH. hist. III. p. 684.

Loc. Locis alpinis, & subalpinis, umbrosis, subhumidis ad rupes, & etiam extra rupes passim occurrat. Uberrime inter Maremma, & Fontana moro, alpe di Grifon, supra Giaveno, atque in vallibus di Feneustrelles, Locana, & Aosta. *PERENNIS*.

1521. SAXIFRAGA stellaris.

Icon. TAUR. Vol. VIII. tab. 15. f. 2. 3.

Saxifraga foliis serratis caule nudo ramoso, petalis acuminatis. LINN. spec. p. 572.

Saxifraga foliis rhomboideis acute serratis, caule nudo ramoso. HALL. hist. tom. 1. n.

973.

Saxifraga stellaris. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 292. tab. 13. f. 2.

Saxifraga Clusii. GOV. illustr. p. 28.

Geum palustre minus foliis oblongis crenatis. TOURN. inst. 252.

Saniculae alpinae aliquatenus affinis. BAUH. hist. III. p. 708.

Loc. Incolit irrigua, & spongiosa summorum alpium; abunde circa lacum montis Cenisi, & thermas Valderionas. *PERENNIS*.

1522. SAXIFRAGA caesia.

Icon. TAUR. Vol. XII. tab. 93. f. 5. 11. 12.

Saxifraga foliis linearibus perforato-punctatis aggregatis recurvatis, caule multifloro.

LINN. syst. 12. p. 303.

Saxifraga foliis crassis duris recurvis subus sulcatis, basi ciliatis. HALL. hist. tom. 1. n. 982.

JACQ. Fl. Austr. tab. 374.

Saxifraga caesia. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 294. tab. 13. ic. n. 945.

Saxifraga alpina minima foliis caesis deorsum incurvis. TOURN. inst. 253. SEGU. Ver.

449. cum icon.

Sedum minus IX. alpinum III. CLUS. hist. 2. p. 61.

Loc. Ad rupes alpium frequens, nascitur locis apricis, & vento perflatis. *PERENNIS*.

1523. SAXIFRAGA bryoides.

Icon. TAUR. Vol. XII. tab. 93. f. 14.

Saxifraga foliis ciliatis inflexis imbricatis, coule nudiusculo unifloro. LINN. spec. p. 572.

Saxifraga foliis lanceolatis ciliatis compactis, coule unifloro. HALL. hist. tom. 1. n. 969.

Saxifraga bryoides. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 295. tab. 13. ic. 497.

Saxifraga pyrenoica minima lutea musco similis. TOURN. inst. 253.

Sedum muscosum. BAUH. hist. III. p. 693.

Loc. In summis nivosis jugis alpium Feneustrellarum, & Sovine versus parvum montem Cenisium: etiam in monte Rosa, & Silvio, inque editissimo jugo l'Auaret. *PERENNIS*.

FOLIIS INDIVISIS, CAULE FOLIOSO.

1524. SAXIFRAGA aspera.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 54. 55. f. 2. & Vol. X. tab. 33. f. 5.

Saxifraga foliis coulinis lanceolatis, alternis ciliatis, caulibus procumbentibus. LINN. syn. 12. p. 304.

Saxifraga foliis duris ciliatis, caule romoso paucifloro. HALL. hist. tom. 1. n. 970. JACQ. Fl. Austr. opp. tab. 31.

Saxifraga foliis linearibus ciliatis, caulibus procumbentibus. GER. p. 423. n. 6.

Saxifraga sedi foliis crenatis aspera. TOURN. inst. 252.

Sedum alpinum hispidum fere spinosum, flore pallido. BAUM. hist. III. p. 695.

Loc. In saxosis irriguis alpinum nostrarum frequens. PERENNIS.

1525. SAXIFRAGA autumnalis.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 52. fig. 6.

Saxifraga foliis coulinis linearibus alternis ciliatis, radicalibus aggregatis. LINN. spec. p. 575.

Saxifraga foliis ellipticis ciliatis, caule simpliciter folioso paucifloro. HALL. hist. tom. 1. n. 971.

Saxifraga autumnalis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 293. tab. 14. n. 493.

Saxifraga angustifolia autumnalis flore luteo guttato, foliis florum magis obovatis. BREYN. cem. 106. tab. 48.

Loc. Ubique ad irrigua precipue. PERENNIS.

1526. SAXIFRAGA aizoides.

Saxifraga foliis caulinis linearibus subulatis sparsis nudis intermixtis, caulibus decumbentibus. LINN. spec. p. 576.

Sedum alpinum flore pallido. BAUM. pin. 284. MORIS. hist. 3. p. 477. t. 12. tab. 6. f. 3.

Loc. Inter stirpes habeo lectas in alpidibus Cottiæ. Cl. BELLARDI inter Ussey, & le Auares. PERENNIS.

1527. SAXIFRAGA hirculus.

Saxifraga foliis caulinis lanceolatis alternis nudis intermixtis, caule erecto. LINN. spec. p. 576.

Saxifraga foliis ellipticis caule unifloro. HALL. hist. tom. 1. n. 972. tab. 11.

Saxifraga flava. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 529.

Chamoecitus friscus foliis Nardi celucæ. BAUM. pin. 466.

Loc. Thomas PRIM communicavit inventam in alpe Albergian. PERENNIS.

1528. SAXIFRAGA muscoides N. tab. 61. fig. 2.

Icon. TAUR. Vol. XII. tab. 93. f. 13.

Saxifraga foliis mollioribus ellipticis subhirsutis, caule paucifloro. HALL. hist. tom. 1. n. 985. Misc. TAUR. tom. 5. p. 87. n. 117.

Saxifraga (trichoides). SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 295. n. 496. tab. 15.

Saxifraga alpina minimo, foliis lingulatis in orbem circumortis, flore ochroleuco. SEGU. veron. p. 450. tab. 9. f. 3.

Loc. In jugo Autorei versus la Verola locis umbris irriguis ex nive deliquescente, atque in monte Cenisio. PERENNIS.

Obs. Consulat lector descriptionem, quam dedit Celeberrimus HALLERUS. Foliis integerrimis oblongo-ovatis, teneris, dilute-viridibus, cauliculis simplicibus, floribusque exiguis ex luteo-viridibus, atque totius plantae teneritudine a reliquis speciebus facile dignoscitur. Nostræ, & Hallerianæ folia acuminata non sunt, sicut exhibet icon a præstantissimo SCOPOLI data.

1529. SAXIFRAGA oppositifolia. tab. 21. fig. 3.

Icon. TAUR. Vol. XII. tab. 93. f. 6.

Saxifraga caule reptante, foliis quadrifariam imbricatis cartilagineis ciliatis. HALL. hist. tom. 1. n. 980.

Saxifraga foliis caulinis ovatis oppositis imbricatis, summis ciliatis. LINN. spec. p. 373. tab. 21. fig. 3.

Saxifraga alpina ericoides flore caeruleo. TOURN. inst. 253.

Sedum alpinum ericoides caeruleum. BAUH. pin. 132.

Loc. Ad summas glaciales rupes alpium *Valdensium*, & montis *Cenisii* ubique. *PERENNIS.*

DESCR. Folia ciliata obscura, aequaliter fere confecta, tum in ramis, cum in caulibus erecta, minus, quam in purpurea, acuminata, & vix reflexa. Calyx non ita patens. Stamina, & tubae aequalis longitudinis, sed petalis paullo breviora: antherae trigonae, obscurae. Petala lineata, ovalia.

1530. *SAXIFRAGA biflora.* tab. 21. fig. 1.

ICON. TAUR. Vol. X. tab. 33. fig. 7.

Saxifraga foliis imbricatis ovatis, caulibus reptantibus bifloris. HALL. hist. n. 981. Misc. TAUR. tom. 5. p. 86.

Loc. In editioribus scopulis alpium, quae a monte *Cenisio* ad *Helvetios*, atque in *Sabaudiam* producuntur. Varietas flore albo occurrit in editissimo jugo *la Vanoise*, foliisque calvis instructa. *PERENNIS.*

DESCR. Adinstar *SAXIFRAE oppositifoliae* ex una radice saxorum rimas penetrante, cespitem cauliculorum filiformium facit, qui varie, & dense ramosi sunt. Juxta cauliculorum longitudinem dense positae oriuntur foliorum rosulae, ex quibus cauliculus, aut ramus, si velis, erigitur uncialis, uniflorus, aut biflorus. Flos magnus, pulchre roseus, petalis ovato-acutis duplo, & ultra calyce amplexibus. Stylus duo flori aequales. Stamina decem embryone vix altiora, purpurea. Folia hirsuta sunt, pilis ciliata, sessilia, ovata, non reflexa, obscura, in ramis florigeris etiam alterna. Tota insuper planta multam visciditatem plerumque solet habere.

1531. *SAXIFRAGA purpurea* N. tab. 21. f. 2.

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 93. f. 9.

Saxifraga caule reptante, foliis quadrifariam imbricatis acutis glabris. Misc. TAUR. tom. 5. p. 86.

Saxifraga alpina ericoides flore purpurascens. TOURN. inst.

Saxifraga retusa. GOU. illustr. p. 28. tab. 17. f. 1.

Loc. In summis scopulosis jugis alpium frequens, sed ubetius in alpiis *Couis.* *PERENNIS.*

DESCR. Calyx expansus, uti etiam flos. Stamina, & tubae aequalis altitudinis, flore altiores; antherae trigonae, luteo-virescentes. Folia acuminata, reflexa, glabra, ad oras versus basim aliquando ciliata, in caulibus dense congesta, & dense imbricata, in ramis florigeris conjugata, & rara.

1532. *SAXIFRAGA rotundifolia.*

ICON. TAUR. Vol. VIII. tab. 15. f. 1.

Saxifraga foliis caulinis reniformibus dentatis petiolatis, caule paniculato. LINN. spec. p. 376.

Saxifraga foliis reniformibus acute serratis hirsutis petiolatis, caule ramoso. HALL. hist. tom. 1. n. 975.

Geum rotundifolium majus. TOURN. inst. 251.

Sanicula montana rotundifolia major. BAUH. pin. 243.

Sanicula alpina guttata. BAUH. hist. III. p. 707.

Loc. Ad umbras irriguas rupes alpium ubique; in convallibus etiam montanis frequentissima. *PERENNIS.*

1533. *SAXIFRAGA granulata.*

Saxifraga foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. LINN. spec. p. 376.

Saxifraga foliis radicalibus reniformibus obtuse dentatis, caulinis palmatis. HALL. hist. tam. 1. n. 976.

Saxifraga foliis inferioribus subrenatis, caulinis sessilibus subpalmatis. NEKER. tom. 1. p. 191.

Saxifraga rotundifolia alba. BAUH. pin. 309.

Saxifraga alba radice granulosa. BAUH. hist. 3. p. 706.

Saxifraga IV. MATTH.

Loc. Locis rupestribus Comitatus Nicaensis. PERENNIS.

FOLIIS LOBATIS

1534. SAXIFRAGA bulbifera.

Saxifraga foliis palmato-lobatis, caulinis sessilibus, caule romoso bulbifero. LINN. syst. 12. p. 304.

Saxifraga ad folia bulbos gerens. BAUH. pin. 309.

Saxifraga bulbosa altera bulbifera monona. COL. ecphr. 1. p. 318. tab. 317.

Loc. In pascuis saxosis apricis agri Pedemoniani. PERENNIS.

1535. SAXIFRAGA tridactylites.

Saxifraga foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecta ramoso. LINN. spec. p. 578.

Saxifraga foliis petiolatis trilobatis, caule erecta ramoso, & foliosa. HALL. hist. tam. 1. n. 986.

Saxifraga foliis radicalibus tri-quadrilobis: caulinis alternis subcuneatis inaequalibus. NEKER. tam. 1. p. 191.

Saxifraga verna annua humilior. Tourn. inst. 232.

Sedum tridactylites sectarum. BAUH. pin. 289.

Sedum tridactylites sectarum flore albo. BAUH. hist. III. p. 762.

Loc. Ubique primo vere in arvis, & pascuis siccis. ANNUA.

1536. SAXIFRAGA Bellardi f. tab. 88. f. 1.

Saxifraga oculis foliis cuneiformibus, trilobis, & quinquelobis.

Loc. In scopulosis humidis muscosis secus rivulum vulgo dictum *Armel* in alpihus di *Useglio* inter *la Marcioussâ*, & *le Autaret* Cl. BELLARDI. PERENNIS.

DESCR. Ex radice fibrosa cespites rosularum proveniunt; folia autem, quae hirsuta, non linearia sunt, obscure virent, cuneiformia, modo triloba, modo quinqueloba, lobo intermedio majori, & obtusiusculo. Ex centro rosularum flos plerumque unicus, raro duo, aut tres oriuntur: hi sessiles sunt petalis ellipticis albissimis instructi.

1537. SAXIFRAGA adscendens tab. 22. fig. 3.

Icon. TAUR. Val. XII. tab. 93. f. 8.

Saxifraga foliis caulinis cuneiformibus apice dentatis, caule adscendente subvillato. LINN. spec. p. 379.

Saxifraga foliis palmatis, caule dense foliato, & florifero. SPEC. PEDEM. p. 17. tab. 3. fig. 1.

Saxifraga caule foliosa multiflora, foliis palmatis hirsutis. HALL. hist. tom. 1. n. 987.

Saxifraga (Scopolii) foliis inferioribus integris; caulinis trifidis; caule suberecta. VILL. prap. p. 47.

Sedum tridactylites alpinum majus 3. BAUH. prodr. 131.

Saxifraga pyrenaica tridactylites laisfalina. Tourn. inst. p. 253.

Loc. Ad rupes aqua madentes in alpihus di *Fenearelles*, non tamen in summis jugis, occurrit. Prope *Oulx* loco dicto *Praman* reperit *Ignatius* MOLINERI. Cl. BELLARDI supra *Usey* loco dicto *la Marcioussâ*. ANNUA.

1538. SAXIFRAGA hypnoides tab. 21. fig. 4.

Icon. TAUR. Val. XII. tab. 93. f. 1. 12.

Saxifraga foliis petiolatis trifidis, caule subfoliato viscido. HALL. hist. tom. 1. n. 989.

Saxifraga foliis caulinis linearibus integris, trifidisve, stolonibus procumbentibus, caule erecta nudiusculo. LINN. spec. p. 379.

Saxifraga hypnoides. SCOP. fl. carn. ed. 2. p. 296. tab. 16. ic. n. 499.

Sedum tridactylites caule folioso. BAUH. pin. 284.

Sedum affinis trisulca flore albo. BAUH. hist. III. p. 696.

Loc. Omnium frequentissima ad scopulos summorum alpium, atque etiam ad subalpina loca descendit. *PERENNIS.*

1539. *SAXIFRAGA exarata* tab. 88. fig. 2.

Saxifraga foliis palmato-trifidis, superne lineatis hirsutis; caule ascendente multifloro; petalis trinerviis. VILL. prosp. p. 47.

Loc. Ubique in scopulis alpium, praesertim *Cottiarum*, frequentissima. *PERENNIS.*

DESCR. Haec *SAXIFRAGA hypnoides* proxima est, sed differt caule humiliori, foliis brevius lingulatis, saepius quinqueidentatis, nervoso-lineatis. Ad radicem nempe de more gentis folia plura rosulam faciunt cuneiformia, sensim dilatata, nervis in utraque facie exarata, sine vero trifido, saepius quinquefido. Folia modo longius, modo brevius producta ad sui originem dentes obtusos, aut etiam acutiusculos habent. Folia parum hirsuta sunt. Caules rubentes, viscosi, hirsuti, & ramosi, etiam foliosi. Folia caulina plerumque simplicia, integerrima. Rami, sive pedunculi foliosi, aut nudi foliolum habent ad ipsorum originem subiectum. Florum color pallide sulphureus est, petalis ellipticis lineatis calyce majoribus.

1540. *SAXIFRAGA pedemontana* N. tab. 21. fig. 5. & 6.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 33. f. 8.

Saxifraga caule erecta subnudo, foliis trilobis, & tridentatis, caulinis palmatis.

Loc. Abunde in alpiibus di *Vià*, & *Lanze* e summorum rupium fissuris; similiter provenit in editis jugis di *Tenda*, & *Limane*; legi etiam supra thermas *Valderii*. *PERENNIS.*

DESCR. Ad radicem haec habet rosulam foliorum, quae ex angusto principio triangulariter amplificatur, & in tres lineares lobos profunde secantur, qui lobi tridentati sunt, raro quadridentati. Caulis inter ea erigitur folio uno circa medium donatus, quod manus instar in quinque lobos dividitur. Umbellatim quasi flores ex summo caule nascuntur, ad pedunculorum ortum quinquedigitum, aut tridigitum foliolo opposito. Suo singuli flores nuntur pedunculo ter floribus longiore, & nudo. Flos albus, patens, petalis ex ungue ovariis etiam ellipticis, calyce duplo longioribus. Calyx tubulatus, profunde sectus in lacinias lanceolatas. Stamina cum antheris luteo-virentibus, calyce non altiora. Tota planta viscida, & hirsuta est. Circa thermas *Valderii* eadem planta aliam faciem induit, quemadmodum exhibet tab. 21. fig. 5., atque folia minime gerit profunde trifida, sed potius quinqueloba, lobo medio saepe bifido, aut trifido, atque petala alba ad unguem rosea sunt.

1541. *SAXIFRAGA caespitosa.*

Icon. TAUR. Val. XII. tab. 93. f. 2. 3.

Saxifraga foliis radicalibus aggregatis linearibus integris, trifidisque, caule erecta subnuda subbiflora. LINN. syst. 12. p. 305.

Saxifraga foliis integris, & trifidis, caule subnudo pauciflora. HALL. hist. tom. 1. n. 988.

Saxifraga caespitosa. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 294. tab. 14. ic. 494.

SEGU. Veran. tab. IX. f. 4.

Sedum tridactylites alpinum minus. BAUH. prodr. 131.

Tridactylites alpina. BAUH. hist. III. p. 762.

Loc. Nihil frequentius in scopulis summorum alpium. *PERENNIS.*

AGRIMONIA. LINN. *gen.* n. 534. *yst.* n. 607. *TOURN. tab.* 155.

Duae squamæ ovato-lanceolæræ sub germine. Conicum istud aculeis superne tectum lap-
pæis ex apice profert calycem quinquedentatum, & ex intervallis quinque petala ellip-
tica. Germen operculo balsamico tegitur: ex eo duæ subæ repandæ. Scamina decem,
tamen etiam duodecim. In fructu duo loculi, & totidem semina, quorum alterum sæpe
abortit.

1542 **AGRIMONIA** eupatoria.

Agrimonia foliis caulinis pinnatis, impari petiolato, fructibus hispidis. LINN. *spec.* p. 643.

Agrimonia foliis pinnatis, pinnulis alterne minimis. HALL. *hist. tom.* 1. n. 991.

Agrimonia officinarum. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 477.

Eupatorium veterum, s. *Agrimonia.* BAUH. *pin.* 321.

Agrimonia, seu Eupatorium. BAUH. *hist. II.* p. 398.

Eupatorio. MATTH.

Off. *Eupatorium veterum*, s. *Agrimonia.*

VERN. *Agrimonia.*

Loc. Ad vias, prata sicca, adque oras sylvarum ubique frequens. *PERENNIS.*

VIR. Adstringens, & ionica planta est in viscerum debilitate utilis.

DIANTHUS. LINN. *gen.* n. 500. *yst.* n. 560. *TOURN. tab.* 174.

Calyx cylindricus, persistens, quinquedentatus, squamis quatuor, ad basim cinctus.

Scamini decem. Styli duo. Capsula unilocularis, cylindrica,
apice dehiscens, polysperma.

FLORIBUS AGGREGATIS

1543 **DIANTHUS** barbatus.

Icon. TAUR. Vol. XIV. tab. 5. & 6.

*Dianthus floribus aggregatis fasciculatis: squamis calycinis ovato-subulatis tubum æquan-
tibus, foliis lanceolatis.* LINN. *spec.* p. 586.

Tunica barbato. SCOP. *Fl. Carn. ed.* 2. n. 502.

Caryophyllus hortensis barbatus latifolius. BAUH. *pin.* 208.

Loc. Nascitur in valle Fenestellarum. *PERENNIS.*

1544 **DIANTHUS** Carthusianorum.

Icon. TAUR. Vol. XI. tab. 67. & *Vol. XX. tab.* 21.

*Dianthus floribus aggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubum subæquantibus,
foliis trinerviis.* LINN. *yst.* 12. p. 307.

Tunico fasciculis trifloris ramos terminantibus, stipulis oristosis maximis. HALL. *hist. tom.* 1. n. 899.

Tunica Carthusianorum. SCOP. *Fl. Carn. ed.* 2. n. 504.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius. BAUH. *pin.* 209.

Caryophyllus montanus primus. TABERN. p. 287.

Loc. In pascuis collium sicciorum, atque etiam in montibus sæpe obviam venit: *PERENNIS.*

DESC. Folia ad nodos connata, non tamen vaginantia. Serius floret: flos major,
quam in atrorubente. Lamina petalorum numerosis subæqualibus demibus incisa,
Calycis squamæ duorum parium: Superiorum squamarum aristæ longitudine
tubi calycis. Corona punctorum nigrorum ad ortum unguium, atque ibi pili ali-
quot, sed albi. Color petalorum dilutior. Flores terminales in duobus ramis a
quatuor ad sex.

1543. DIANTHUS atrorubens N.

Dianthus floribus aggregatis, squamis calycinis ovatis oristosis tubo brevioribus, foliis connatis striatis.

Caryophyllus sylvestris, flore rubro plurimo de summo coule prodeunte. SEGU. Veron. p. 434. tab. 7. fig. 2.

Loc. Loci aridis collinis ad oras sylvarum. PERENNIS.

DESCR. Folia glabra, plana, ex geniculo primum per unciae longitudinem connata, subeus striata, lanceolata, erecta. Capitulum terminale est, quod hac ratione se habet: par foliorum ellipticorum longam aristam emittentium, duos primum utrinque breves pedunculos suscipit: inde adhuc paullisper elata caulis portio similiter tres alios brevissimos proferi, singuli triflori. Similes bracteae calycinas glumas excipiunt. Squamæ calycinae quatuor transparentes, ex albido rubentes, arista brevi fusca instructae. Calyx cylindricus, fuscus, densissime striatus: ungues albi: lamina coccinea, rhombea, paucis, & inaequalibus dentibus secia; duo nimirum utrinque esse solent dentes; extrema lamina brevius demata dentibus duobus, aut tribus. Petala supra paucis pilis nigris erectis instructa. Odor vix ullus. Altitudo bipedalis, aut etiam tripedalis. Haberi nulla ratione potest pro varietate DIANTHI *Curthusionorum*, quemadmodum patet ex utriusque comparata descriptione.

1546. DIANTHUS Armeria.

Icon TAUR. Vol. XIV. tab. 7. f. 1.

Dianthus floribus aggregatis fasciculatis: squamis calycinis lanceolatis villosis, tubum aequantibus. LINN. spec. p. 386.

Tunica floribus umbellatis, squamis calycinis hirsutis mucronatis tubum aequantibus. HALL. hist. tom. 1. n. 900.

Caryophyllus barbatus sylvestris. BAUH. pin. 208. Tourn. inst. 333.

Caryophyllus barbatus. SEGU. Veron. tom. 1. tab. 7. f. 4. p. 437.

Loc. Vulgatissima planta est in argillaceo-sabulosis, sterilibusque torrentium ripis. ANNUUS.

1547. DIANTHUS prolifer.

Dianthus floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis mucicis, tubum superantibus. LINN. spec. p. 387.

Tunico capitulo compacto ovali, calyce universalis quadrifido. HALL. hist. tom. 1. n. 901.

Tunica prolifera. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 503.

Caryophyllus sylvestris prolifer. BAUH. pin. 209. SEGU. Veron. 26. tab. 7. f. 1.

Beitico coronaria squamosa sylvestris. BAUH. hist. III. p. 335.

Loc. Frequens in saxosis declivibus, & pascuis siccis. ANNUUS.

FLORIBUS SOLITARIIS

1548. DIANTHUS Caryophyllus.

Icon TAUR. Vol. VIII. tab. 16. f. 3. 4.

Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. LINN. spec. p. 387.

Tunica ramis unifloris, & bifloris, petalis laevibus, stipulis calycinis brevissimis. HALL. hist. tom. 1. n. 896.

Tunica Caryophyllus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 507.

Dianthus floribus solitariis, petalis crenatis, unguibus triquetris. SCOP. Fl. Carn. p. 507. n. 3.

Caryophyllus sylvestris biflorus. BAUH. prodr. 104. pin. 209.

Loc. In sterilibus montanis ad oras sylvarum non rarus est; frequentior in montibus alpium Cotiarum. PERENNIS.

1549. DIANTHUS virgineus.

Dianthus caule subanifloro, corollis crenatis, squamis calycinis brevissimis, foliis subulatis, LINN. spec. p. 590.

JACQ. Fl. Austr. append. tab. 15.

Tunica virginea, SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 509.

Dianthus rupestris, LAM. Fl. Franc. tab. 11. p. 536.

Caryophyllus sylvestris repens multiflorus, BAUH. pin. 209.

Loc. In pascuis sterilibus, & saxosis frequens est. PERENNIS.

1550 DIANTHUS glaucus

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 10.

Dianthus flaribus subsiliariis, squamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis crenatis, LINN. spec. p. 588.

Tunica ramosior flore candido cum corolla purpurea, DILL. elth. 400. tab. 298. f. 384.

Loc. In collibus Monregalensibus. PERENNIS.

1551. DIANTHUS monspeliacus.

Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 10.

Dianthus flaribus solitariis: squamis calycinis subulatis longitudine tubi, corollis multifidis, caule erecta, LINN. syst. 12. p. 308.

Loc. Pedemonii indigena planta est. PERENNIS.

1552. DIANTHUS plumarius.

Icon. TAUR. Vol. VIII. tab. 17. 18.

Dianthus flaribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis multifidis fauce pubescentibus, LINN. spec. p. 589.

Tunica foliis glaucis patentibus, floribus serratis, in fauce lanuginosis, HALL. hist. rom. 1. n. 897.

Tunica plumaria, SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 505.

Caryophyllus sylvestris V. species altera, CLUS. hist. p. 284.

Loc. Ex montis Cenisii alpinis in hortum adductus est. Frequens in montibus Javennensibus, & Bugellensibus. PERENNIS.

1553. DIANTHUS superbus.

Dianthus flaribus paniculatis, squamis calycinis brevibus acuminatis, corollis multifido-capillaribus, caule erecto, LINN. spec. p. 589. JACQ. obs. 1. p. 40. tab. 25.

Tunica petalis minutissime lacinatis, HALL. hist. rom. 1. n. 898.

Betonica caranaria tenuissime dissecta, sive caryophyllaea superba elatior vulgaris, BAUH. hist. p. 330.

Caryophyllus sylvestris, flare laciniato sine corniculis, adoro, BAUH. pin. 210.

Caryophyllus sylvestris VI, CLUS. hist. p. 284.

Loc. Collegit loco dicto Col del mul D. GIAVELLI: in pratis a Ranco ad Cimam Cl. BELLARDI: Ignatius MOLINERI in sylvis prope Clermont: & dudum Johannes BAUHINUS in Sabaudiae sylvis copiose provenire adnotaverat hist. vol. III. lib. 29. p. 330. f. 1. ANNuus.

1554. DIANTHUS saxifragus.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 24.

Gypsophylla foliis linearibus, calycibus angulatis squamis quatuor, corollis emarginatis, LINN. syst. 12. p. 306. JACQ. vindob. p. 71.

Tunica calycibus pelvisiformibus, HALL. hist. rom. 1. n. 902.

Gypsophylla caule dichotomo, foliis subulatis, calycibus quinqueangularibus, squamis ad basin accessoriis, LINN. got. p. 194.

Betonica coranaria, s. Tunica minima, BAUH. hist. III. p. 337.

Loc. In arenosis sterilibus, & inter saxa admodum frequens. PERENNIS.

CAULIBUS UNIFLORIS.

1555. DIANTHUS arenarius.

Dianthus caulibus subunifloris, squamis calycinis obtusis, petalis multifidis, foliis linearibus. LINN. *syn.* 12. p. 308.

Tunica arenaria. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 508.

Caryophyllus sylvestris, humilis flore unica. BAUH. *pin.* 209.

Caryophyllus sylvestris I. CLUS. *hist.* 1. p. 282.

Armerius flas tertius. DOD. *pempt.* 176.

Loc. Abunde locis arenosis, & siccis circa *Fenestrelles*, & *Exilles*. *PERENNIS*.

1556. DIANTHUS alpinus.

Icon. TAUR. Val. VIII. tab. 19. 20. fig. 2. 3. 4. & Val. XIV. tab. 7. fig. 2.

Dianthus caule unifloro, corollis crenatis, squamis calycinis exterioribus tubum æquantibus, foliis linearibus obtusis. LINN. *spec.* p. 590.

JACQ. Fl. Austr. tab. 52.

Caryophyllus pumilus lasifolius. BAUH. *pin.* 209. *pradr.* 104.

Caryophyllus sylvestris flore magno inodoro hirsuto. BAUH. *pin.* 209.

Caryophyllus sylvestris 2. CLUS. *hist.* 1. p. 283. f. 1.

Loc. In pratis editioribus alpium, & pascuis montanis, tum etiam ad rupes. *PERENNIS*.

SAPONARIA. LINN. *gen.* n. 499. *syn.* n. 559.

Calyx tubulosus, quinquedentatus, persistens, ad basin nudus. Stamina decem.

Petala unguibus longitudine calycis. Styli duo. Capsula oblonga, unilocularis, polysperma.

1557. SAPONARIA officinalis.

Icon. TAUR. Val. III. tab. 25.

Saponaria calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. LINN. *spec.* p. 584.

Saponaria foliis ovato-lanceolatis trinerviis, floribus tubulosis umbellatis. HALL. *hist. tam.* 1. n. 908.

Lychnis flaribus digynis corymbosis, capsulis quadrivalvibus. SCOP. *Fl. Carn.* p. 501. n. 2.

Lychnis officinalis. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 510.

Lychnis sylvestris, quæ Saponaria vulgo. TOURN. *inst.* 336.

Saponaria major laevis. BAUH. *pin.* 206.

Saponaria vulgaris. BAUH. *hist. III.* p. 346.

Loc. Ad vias tum in agro *Pedemontano*, tum in sylvis collium *Taurinensium* non infrequens est. *PERENNIS*.

VIR. Instar saponis mundandis pannis, atque telis *SAPONARIÆ* decoctum inservit. Amara, valideque abstergens planta est, ac coactos humores resolvit. Apud nos frequenter in usum venit in viscerum imi ventris obstructionibus: extus applicita induratas etiam glandulas resolvit. Adhibetur in decoctione, aut succus expressus datur ab uncia una ad uncias tres. Extractum etiam familiare est, daturque a drachma semisse ad drachmas duas. In rheumatismo, & febris quotidiana opportunis aliis remediis solet etiam utiliter adjungi.

1558. SAPONARIA Vaccaria.

Icon. TAUR. Val. III. tab. 35.

Saponaria calycibus pyramidalis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis sessilibus. LINN. *spec.* p. 585. HALL. *hist. tom.* 1. n. 907.

Lychnis vaccaria. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 511.

Saponaria rubra. LAM. *Fl. Franc.*, *tam.* 2. p. 541.

Lychnis segetum rubra foliis perfoliatis. BAUH. *pin.* 204.

Vaccaria. BAUH. *hist. III.* p. 357. DOD. *pempt.* 104.

ALLIOTII Fl. Pedem. Tom. II.

Loc. Inter segetes circa *Segusium*, & prope *Avillianam* abunde legi: sed reperitur etiam similibus locis in Comitatu *Asiensis*, *Nicaeensis*, atque agris collium calidiorum. *ANNUA*.

1559. *SAPONARIA* *Ocymoides*.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 84.

Saponaria calycibus cylindricis villosis, caulibus dichotomis procumbentibus. LINN. spec. p. 585.

Saponaria caule decumbente nodoso, foliis ovato-lanceolatis, calycibus tubulosis hirsutis. HALL. hist. tom. 1. n. 909.

Lychnis, vel Ocymoides repens montanum. BAUH. pin. 206.

Saponaria minor quibusdam. BAUH. hist. III. p. 344.

Ocymoides repens polygonifolia flore Saponariae. LOB. p. 144.

Saponaria repens. LAM. Fl. Franc., tom. 2. p. 542.

Loc. In umbrosis saxosis abunde, seu in collibus *Taurinensibus*, montanis, & subalpinis. *PERENNIS*.

1560. *SAPONARIA* *lutea* tab. 23. fig. 1.

Icon. TAUR. Vol. XI. tab. 101. f. 1.

Saponaria floribus umbellatis ochroleucis, petalis ovatis, filamentis nigris. SPEC. PEDEM. p. 29. tab. 5. f. 2.

Saponaria calycibus serotibus, corollis coronatis, floribus subumbellatis, foliis linearibus canaliculatis. LINN. spec. p. 585.

Saponaria foliis graminis congestis, floribus umbellatis, petalis ovatis. HALL. hist. tom. 1. n. 904.

Loc. Proveoit abunde in altissimo jugo *Assietis*: in parvo monte *Cenisio*, & ad jugum *Col della Fenestra*, tum in summis alpinis parvo monti *Cenisio* proximis *Savine*, & *Jaillon*. Abunde etiam in jugis *Col di Cogne. PERENNIS*.

Obs. Calyx persistens; fructus ore quinque valvis profunde aperitur, unilocularis. Semina nigra, reniformia. Confer. *SPEC. meum Pedemont. loc. citat.*

GYPHOPHILA. LINN. gen. 498. syst. n. 558.

Calyx campanulatus, persistens. Petala subsessilia. Stamina decem. Styli duo.

Capsula subrotunda, unilocularis, polysperma.

1561. *GYPHOPHILA* *prostrata*.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 48. & Vol. XIII. tab. 5. 6.

Gypsophila foliis lanceolatis, naminibus corolla emarginata brevioribus. LINN. syst. 12. p. 306.

Saponaria radice lignosa maxima, foliis glaucis pulponis, floribus emarginatis. HALL. hist. tom. 1. n. 905.

Gypsophila foliis linearibus carnosis triquetris, naminibus petalis emarginatis brevioribus. GER. Fl. Gallopr. p. 409. n. 2.

Alsine caryophylloides angustifolia multiflora glabra purpurascens, radice auragaliti. PLUK. p. 22. tab. 75. f. 2.

Lychnis alpina linifolia multiflora perampla radice. Tourn. inst. 338.

Coryophyllus alpinus crasso linariae folio, calycibus variegatis. BOCC. mus. 23. tab. 5.

Loc. Ubique ad semitas saxosas novarum alpium; etiam circa *Taurinum* in sabulosis *Sturae* obviam venit, semine ex alpinis allato: in monte *Cenisio* sicuti olim observavit *Boccone* multa est. *PERENNIS*.

1562. *GYPHOPHILA* *muralis*.

Gypsophila foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. LINN. spec. p. 583.

Saponaria foliis filiformibus, caule diffuso brachiato. HALL. hist. tom. 1. p. 394.

Betoniceae tunicae minimae similis plantula. BAUH. hist. p. 338.

Caryophyllus minimus muralis. BAUH. pin. 211.

Sapanaria muralis. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 2. p. 340.

Lychnis parva palustris, foliis acutis lanceolatis, flosculis purpureis. MENTZ. pug. tab. 7. f. 4.

Loc. Secus arva ad vias, &c, ut recte observavit Celeberrimus HALLERUS, inter stipulas, Autumni tempore in agro Canapiciensi, & Eporediensi præsertim, etiam in agro Taurinensi occurrit. *ANNUA*.

VELEZIA. LINN. *gen. n.* 404. *syn. n.* 447.

Calyx cylindricus, quinquedentatus. Stamina quinque, vel sex. Styli duo. Capsula unilocularis, cylindrica, polysperma. Stamina in simplici serie.

1563 VELEZIA rigida. LINN. *spec. p.* 474.

Silene foliis subulatis cauli appressis, calycibus rigidis intermedio longioribus. SAUV. *monsp.* 145.

Lychnis corniculata minor. BARR. *rar.* 665. tab. 1017. 1018. BOCC. *mus.* 2. p. 30. tab. 43.

Lychnis minima rigida Cherleri. BAUH. *hist.* III. p. 352.

Lychnis sylvestris minima exigua flore. BAUH. *pin.* 226. *prodr.* 103.

Loc. In sterilibus ad limites agrorum Nicaeae. *ANNUA*.

SILENE. LINN. *gen. n.* 503. *syn. n.* 562.

Calyx quinquedentatus. Petala ad fauces squamis coronata. Styli tres. Capsula trilocularis, polysperma.

FLORIBUS SOLITARIIS LATERALIBUS

1564 SILENE anglica.

Silene hirsuta petalis emarginatis, floribus erectis, fructibus reflexis pedunculatis alternis. LINN. *syn.* 12. p. 309.

Lychnis sylvestris hirsuta annua flore minore alba. VAILL. *paris.* 121. tab. 16. f. 12.

Loc. Secus arva Nicaeensis. *ANNUA*.

1565. SILENE cerastoides.

Silene hirsuta petalis emarginatis, fructificationibus erectis, calycibus subpilosis sessilibus. LINN. *syn.* 12. p. 310.

Lychnis cerastoides. SCOP. *Fl. Carn. ed.* 2. n. 522.

Viscago cerastii foliis, vasculis erectis sessilibus. DILL. *esh.* 416. tab. 309. 2. 397.

Loc. Habui inter stirpes a Medica Hanarata CAUVINI in agro Nicaeensi collectas. *ANNUA*.

1566. SILENE quinquevulnera.

Silene petalis integerrimis subrotundis, fructibus erectis alternis. LINN. *spec. p.* 595.

Lychnis vulnerata. SCOP. *Fl. Carn. ed.* 2. n. 524.

Cucubalus variegata. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 28.

Lychnis hirta flore variegato. TOURN. *inst.* 338.

Loc. Secus arva Nicaeensis. *ANNUA*.

1567. SILENE gallica.

Icon. *Taur. Val.* XIX. tab. 79.

Silene floribus subapicatis alternis secundis, petalis indivisis, fructibus erectis. LINN. *spec. p.* 595.

Viscago foliis ellipticis, calycibus lineatis viscidis, petalis ovatis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 914.

Lychnis sylvestris hirsuta, flore minore carnea. VAILL. *paris.* 121. tab. 16. f. 12.

Cucubalus sylvestris. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 28.

Loc. TERRANEUS in agris prope Casalborgone inter segetes. Inter Caselle, & Lombardore lecta est. Vidi enim secus arva in agro Taurinensi: neque infrequens est in avis Monisferrati. Cl. BELLARDI in agro di Ciliانو. *ANNUA*.
Obs. Petala ovata aequalis rosei coloris, modo integra, modo laeviter emarginata.

1568. *SILENE nocturna.*

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 39.

Silene floribus spicatis alternis secundis sessilibus, petalis bifidis. LINN. spec. p. 595.

Viscago hirta noctiflora, floribus obsoletis spicatis. DILL. elrh. 420. tab. 310. f. 400.

Cucubalus spicatus. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 34.

Loc. In agri Nicaensis olivetis passim occurrit. *ANNUA*.

FLORIBUS LATERALIBUS CONFERTIS.

1569. *SILENE nutans.*

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 31.

Silene petalis bifidis, floribus lateralibus secundis cernuis, panicula nutante. LINN. spec. p. 596.

Viscago foliis lanceolatis hirsutis, floribus paniculatis nutantibus. HALL. hist. tom. n. 915.

Lychnis floribus trigynis secundis paniculatis pendulis, petalis convolutis. SCOP. Fl. Carn. p. 503. n. 5.

Lychnis nutans. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 525.

Cucubalus nutans. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 35.

Lychnis silvestris, 1. mamano latifolia viscosa florum petalis supra albis, subtus virentibus, interdum se contrahentibus. MORIS. ox. 2. p. 535.

Lychnis silvestris 1. olba flore. CLUS. hist. p. 390. 391.

Polemanium petreum Gesneri. BAUH. hist. III. p. 351.

Loc. Secus prata, ad semitas sylvarum, ad muros ubique tum in Taurinensibus colibus, tum in subalpinis. *PERENNIS*.

Obs. Secus torrentem Teregi dictum non longe ab oppido Sastello in provincia Aquis nascitur singularis hujusce *SILENES* varietas, quae folia habet ovata, lucide-virentia, vix sinuata, minus hirsuta, atque petala intus rosea, exius fusca.

1570. *SILENE viridiflora.*

Silene petalis semibifidis, foliis ovatis, scabriusculis acutis, panicula elongata subaphylla. LINN. spec. p. 597.

Lychnis ocymastris facie, flare viridi. HERM. parad. 199. tab. 199.

Loc. In provincia Aquis ad pagum Genuvensi diuioni conterminum, Monsenocae dictum, reperit Ignatius MOLINERI. *PERENNIS*.

FLORIBUS EX DICHOTOMIA CAULIS.

1571. *SILENE conoidea.*

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 30.

Silene calycibus fractus globosis acuminatis, striis triginta, foliis glabris, petalis integris. LINN. spec. p. 598.

Lychnis silvestris latifolia, calycibus turgidis striatis. BAUH. pin. 205.

Lychnis silvestris 2. CLUS. hist. 1. p. 288.

Cucubalus conoideus. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 27.

Loc. Nasctur in agro Nicaeensi. *ANNUA*.

1572. *SILENE conica.*

Silene calycibus fractus conicis striis triginta, foliis mollibus, petalis bifidis. LINN. spec. p. 598.

JACQ. Fl. Austr. tab. 253.

Lychnis conica. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 521.

Cucubalus conicus. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 33.

Lychnis silvestris angustifolia calycibus turgidis striatis. BAUH. pin. 205.

Lychnis glabra annua, foliis oblongis mucronatis, flore amplo rubello, capsula oblonga pyramidali. MORIS. *hist.* 2. p. 342. t. 5. tab. 30. f. 6.

Loc. luter segetes Sabaudiae prope Termignon vidit Cl. BELLARDI. ANNUA

1573. *SILENE sericea* N. tab. 79. fig. 3.

Icon. TAUR. Vol. XXVIII. tab. 30.

Silene foliis acuminatis succulentis hirsutis lucidis, flore carneo.

Loc. Ad maris litus in sabulosis inter Oneglia, & Porto Maurizio collegit, & in hortum retulit Ignatius MOLINERI. ANNUA.

DESCR. Radix alba, annua, teres, parum fibrosa. Caulis teres, statim alterne, aut per dichotomiam divisus ramis procumbentibus, saepius simplicibus. Tota planta sericeo-subincana. Folia conjugata opposita, lingulata amplexicaulia, firmula, & succosa, elliptica. Flos petiolarum ramum terminat, pedunculo longitudine calycis, & foliorum. Calyx clavatus, decem striato-angularis, albedo-transparentis, sed angulis majoribus in calycis segmenta productis: calyx ad segmenta contractior, infra eadem inflatus, unguis petalorum lineares, splendentes, calyce altiores. Petala cordata, dilute rosea, ultra medium bifida, segmentorum fine subrotundo. Corollae squamae erectae, acutae. Petala subtus pallidiora ultra divisionem petalorum, sive versus unguis luteo-virent. Styli tres subulsi, filiformes, erecti. Receptaculum hirsutum, decem striatum, staminum longitudinem circiter habet. Calyx non exarescit, sed firmior continuo evadit, atque a fructu maturescente extenditur. Folia ad sui originem evidentioribus, & longioribus pilis ciliata. Geniculi tument, atque foliorum conjugationes sursum saepe respiciunt. Sapor plantae aquosus.

1574. *SILENE vallesia.* tab. 23. fig. 2.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 37.

Silene caulibus subunifloris decumbentibus, foliis lanceolatis tomentosis longitudine calycis. LINN. *spec.* p. 603.

Viscago foliis ovato-lanceolatis tomentosis, caulibus unifloris. HALL. *hist.* tom. 1. n. 910.

Loc. Locis sterilibus, & editioribus alpium Valdensium. PERENNIS.

DESCR. Habet haec *SILENE* duram lignosam radicem, ex qua cauliculi nascuntur semipalmates, nunc uniflori, nunc dichotomi, & triflori. Folia sunt lineari-elliptico-acuminata, sessilia, nondum amplexentia, hirsuto-viscosa, ex viridi-cinerea. Flores erecti, longis insidentes pedunculis, qui florum altitudini aequales sunt. Calyx inflatus, primum cylindricus, dein ovalis, unciam longus, quinque-dentatus, decem striis notatus, viscido-hirsutus, purpureis venis reticulatus. Petala quinque quadrangulo-cordata, amplo hilo excisa, intus alba, levissime rosea, aut albicantia, extus phaenicea cum venis rubris. Lamina versus centrum floris saepe revoluta. Squamae decem concolores internam corollam faciunt, & petala utrinque ala una augentur. Stamina decem alternis cum unguibus connatis. Styli floris tres, filiformes, corniculati, corolla altiores. Fructus est capsula trilocularis, intra calycem maturans, apice quinquefido, aut sexfido dehiscens & semina fundens.

1575. *SILENE noctiflora.*

Icon. TAUR. Vol. XI. tab. 65. vol. XX. tab. 29. & Vol. XXI. tab. 15.

Silene calycibus decemangularibus, dentibus subum aequantibus, caule dichotomo, petalis bifidis. LINN. *syn.* 12. p. 311.

Viscago foliis ovato-lanceolatis hirsutis, caule brachiato, calycibus venosis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 911.

Cucubalus noctiflorus. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 35.

Lychnis noctiflora. BAUH. *pin.* 205.

Ocymoides noctiflorum. CAM. *hort.* 109. tab. 34.

Loc. Habui ex comitatu Nicaeensi. ANNUA.

1576. *SILENE Nicaeensis* N. tab. 44. fig. 2.

Icon TAUR. Vol. XVII. tab. 96.

Silene villosa, & viscosa, foliis linearibus obtusis, petalis semibifidis, fructibus ovatis, calycibus decemstriatis. MISC. TAUR. tom. 1. p. 88. n. 123.

ALLIOTII Fl. Pedem. Tom. II.

X

Loc. In agro Nicaensi secus le Var frequens est. *ANNUA*.

DESCR. Caules infirmi, vix erecti. Folia linearia, crassiuscula, sulcata. Caulis de more gentis in pedunculos dichotome finditur. Calyces decemstrati striis viridibus, non inflati, tubulosi. Petala semifida, coronata squamis subrotundis, extus pallide flavo-purpurascentia, intus albidia, & per diem intus convoluta, ungues pallide lutescentes. Antherae didymae, luteo-virides. Styli tres cum stigmatibus hirsutis. Fructus est capsula ovata, trilobularis ore sexfido, aut septemfido. Tota planta villosa, & viscosa est.

1577. *SILENE inaperta*.

ICON. TAUR. Vol. XXVI. tab. 1. 2.

Silene caule dichotomo paniculato, calycibus laevibus, petalis brevissimis emarginatis, foliis glabris lanceolatis. LINN. spec. p. 600.

Lychnis inaperta. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 523.

Viscaga laevis, inaperta flore. DILL. elsh. 424. tab. 325. f. 407.

Cucubalus inapertus. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 31.

Loc. Haec etiam Nicaensis agri indigena planta est. *ANNUA*.

1578. *SILENE armeria*.

ICON. TAUR. Vol. III. tab. 33.

Silene floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superiaribus cordatis glabris, petalis integris. LINN. syst. 12. p. 311.

Viscago foliis glabris ovato-lanceolatis, floribus umbellatis. HALL. hist. tom. 1. n. 916.

Lychnis viscosa purpurea latifolia laevis. BAUH. pin. 205.

Lychnis armeria. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 526.

Cucubalus fasciculatus. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 27.

Armeria flus quartus. DOD. hist. 176.

Loc. In saxosis acclivibus Sturæ non longe ab urbe Taurini, & prope pagum Viâ loco dicto il mal pas, & in collibus Canapiciensibus. *ANNUA*.

1579. *SILENE quadrifida*.

Silene petalis quadrilobis, caule dichotoma, floribus pedunculatis, foliis glabris recurvis. LINN. spec. p. 602.

Lychnis floribus trigynis, petalis quadrilobis, foliis linearibus. SCOP. Fl. Carn. p. 504. n. 7.

Viscago foliis teneris recurvis, petalis quadrifidis. HALL. hist. tom. 1. n. 918.

Lychnis alpina foliis angustis reflexis, petalis quadripartitis. SEGU. veron. 3. p. 186. tab. 3. f. 1.

Lychnis quadrifida. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 519.

Loc. Ex monte Genevre retulit Thomas PRIM. *PERENNIS*.

1580. *SILENE rupestris*.

ICON. TAUR. Vol. VIII. tab. 12. f. 1. & Vol. XII. tab. 18. f. 3.

Silene floribus erectis, petalis emarginatis, caulibus teretibus, foliis lanceolatis. LINN. spec. p. 602.

Viscaga foliis lanceolatis, caulibus brachiatis, calycibus infundibuliformibus, floribus laxo umbellatis erectis. HALL. hist. tom. 1. n. 917.

Lychnis floribus erectis, capsulis trilobularibus, foliis linearibus. SCOP. Fl. Carn. p. 503. n. 6.

Lychnis saxatilis alpina glabra pumila. Tourn. inst. p. 338.

Auricula muris alpina, glabra, sive Lychnis glabra minima, aut Caryophylli minima species flore albo. BAUH. hist. III. pag. 360.

Loc. In montanis, & subalpinis umbrosis rupibus frequens. *PERENNIS*.

1581. *SILENE cordifolia* N. tab. 23. f. 3.

ICON. TAUR. Vol. XXV. tab. 67.

Silene caule simplici foliis ovatis acutis, floribus subsessilibus terminalibus, petalis semibifidis.

Loc. Collegi circa thermas Vinadii, & Valderii. In praeceptis saxosis, atque editoribus jugis frequens est, atque saepe occurrere in proximis montibus ad Comitatum Nicatensem pertinentibus adnotavit Ignatius MOLINERI, uti supra Tenda, & Savario. *PERENNIS*.

DESCR. Ex radice fibrosa saxum subeunte cespitis instar exeunt plures cauliculi filiformes, sesquidigitales, qui folia habent opposita, sessilia, ovata, acuminata, *Alisines mediae* foliis fere similia, sinuata eadem laevius sum, viridia, & tenuissime villosa. Primae conjugationis folia minora sunt, sequentium ampliora, postremae autem magis acuminata, & minora. Conjugationes saepe quinque sunt. Caulis abir in brevem pedunculum, florem gerensem, ex albo laevissime roseum, petalis extus flavescemibus. Petala sunt semiquinquefida, segmentis linearibus subrotundis squama coronatrice profunde bifida, instructa. Stamina decem cum antheris didymis, cinereis, & cum unguibus petalorum infra embryonem ex receptaculo nascuntur; receptaculum vero est longitudine embryonis, qui tres filiformes tubas habet. Calyx inflatus, pallide virens, sed qua parte soli patet, rubescens, decem-angulatus angulis alterne minoribus, & quinque dentatus. Calycis longitudinem metiuntur ungues, quorum summa pars ala utrinque decoratur. Flos saepius unus, sed interdum utrinque unus accedit. Fructus est capsula oblonga unilocularis, quae quatuor valvis bidentatis, non revolutis, solet aperiri. Planta in universon glotie viscido donatur.

1582. *SILENE saxifraga.*

Silene caulibus subunifloris, pedunculis longitudine caulis floribus hermaphroditis, foemineisque, petalis bifidis. LINN. *syst.* 12. p. 311.

Lychnis floribus trigynis, erectis, capsulis trilocularibus, foliis linearibus. SCOP. *Fl. Carn.* p. 503. n. 6.

Lychnis saxifraga. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n.* 520.

Cucubalus saxifragus. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 29.

Lychnis minar saxifraga. PLUK. *almag. bot. SEGU. veron.* p. 431. tab. 71.

Caryophyllus saxifragus. BAUH. *pin.* 211.

Saxifraga antiquorum quibusdam. BAUH. *hist.* III. p. 338.

Lychnis fruticosa angustifolia minima flore albo. BOCC. p. 81. tab. 71.

Saxifraga grande. MATTH.

Loc. In rupibus alpium frequens locis apricis. *PERENNIS*.

CAULIBUS DESTITUTÆ

1583. *SILENE acaulis* tab. 79. fig. 1.

Silene acaulis depressa, petalis emarginatis. LINN. *syst.* 12. p. 311. JACQ. *Vind.* p. 242.

Viscago foliis gramineis, caule brevissimo uniflora. HALL. *hist.* tom. 1. 919.

Lychnis acaulis. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n.* 516.

Cucubalus muscosus. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 30.

Lychnis alpina pumila folio gramineo, seu muscus alpinus Lychnidis flore. BAUH. *pin.* 206.

Muscus alpinus Lychnidis flore. BAUH. *hist.* III. p. 767.

Ocymoides muscoso alpina. PON. *ital. Bald.* 199.

Loc. Lapides, & lapidum intersitia in pene summis alpiis ubique fere exornat. *PERENNIS*.

Obs. Loco squamarum, quae coronam faciunt, adsunt tubercula, styli tres, stamina decem, calyx decem striatus, striis elevatis, petala emarginata, pedunculi, sive scapi longitudine calycis. Fructus cylindricus.

1584. *SILENE exscapa* N. tab. 79. fig. 2.

Silene flore sessili fructibus subrotundis.

Loc. lisdem locis, quibus *SILENE acaulis*, sed amat potius loca editiora, & vento magis perfusa. *PERENNIS*.

Obs. Similis est priori, adeo ut pro varietate habuerim, sed ea discrimina habet, quae distinctam speciem constituunt. Tota planta minor est. Flos minor dilutioris coloris, qui in rosula foliorum sedet vix pedunculatus. Fructus non cylindrici, sed globosi.

CUCUBALUS. TOURN. *inst.* 339. *tab.* 176.

Calyx quinqueidentatus. Petala unguiculata, ad fauces nuda. Styli tres.

Capsula uni, aut trilocularis, polysperma.

1585. CUCUBALUS baccifer.

Icon. TAUR. Vol. XXV. tab. 25.

Cucubolus colycibus componulatis, petolis distantibus pericarpis coloratis, romis divoricatis. LINN. *spec.* p. 591. BOHEM. *Fl. Lips.* p. 163.

Viscago baccifero petalis serratis. HALL. *hist. tom. 1. n. 912.*

Lychnis floribus trigynis, colycibus campanulatis, capsulo colorato. SCOP. *Fl. Carn.* p. 502. n. 3.

Lychnis baccifera. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 517.*

Cucubalus Plinii. LUGD. 1429. TOURN. *inst.* 338. HALL. *gouing.* 147.

Cucubolus quibusdam, vel Alsine baccifera. BAUH. *hist. II. p. 173.*

Alsine scandens baccifera. BAUH. *pin.* 250.

Alsine repens. DOD. *pempt.* 403.

Loc. Ad sepes ubique vulgarissima, præsertim in collibus *Taurinensibus*. *PERENNIS.*

1586. CUCUBALUS Behen.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 44.

Cucubalus colycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. LINN. *spec.* p. 591.

Viscago caule brachiato nodoso, colycibus inflatis venosis. HALL. *hist. tom. 1. n. 913.*

Lychnis floribus trigynis pendulis, colycibus ovatis inflatis venosis, capsulis semitrilocularibus. SCOP. *Fl. Carn.* p. 502. n. 4.

Lychnis tristyla, trilocularis, colyce inflato. BOHEM. *Fl. Lips.* p. 165. n. 394.

Lychnis behen. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 514.*

Lychnis silvestris, quæ behen orbum vulgo. BAUH. *pin.* 205.

Behen orbum officinarum. BAUH. *hist. III. p. 356.*

B. Lychnis alpina repens saxatilis, quæ Behen orbum vulgo folio latiusculo, & breviori. PON. *comp.* 128. SPEC. PEDEM. p. 33. *tab. 5. fig. 3.*

Loc. In pratis ubique vulgarissima at varietas B nascitur copiose inter mobiles lapides ad summos alpium præcipue *Valdensium* scopulos. *PERENNIS.*

Obs. Cauliculis repentibus ramis, unifloris, foliis subrotundis, & ciliatis a *Behen* albo vulgari differt varietas insignis descripta in SPEC. PEDEM. p. 33. Collecta variis locis specimina docuerunt hanc plantam non eandem esse, sed parum a præcedenti diversam.

1587. CUCUBALUS italicus.

Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 8.

Cucubalus colycibus clavatis, petalis semibifidis, panicula dichotomo erecto, genitalibus declinatis, caule erecto. LINN. *yst.* 12. p. 309.

JACQ. *obs.* 4. *tab.* 97.

Loc. In dumetis, & ad oas sylvarum in collibus *Taurinensibus* prope *Supergo*, & *S. Rafele*. Copiose ad sepes circa *Vico di Mondovi*. Circa *Segusium* etiam nascitur locis saxosis. *PERENNIS.*

1588. CUCUBALUS oites.

Cucubolus floribus dioicis, petolis linearibus indivisis. LINN. *spec.* p. 594.

Viscago floribus verticillatis spicatis, sexu distinctis, petolis linearibus. HALL. *hist. tom. 1. n. 920.*

Lychnis oites. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 515.*

Cucubalus parviflorus. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p. 26.*

Lychnis viscosa flore mucoso. BAUH. *pin.* 206.

Sesamoides magnum salmanticum. CLUS. *hist. 1. p. 295.*

Loc. Circa *Segusium* in arenosis fluminis *Dora* sat copiose, sed non infrequens est in pascuis saxosis sterilibus, præsertim collium. *PERENNIS*.

LYCHNIS. LINN. *gen. n.* 507. *syn. n.* 580.

Calyx quinqueidentatus. Stamina decem; styli quinque. Capsula 3-vel 5-jocularis.

1589. **LYCHNIS** flos cuculi.

Icon. *TAUR.* Vol. III. tab. 45.

Lychnis petalis quadrifidis fructu subrotundo. LINN. *spec. p.* 625. HALL. *hist. tom. 1. n.* 921.

Lychnis floribus pentagynis, petalis laciniatis. SCOP. *Fl. Carn. p.* 504. n. 8. ed. 2. n. 528.

Lychnis pragensis flore laciniato simplici. MORIS. *ox. 2. p.* 537.

Caryophyllus pragensis, flore laciniato simplici, 2. flos cuculi. BAUH. *pin.* 210.

Cuculi flos, odonites quibusdam. BAUH. *hist. III. p.* 347.

Loc. In pratis irriguis frequens est. *PERENNIS*.

1590. **LYCHNIS** viscaria.

Lychnis petalis integris. LINN. *spec. p.* 625.

Lychnis foliis lanceolatis, floribus verticillatis spicatis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 927.

Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia. BAUH. *pin.* 205.

Lychnis sylvestris IV. CLAUD. *hist.* 289.

Loc. Inhabitat colles locis aridis soli expositis ad oras sylvarum. *PERENNIS*.

1591. **LYCHNIS** alpina.

Icon. *TAUR.* Vol. XIII. tab. 101. f. 1.

Lychnis foliis linearibus lanceolatis, floribus umbellato-capitatis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 922. tab. 27. emend. 5. n. 46.

Lychnis petalis bifidis, floribus corymbosis. LINN. *spec. p.* 616.

Loc. Nascitur in alpinis pratis della *Vanoesa*, alp re, & *Courmajour*, atque in editis jugis inter *Ceresole*, & *Augustiam Prætoriam*, in catena alpium di *Grassones*, valle di *Tigne*, & monte *Cenisio*. *PERENNIS*.

Obs. Calyx inflatus. Laminæ petalorum profunde sectae, purpureae. Squamæ coronatrices lineares. Styli quinque flore longiores. Stamina decem.

1592. **LYCHNIS** dioica.

Icon. *TAUR.* Vol. III. tab. 38.

Lychnis floribus dioicis. LINN. *spec. p.* 626. SCOP. *Fl. Carn. p.* 505. ed. 2. n. 530. HALL. *hist. tom. 1. n.* 923.

Lychnis sylvestris, seu aquatica purpurea simplex. BAUH. *pin.* 204.

Ocymoides purpureum multis. BAUH. *hist. III. p.* 343.

n. *Lychnis sylvestris alba simplex.* BAUH. *pin.* 204.

Ocymoides album multis. BAUH. *hist. III. p.* 342.

Loc. Prima ad radices alpium in irriguis umbrosis, ad fontium scaturigines præcipue frequens est. Varietas n. ubique obviam venit in agro *Pedemontano* ad sepes, fossas, & semitas. *PERENNIS*.

Obs. Præstantissimi viri LINNÆUS, HALLERUS, & SCOPOLI, purpuream ab alba non distinguunt. Eos etiam secutus sum, attamen non varietate, sed specie differre putarem animadvertens purpuream in montanis, & irriguis tantummodo nasci, neque adeo ramosam, & caespitosam esse.

AGROSTEMMA. LINN. gen. n. 316. syst. n. 579.

Calyx quinquedentatus, quinqueangulatus, vel decemstriatus, coriaceus. Stamina decem. Styli quinque. Capsula unilocularis.

1593. **AGROSTEMMA** githago.

ICON. TAUR. Vol. III. tab. 36. & Vol. XXII. tab. 9.

Agrostemma hirsuta, calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis. LINN. spec. p. 624.

Lychnis calycibus longissime caudatis. HALL. hist. tom. 1. n. 926.

Lychnis floribus pentagynis, petalis nudis calyce brevioribus. SCOP. Fl. Carn. p. 303. n. 9.

Lychnis githago. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 527.

Lychnis segetum. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 50.

Lychnis segetum major. BAUH. pin. 204.

Pseudo-Melanthium. BAUH. hist. III. p. 341.

Pseudomelansio. MATTH.

Loc. Ubique inter segetes. *ANNUA*.

Obs. Ejusdem insignem varietatem senapalmarem corollae longitudine calycem excedente, unifloram, foliis linearibus angustissimis reperit CL. DANA in alpibus pratis sterilibus prope Carlinum in valle Tanari, quam non separo, licet uniflora constanter sit, atque insignem differentiam praebeat.

1594. **AGROSTEMMA** caeli rosa.

ICON. TAUR. Vol. XVI. tab. 9.

Agrostemma glabra foliis linearilanceolatis, petalis emarginatis coronatis. LINN. spec. p. 624.

Lychnis pseudomelanthis similis africana glabra angustifolia. HERM. Lugdb. 391. tab. 393.

Loc. In Comirata Nicaeensi vidit CL. BELLARDI. *ANNUA*.

1595. **AGROSTEMMA** coronaria.

ICON. TAUR. Vol. III. tab. 27. & Vol. XIII. tab. 104.

Agrostemma tomentosa foliis ovato-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis serratis. LINN. syst. 12. p. 319.

Lychnis tomentosa calycibus costatis, floribus longissime petiolatis. HALL. hist. tom. 1. n. 925.

Lychnis coronaria Dioscoridis sativa, flore dilute rubente. Tourn. inst. 334.

Lychnis coronaria Dioscoridis sativa vulgo. BAUH. hist. III. p. 340.

Loc. In sylvis caeduis, & locis saxosis Canapieciensium, & Montisregalensium, uti circa Roburent, Monaldo, & Frabosa. In valle Augustae Praetoriae prope Bard observavit Ignatius MOLINERI. *PERENNIS*.

1596. **AGROSTEMMA** flos Jovis.

ICON. TAUR. Vol. XXV. tab. 63.

Agrostemma tomentosa petalis emarginatis. LINN. spec. p. 625.

Lychnis tomentosa, umbellis paucifloris, petalis cordatis. HALL. hist. tom. 1. n. 924.

Lychnis umbellifera. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 52.

Lychnis umbellifera montana helvetica. ZANN. hist. 128. tab. 51.

Loc. In alpinis ad rupes frequens locis apricis. *PERENNIS*.

TAMARISCUS. TOURN. *inst.* 661. TAMARIX. LINN. *gen. n.* 337. *yst.* n. 372.

Calyx campaniformis, profundissime quinquefidus, ut pentaphyllus videatur.

Stamina quinque, aut decem. Stylus unus. Capsula unilocularis, trivalvis.

Semina papposa.

1597 **TAMARISCUS gallicus.**

Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 74.

Tamarix floribus pentandris. LINN. *spec. p.* 386. GOU. *hort. monsp. p.* 155.

Tamarix altera folio tenuiore, seu gallica. BAUH. *pin.* 485.

Tamariscus narbanensis. LOR. *it.* 218. TOURN. *inst.* 661.

Loc. In agro Nicasensi. **FRUTEX.**

DESCR. TAMARIX gallica in parvam arborem excrescit. Folia multo minora, densius imbricata, viridia, acutiora, eum in germanica glauco-cinerea sint. In germanica rami floriferi recti esse solent: In gallica autem rami floriferi orizzontales, sive ramo majori perpendiculares. Flores in germanica duplo, & ultra majores, quam in gallica, brevius pedunculati. Stamina in germanica decem: Stigma simplex, stamina petalis breviora antheris dydimis, albidis, in gallica stamina quinque, multo petalis longiora antheris purpureis, etiam didymis. Calyx in germanica apparet ex quinque foliolis linearibus viridibus compositus, folio uno instructus ab aliis foliis non dissimili, pedunculum fulciente. In gallica folium floribus singulis subjectum, albidum est, pellacens, aristatum. Calyx autem videtur ex quinque foliolis viridibus, imbricatim positus, brevissimis conflatum. In germanica stigma orbiculatum, non trifidum. In gallica germen purpureum cum stigmate trifido.

1598. **TAMARISCUS germanicus.**

Icon. TAUR. Vol. II. tab. 142.

Tamarix floribus decandris. LINN. *spec. p.* 387.

Tamarix fruticosa, folio crassiore, seu germanica. LOR. *it.* 218.

Mirrice, o sia Tamariggia. MATTH.

Loc. Ubique in sabulosis fluminum alveis in agro Pademoniano. **SUFFRUTEX.**

VIR. TAMARISCUS utraque similia principia possidet, sed TAMARISCUS germanica in usum venire solet. Cum adstrictoria, & tonica vi abstergit, atque adhibetur ad urinam ciendam, & in viscerum imi ventris obstructionibus, praesertim in lienis morbis. Planum est hoc remedii genus non vere sufficere ad viscerum infarctus resolvendos, alicujus autem adjumenti esse posse post fortiora abstergentia, & saponacea adhibita. Per combustionem haec planta non exiguum praebet quantitatem salis medii ad salem mirabilem GLAUBERI accedentis, qui apozematibus diureticis, aut deobstruentibus saepe adjicitur. Cortici radicis uberius inest activum principium, hic ideo in usum eligitur. Ea, quae de Ononide dicta sunt, ad TAMARISCUM transferri possunt. TAMARISCI cortex in decocto adhibetur a drachmis duabus ad drachmas sex, aut etiam unciam unam, duplo major esse potest ligni, & foliorum dosis.

ALDROVANDA. LINN. *gen. n.* 350. *yst.* 386. TOURN. *tab.* 127.

Calyx campaniformis, profunde quinquepartitus. Petala persiscentia. Stamina quinque.

Syli quinque. Capsula unilocularis, quinquevalvis, decemisperma.

1599 **ALDROVANDA vesiculosa.** LINN. *spec. p.* 402.

Aldrovanda. MONT. *act. Botan.* vol. 2. p. 3. *part.* 404. *tab.* 12.

Lenticula palustris indica, foliis subrotundis, binis capillamentis ad imum barbaris.

PLUK. *alm.* 211. *tab.* 41. f. 6.

Loc. Aquis innatat secus lacus di Candia, & Viverane. Crescit etiam in fossis profundioribus di Viverane, & signatim, observante Cl. BELLARDI, loco dicto Morigna. **PERENNIS.**

Oss. Pedunculus teres, foliis longior. Calyx viridis, profunde quinquefidus, foliolis ovatis concavis. Petala ovata, sordide alba, vix calyce majora, conniventia. Stamina quinque, inter unum, & alterum petalum orta. Apices lutei, didymi. Petala inter calycina folia enascuntur. Styli quinque. Capsula unilocularis in quolibet foliorum verticillo. Flos unicus; caulis nimirum in pedunculum abire videtur, dum ex latere ramum, sive caulem producit.

RORELLA. HALL. *hist. tom. 1. p. 371.*

DROSERA. LINN. *gen. n. 351. syst. n. 387.*

Calyx tubulosus, semiquinquefidus. Stamina quinque. Styli quinque. Capsula unilocularis, quinquevalvis, polysperma.

1600 **RORELLA** longifolia.

Rorella foliis ellipticis, coule nudo poucifloro. HALL. *hist. tom. 1. n. 833.*

Drosera scapis radicatis, foliis oblongis. LINN. *spec. p. 403.*

Ros solis septentrionalis. SCOP. *Fl. Corn. ed. 2. n. 390.*

Ros solis folio oblongo. BAUH. *pin. 357.*

Ros solis. DOD. *pempt. 474.*

Loc. In pratis spongiosis, atque ad fontium scaturigines, & secus lacus di Candia, Vivrone, & Eporedia. *ANNUA.*

1601. **RORELLA** rotundifolia.

Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 8.

Rorella coule nudo poucifloro, foliis petiolosis subrotundis. HALL. *hist. tom. 1. n. 834.*

Drosera scapis radicatis, foliis orbiculatis. LINN. *spec. p. 403.*

Ros solis septentrionalis. SCOP. *Fl. Corn. ed. 2. n. 390.*

Ros solis folio rotundo. BAUH. *pin. 357.*

Ros solis. BAUH. *hist. III. p. 761.*

Off. Ros, s. Rorella rotundifolia.

Loc. Haec longe vulgarior est, quam longifolia, & dictis locis occurrit, sive ad radices alpium, sive ad oras lacuum. TERRANEUS in montibus Bugellensibus legit. *ANNUA.*

VIR. Utriusque RORELLÆ similis est natura. Laudata est RORELLA rotundifolia ad urinam ciendam, & morbos pulmonis etiam suppurati, sed summa acrimonia, quam habet, in tanta remedium balsamicorum, & abstergentium ubertate, suadet ab ejusdem usu abstinere.

OXY. TOURN. *inst. 88. tab. 19.*

OXALIS: LINN. *gen. n. 315. syn. n. 378.*

Calyx campaniformis acute quinquefidus. Corolla pentapetala, unguibus primum distinctis, deinde conglutinis. Stamina decem. Styli quinque.

Fructus pentagonus, foetus ex quinque conjunctis loculis polyspermis, & per maturitatem dissiliemibus.

1602 **OXY** acetosella.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 52. 53.

Oxys scopo unifloro, radice squamoso articulo. BOHEM. *lips. n. 70.*

Oxalis scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamoso articulata. LINN. *syst. 12. p. 318. HALL. hist. tom. 1. n. 918.*

Oxys acetosello. SCOP. *Fl. Corn. ed. 2. n. 361.*

Oxys albo. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p. 60.*

Oxys flore albo. TOURN. *inst. 88.*

Trifolium octorum vulgore. BAUH. *pin. 330.*

Trifolium octosum. DOD. *pempt. 378.*

Oxys Pliniana, panis cuculi, olleluja officinarum, trifolium acetosum. LOB. ic. p. 32.
Trifolium acetosum. MATTH.

OFF. Acetosella, Alleluja, & Lajula.

Loc. Abunde in umbrosis sylvis primovere ubique. PERENNIS.

VIR. Acido plurimo abundat. Utilis est in morbis a putredine, febribus ardentibus, & sanguinis aestu: sitim extinguit, calorem temperat, atque humorum alkalescentiam continet. Datur ex aqua decocta, aut succus expressus ab uncia una ad uncias duas. Ex succo paratur sal essenziale *Acetosellæ*, cujus usus frequens est in supra recensitis morbis. Cuilibet cyatho aquæ, aut apozematis adjici solent grana aliquot a duobus ad quinque. Sequentes duæ species minus quidem valent, similes tamen virtutes suppeditant.

1603. OXYS corniculata.

ICON. TAUR. Vol. III. tab. 51.

Oxys caule ramoso, pedunculis plerumque bifloris. BOHEM. lips. p. 34. n. 71.

Oxalis caule ramoso diffuso, pedunculis umbelliferis. LINN. spec. p. 623.

Oxys luteo fove flore. CLUS. hist. 2. p. 249.

Oxys flore luteo. BAUH. hist. p. 388.

Trifolium acetosum corniculatum. BAUH. pin. 330.

Oxys corniculata. SCOP. Fl. Corn. ed. 2. n. 562.

Oxys luteo. TOURN. 88. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 60.

Trifolium acetosum giallo. MATTH.

Loc. In montibus *Liguriae* ad irrigua frequentem esse TERRANEUS adnotavit, addidit etiam sibi occurrisse hanc stirpem in agro *Tourinensi*. Passim nascitur ad macerias, & in vineis locis collinis. ANNUA.

1604. OXYS stricta.

ICON. TAUR. Vol. III. tab. 50.

Oxalis caule romoso erecto, pedunculis umbelliferis. LINN. spec. p. 624.

Oxys americana erectior. TOURN. inst. 88.

Trifolium acetosum corniculatum luteum majus rectum indicum, s. virginianum. MORIS. hist. 2. p. 184. 2. 2. tab. 17. f. 3.

Loc. In pascuis umbrosis collium *Tourinensium*, & ad sepes minime rara, ita ut indigena videatur. Aliis etiam, similibusque locis sponse oriri animadvertit CL. BELLARDI. PERENNIS.

STATICE. LINN. gen. n. 348. syst. n. 384. TOURN. tab. 177.

Involucrum universale varium. Calyx proprius infundibuliformis, limbo integro plicato.

Petala quinque, sensim dilatata, & juxta se posita, infundibulum referentia.

Stamina quinque. Stylus quinque. Fructus stellatus, monospermus
ex calyce persistente.

1605. STATICE armeria.

ICON. TAUR. Vol. X. tab. 37.

Statice scapo simplici capitato, foliis linearibus. LINN. spec. p. 394. HALL. hist. tom. 1. n. 835.

Statice alpino major flore albo. TOURN. inst. 341.

Coryophyllus montanus major flore globoso. BAUH. pin. 211.

Coryophyllaceus flos ophyllocaulos, vel junceus major. BAUH. hist. III. p. 336.

n *Statice montana minor*. TOURN. inst. 340.

c *Statice montana minima*. TOURN. inst. 341.

Loc. In saxosis summi collis *Supergo* dicti in saxosis apricis subalpinis copiose provenit, neque deest in pascuis alpinis. Varietas n, & c in jugis pene summis alpium adinventur; hujusce varietatis specimina ex monte *Cenisio* habeo, quorum scapus Parisiensem pollicem vix aequat. PERENNIS.

1606. STATICE plantaginea N.

Icon. TAUR. Vol. IX. tab. 96.

Statice foliis lanceolatis nervosis, scapa simplici capitato.

Statice armeria major. JACQ. hort. vindob. tab. 42.

Statice lusitanica Scarpenerae folia. TOURN. inst. p. 341.

Loc. In vallibus Locanae montibus, atque inter Lance, & Viâ nascitur. PERENNIS.

Obs. Distincta species est, non varietas superioris; convenit floribus, & capitulo, sed elyptico-lanceolata est, & evidentibus nervis instar plantaginis instructa.

1607. STATICE Limonium.

Icon. TAUR. Vol. XXV. tab. 26.

Statice scapo paniculato tereti, foliis laevibus nerviis subtus mucronatis. LINN. syst.

12. p. 222.

Limonium maritimum majus. BAUH. pin. 192.

Limonio. MATTH.

Loc. Agrum Nicaensem ad maris litus inhabitat. PERENNIS.

1608. STATICE cordata.

Statice scapo paniculato, foliis spatulatis retusis. LINN. spec. plant. p. 394.

Statice maritima. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 64.

Limonium maritimum minus, foliis cordatis. BAUH. pin. 192. prodr. 99.

Limonium minimum cordatum, s. folia retusa. BARR. ic. 803.

Loc. Ad rupes maritimas frequens. PERENNIS.

FRANKENIA. LINN. gen. n. 401. syst. n. 441.

Calyx subcylindricus, quinqueidentatus, persistens. Stamina quinque. Stylus unus stygmate bifido. Capsula unilocularis, ab imo ad summum in tres valvas dehiscens, polysperma.

1609. FRANKENIA pulverulenta.

Icon. TAUR. Vol. XVI. tab. 103.

Franca maritima quadrifolia supina, chamaesyces folio, & facie. MICH. gen. 23.

Frankenia foliis obovatis retusis, subius pulveratis. LINN. spec. p. 474.

Franca foliis ovatis. GER. Fl. Gallopr. p. 319. n. 1.

Anthyllus valentina. CLUS. hist. 2. p. 186.

Aisine maritima supina foliis chamaesyces. TOURN. inst. 663.

Loc. In agris Nicaensibus arenosis collectam habeo. ANNUA.

PYROLA. LINN. gen. n. 490. syst. n. 545. TOURN. tab. 132.

Calyx campaniformis, quinquefidus. Stamina decem, saepius inaequaliter disposita.

Stylus unus cum stygmate quinquefido. Capsula 5-locularis, loculis polyspermis.

1610. PYROLA rotundifolia.

Icon. TAUR. Vol. VII. tab. 107. f. 2.

Pyrola staminibus adscendentibus, pistillo declinato. LINN. spec. p. 567.

Pyrola foliis subrotundis, tubis recurvis. HALL. hist. tam. 1. n. 1010.

Pyrola folia rotundo. RAVIN. tab. 135. & folia obtuso ibid. tab. 136.

Pyrola rotundifolia major. BAUH. pin. p. 191. TOURN. inst. p. 256.

Pyrola. BAUH. hist. III. 535.

Pyrola. MATTH.

Off. Pyrola.

Loc. In dumetis saxosis, & umbrosis alpium nascitur. PERENNIS.

Vir. Adstringit, & abstergit, minus succosa, quam Bugula, cujus virtutes aemulatur. HELVETI magni faciunt, eamque vulnerariarum stirpium speciebus addere solent.

1611. PYROLA minor.

Pyrola floribus racemosis dispersis, staminibus, pistillisque rectis. LINN. spec. p. 567.

Pyrola foliis subrotundis, subis rectis. HALL. *hist. tom. 1. n. 1009.*

Pyrola minor. RIVIN. *pentap. irreg. tab. 134.*

Loc. CACCIA in valle *Uiciensi*. Abunde nascitur in umbris montanis circa *Luce-rome*, supra *Sanctuarium B. M. V. d' Oropo*, atque in alpihus *Chamony*, & *Prolugan*. PERENNIS.

1612. PYROLA secunda.

Pyrola racemo unilaterali. LINN. *spec. p. 567.* HALL. *hist. tom. 1. p. 430. n. 108.*

Pyrola folio mucronato serrato. BAUH. *pin. p. 191.* TOURN. *inst. p. 256.*

Pyrola folio serrato. BAUH. *hist. III. 536.*

Pyrola II. tenuior. CLUS. *pon. 506.*

Loc. Abunde in monte *Cenisio*, valle di *Locono*, alpihus *Voldensium*, & di *Ussey*. PERENNIS.

1613. PYROLA uniflora.

Pyrola scopi uniflora. LINN. *spec. p. 568.* HALL. *hist. tom. 1. p. 431. n. 1011.*

Pyrola flore singulari. RIVIN. *tab. 137.*

Pyrola minima alpina. BAUH. *hist. III. 536.*

Loc. Umbrosa, & frigida loca incolit prope *Chomony*, *Linsbourg*, in monte *Cenisio*, & alpihus di *Locona*. In editionibus supra *Courmajoür* copiose nascentem legit *Petrus MOLINERI*. PERENNIS.

RESEDA. LINN. *gen. n. 537. syst. n. 608.* TOURN. *tab. 238.*

Calyx profunde multipartitus, in variis speciebus diversimode. Petala saepius quinque, interdum sex, aliquibus multifidis. Styli tres ad quinque. Capsula unilocularis, apice hians valvis tribus, aut quatuor, sed in *Sesamoide* fructus ex quinque capsulis monospermis compositus.

1614. RESEDA luteola.

Icon. *TAVR. Vol. III. tab. 88.*

Reseda foliis ellipticis obtuse lanceolatis undulatis, calycibus quadrifidis. HALL. *hist. tom. 2. n. 1058.*

Reseda foliis lanceolatis integris basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. LINN. *syn. 12. p. 329.*

Reseda foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis. GER. *p. 376. n. 1.*

Luteola herba salicis folio. BAUH. *pin. p. 100.* TOURN. *inst. p. 423.*

Sirasto folio. MATTH.

Off. *Luteola.*

Loc. In Comitatu *Astensi*, *Liguria*, & *Monteferrato* ad muros, vias, & ruderata. ANNUA.

Vin. A nobis neglecta planta, alibi, data opera, colitur propter luteum colorem.

1615. RESEDA lutea.

Reseda foliis omnibus trifidis, inferioribus pianotis. LINN. *spec. p. 645.*

Reseda hexapetala, foliis pinnatis, undulatis, calyce sexfido. HALL. *hist. tom. 2. n. 1056.*

JACQ. *Fl. Austr. tab. 353.*

Reseda vulgaris. BAUH. *pin. p. 100.* TOURN. *inst. 423.*

Reseda luteo. BAUH. *hist. III. 467.*

Reseda Plinii Neotericorum, Belgis Erucio peregrina italica, vel cantabrica. LOR. *ic. 222.*

Loc. In aridis, & subulosis praesertim torrentium, & fluminum in agro *Pedemon-tono* vulgaris est. ANNUA.

1616. RESEDA alba.

Icon. *TAVR. Vol. III. tab. 87. & Vol. XV. tab. 4. 8.*

Reseda foliis pinnatis, floribus tetragynis, calycibus sexpartitis. LINN. *spec. p. 645.*

Reseda maxima. BAUH. *pin. p. 100.*

Reseda foliis calettrapae, flore albo. MORIS. h. r. hlez. TOURN. inst. p. 423.
Loc. Io comitatu Nicacensi locis sterilibus, & arenosis. *ANNUA.*

1617. RESEDA phyteuma.

ICON. TAUR. Vol. XXVI. tab. 73.

Reseda foliis integris, trilobisque, calycibus sexpartitis maximis. LINN. spec. p. 645.

Reseda foliis radicalibus integris, caulinis integris, & semitrilobis, calycibus sexfidis florem superantibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1057.

Reseda minor vulgaris TOURN. inst. p. 423.

JACQ. Fl. Austr. tab. 132.

Reseda affinis phyteuma. BAUH. pin. p. 100.

Phyteuma. BAUH. hist. III. 386.

Erucago apula trifida quinquefolia. COL. ecphr. 267. tab. 269.

Reseda calicanalis. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 204.

Loc. Ad vias, & locis saxosis, tum etiam in vicis collium calidiorum. *ANNUA.*

1618. RESEDA sesamoides. tab. 88. f. 3.

ICON. TAUR. Vol. XXVIII. tab. 20.

Reseda foliis lanceolatis integris, fructibus stellatis. LINN. spec. p. 644.

Sesamoides fructu stellato. TOURN. inst. p. 424.

Reseda stellata. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 204.

Loc. In saxosis apricis provinciae Aquensis circa Mieuje, & la cà di prà. *PERENNIS.*
DESCR. Planta perennis. Ex una radice caules plures prostrati, sesquipalmares, striati, subangulati, virides. Folia radicalia elliptico-spathulata, longe lingulata: caulina sessilia, fere linearia, sed versus finem ampliora, obtusa, glabra omnia, neque sinuata, neque dentata. Caules saepissime simplices. Flores longissime racemosi, subsessiles. Calyx profundissime quinquefidus. Ex calyce receptaculum florem sustinens. Perala alba. Antherae luteae. Germina distincta quinque, quae in toridem capsulas abeunt monospermas. Calyx expansus, & reflexus tribus segmentis sursum spectantibus, & duobus inferius.

SPIRÆA. LINN. gen. n. 354. syn. n. 630.

Calyx quinquefidus. Petala quinque aequalia. Stamina plura. Capsulae plures coogestae, bivalves, in nostris monospermae.

1621. *SPIRÆA* aruncus.

ICON. TAUR. Vol. XXI. tab. 19.

Spiraea foliis bipinnatis, floribus hermaphroditis, masculisque. GOU. illustr. p. 31.

Spiraea foliis supradecompositis, specie paniculatis, floribus dioicis. LINN. spec. p. 702.

Ulmaria floribus in longas spicas digestis. BOHER. ind. p. 293.

Filipendula dioica foliis duplicato-pinnatis, pinnis quinquefoliis, trifoliis, & simplicibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1134.

Barba caprae floribus oblongis. BAUH. pin. 163.

Barba caprae. BAUH. hist. III. p. 488.

Loc. In dumetis, & in sylvis collinis, & montanis frequens. *PERENNIS.*

1622. *SPIRÆA* filipendula.

Spiraea foliis pinnatis, foliolis uniformibus serratis, caule herbaceo, floribus cymosis.

LINN. spec. p. 702. CRANTZ. fasc. 2. p. 82.

Filipendula foliis pinnatis maximis intermixtis, extremo trilobato. HALL. hist. tom. 2. n. 1136.

Filipendula vulgaris. BAUH. pin. 163.

Filipendula. MATTH.

Loc. In pratis agri Pedemontani passim reperitur. Copiosius in pratis, quae parum distant a montibus. *PERENNIS.*

VIR. Universæ plantæ inest principium acidum alkalino sali junctum; copiosius hoc principio redundat radix, quæ præsertim ad usus medicinales recipitur. Alvi fluxus dicitur cohibere, sed præsertim ad calculum pellendum commendata est radix *FILIPENDULÆ*, quæ datur in pulverem redacta a drachma una ad drachmas duas. Vis ejus convenit cum virtute radicum *Fragariæ*, aliarumque similium plantarum.

1613. *SPIRÆA ulmaria.*

Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 10.

Spiræa foliis pinnatis impari majore lobata, floribus cymosis. LINN. spec. p. 702.

Filipendula foliis pinnatis acutè serratis minimis intermixtis, extrema trilobata maxima.

HALL. hist. tom. 2. n. 1135.

Ulmæ vulgaris. PARK.

Barba capræ floribus compactis. BAUH. pin. 164.

Ulmæ. BAUH. hist. III. 488.

Loc. Secus aquarum canales, quibus prata irrigantur, in agro *Pedemontano* abunde. *PERENNIS.*

VIR. Non unus, sed diversæ naturæ activa principia continet *ULMÆ*. Adstringendo abstergit principio fixo, sed præterea volatili abstergente, & resolvente humores solvit, atque minima vasa expedit. Succus, & decoctum *ULMÆ* utile est in alvi fluxu. Aqua vero stillatitia efficax habetur in febribus mali moris, in quibus opportunum est alvi fluxum cohibere, humorum corruptionem continere, ac blande perspirationem propellere. In febribus igitur peticularibus, quæ hæc sibi vindicant indicationes, eadem aestimatur, ac a Medicis utiliter adhibetur. Datur succus *ULMÆ* ab unciiis duabus ad uncias quatuor. Aquæ stillatitiæ usus, repetitis dosibus unciarum quatuor, aut sex pro ratione circumstantiarum, præscribitur.

TRIBULUS. LINN. gen. n. 476. syst. n. 527. *TOURN. tab. 141.*

Calyx profunde quinquefidus. Petala quinque aequalia. Stamina decem. Stylus nullus.

Syigma capitatum. Capsulae plures congestæ, aculeatæ.

1614. *TRIBULUS terrestris.*

Tribulus foliis subexjugis subaequalibus, seminibus quadricarnibus. LINN. syst. 12. p. 296.

Tribulus terrestris ciceris folio, fructu aculeato. BAUH. pin. 252.

Tribulus terrestris. BAUH. hist. II. p. 352.

Tribolo terrente. MATTH.

Loc. *Niceæ* secus arva abunde: nobis circa *Segusium* occurrit, in comitatu *Anseni*, & in valle *Augustæ Præstariæ*, necnon in *Liguria*, & *Monteferrato*. *ANNUUS.*

STAPHYLÆA. LINN. gen. n. 336. syst. n. 311. *TOURN. tab. 386.*

Calyx concavus, quinquefidus, marcescens. Petala elliptica. Stamina quinque.

Styli bini, quandoque tres. Capsula membranacea, interdum 3-locularis, vesicae instar inflata continet ossicula globosa.

1615. *STAPHYLÆA pinnata.*

Staphylæa foliis pinnatis. LINN. spec. p. 386. HALL. hist. tom. 1. n. 831.

Pistacia silvestris. BAUH. pin. 401.

Nux vesicaria. DOD. pempt. 318.

Loc. In collinis frequens ad sepes. *FRUTEX.*

TILIA. LINN. *gen.* n. 387. *yst.* n. 660. TOURN. *tab.* 381.

Bractea oblonga, pedunculum multiflorum sustinens. Calyx profunde quinquepartitus, deciduus. Stamina plurima, in phalanges disposita. Stylus unus. Capsula globosa, coriacea, quinquelocularis, quinquevalvis, loculis monospermis, sed unum tantum plerumque solet ad maturitatem pervenire.

1616 **TILIA** europaea.

Icon. *TAUR.* Vol. XXII. *tab.* 44.

Tilia floribus nectario densius, LINN. spec. p. 733.

Tilia foliis cordato-lanceolatis spongiosis, ad nervorum folii angulos sessilibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1030.

Tilia (officinarum Tilia omnium). CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 96.

Tilia platyphyllos. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 641.

Tilia foemina folio majore. BAUH. pin. 426.

Tilia vulgaris platyphyllos. BAUH. hist. I. part. 2. p. 133.

B *Tilia montana maximo folio. BAUH. pin. 426.*

Tilia foemina. MATTH.

Off. Tilia.

VERN. Tiliô.

Loc. In montanis sylvis sponte provenit, frequentius in *Canapiciensibus*, & *Eporediensibus* etiam ad rupes. **B.** in collinis sylvis prope *Augustam Taurinorum* reperitur. *ARBOR.*

VIR. **TILIAE** lignum album est, leve, atque commodum ad opera nonnulla tormentorum. Cortex medius mucilaginem dat utilem ad ambusta. Flores sunt grate odorati: blande resolvunt, atque nervorum spasmos leniunt. Adhibentur in morbis capitis, praesertim in vertigine: vidi profuisse in morbis ventriculi spasmodicis. Perspirationem etiam leniter promoveant. Praescribi solet aqua stillatitia, aut theiforme infusum. Dosis florum **TILIAE** est a pugillis duobus ad manipulum semis. Fructus adstringentes sunt, atque fluidam alvum cohibent.

ACER. LINN. *gen.* n. 1013. *yst.* n. 1155. TOURN. *tab.* 386.

Calyx quinquefidus, coloratus. Receptaculum balsamicum, tuberosum, rotundum intra calycem: ex eo petala quinque elliptica calycis longitudine. Stamina octo, etiam decem. Tuba bicornis. Duæ capsulae monospermae ad latus educunt suam quaeque alam recurvam, suo semine multo majorem.

1617 **ACER** platanoides.

*Acer foliis quinquelobis, dentibus acutis, intervallis lunatis racemis erectis. HALL. hist. tom. 1. p. 443. n. 1019. * * * **

Acer foliis quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, floribus corymbosis. LINN. spec. p. 1496.

Acer platanoides. MÜNTING. Phytogr. f. 11.

Loc. In sylvis editioribus vallis *Brossae* dictae, & *Segusii* frequens. *ARBOR.*

1618. **ACER** pseudo-platanus.

Icon. *TAUR.* Vol. XIV. *tab.* 102.

*Acer foliis quinquelobis, acute serratis, racemis pendulis. HALL. hist. tom. 1. p. 443. n. 1019. * * * **

Acer foliis quinquelobis inaequaliter serratis, floribus racemosis. LINN. spec. p. 1495.

Acer montanum. LAM. Fl. Franc., tom. 2. p. 533.

Acer montanum candidum. BAUH. pin. 430.

Acer majus multis falso-platanus. BAUH. hist. I. part. 2. p. 168.

Loc. In montanis, & collinis sylvis vulgaris arbor. *ARBOR.*

VIR. Succus ex vulnerato **ACERE** stillans dat saccharum, uti **ACER** saccharinum.

1619. ACER campestre.

Acer foliis semirilobis obtusis, lobis lateralibus emarginatis. HALL. hist. tom. 1. p. 443. n. 1019.

Acer foliis lobatis obtusis emarginatis. LINN. spec. p. 1497.

Acer campestre, & minus. BAUH. pin. 431.

Acer vulgare minori folio. BAUH. hist. l. part. 2. p. 166.

Loc. Ad sepes agri Pedemoniani frequentissimum, potissimum locis submontanis, vel etiam collinis Taurinensibus. ARBOR.

1630. ACER monspessulanum.

Acer foliis trilobis integerrimis glabris. LINN. spec. p. 1497.

Acer trifolium. BAUH. pin. 431. FLUK. alm. 7. tab. 251. f. 3. DURAM. arbr. 1. p. 28. tab. 10. f. 8.

Loc. Locis saxosis, apricis, necnon in vinetis vallis Maurianensis circa S. Michel, S. Martin, & S. Julien. FRUTEX.

FRAXINUS. LINN. gen. n. 5016. syst. n. 1160. TOURN. tab. 343.

Fraxini species alia petaloidea, alia apetalæ est. In omnibus stamina duo, germen unicum, quod abit in fructum linguiformem, planum, membranaceum, semen unicum includentem. Petaloidea species petala quatuor, aut quinque habet angusta, sed præterea in eadem planta adsunt flores masculi, & hermaphroditi.

1631. FRAXINUS excelsior.

ICON. TAUR. Vol. XXII. tab. 27.

Fraxinus foliolis serratis, floribus apetalis. LINN. spec. p. 1509.

Fraxinus apetalæ foliis pinnatis serratis. HALL. hist. tom. 1. n. 528.

Fraxinus excelsior. TOURN. inst. p. 577. BAUH. pin. p. 416.

Fraxinus vulgaris. BAUH. hist. l. p. 174.

Fraxinus apetalæ. LAM. Fl. Franc., tom. 2. p. 525.

FRASSINA. MATTH.

OFF. Fraxinus.

VERN. Frassa.

Loc. Ubique in montanis, & subalpinis reperitur: nec in collibus desideratur. ARBOR.

VIR. FRAXINI lignum durum est, atque propter rectitudinem, validumque fibrarum nexum ad nonnulla utensilia insignis usus est. Ejus cortex pro febrifugo habitus est, recentibus observationibus clar. virorum COSTE, & WILLEMET nuper confirmatus: nimirum corticis in pulverem contriti drachmæ duæ, vel etiam tres in decoctione foliorum FRAXINI iteratis vicibus tempore remissionis, aut apyrexiae exhibentur, eaque dosis, sublata febris, minuitur. Valuit cortex FRAXINI ad febres tertianas superandas, minime autem sustulit quartanam. Continet cortex FRAXINI principia fixa, & volatilia, antiseptica, incidentia, & resolventia. Estimulando etiam videntur folia FRAXINI aliquantisper alvum movere. Vix quidem antiseptica febrifuga major inest cortici Peruviano, sed nostræ plantæ cortex minime est contemnendus, quum ab eo haud timenda ea mala sint, quæ Chinae chinæ stipectici, atque fientis medicamenti usum consequuntur. Puto etiam cortici FRAXINI aut acida antiseptica, aut alia amara aromatica, aut saponacea abstergentia utiliter adjungi posse pro indicationum diversitate. Contra luum celticam etiam commendatus fuit veluti Guajaci succedaneus, sed hæc vires experientia non comprobavit. Semen multum acre, & aromaticum, mucum incidit, seti copiam augeat, atque diureticum est, quod prodest in cachexia, hydropse incipiente. In pulverem redactum exhibetur dosi scrupuli, aut drachmæ unius, vel duplo major dosis vino albo infunditur. Sal per incinerationem ex FRAXINO elicitus potenter incidit, atque diureticus est.

1632. FRAXINUS ornus.

ICON. TAUR. Vol. XXII. tab. 28.

Fraxinus foliolis serratis, floribus corollatis. LINN. spec. p. 5510.

- Fraxinus florifera*. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. p. 282. n. 1250.
Fraxinus humilior, s. *olero Theophrasti minore*, & *tenuiore folio*. BAUH. pin. 416.
Fraxinus tenuiore, & *minore folio*. BAUH. hist. I. p. 177.
Fraxinus florifera Botryoides. MORIS. *prael.* 265. *Ort. angl.* 33. tab. 9.
 Loc. In sylvestribus, & saxosis locis collium editiorum Provinciae *Aquensis*. *FRUTEX*.
VIR. In calidis regionibus mannæ officinarum suppeditat.

EVONYMUS. LINN. *gen.* n. 240. *syn.* n. 270. *TOURN.* tab. 388.

Calyx monophyllus quadri, vel quinquefidus. Corolla rosacea petalis quatuor, vel quinque patentibus. Strygma obtusum. Fructus membranaceus, angulosus, ex quatuor, vel quinque capsulis coactis, in quibus semina pulpæ involuta hærent.

1633 **EVONYMUS** latifolius.

- Icon. TAUR.* Vol. XXVIII. tab. 28.
Evonymus foliis acutis, & *argute serratis capsularum ongulis oculis membranaceis*. GOU. hort. p. 113.
Evonymus pedunculis lateralibus parvis, *foliis subrotundis*, *fructibus oclatis*. SCOP. *Fl. Carn.* p. 315. HALL. *hist. tom.* 1. n. 830.
Evonymus latifolio. BAUH. *hist.* I. p. 202.
Evonymus primus, sive *latifolius*. CLUS. *hist.* 56.
Evonymus latifolius. VILL. *prosp.* p. 21.
 Loc. In editioribus montibus *Liguriae* lectus in hortum translatus est. Nuper raram hanc stirpem legit circa *S. Michael Maurianensem* Ignotius MOLINERI. *FRUTEX*.

1634 **EVONYMUS** europæus.

- Icon. TAUR.* Vol. I. tab. 131.
Evonymus foliis obtuse serratis, *capsularum ongulis obtusis*. GOU. hort. *monsp.* p. 113. n. 1.
Evonymus foliis ovato-lanceolatis serratis, *ramis tetragonis*. HALL. *hist. tom.* 1. n. 829.
Evonymus floribus plerisque quadrifidis. LINN. *spec.* p. 286. *foliis sessilibus*. MANTH. obs.
Evonymus pedunculis solitariis, *petalis oblongis*, *fructibus oclatis*. SCOP. *Fl. Carn.* p. 324. n. 1. ed. 2. n. 267.
Evonymus vulgaris granis rubenibus. BAUH. pin. 428.
Evonymus multis aliis tetragonia. BAUH. *hist.* 1. p. 201.
Evonimo. MATTH.
 Off. *Evonymus*.
 VERN. *Boréte & Preive*.
 Loc. Ad sepes, & in sylvis præcipue montanis ubique. *FRUTEX*.
VIR. Pene venenata stirps vehementer purgat. Pulvis fructuum efficacæ remedium est ad pediculos, aliaque insecta necanda.

3. CALYCE POLYPHYLLO.

PARNASSIA. LINN. *gen.* n. 345. *syn.* n. 381. *TOURN.* *inst.* 127.

Calyx pentaphyllus. Stamina quinque. Necasias quinque cordata, ciliata, apicibus globosis. Strygma quatuor. Capsula quadrilocularis, quadrivalvis, loculis polyspermis.

1635 **PARNASSIA** palustris. LINN. *spec.* p. 391. HALL. *hist. tom.* 1. n. 832.

- Icon. TAUR.* Vol. VII. tab. 107. f. 1. & Vol. XIX. tab. 15. fig. 7.
Parnassia foliis omnibus cordatis. GOU. hort. 157.
Parnassia palustris, & *vulgaris*. *TOURN.* *inst.* 246.
Græmen Parnassi albo simplici flore. BAUH. pin. 309.
Græmen Parnassi Dodoneo quibusdam hepaticis flor. BAUH. *hist.* III. p. 537.
 Off. *Parnassia*, s. *hepatica alba*.
 Loc. Ubique ad rivulos, & fontium scaturigines, atque etiam in pratis humectis, locis montanis, & subalpinis. *PERENNIS*.

VIOLA. LINN. *gen. n.* 898. *sys. n.* 1007. TOURN. *tab.* 136.

Calyx pentaphyllus. Corolla irregularis, postice calcarata. Stamina quinque antheris connexis. Stylus unus. Capsula unilocularis, trivalvis, polysperma.

1636 VIOLA pinnata.

ICON. TAUR. Vol. XXIII. *tab.* 16. f. 3.

Viola acaulis foliis pinnato-multifidis, & laciniatis. MISC. TAUR. *tom.* 3. p. 181. *tab.* 3. f. 2. *tam.* 3. p. 84.

Viola acaulis foliis pinnatifidis. LINN. *spec. p.* 1323.

Viola scapis radicalibus nudis, foliis multifidis obtusis. HALL. *hist. tom.* 1. n. 361.

Viola alpina folio in plures partes dissecto. BAUH. *pin.* 199.

Loc. Habitat in jugo Asiense dicto inter Albergian, & Fenestrelles; inter montes Genevre, & Casana ad rupes, & in valle di Tigne. Reperta etiam est supra Termignon, & in monte Cenisia prope l' Ospialetto. BIENNIS.

1637. VIOLA hirta.

ICON. TAUR. Vol. VI. *tab.* 101. 102. 103. f. 1.

Viola acaulis foliis cordatis piloso-hispidis. LINN. *spec. p.* 1324. HALL. *hist. tom.* 1. n. 359.

Viola acaulis stolonibus repentibus densiuscula. Ejusdem *enum. helv.* 301.

Viola maritima hirsuta inodora. MORIS. *ox.* 2. p. 473. *tab.* 33. f. 4.

Loc. Secus sylvas, sepes, & ad vias, & secus pascua, primovere non infrequens. PERENNIS.

1638. VIOLA palustris.

Viola acaulis foliis reniformibus. LINN. *spec. p.* 1324. HALL. *helv.* 301.

Viola palustris rotundifolia glabra. MORIS. *hist. tom.* 2. p. 463. *sect.* 3. *tab.* 33. f. 3.

Loc. In alpinis irriguis, & humentibus; non tamen frequens. Copiose ad fontium scaturigines circa Tendam, & in pratis spongiosis Canapiciensis, observantur Ignatio MOLINER. In monte du grand Saint Bernard Franciscus PETROLERI. PERENNIS.

1639. VIOLA odorata.

ICON. TAUR. Vol. VI. *tab.* 90. 91. 92. 93. 94.

Viola acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. LINN. *spec. p.* 1324. HALL. *hist. tam.* 1. n. 358.

Viola pedunculis radicalibus, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. SCOP. *Fl. Carn. p.* 346. n. 1. ed. 2. n. 1097.

Viola acaulis maritima purpurea. BAUH. *hist. III.* p. 342.

Viola purpurea. MATTH.

OFF. Viola maritima.

VERN. Violette.

VIOLA maritima alba. BAUH. *pin.* 199.

Loc. In agro Pedemontano ubique. PERENNIS.

VIR. Inter emollientes recensetur VIOLA, & non infrequenter adhibetur; praeter autem vim emollientem aliquid huic plantae inest exstimulantis. Succus florum cum calycibus expressorum leniter, & utiliter alvum movet absque incommodo: utilis est praecipue in hypocondriacis, qui plerumque a purgantibus laeduntur. Ex seminibus contritis emulsio paratur, quae leniter vomitum, alvumque excitat; dosis a drachmis duabus ad sex, aut etiam ad unciam unam. Sirupus violatus recenter paratus, & convenienti dosi exhibitus alvum quoque laxat: Cochleatim dari solet in morbis pectoris ad tussim leniendam, & ad expectorationem aliquantisper ciendam. Major vis exstimulans in radice continetur; unciae semisis, aut unius decoctio commode vomitum, atque alvum sollicitat, similiterque drachmae duae pulveris radices violae valent ad hosce effectus gignendos

instar radicis Ipecacuanhæ, his igitur in casibus, in quibus Medici velint solummodo exstimulare remedio vomitum, alvumque excitare, loco Ipecacuanhæ, indigenæ, & familiaris hujusce plantæ radices poterunt adhibere.

1640. VIOLA nummularifolia N. tab. 9. fig. 4.

Icon. TAUR. Vol. XIV. tab. 99. fig. 2.

Viola foliis cordato-ocuminatis glabris integerrimis.

Viola alpina minima nummulariaefolia, BOCC. mus. 2. p. 163, tab. 127. SPEC. PEDEM. tab. 11. fig. 1.

Viola (nummulariaefolia), foliis subrotundis obtuse crenatis, stipulis lanceolatis serratis, coule brevissimo bifloro. VILL. prosp. p. 16.

Loc. Inter diffractos lapides summi, & edissimi jugi Col de la fema moria ad alpes Valderianas pertinens enascitur. Descriptionem dedi SPEC. PEDEM. p. 7. PERENNIS.

Obs. Folia in hac VIOLA sunt cordato-acuminata, glabra, integerrima; flos VIOLÆ maritimæ aequalis. Stipulae tridentatae.

1641. VIOLA cenisia, tab. 11. fig. 6.

Icon. TAUR. Vol. XIV. tab. 99. f. 3.

Viola foliis ovalibus integerrimis uniformibus, pedunculis caulinis, SPEC. PEDEM. p. 14. tab. 3. f. 4.

Viola caulibus filiformibus indivisis prorepentibus, foliis ovatis integerrimis glabris, stipulis indivisis. LINN. syst. 12. p. 585.

Viola radice multicauli, foliis petiolatis ovatis integerrimis. HALL. hist. tom. 1. n. 565.

Loc. Abunde oritur in monte Cenisio ad jugum Ronche dictum, & in jugis di Scerrieres, & valli Queiras imminetibus. PERENNIS.

Obs. Flore suo refert VIOLAM coeruleam grandifloram, a qua distinguitur foliis omnibus ovalibus, succosis, integerrimis.

1642. VIOLA alpina, JACQ. Fl. Austr. p. 24. tab. 241.

Loc. Cl. BELLARDI secus torrentem ischior prope thermas Vinodii legit. PERENNIS.

Obs. Folia dentata, uniformia, ovata, hanc ab aliis affinis abunde distinguunt.

1643. VIOLA biflora.

Icon. TAUR. Vol. VI. tab. 105. 106. f.

Viola caule debili paucifloro, foliis petiolatis reniformibus obtuse serratis. HALL. hist. tom. 1. n. 564.

Viola coule bifloro, foliis reniformibus serratis. LINN. spec. p. 1316.

Viola pedunculis caulinis, stipulis lanceolatis, foliis reniformibus serratis. LINN. spec. p. 1316.

Viola pedunculis caulinis, stipulis lanceolatis, foliis reniformibus. SCOT. Fl. Corn. p. 547. n. 4. ed. 2. n. 1099.

Viola alpina rotundifolia lutea. BAUM. pin. 199.

Viola maritima lutea. BAUM. hist. III. p. 544.

Loc. Ubique ad saxosa irrigua torrentium inter alpes. PERENNIS.

1644. VIOLA valderia, N. tab. 24. fig. 3.

Viola erecto herbaceo, foliis ellipticis sinuatis non dentatis, stipulis integerrimis.

Loc. Mihi occurrit nova hæc VIOLÆ species circa Volderis thermas in saxosis torrentis ad radices montis S. Joannis. ANNUA.

DESCR. Radix hujus VIOLÆ est parva, & albicans, ex qua cauliculus erectus, vix unciarum duorum altitudinem habens, striatus, & angulosus. Folia alternatim, & dense nascuntur. Radicalia, aut inferiora pene orbiculata sunt, reliqua elliptica, aut longe elliptica, petiolo pene longitudine folii, & intus sulcato. Foliorum aversa facies venosa est; ambitus autem sinuatus, & integerrimus. Flores ex alis foliorum nascuntur, pedunculis plantæ altitudinem superantibus, fere biuncialibus. Flos purpureus cum infimo petalo ad floris fauces luteo. Flos paullo minor mihi visus est, quam in VIOLA calcarata. Tubæ apex crassus est, & perforatus, & stipulae præstant duo foliola sæpius inaequalia.

1645. VIOLA canina.

ICON. TAUR. Vol. VI. tab. 109.

Viola caule adulescente ascendente, foliis oblongo-cordatis. LINN. spec. p. 1324.

Viola caule procumbente ramoso, foliis petiolis cordatis. HALL. hist. tom. 1. n. 563.

Viola pedunculis caulinis, stipulis ciliatis, foliis cordatis. SCOP. Fl. Carn. 546. n. 2. ed. 2. n. 1098.

Viola silvestris. LAM. Fl. Franc. tom. 2. p. 680.

Viola maritima inodora silvestris. BAUH. pin. 199.

Viola maritima caerulea inodora sylvestris, in cacumine semen ferens. BAUH. hist. III. p. 543.

Loc. In sylvis apricis, & caeduis collium, & montium. PERENNIS.

1646. VIOLA Ruppil N. tab. 26. fig. 6.

ICON. TAUR. Vol. VI. tab. 105. 106. f. 2.

Viola caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis serratis. HALL. hist. tom. 1. n. 562.

MSC. TAUR. tom. 5. p. 84.

Viola foliis mucronatis, & serratis. RUPP. Fl. Jenens. p. 289.

Viola flore albo. RIV. tab. 120.

Loc. In argillosis prope la Morra, similibusque locis inter Pinerolo, & Lucerna, in montibus Monregalensibus Cl. BELLARDI prope Majon, & Moncrivello in ericetorum spongiosis. PERENNIS.

DESCR. Caulibus procumbit angulatis, qui se se erigunt. Folia prima cordata, sed reliqua cordato-acuminata: venosa sunt, non succulenta, aequaliter, & dense denticulata. Petiolum est praeterpropter aequale foliorum longitudini. Pedunculus ex ala foliorum natus, folio longior, florem gerit dilute caeruleum, aut etiam album petalis omnibus similibus, ovalibus. Stipulae dentatae sunt denibus utrinque nunc duobus, nunc tribus. Capsula tribus valvis aperiitur, quarum quaelibet, quinque, aut sex in seriem posita subrotunda, nigra semina continet. Calyx floris ex quinque foliolis, quorum tria minora, duo majora. Ex eadem ala foliorum petiolas floriger, & ramus prodire solet. Folia glabra sunt. Petalorum prima parva prope originem suam pilosa.

1647. VIOLA montana.

Viola caule alto erecto, foliis ellipticis crenatis, stipulis semipinnatis. HALL. hist. tom. 1. n. 567.

Viola caulibus erectis, foliis cordatis oblongis. LINN. spec. p. 1325.

Viola maritima arborescens purpurea. BAUH. pin. 199. GARID. Aix. tab. 97.

Jacea tricolor surrectis cauliculis, quibusdam arborea dicta. BAUH. hist. III. p. 547.

Viola arborea. MATTH.

Loc. Observavi secus vias circa Albam Pompejam. PERENNIS.

1648. VIOLA mirabilis.

ICON. TAUR. Vol. VI. tab. 104.

Viola caule triquetro, foliis reniformi-cordatis, floribus caulinis apetalis. LINN. spec. p. 1326.

JACQ. Fl. Austr. tab. 19.

Viola montana latifolia, flores ex radice, semina in cacumine gerens. ZAMON. p. 228. tab. 176.

Loc. Prope Marigny in Sabaudia, atque in sylvis proximorum collium Taurinensium. PERENNIS.

1649. VIOLA tricolor.

ICON. TAUR. Vol. 6. tab. 111. 112.

Viola caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis, stipulis dentato-pinnatis, lacinia suprema oblonga densato-crenata petiolata. HUDS. Fl. Angl. p. 331. n. 6.

Viola caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis, stipulis pinnatifidis. LINN. syn. 12. p. 585.

Viola caule anguloso diffuso, foliis ovatis dentatis, flore calyce duplo longiori. HALL. *hist.* tom. 1. n. 568.

Viola pedunculis caulinis triquetris, stipulis laciniatis, foliis oblongis crenatis. SCOP. *Fl. Carn.* p. 546, n. 3. ed. 2. n. 1100.

Viola tricolor arvensis repens. BAUH. *pin.* 199.

Jacea tricolor hortorum, & frugum vitium Tragi. BAUH. *hist.* III. p. 548.

Jacea alba. MATTH.

B. *Viola bicolor arvensis.* BAUH. *pin.* 200. MISC. TAUR. tom. 5. p. 84.

Loc. *VIOLA tricolor* in montanis arvis nascitur; *bicolor* autem in arvis *Pedemontanis* abunde, & *Sabaudia.* *ANNUA.*

VIR. Hujusce plantae in crusta lactea utilitatem probavit peculiari libello CL. STRACK.

Habitaë autem observationes edocent hujusce plantae actione mucum solvi, atque haec mucoso-salina recrementa per urinarias vias evacuari. Herba decoquitur dosi manipuli unius, aut siccatae plantae pulvis datur dosi drachmae unius pulmentis etiam, atque alimeotis immixtus. Diu autem protrahendus est medicamenti usus.

1650. *VIOLA calcarata.*

Icon. TAUR. Vol. XXIII. tab. 16. fig. 2.

Viola caule erecto pauciflora, foliis imis subrotundis, caulinis ellipticis, stipulis semipinnatis maximis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 566.

Viola caule abbreviato, floris nectario subuloto petalis longiore, foliis subovatis, stipulis dentatis. LINN. *spec.* p. 1335.

Melanium montanum. DALECH. *hist.* 1204.

Viola alpina di più colori. ZANONI, p. 229. tab. 177.

B. *Viola montana caerulea grandiflora.* H. R. P.

C. *Viola montana lutea grandiflora.* BAUH. *pin.* 200.

Loc. In saxosis pascuis pene summatarum alpium abunde provenit flore saepissime violaceo. *PERENNIS.*

Obs. *VIOLAE calcaratae* nomen triviale servavi a *Celeberrimo LINNEO* datum in speciebus plantarum, licet illud mutaverit in systemare plantarum. Si pyrenaica vere diversa est, novum nomen habeat; sed puto non differre. Nomina porro trivialia sine magna necessitate non sunt delenda, multo minus cum aliis stirpibus commuanda.

IMPATIENS. LINN. *gen.* n. 899. *yst.* n. 108. *TOURN.* tab. 235.

Calyx dipyllus. Petala quinque inaequalia, nectario cucullato. Stamina quinque

Antheris connexis. Stylus unus. Capsula elongata, unilocularis, quinquevalvis, valvis elasticis.

1651. *IMPATIENS* nolitangere.

Icon. TAUR. Vol. VI. tab. 128.

Impatiens pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumensibus. LINN. *spec.* p. 1329.

Balsamina capsula oblonga tenui. BOHEM. *lips.* p. 131. n. 310.

Balsamina nolitangere. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 1101.

Noli me tangere. COL. *ecphr.* 1. p. 149. tab. 150.

Balsamina lutea, sive noli me tangere. BAUH. *pin.* 306. *TOURN. inst.* p. 419.

Noli me tangere. BAUH. *hist.* II. 908.

Persicaria siliquosa, & noli tangere. LOR. p. 135.

Impatiens lutea. LAM. *Fl. Franc.* tom. 2. p. 666.

Loc. Ubique locis umbrosis, & subhumidis ad radices montium. *ANNUA.*

HARMALA. TOURN. *inst.* 257. *tab.* 133. LUDW. *def.* n. 772.

Calyx pentaphyllus. Corolla pentapetala, aequalis. Stamina quindecim. Stylus trifidus.
Capsula trilocularis, polysperma.

1652 **HARMALA** multifida.

Peganum foliis multifidis. LINN. *spec.* p. 638.

Harmala. DOD. *pempt.* 121. TOURN. *inst.* 257.

Ruga sylvestris flore magno albo. BAUH. *pin.* 336.

Ruta, quae dici solet Harmala. BAUH. *hist.* III. p. 100.

Loc. In agro Nicaeensi nascitur. *PERENNIS.*

CISTUS. LINN. *gen.* n. 598. *syst.* n. 673. TOURN. *tab.* 10. f. 128.

Calyx persistens pentaphyllus, foliolis duobus minoribus. Corolla pentapetala, aequalis. Stamina numerosa. Stylus unicus. Capsula unilocularis trivalvis, aut quinquelocularis, polysperma.

EXSTIPULATI

1653 **CISTUS** laurifolius.

Icon. TAUR. Vol. XVI. *tab.* 18.

Cistus arborescens exstipulatus, foliis oblongo-ovatis petiolatis utrinque supra glabris, petiolatis basi connatis. LINN. *spec.* p. 736.

Cistus ledon, foliis laurinis. BAUH. *pin.* 467.

Ledum 1. *latifolium.* CLUS. *hist.* 1. p. 77.

Loc. In collibus circa Bistagno, unde in hortum regium Taurinense illatus est. *FRUTEX.*

1654. **CISTUS** monspeliensis.

Icon. TAUR. Vol. XVII. *tab.* 30.

Cistus arborescens exstipulatus, foliis lineari-lanceolatis sessilibus utrinque villosis trinerviis. LINN. *spec.* p. 737.

Ledum. DALECH. *hist.* 230.

Cistus ladanifera monspeliensium. BAUH. *pin.* 467. MAGNOL. *ind. plant. monspel.* p. 67.

Cistus ladanifera, sive Ledon monspesulanum angusta folio nigricanti. BAUH. *hist.* II. p. 10.

Loc. Frequens in aridis incultis, & saxosis circa Villafrancam Nicaensem. Copiosissime nasci circa Berra in Comitatu Nicaeensi vidit Ignatius MOLINERI. *FRUTEX.*

1655. **CISTUS** salvifolius.

Icon. TAUR. Vol. XVIII. *tab.* 80.

Cistus arborescens exstipulatus foliis ovatis petiolatis utrinque hirsutis. LINN. *spec.* p. 738.

Cistus fruticosus foliis petiolatis, ovatis rugosis serratis. HALL. *hist. rom.* 2. n. 1031.

Cistus foemina monspeliaca flore albo. BAUH. *hist.* II. 4.

Loc. In agro Nicaeensi ad rupes aridas. Nascitur etiam in Provincia Aquisani, & Aquisani circa Canale, & la Montà. *PERENNIS.*

Oss. Ex caule pedunculi uniflori petalis albis, duo, aut tria ad summum paria foliorum ad basim habentes. Folia viridia, subhirsuta, non viscosa.

1656. **CISTUS** incanus.

Icon TAUR. Vol. VII. *tab.* 38.

Cistus arborescens exstipulatus foliis spatulatis tomentosis rugosis: inferioribus basi vaginantibus connatis. LINN. *spec.* p. 737.

Cistus mar angustifolius. BAUH. *pin.* 464.

Cistus mar 2. CLUS. *hist.* 1. p. 69.

Loc. In Comitatu Nicaeensi non infrequens. *PERENNIS.*

ALLIONI Fl. Pedem. Tom. II.

C c

1657. CISTUS medius POURR.

Cistus formino, folio salviae, flore ochrae colore. TOURN. inn. 260.

Loc. In agro Nicaeensi. *FRUTEX.*

Obs. Caules rubentes, viscosi, pedunculi solitarii, axillares, & terminales: folia peniolata, multum rugosa, viridia, ovato-lanceolata, in ambitu denticulata: flos ochrae colore.

1658. CISTUS albidus.

Icon. TAUR. Vol. XVI. tab. 105.

Cistus arborescens exstipulatus, foliis ovato-lanceolatis tomentos incanis sessilibus uninerviis. LINN. spec. p. 737.

Cistus mas folio oblongo incano. BAUH. pin. 464.

Cistus mas IV. monspeliensis folio oblongo albedo. BAUH. hist. II. p. 3.

Cistus mas 1. CLUS. hist. 1. p. 68. bene

Cistus tomentosus. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 168.

Loc. In agro Nicaeensi ad rupes aridas. TERRANEUS in incultis, & maritimis collibus *Unelliae.* *FRUTEX.*

1659. CISTUS crispus.

Cistus arborescens exstipulatus, foliis lanceolatis pubescentibus trinerviis undulatis. LINN. spec. p. 738.

Cistus mos foliis chamaedryos. BAUH. pin. 464.

Cistus mas 3. CLUS. hist. 1. p. 69.

Loc. In Comitatu Nicaeensi. *FRUTEX.*

1660. CISTUS laevipes.

Icon. TAUR. Vol. XVII.

Cistus suffruticosus adscendens exstipulatus, foliis alternis fasciculatis filiformibus glabris, pedunculis racemosis. LINN. syst. 12. p. 367. JACQ. hort. vindob. tab. 138.

Cistus suffruticosus foliis linearibus, confertim oppositis, alternisque, pedunculis villosis glutinosus. GER. Fl. Gallopr. p. 364. c. icon.

Helianthemum massiliense Coridis folio. TOURN. inst. 250. BARR. obs. p. 31. n. 316.

Loc. In agro Nicaeensi frequens. *SUFFRUTEX.*

1661. CISTUS fumana.

Icon. TAUR. Vol. XXIII. tab. 27.

Cistus suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis alternis linearibus, margine scobris, pedunculis unifloris. LINN. spec. p. 740. SCOP. Fl. Corn. p. 312.

Cistus foliis duris confertis linearibus, petiolis unifloris, calycibus glabris. HALL. hist. tom. 2. n. 1032.

JACQ. Fl. Austr. tab. 252.

Cistus suffruticosus, foliis linearibus alternis nudis. GER. p. 393. n. 3.

Cistus nudifolius. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 163.

Chamaecistus luteus vermiculato folio, major. BARR. ic. 445.

Chamaecistus major, & minor, brevi, vermiculatoque folio hispanicus. BARR. ic. 286.

Erica Chrysanthemo minimo nostris. LOB. obs. 352.

Herba fumono. ACT. HAFEN. 3. obs. 63.

Loc. In aridis apricis collium calidiorum frequens. *SUFFRUTEX.*

1662. CISTUS calycinus.

Cistus fruticosus exstipulatus erectus foliis linearibus, pedunculis unifloris, calycibus triphyllis. LINN. mant. ult. append. p. 365.

Cistus humilis, seu Chamaecistus ericae folio, luteus, & elatior. BAUH. pin. 466. PLUK. olm. 107. tab. 83. f. 6.

Helianthemum tenuifolium, glabrum, flore luteo. BAUH. hist. 2. p. 18.

Loc. In apricis montanis, & collimis, atque alveis fluminum locis sabulosis. *PERENNIS.*

1663. CISTUS alpestris.

Cistus suffrutescens procumbens exstipulatus, foliis oppositis ciliatis, calycibus laevibus. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 103. tab. 6. f. 1.

Cistus caulis duris procumbentibus, foliis subhirsutis ellipticis conjugatis, petiolis unifloris, confertis, calycibus tomentosis. HALL. hist. tom. 2. n. 1034.

Chamaecistus serpillifolius. CLUS. pann. p. 62. 63.

Chamaecistus serpilli folio nigricante, & hirsuto, flore aureo, & odorato. BAUH. hist. II. p. 17.

Loc. Ubique in pascuis, & ad rupes locis montanis, & subalpinis, imo & alpes ascendit. *SUFFRUTEX.*

1664. CISTUS canus tab. 45. fig. 3.

Cistus suffrutescens exstipulatus procumbens, foliis oppositis obovatis villosis, subtus tomentosis, floribus subumbellatis. LINN. spec. p. 740.

Cistus exstipulatus foliis oppositis incanis nudis. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 103.

JACQ. Fl. Austr. tab. 278.

n. *Helianthemum foliis myrti minoris subtus incanis.* TOURN. inst. 249. GARID. Aix. 223.

Cistus marifolius. LINN. syn. p. 367.

Chamaecistus foliis myrti saraminae, canis, & cinereis. BAUH. hist. II. p. 18.

Chamaecistus 3. CLUS. hist. p. 74.

Loc. Habitat in Comitatu Nicaeensi. *SUFFRUTEX.*

1665. CISTUS italicus.

Cistus suffrutescens exstipulatus, foliis oppositis hispidis, inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis, ramis patentibus. LINN. spec. p. 740.

Helianthemum, serpilli folia villosa, flore pallido, italicum. BARR. rar. 510. tab. 366.

Cistus oleae folio villosa, flore aurea, italicus. BARR. ic. 365. obs. 509.

Cistus angusto serpilli folio villosus, flore aureo italicus. BARR. ic. 488. obs. 511.

Loc. In rupibus circa Luceram. *SUFFRUTEX.*

Obs. Puto CISTUM alpestrum, incanum, marifolium, italicum LINN. unam, eundemque plantam constituere, quae pro varietate locorum folia exhibet glabra, & ciliata; utrinque viridia, & pilosa; cinereo-incana, aut etiam incana. Certe exemplaria habeo CISTI canis, quorum quaedam utrinque incana sunt, alia tantum subtus incana, aliaque vix incana, atque pilis instructa, ut ad CISTUM alpestrum accedant. CISTUS alpestris modo glaber, modo pilosus incolit montana, & alpina loca. CISTUS italicus montes maritimos, locaque minus sole percussa. CISTUS canus sterilia, & rupestris loca soli patentia.

1666. CISTUS tuberaria.

Cistus exstipulatus perennis, foliis radicalibus, ovatis trinerviis tomentosis, caulibus glabris lanceolatis, summis alternis. LINN. spec. p. 741.

Cistus folio plantaginis. BAUH. pin. 465. MAGN. ind. plant. monsp. p. 69.

Tuberaria nostras major, & minor Myconi. BAUH. hist. II. p. 12. 13.

Cistus nervosus. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 164.

Loc. In Comitatu Nicaeensi locis sterilibus, & rupestribus quandoque occurrit: frequentius circa Nicaeam. *PERENNIS.*

1667. CISTUS guttatus.

ICON. TAUR. Vol. XX. tab. 45.

Cistus herbaceus exstipulatus, foliis oppositis lanceolatis trinerviis, racemis abreactatis. LINN. spec. p. 741.

Cistus flore pallida punicea macula insignito. BAUH. pin. 465.

Helianthemum flore maculoso. COL. cephr. 2. p. 78. tab. 77.

Loc. In pascuis siccis sterilibus Nicaeensis comitatus, Liguriae, Montisferrati, Canapiciensis, similibusque locis; secus flumen Ticinum copiosissime. *ANNUUS.*

STIPULATI

1668. CISTUS ledifolius.

Icon. TAUR. Vol. XVII. tab. 91. f. 1. & Vol. XVIII. tab. 73.

Cistus herbaceus globos stipulatus, floribus solitariis subsessilibus folio ternato oppositis.

LINN. spec. p. 742.

Cistus herbaceus, foliis alternatim confertis, subus subinconcis, capsulis longitudine calycis.

GER. p. 392. n. 1.

Cistus ledi folio. BAUH. pin. 465.

Cistus annuus foliis ledi. LON. ic. 2. p. 118.

Cistus herbaceus posulus villosus stipulatus, floribus alaribus, & terminalibus, stipulis minimis. ZINN got. p. 441.

Loc. In comitatu Nicoensi. ANNUUS.

1669. CISTUS salicifolius.

Cistus herbaceus posulus villosus stipulatus, floribus racemosis erectis pedunculis horizontalibus. LINN. spec. p. 742.

Cistus herbaceus, foliis alternatim confertis, subus subinconcis, capsulis calyce longioribus.

GER. p. 392. n. 2.

Cistus herbaceus erectus hirsutus stipulatus, floribus solitariis subsessilibus, folio ternato oppositis. ZINN got. p. 440.

Cistus folio salicis. BAUH. pin. 465.

Loc. In comitatu Nicoensi. ANNUUS.

1670. CISTUS serpyllifolius.

Cistus suffruticosus stipulatus, foliis herbaceis venosis marginibus porum ciliatis. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 101. tab. 6. fig. 3.

Loc. Circa thermas Vinadii in rupibus legi.

Cl. BELLARDI prope S. Vincent in valle Augustoe Procorioe. PERENNIS.

Obs. CISTUS serpyllifolius auctorum omnino ad alpestem videtur pertinere, atque hic CISTUS serpyllifolius fortasse varietas est CISTI helionthemii.

1671. CISTUS thymifolius.

Icon. TAUR. Vol. XVIII. tab. 73. fig. 3.

Cistus suffruticosus stipulatus procumbens, foliis ovato-linearibus oppositis brevissimis congestis. LINN. spec. p. 743.

Cistus folio thymi. BAUH. pin. 465. CLUS. hist. 72.

Cistus folio thymi Clusii cum maculis in flore. BAUH. hist. II. 6.

Helianthemum thymifolio, luteum majus, Chamaecistus luteus thymifolio, polyonthos, seu major. BARR. obs. n. 517. tab. 443.

Chamaecistus luteus, imis thymifoliis. BARR. rar. tab. 442.

C. *Chamaecistus luteus thymifolio polyonthos, s. major.* BARR. ic. 448. obs. 517.

Helianthemum thymifolio glabro. Tourn. inst. p. 249.

Chamaecistus angusto-thymifolio hispanicus. BARR. ic. 416.

Loc. In collibus maritimis frequens. SUFFRUTEX.

1672. CISTUS pilosus tab. 45. fig. 1. 2.

Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 94. f. 1.

Cistus suffruticosus stipulatus erectusculus, foliis linearibus subus bisulcatis incanis, calycibus laevibus. LINN. syst. 12. p. 568.

Cistus suffruticosus erectus, foliis majoribus petiolatis revolutis, subus incanis, caeteris linearibus. GER. p. 395. n. 9.

Chamaecistus 4. CLUS. hist. 1. p. 74.

Helianthemum flore albo, folio angusto hirsuto. Tourn. inst. p. 248. BAUH. hist. II. 17.

Cistus stipulis quaternis, foliis lineari-ovalibus incanis, calycibus tomentosis. SAUV. monsp. p. 148.

Loc. Abunde circa Segusium: in valle Macrae occurrit frequens locis saxosis, apricis, subalpinis. TERRANEUS in Ligurum montibus observavit: passim inter *Garrusia*, & *Ormea*, atque in Comitatu *Nicaeensi*. *SUFFRUTEX*.

Obs. Variat foliis laticribus, ovatis, vix revolutis; & angustioribus utroque latere revolutis, saepius candicantibus. Albus color floris mire ludit, atque habui in horto cultam stirpem exhibentem flores albos, sulphureos, ac etiam roseos. Eadem planta in collibus maritimis *Nicaeensibus* solet roseum colorem ostendere. Puto *CISTUM apenninum*, & *polyfolium* LINNÆI, a *CISTO pilosa* non differre. Fig. 1. exhibet *CISTUM pilosum* foliis vix revolutis donatum. Alteram autem varietatem exhibet fig. 2. *CISTUS mutabilis* JACQ. misc. austr. vol. 2. non videtur alia planta esse.

1673. *CISTUS helianthemum*.

Icon. TAUR. Val. VIII. tab. 40. 41. 42.

Cistus suffruticosus procumbens stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosus. LINN. spec. p. 744.

Cistus stipulatus foliis subhirsutis ellipticis obtuse acuminatis. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 100.

Cistus suffruticosus procumbens foliis majoribus subtus subincanis oblongis, minoribus linearibus ciliatis. GER. p. 395. n. 8.

Cistus foliis conjugatis ellipticis hirsutis integerrimis, petiolis unifloris subhirsutis. HALL. hist. tam. 2. n. 1033.

Helianthemum vulgare flore lutea. BAUH. hist. II. p. 15.

Flos salis. DOD. pempt. 193.

B. *Helianthemum vulgare flore alba.* TOURN. inst. 248.

Loc. Ad vias in montanis ubique: in sylvis apricis, & pascuis agri *Pedemontani* etiam frequenter. Varietas B. in montanis pascuis *Taurinensibus*. *SUFFRUTEX*.

Vir. Cum aliqua vi abstergente adstringit, & pro vulnerario habitus est, sed nostris diebus exolevit.

1674. *CISTUS grandiflorus*.

Cistus grandiflorus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. m. 642. tab. 25.

Helianthemum alpinum vulgari simile foliis laxioribus. SECV. veran. suppl. p. 193. tab. 6. fig. 1.

Loc. Frequens in pascuis saxosis montanis, & subalpinis. *PERENNIS*.

Obs. Adeo ludit *Cistus helianthemum* pro varietate locorum, ut fere putaverim ad unam, eandemque plantam pertinere *CISTUM angustifolium*, & *hispanicum* CL. JUSSIEI, *CISTUM grandiflorum*, *helianthemoidem* CRANTZ, & *serpillifolium*.

1675. *CISTUS roseus.* tab. 45. fig. 4.

Helianthemum folia ampliori, flore rosea. SCHER. phil. trans. n. 383. HALL. got. p. 114. Misc. TAUR. tom. 3. p. 89.

Loc. In comitatu *Nicaeensi*, & *Uneliæ*. *SUFFRUTEX*.

Obs. Suspicio meram varietatem esse *CISTI helianthemi*, licet caule magis ramoso, & fruticoso, foliis etiam firmioribus, subtus subincanis, videatur differre: rarum enim non est, locis maritimis *CISTUM helianthemum*, roseum colorem exhibere: caules in frigidis locis annui, & pereuntes saepe perennant, & fruticosi evadunt in calidis.

1676. *CISTUS rosmarinifolius*.

Cistus foliis oblongo-linearibus, margine revolutis. SAUV. monsp. p. 148.

Cistus foliis lanceolato-linearibus integerrimis, subtus incanis. GRON. Fl. Orient.

Cistus (hirsutus) suffruticosus stipulatus foliis ovatis, calycibus hispidis. LINN. spec. p. 744.

Cistus ledan rosmarinifolius foliis subtus incanis. BAUH. pin. 467.

Ledan VIII. CLUS. hist. p. 80.

Loc. In aridis circa *Villafrancam Nicaensem* lectum habeo. *SUFFRUTEX*.

ALLIONI Fl. Pedem. Tom. II.

D d

Oss. *Hirti* nomen triviale mutavi, quum haec planta nullibi hirta sit. Folia habet supra lucide-virentia, subtus incana: calyces etiam subalbicantes sunt: nihil habet hirti, & pilosi. Distincta a reliquis *Cisti* speciebus planta est.

1677. *CISTUS glutinosus*.

Icon. TAUR. Vol. XXVIII. tab. 53.

Cistus suffrutescens stipulatus: foliis linearibus oppositis, alternisque, pedunculis villosis glutinosus. LINN. *man. alt.* p. 246.

Chamaecistus incanus tragorigani folio hispanicus. BARR. *rar.* 522. *tab.* 415.

Helianthemum folio thymi incano. BAUH. *hist. II.* p. 19. *TOURN. ins.* 249.

Chamaecistus mas flore rubello, thymi foliis. BARR. *ic.* 328.

Loc. In rupibus agri *Nicaeensis* *Anconius* JUSSIEU; ibi revera non infrequens est. *SUFFRUTEX.*

PORTULACA. LINN. *gen.* n. 531. *syn.* n. 603. *TOURN. tab.* 118.

Calyx diphyllus, aut profunde bifidus. Corolla pentapetala, aequalis. Stamina plura. Stylus simplex, multifidus. Capsula uoilocularis, polysperma, horizontaliter dehiscens.

1678. *PORTULACA oleracea.*

Portulaca foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. LINN. *spec.* p. 638. *HALL. hist. rom.* 1. n. 968.

Portulaca angustifolia sylvestris. BAUH. *pin.* 288.

Portulaca sylvestris minor, seu spontanea. BAUH. *hist. III.* p. 678.

Portulaca salviaica. MATTH.

Off. *Portulaca.*

VERN. *Portulana.*

Loc. In agris, & hortis, tum & in sabulosis ubique abunde. *ANNUA.*

VIR. *Oleracea* est, aquosa, & attemperans; succus e tota planta expressus utilis est in febrilibus ardentibus, atque speciatim in urinae ardore.

DICTAMNUS. LINN. *gen.* n. 468. *syn.* n. 516. *TOURN. tab.* 243.

Calyx pentaphyllus, deciduus. Corolla pentapetala, subpapilionacea, uno petalo descendente. Stamina septem ad decem, deorsum inclinata. Capsulae quinque, margine interiore coalitae, superius dehiscentes, cornutae, polyspermae. Semina nitida, calyptra elastica involuta.

1679. *DICTAMNUS albus.*

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 22. 23.

Dictamnus albus. LINN. *spec.* p. 548.

Fraxinella. HALL. *hist.* n. 1029. * *

JACQ. Fl. Austr. *tab.* 428.

Dictamnus albus vulgo Fraxinella. BAUH. *pin.* 222. *GARUD. tab.* 37.

Fraxinella officinis dictamnus. BAUH. *hist. III.* p. 494.

Dictamno bianco. MATTH.

Off. *Dictamnus albus, sive Fraxinella.*

Loc. In apricis collibus *Taurinensibus* *Superga* dictis, uti etiam in montibus supra *Giaveno*, & *Piosasco*, inter *Castiglione*, & *Bardassano*. Ex alpinis *Vinadiensis* misit *Cl. GIAVELLI*. In pascuis alpinis *Augustae Praetoriae*, & vallis *Pellinae* frequens est. *PERENNIS.*

VIR. Calyces, & flores praesertim, fortissimum odorem graveolenti-aromaticum spirant, quorum momentanea fere applicatio odor aliorum florum facile deleri ad tempos potest: exhalant nimirum oleosae volatiles particulae, tam forti odore praeditae, ut aliarum stirpium floribus inhaerentes ipsarum odorem superent, atque occultent. In cortice praesertim extant hae salinae, oleosae, volatiles particulae. Radix *DICTAMNI albi* amara, acris, & aromatica est: theriacam ingreditur propter alios usus vix in officinis nota; magnas interim virtutes haec planta

promittit. Laudatur ad vermes necandos, menses pellendos, vimque alexipharmacam habere dicta est. Datur radix in pulverem redacta a drachma semisse ad drachmas duas; in infuso autem a drachmis duabus ad unciam unam.

PEONIA. LINN. *gen.* n. 600, *syn.* n. 678. *TOURN.* tab. 146.

Calyx persistens, pentaphyllus. Corolla pentapetala, aequalis. Stamina plura. Ovaria bina, vel terna mutantur in capsulas, srygmate oblongo persistente instructas, uniloculares, polyspermas.

1680 **PÆONIA** officinalis.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 89.

Paeonia foliis oblongis. LINN. *spec.* p. 747.

Paeonia radice glandulosa foliis duplicato-pinnatis, pinnis ellipticis, & trilobis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1187.

Paeonia communis, s. foemina. BAUH. *pin.* 323.

Paeonia foemina vulgarior. BAUH. *hist.* III. p. 493.

Paeonia foemina. LOB. *ie.* p. 682. & MATTH.

Loc. Abunde circa montem S. Michaelis della Chiusa, & supra Piosasco. *PERENNIS.*

Vin. Floribus, seminibus, atque praesertim radici PÆONIÆ tributae sunt vires antispasmodicae, imo & antiepilepticae; tanta etiam extitit in hocce remedio fiducia, ut adversus epilepsiam etiam de collo suspensam valere dictum sit. Sed merito hisce viribus non credant recentiores, suspectam imo plantam habent, quae certo nauseosa est, atque stomacho inimica, ut vomitum moveat.

GARIDELLA. LINN. *gen.* n. 502, *syn.* n. 566. *TOURN.* tab. 430.

Calyx pentaphyllus, coloratus. Petala quinque aequalia, bilabiata, nectarifera. Stamina decem. Capsulae tres connexae, polyspermae.

1681 **GARIDELLA** nigellastrum.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 67.

Garidella nigellastrum. LINN. *spec.* p. 608.

Garidella foliis tenuissime divisis. GARID. *Aix.* p. 203. tab. 39. *TOURN.* inst. 655.

Nigellastrum raris, & foeniculaceis foliis. MAGN. *hort. monsp.* tab. & p. 143. *BAER.* *ie.* 1240.

Nigella erecta folio foeniculi. BAUH. *pin.* 146. MORIS. *hist.* tom. 3. p. 516. s. 12. tab. 18. f. 6.

Melanthium peregrinum, sive ereticum. FON. *Bald.* 46.

Loc. Nascitur in agris Nicaeensis. *ANNUA.*

TELEPHIUM. LINN. *gen.* n. 339. *syn.* n. 374. *TOURN.* tab. 128.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque aequalia. Stamina quinque. Stylus trifidus. Capsula unilocularis, trivalvis, polysperma.

1682 **TELEPHIUM** Imperati.

Telephium foliis alternis. LINN. *spec.* p. 388. HALL. *hist.* tom. 1. n. 841.

Telephium foliis obverse-ovatis. GOU. *hort.* p. 155. n. 1.

Telephium repens folio non deciduo. BAUH. *pin.* 287.

Telephium Dioscoridis. IMPER. 665. *TOURN.* inst. 248.

Telephium legitimum Imperati VII. CLUS. *hist.* 2. p. 67.

Loc. Intra, & circa arcem la Bruneia copiose: in umbris non humidis prope Giaveno etiam legit, atque oritur frequens in Comitatu Nicaeensi. *PERENNIS.*

LINUM. LINN. *gen.* n. 349., *yst.* n. 385. TOURN. *tab.* 176.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque aequalia. Styli quinque. Capsula decemlocularis, loculis monospermis.

1683. LINUM perenne.

ICON. TAUR. Vol. XXIII. *tab.* 13.

Linum calycibus, capsulisque obtusis, foliis alternis lanceolatis integerrimis. LINN. *yst.* 12. p. 224.

Linum foliis alternis lanceolatis, calycibus acutis integris. SCOP. *Fl. Carn.* p. 509. n. 3.

Linum perenne majus caeruleum capitulo majore. MORIS. *hist. Oxon.* part. 2. n. 573. TOURN. *inst.* 339.

Linum sylvestre caeruleum perenne erectius, flore, & capitulo majore. RAJ. *angl.* 3. p. 362.

Loc. In montibus circa Sospello, & Lucerame. PERENNE.

1684. LINUM hirsutum.

ICON. TAUR. Vol. XV. *tab.* 106. f. 1.

Linum calycibus hirsutis acuminatis sessilibus alternis, foliis alternis, ramis oppositis.

LINN. *yst.* 12. p. 224. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. p. 228. *tab.* 11.

JACQ. *Fl. Austr.* *tab.* 31.

Linum sylvestre latifolium hirsutum caeruleum. BAUM. *pin.* 214.

Linum sylvestre latifolium hirsutum flore caeruleo. BAUM. *hist.* III. p. 453.

Loc. Abunde legi in dumetis, & ad sepes circa Mareminum. D. RICHERIUS circa la Morra. TERRANEUS prope Vernone. In Monteferrato, & Comitatu Nicaensi passim occurrit, neque rarum in Liguria est. PERENNE.

ORT. LINUM viscosum LINN. eadem omnino planta est cum hirsuto.

1685. LINUM carbonense

Linum calycibus acuminatis, foliis lanceolatis sparsis utricis scabris acuminatis, caule tereti, basi ramoso. LINN. *spec.* p. 398.

Linum sylvestre laevis acutis foliis, flore amplo. BARR. *ic.* n. 107.

Loc. Frequens in saxosis inter Lucerame, & Touet. Cl. BELLARDI in montibus a Castiglione ad Menton, & a l'Escarene ad Breglio. PERENNE.

1686. LINUM tenuifolium.

ICON. TAUR. Vol. XVII. *tab.* 30. f. 2.

Linum calycibus acuminatis, foliis sparsis linearis-setaceis, retrorsum scabris. LINN. *spec.* p. 398.

Linum foliis linearibus, calycibus longe aristatis. HALL. *hist. rom.* 1. n. 838.

Linum foliis alternis linearibus, inferne scabris, calycibus acutis. SCOP. *Fl. Carn.* p. 509. n. 4.

JACQ. *Fl. Austr.* *tab.* 215.

Linum sylvestre angustifolium flore magno. BAUM. *pin.* 914.

Linum sylvestre quintum angustifolium. CLUS. *hist.* 1. p. 318.

Loc. In apricis saxosis collinis, montanis, & subalpinis abunde. PERENNE.

1687. LINUM gallicum.

Linum calycibus subulatis acutis, foliis linearis-lanceolatis alternis, paniculae pedunculis bifloris, floribus subsessilibus. LINN. *yst.* 12. p. 224. GER. *Fl. Galloprov.* 421.

tab. 16. f. 1. SAUV. *fl. monsp.* p. 53.

Linum sylvestre minus flore luteo. BAUM. *pin.* 214.

Loc. Locis saxosis, & declivibus collium calidiorum frequens est. ANNUUM.

1688. LINUM alpinum.

Linum calycibus rotundatis obtusis, foliis linearibus acutiusculis, caulibus declinatis. LINN. *yst.* 12. p. 224.

Linum foliis linearibus lanceolatis aristatis, calycibus ovato-lanceolatis semimembranaceis. HALL. hist. tom. 1. n. 837.

Linum (alpinum) calycibus rotundatis, foliis linearibus infirmis reflexis, caulibus declinatis. JACQ. Vind. p. 229.

Linum montanum foliis tenuibus erectis, flore amplo caeruleo. LAN. p. 146. tab. 107. JACQ. Fl. Austr. tab. 231.

Loc. Abunde secus arva, & in pascuis, nec non ad vias in montanis, atque sub-alpinis; perenne apud nos non est. *ANNUUM.*

DESCR. Plures in hoc LINO erigi solent cauliculi, simplices, qui deinde in erectos ramulos dividuntur. Folia cinerea, & subpilosa, mollia, non serrulata. Calycis foliola inaequalia, viridia, ovata, aristata, ora albicante. Petala aristata, non emarginata, crenulata, dilute purpurascencia.

1689. LINUM strictum.

ICON. TAUR. Vol. XVII. tab. 30. f. 1.

Linum calycibus subulatis, foliis lanceolatis strictis mucronatis margine scabris. LINN. spec. p. 400.

Linum foliis asperis umbellatum luteum. MAGN. bot. monsp. 164.

Passerino Lobelii. BAUH. hist. III. p. 455.

Loc. Locis aridis in agro Nicaeensi, uberrime: nec infrequenter in Mantferroto, & valle Segusii. *ANNUUM.*

1690. LINUM campanulatum.

Linum foliorum basi utrinque punctata glandulosa. LINN. syst. 12. p. 224.

Linum silvestre luteum foliis subrotundis. BAUH. pin. 212.

Campanula linifolia lutea. BAUH. hist. III. p. 817.

Loc. Inter l' Escarene, & Drap. *PERENNE.*

Obs. Caules angulato-striati, saepe pentagoni. Folia minime serrata, axillae uniflorae. Calycis foliola non serrata, acuminata, lanceolata.

1691. LINUM flavum.

Linum calycibus subserrato-scabris lanceolatis subversutibus, panicula ramis dichotomis. LINN. spec. p. 399.

JACQ. Fl. Austr. tab. 214.

Linum silvestre 3. latifolium. CLUS. hist. 1. p. 317.

Linum silvestre latifolium luteum. BAUH. pin. 214.

Linum latifolium luteum. BAUH. hist. III. p. 454.

Loc. In collibus maritimis Nicaeensibus Cl. BELLARDI. *PERENNE.*

1692. LINUM maritimum.

ICON. TAUR. Vol. III. tab. 2. & Vol. XVI. tab. 2.

Linum calycibus ovatis acutis mucis, foliis lanceolatis, inferioribus oppositis. LINN. spec. p. 400.

JACQ. hort. vind. tab. 154.

Linum maritimum luteum. BAUH. pin. 214.

Linum luteum narbonense. BAUH. hist. III. part. 2. p. 454.

Loc. In humidis, & stagnantibus agri Nicaeensis, & praecipue secus flumen le Var. *ANNUUM.*

1693. LINUM catharticum.

Linum foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis oculis. LINN. spec. p. 401.

Linum foliis conjugatis ovatis, calycibus aristatis patulis lanceolatis. HALL. hist. tom. 1. n. 839.

Linum pratense flosculis exiguis. BAUH. pin. 214.

Aline verna glabra flosculis albis, vel potius Linum minimum. BAUH. hist. III. p. 455

Off. *Linum catharticum.*

Loc. In pascuis subhumidis præcipue montanis, etiam in *Taurinensibus*, minime rarum. *ANNUUM*.

Viz. Hujus herbae infusum aquosum, amarum est, & commodè alvum ducit. Saepius etiam ad eundem usum in sero lactis infunditur dosi manipuli unius.

1694. LINUM radiola.

Linum foliis oppositis, coule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. LINN. *spec.* p. 402.

Linum tetrapetalon caule ramosissimo dichotomo. HALL. *hist. rom.* 1. n. 840.

Linocarpum serpilli folia, multicaule, & multiflorum. MICH. *gen.* 23. tab. 21.

Linum multiflorum. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 70.

Polygonotum minimum, s. millegrana minimo. BAUH. *pin.* 282.

Loc. Petrus MOLINERI Eporediæ ad lacum. Ignastius MOLINERI in sylvis castaneorum provinciae Aquis crecere adnotavit. *ANNUUM*.

ALSINE, LINN. *gen.* n. 342. *yst.* n. 377. TOURN. *tab.* 126.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque aequalia, bipartita. Styli tres.

Capsula unilocularis, trivalvis, polysperma.

1695. ALSINE media.

Icon. TAUR. Vol. XXIII. tab. 98.

Alsine foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, petolis bipartitis. HALL. *hist. rom.* 1. p. 387. n. 880.

Alsine petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. LINN. *spec.* p. 389.

Alsine foliis cordatis infimis petiolatis, caeteris sessilibus. GER. p. 403. n. 1.

Alsine floribus pentandris, foliis ovato-cordatis. SCOP. *Fl. Carn.* p. 496. n. 2. ed. 2. n. 376.

Alsine minor. DOD. *pempt.* 29.

Alsine media. BAUH. *pin.* 230. TOURN. *hist.* 243.

Alsine vulgaris, s. morsus gallinae. BAUH. *hist.* III. 363.

Alsine. MATTH.

Off. Alsine media, s. morsus gallinae.

VERN. Euratio, oppure Pavaronia.

Loc. Nihil in hortis, ruderalis, atque arvis frequentius. *ANNUA*.

Viz. Avibus in alimentum cedit. Nostrates, in angina, coctam in sartagine plantam collo subijciunt. Haemorrhoidum dolores lenire dicitur cum butyro subacta.

Succus ab uncia una ad uncias duas, aut etiam tres in jasculo, datus est adversus phrysim: nullius autem, ut puto, utilitatis hæc planta in officinis exolevit.

1696. ALSINE segetalis.

Alsine petalis integris, foliis subulatis. LINN. *spec.* p. 390.

Spergula foliis filiformibus unum latus spectantibus, stipulis membranaceis vaginantibus, pedunculis umbellatis. GUET. *stamp.* 299. DAL. *paris.* 133.

Alsine segetalis gramineis foliis unum latus spectantibus. VAILL. *paris.* 8. tab. 3. f. 3.

Arenario segetalis. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 43.

Loc. In arvis di Ciliano minime rara, observante Cl. BELLARDI. Etiam inter segetes collium Tourinensium lecta est. *ANNUA*.

HOLOSTEUM. LINN. *gen.* n. 98. *yst.* n. 104.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque aequalia, marcescentia. Stamina tria. Styli tres.

Capsula unilocularis, apice dehiscens, polysperma.

1697. HOLOSTEUM umbellatum.

Holosteum floribus umbellatis. LINN. *spec.* p. 130.

Alsine floribus umbellatis, petalis serratis. HALL. *hist. rom.* 1. n. 879.

Holosteum coryphyllum oryense. TABERN. *ic.* 233.

Caryophyllus arvensis umbellatus folio glabra. BAUH. pin. 210.
Loc. In arvis collinis vulgate est. *ANNUUM.*

POLYCARPON. LINN. *syst.* n. 103.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque persistentia, calyce minora. Stamina tria.
 Styli tres. Capsula unilocularis, trivalvis.

1698 POLYCARPON tetraphyllum. LINN. *spec.* p. 331.

Anthyllis alsine folia polygonoides major. BARR. 103. icon. 5314.

Loc. *Nicaeensis*, & *Pedemontani* agri locis cultis sponte nascitur, præsertim ad sepes, & in umbrosis. *ANNUUM.*

ARENARIA. LINN. *gen.* n. 305. *syst.* n. 364.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque aequalia, integra. Stamina decem. Styli tres.
 Capsula unilocularis, polysperma.

1699 ARENARIA biflora. tab. 44. fig. 1. & tab. 64. fig. 3.

Icon. TAUR. Val. XV. tab. 91. f. 4.

Arenaria foliis obovatis obtusis, caulibus procumbentibus, pedunculis bifloris lateralibus. LINN. *syn.* 12. p. 312. *mont.* p. 71.

Alsine caule recta prostrata, foliis ovatis. HALL. *hist. tom. 1. n. 877.*

Alsine palustris serpylli folia. SCHEUCHZ. *it. 2. p. 129.*

Loc. Abunde in alpinis inter montem *Cenisium*, & montem *S. Bernardi* etiam in *Sabaudia* alpinis frequens; incolit autem summa alpium juga prope nivem deliquescentem. *PERENNIS.*

1700. ARENARIA trinervia.

Arenaria foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. LINN. *spec.* p. 605.

Alsine foliis ovato-lanceolatis trinerviis. HALL. *hist. tom. 1. n. 878.*

Alsine plantaginifolia. BAUH. *hist. III. p. 363.*

Loc. In umbrosis ad oras sylvarum. *ANNUA.*

1701. ARENARIA ciliata.

Icon. TAUR. Val. XXIII. tab. 31.

Arenaria foliis ovatis enerviis sessilibus acutis, corollis calyce majaribus. LINN. *syst.* 12. p. 312.

Arenaria foliis ovatis acutis plantis sessilibus, corollis calyce majaribus. JACQ. *vind. 75.*

Alsine foliis ovato-lanceolatis ciliatis, petalis calyce majaribus. HALL. *hist. tom. 1. n. 876. tab. 17.*

Alsine alpina serpylli folio, multicaulis, & multiflora. TOURN. *inst. 243. SEGU. veran. 1. p. 421. tab. 5. f. 2.*

Loc. Ad saxosa summorum alpium præcipue *Fenestrellarum*, montis *Cenisii*, & vallis *di Viù*, nec non alibi frequens. *PERENNIS.*

1702. ARENARIA serpyllifolia.

Arenaria foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. LINN. *spec.* p. 606.

Alsine foliis ovato-lanceolatis subtruncatis, petalis calyce brevioribus. HALL. *hist. tom. 1. n. 875.*

Stellaria serpyllifolia. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 544.*

Alsine minor multicaulis. BAUH. pin. 230.

Alsine minima. DOD. *pempt. 30.*

Loc. Ad muros, circa urbem, & pagos locis aridis ubique. *ANNUA.*

1703. ARENARIA bavarica.

Arenaria foliis semicylindricis carnosis obtusis, petalis lanceolatis, pedunculis terminalibus subbinatis. LINN. *spec.* p. 607.

Aline alpina foliis teretibus obtusis, flore albo. SEGU. veron. 1. p. 429.

Loc. In nouis meis reperio lectam fuisse in monte du petit Saint Bernard. PERENNIS.

1704. ARENARIA saxatilis.

Icon. TAUR. Vol. XIV. tab. 73. fig. 3.

Arenaria foliis subulatis, caulibus paniculatis, calycum foliatis avaxis obtusis. LINN.

yst. 12. p. 313. JACQ. vind. p. 75.

Aline foliis linearibus, petalis calyce longioribus. HALL. hist. sam. 1. n. 867.

Stellaria saxatilis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 339.

Aline arenaria foliis subulatis, inferiariis longissimis. GMEL. Sibir. 4. p. 137. tab. 63. fig. 2.

Aline saxatilis, & multiflora capillosea folio. VAILL. Paris. 1. 7. tab. 2. f. 3.

Loc. In valle Ucienti. PERENNIS.

1705. ARENARIA montana.

Arenaria foliis lineari-lanceolatis scabris, caulibus sterilibus longissimis procumbentibus.

LINN. yst. 12. p. 312.

Aline foliis linearibus acuminatis, petalis florum integris, calyce duplo longioribus.

MONN. ops. 137.

Loc. Legi in summo jugo Tendae la Cola dicto. ANNUA.

DESCR. Radix fibrosa. Folia circa radicem, cespitem efformant, eaque sunt fere imbricata, setacea, rigidula, patentia, lucide-viridia; caulina rariora, internodiis breviora: omnia amplexicaulia. Caulis semipedalis, suberectus, subhirsutus. Ex summo caule duo, vel tres flores prodeunt satis longe pedunculati, ampli, quorum calyx tristrius, oblongus, obtusus, foliolis dissitis. Petala calyce duplo longiora, lineata, ovata, breviter emarginata. Stamina decem. Tubae tres. Fructus longus, subcylindricus.

1706. ARENARIA verna.

Arenaria foliis subulatis, caulibus paniculatis, calycibus acuminatis striatis. LINN. yst. 12.

p. 313. JACQ. Fl. Austr. tab. 404.

Loc. Inter Modane, & Col de la Roue in saxosis. PERENNIS.

1707. ARENARIA tenuifolia.

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 21.

Arenaria foliis subulatis caule paniculata, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus lanceolatis. LINN. yst. 12. p. 313.

Aline foliis linearibus glabris, petalis calyce brevioribus. HALL. hist. sam. 1. n. 866.

Aline tenuifolia. BAUH. hist. III. p. 364.

Arenaria (hybrida) foliis filiformibus, caule erecta ramosissima, floribus decandris. VILL. prosp. p. 48. tab. 30. f. 3.

Loc. Muros vetustos, & saxosa, arida praecipue, incolit secus Padum. In acclivibus aridis saxosis non infrequens est. ANNUA.

DESCR. Cauliculi semipalmares. Folia ad originem connata, sessilia, linearia, crassiuscula, fine acuto. Tota planta glabra est, & dichotoma, undequaque in extremis ramis florifera. Flos patens, petalis cum calycinis foliolis alternantibus. Petala elliptica, fine non acuto, albissima, calyce breviora. Calycina folia striata margine albicanie, aristata. Antherae purpurascens, petalis humiliores, filamentis albis, subulatis, erectis, erecto-patentibus insistent. Flos sole percussus patens. Styli tres reflexi, plumosi. Calyx persistens, & connivens.

1708. ARENARIA austriaca tab. 64. f. 2.

Arenaria austriaca. JACQ. Fl. Austr. tab. 270.

Aline caule flaccida dichotoma, foliis linearibus acutis. HALL. hist. 1. n. 864.

Loc. Locus saxosis, & umbrosis ad rupes alpium Valdensium. PERENNIS.

DESCR. Multiceps planta est. Cauliculi primum decumbunt, deinde eriguntur summo dichotomi, aut trichotomi, pedunculo intermedio longiore. Flos pentapetalus, petalis obovatis, laevissime emarginatis. Folia linearia, subvillosa, fine acuto, non nervosa, crassula, ad basim connata, non tamen perfoliata. Caulis rotundi,

villosuli, praesertim pedunculi. Calycis foliola concava, ovata fine acutiusculo, villosula. Styli tres. Stamina decem. Calyx post efflorescentiam connivet, fructui appressus. Fructus in cornu non producitur, calyce brevior, & est capsula, quae quinquevalvis aperitur. Antherae, & styli albescunt. Semina leucophaea.

1709. *ARENARIA fasciculata.*

JACQ. *Fl. Austr.* tab. 182.

Stellaria rubro. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. p. 316. tab. 17. ic. n. 538.*

Arenaria fasciculata. GOU. obs. 30. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p. 41.*

Loc. In sabulosis, & sterilibus praesertim fluminum, torrentium, locis apricis, & sole percussis. *ANNUA.*

1710. *ARENARIA laricifolia.*

Arenaria foliis setaceis, caule superne nudiusculo, calycibus subhirsutis. LINN. *spec. p. 607.*

Alsine foliis linearibus angustissimis, calycibus tubulosis villosis. HALL. *hist. tom. 1. n. 869. Emend. 1. n. 74.*

Stellaria laricifolia. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 541. tab. 18.*

Arenaria foliis lineari-lanceolatis sessilibus, corollis calyce longioribus. DALIB. *Paris. 133. n. 5.*

Alsine alpina junci folio. BAUH. *pin. 251.*

Auricula muris pulchro flore, folio tenuissimo. BAUH. *hist. III. p. 360.*

Loc. Nihil frequentius secus torrentes, & vias locis aridis montanis, & subalpinis. *PERENNIS.*

Obs. Petala ovata, lineata, ampla, integerrima, calyce duplo longiora; calycis folia lanceolata, sulcata, hirsutula.

1711. *ARENARIA grandiflora* tab. 10. fig. 1.

ICON. *Taur. Vol. XIV. tab. 73. fig. 7.*

Arenaria foliis subulatis stricis, radicalibus confertis, caulibus unifloris. LINN. *spec. p. 603.*

Alsine uniflora, & grandiflora foliis obovatis glabris, petalis integris. SPEC. *PEDEM. 49. tab. 10. f. 1.*

Alsine foliis sulcatis argus lanceolatis, petiolis unifloris. HALL. *hist. tom. 1. n. 874.*

Arenaria foliis lanceolatis, cauliculis multifloris, foliolis calycinis inaequalibus, exterioribus cordato-ovatis latioribus. GOU. *Illustr. p. 30.*

Stellaria aculeata. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 527. tab. 17.*

Loc. In editionibus alpinis montis Cenisii, & vallium Valdensem. *PERENNIS.*

1712. *ARENARIA striata* tab. 26. f. 4.

Arenaria foliis linearibus erectis appressis, calycibus oblongis stricis. LINN. *spec. p. 608.*

Auricula muris pulchro flore, folio tenuissimo. BAUH. *hist. III. p. 360.*

Caryophyllus saxatilis, polygoni minoris folio, & facie. BURS. 11. 129.

Arenaria (Cherlerioides) caule basi nodoso, suffruticoso, foliis lineari-lanceolatis, calycinis aequalibus, caulibus saevifloris. VILL. *prosp. p. 48. tab. 30. fig. 1. 2.*

Loc. In pascuis saxosis alpinum. *PERENNIS.*

1713. *ARENARIA recurva* N. tab. 89. f. 3.

ICON. *Taur. Vol. XIV. tab. 73. fig. 5.*

Arenaria foliis radicalibus congestis recurvis subulatis, caule simplici subtriflora.

Alsine foliis sulcatis recurvis, radicalibus linearibus congestis, caulibus lanceolatis. HALL. *hist. n. 868.*

Loc. In pascuis saxosis editiorum alpinum Valdensem minime rara est. *BIENNIS.*

DESCR. Radix ex multis, longis, teretibus, flavescens fibris tenacibus, uno capite collectis, quod cespitem promit cauliculorum; ad eorum basim rosulae foliorum, ex quibus cauliculi digitales. Folia sunt nihil striata, laevia, teretia, supra planiuscula, fine acuto, fasciculata, & recurva. Tres plerumque in caule foliorum conjugationes. Caulis summus semel plerumque dichotomus, duos, aut tres flores sustinet. Calycina folia ex ovatis lanceolata, aristata terminata, tribus striis donata. Caulis, & pedunculi laevissime hirsuti. Flos albus, calyce paullo major, petalis aristatis, integris. Styli tres. Conjugationes foliorum in caule quodque quatuor.

ALLONII *Fl. Pedem. Tom. II.*

F f

1714. ARENARIA obtusa N. tab. 64. fig. 4.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 91. fig. 4.

Aisine foliis linearibus obtusis, calycibus viscidis. HALL. hist. tom. 1. n. 863. MISC. TAUR. tom. 3. p. 87. n. 121.

Loc. Nasctur in pascuis saxosis umbrosis alpium di Fenestrelles, & Ceresole, & circa Caenobium S. Bernardi, & Col di Cognè. PERENNIS.

DESCR. Caules ex una radice plures, procumbentes, ramosi. Folia connata, linearia, obtusa, mollia, viridia. Rami, duobus plerumque floribus longe pedunculatis, terminantur. Calycis foliola ex ovatis lanceolata, viridia. Petala ovata, integerrima, vix calyce majora. Stamina decem, petalis breviora. Tubae tres. Fructus conicus, qui quinquevalvis aperitur. Ex fide speciminis sicci transmissi nostra planta eadem est cum *Aisine* HALLERT. n. 863. Foliis linearibus non revolutis, obtusis, caule infirmo, ramoso, procumbente, atque calycis foliis non acutis, aut profunde striatis, a proximis ARENARIÆ speciebus distinguitur.

1715. ARENARIA lanceolata tab. 26. fig. 3.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 91. fig. 2.

Arenaria foliis, & calycibus lanceolatis trinerviis. MISC. TAUR. tom. 3. p. 87. n. 120.*Aisine caule stacido dichotomo, foliis linearibus acutis.* HALL. hist. tom. 1. n. 864.

Loc. In pascuis saxosis vallis Queiras, & alpium Valdensium non infrequens, uti etiam in alpiibus Augustae Praetoriae. & montis Cenisii. PERENNIS.

DESCR. Radix obscura, renax, parum fibrosa, & repens, cespitem cauliculorum ramosorum producit repentium, & rependo radices agentium, fasciculis, seu gemmis foliorum hi cauliculi donantur, haeque gemmae in cauliculos se se explicans erectos, simplices, unciam unam, aut cum dimidia altos. Ad ortum itaque hujus cauliculi foliorum ovato-acutorum rosula, deinde conjugata, & sessilia folia duo, quae quo magis summirati accedunt, magis interae se distant. Glabra folia sunt raro subhirsuta, firma, erecto-patentia, lanceolata, acuta, sed inermia in exteriori facie, tribus elatis nervis signata, tres lineas longa in elatioribus cauliculis. Saepe post tres foliorum conjugationes caulis in duos pedunculos (raro tres) abit vix divergentes, nunc nudos, nunc conjugatione una donatos. Pedunculorum nudorum longitudo ad calycem se habet uti 2. ad 1. Flos patens, & amplius petalis ovaris integerrimis, calyce paullo major. Stamina decem petalis longiora, alternis brevioribus, sustinent antheras parvas purpureas. Styli tres filiformes. Calycis folia similia omnino sunt reliquis foliis. Cauliculi filiformes sunt, & subtilissime hirsuti. Discrimen ideo hujus a reliquis constitui videtur potissimum a lanceolata, trinervia forma foliorum, similibusque calycinis foliolis. Fructus conicus, unilocularis, quinquevalvis aperitur.

1716. ARENARIA campestris.

Arenaria foliis intermedio longioribus. GOU. Fl. monsp. p. 242.*Arenaria foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus.* LINN. spec. p. 606.*Aisine foliis linearibus, stipulis ovato-lanceolatis argenteis.* HALL. hist. tom. 1. n. 872.*Aisine spergulae facie minor, s. spergula minor subcaeruleo flore.* BAUH. pin. 251. prodr. 219.*Spergula foliis oppositis, stipulis vaginantibus, caulibus procumbentibus.* GER. p. 418. n. 4.

Loc. In sabulosis torrentium, atque in arvis collinis, montanisque siccioribus frequens est. ANNUA.

1717. ARENARIA marina.

Arenaria foliis linearibus longitudine internodiorum. GOU. fl. monsp. 242. MISC. TAUR. tom. 3. p. 87.*Aisine spergulae facie media.* BAUH. pin. 251.*Spergula marina nostras.* BAUH. hist. III. p. 772.

Loc. Prope portam Villafrancae Nicaeensis: aliis quoque locis arenosis, & maxime exsiccis nascitur. ANNUA.

1718. ARENARIA tetragyneta. tab. 89. f. 1.

Arenaria foliis ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis. LINN. *synt.* 12. p. 322.
Gypsophila (aggregata) *foliis mucronatis recurvatis, floribus aggregatis.* LINN. *spec. pl.* 2. p. 381.

Saponaria calycibus pentaphyllis, floribus aggregatis, foliis mucronatis canaliculatis recurvis. HORT. ups. 107.

Caryophyllus saxatilis, ericæ foliis, umbellatis corymbis. BAUH. pin. 211. prodr. 105.
 RAL. hist. 1033. MAGN. monsp. 53. tab. 5.

Loc. In montibus Tendæ locis siccis. PERENNIS.

DESCR. Radix oblonga, perennis. Caulis ramosus ramis erectis multis. Folia connata, firma, recurva, acuta, nervo instructa, circa radicem internodiis longiora, breviora in ramis. Flores in capitulum congesti quinque, vel sex. Calycis foliola quinque, foliis caulinis similia. Petala calyci subaequalia. Stamina decem, quorum quinque corolla breviora, s. parum longiora. Caulis, folia, & calyces lentis vitreæ ope aspera, quorum margines scariosi, argentei.

STELLARIA. LINN. *gen. n.* 304. *synt. n.* 563.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque aequalia, profunde bipartita. Stamina decem. Styli tres. Capsula unilocularis, polysperma.

1719. STELLARIA nemorum.

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 19.

Stellaria foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramosis. LINN. *spec. p.* 603. *Fl. Svec.* 2. n. 391.

Myosotis foliis petiolatis cordatis tubis ternis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 886.

Alsine montana haederacea maxima. COL. *ecphr. 1. p.* 289.

B. *Stellaria* (dichotoma) *foliis sessilibus, caule dichotoma, floribus solitariis, pedunculis fructiferis reflexis.* LINN. *spec. p.* 603.

Loc. Locis umbrosis, & rupestribus ad radices montium, & alpium. PERENNIS.

1720. STELLARIA hypericifolia N.

Alsine foliis lanceolatis, petalis bipartitis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 881.

Alsine foliis lanceolatis, caulibus procumbentibus ramosissimis. GER. 40. n. 3.

Alsine uliginosa. VILL. *præp.* 48.

Alsine hyperici folio D. Vaill. *TOURN. inst.* 242.

Anagallis aquatica 4. LOB. *p.* 467.

Alsine aquatica folia Gratiolæ, stellato flore. DILL. *Cat. Giess. p.* 58.

Loc. Ad rivulos aquarum lenes fluentium in collinis, & montanis locis non infrequens est: copiosissime circa thermas Valderii. ANNUA.

1721. STELLARIA holostea.

Stellaria foliis lanceolatis serrulatis, petalis bifidis. LINN. *spec. p.* 603.

Alsine foliis gramineis ciliatis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 884.

Alsine floribus decandris tryginis, foliis lanceolatis, petalis bifidis. SCOP. *Fl. Carn. p.* 497. n. 4. ed. 2. n. 534.

Caryophyllus holosteus arvensis flore majore. BAUH. pin. 210.

Gramen Fuchii, s. Leuchanthemum. BAUH. *hist. III. p.* 361.

Loc. Vulgatissima non est. Ego reperi circa la Perosa. Ignatius MOLINER! supra Giaveno eundo ad jugum Col de la rossa: visa etiam est ab eodem ad oras sylvarum in collibus Taurinensibus supra Rioje, & in comitatu Aussen! PERENNIS.

1722. STELLARIA graminea.

ICON. TAUR. Vol. XIX. tab. 23. fig. 1.

Stellaria foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. LINN. *spec. p.* 604.

Alsine foliis lanceolatis linearibus, petiolis ramosis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 882.

Alsine floribus decandris, trigynis, paniculatis, foliis linearibus. SCOP. *Fl. Carn. p.* 498. n. 5. ed. 2. n. 535.

- Caryophyllus arvensis glaber flore minare.* BAUH. pin. 210.
Aline pratensis graminea folia angustiare. TOURN. inst. 243.
Gramini Fuchsii, Leucanthema affinis, & similis planta. BAUH. hist. III. p. 361.
 Loc. In pascuis humidis, inundatis frequens. *PERENNIS.*

CERASTIUM. LINN. gen. n. 318. syst. n. 381. TOURN. tab. 126.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque aequalia, magis, aut minus incisa. Stamina decem.
 Styli tres. Capsula unilocularis, apice dehiscens.

1723 CERASTIUM vulgatum.

- Cerastium foliis ovatis, petalis calyci aequalibus, caulibus diffusis.* LINN. spec. p. 627.
Myosotis foliis ovato-lanceolatis, petalis calycis longitudine. HALL. hist. tom. 1. n. 893.
Cerastium perenne hirsutum. GER. p. 407. n. 3.
Myosotis arvensis hirsuta parva flore albo. TOURN. inst. 245.
Auricula muris quarundam flore parvulo vasculo tenui longa. BAUH. hist. III. p. 359.
 Loc. Ad vias, secus arva, & ubique copiose. *ANNUUM.*

1724 CERASTIUM viscosum.

- Icon. TAUR. Val. X. tab. 24.*
Cerastium erectum villato-viscosum. LINN. spec. p. 627.
Cerastium annuum hirsutum. GER. Fl. Gallaprov. p. 406. n. 2.
Myosotis hirsuta, & viscosa. HALL. hist. tom. 1. n. 893.
Myosotis hirsuta altera viscosa. TOURN. inst. 245.
Aline hirsuta altera viscosa, foliis longis saurase virentibus. MORIS. ox. 2. p. 351.
Cerastium obtusifolium. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 38.
 Loc. Secus arva macilenta abunde. *ANNUUM.*

1725 CERASTIUM semidecandrum.

- Cerastium flaribus pentandris, petalis emarginatis.* LINN. spec. p. 627.
Myosotis caule simplici, foliis ovatis hirsutis, tubis termis. HALL. hist. tom. 1. n. 894.
Cerastium annuum hirsutum. GER. Fl. Gallaprov. p. 406. n. 1.
Centunculus semidecander. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 349.
Myosotis hirsuta minar. TOURN. inst. 384.
Myosotis arvensis hirsuta minar. VAILL. bot. 30. f. 2.
 Loc. In sterilibus pascuis abunde, & ad vias. *ANNUUM.*

1726 CERASTIUM arvense.

- Cerastium foliis linearis-lanceolatis obtusis glabris, carallis calyce majaribus.* LINN. spec. p. 628.
Myosotis foliis linearibus, lanceolatis petalis calyce dupla longiaribus. HALL. hist. tom. 1. n. 889.
Centunculus arvensis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 348.
Myosotis arvensis hirsuta flore majare. TOURN. inst. 245. VAILL. bot. 141. tab. 30. f. 4. 5.
 Loc. Ad vias, & in montanis secus arva frequens admodum est. *PERENNE.*

1727 CERASTIUM alpinum.

- Cerastium foliis ovato-lanceolatis, caule divisa, capsulis oblongis.* LINN. spec. p. 628.
Myosotis foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis, petalis calyce duplo-langiaribus. HALL. hist. tom. 1. n. 888.
Cerastium flaribus decandris, carallis calyce majaribus, foliis ovato-lanceolatis. SCOP. Fl. Carn. p. 499. n. 1.
Centunculus alpinus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 350.
Aline Myosotis facie Lychnis alpina flore amplo niveo repens. RAJ. Syn. ed. 3. p. 349. tab. 13. fig. 2.
 Loc. Nasctur frequens in rupibus, & alpium scopulis. *PERENNE.*

1728. CERASTIUM refractum N.

Myosotis foliis glabris lanceolatis, petiolis infractis. HALL. hist. tom. 1. n. 890.

Loc. Locis humidis summorum alpium editiorum, & frigidarum. Copiose in monte magni S. Bernardi prope coenobium. PERENNE.

DESCR. Ex una radice cauliculi plures digitales, virides. Folia de more gentis semialexicaulia, pulposa, linearia, sine obtusiusculo. Folia glabra sunt, pulposula, virentia. Cauliculi teretes, modo glabri, modo subhirsuti: cauliculi autem biflori sunt: pedunculi longi: horum pedunculorum unus refractus, sive geniculatus est, alter minime: qui refractus est, ad locum refractionis duas stipulas, sive foliola habet. Pedunculi evidenter hirsutuli. Calyx nunc glaber, nunc hirsutulus, viridis ex foliolis ovatis, non aristatis, limbo leviter albicante. Flos calyce multo maior, petalis ad $\frac{1}{3}$. bifidis, segmentis linearibus. Stylos quatuor numeravi. Fractus conicus, polygonus, virens, transparent, qui septem valvis ad medium usque discedentibus aperitur. Semina orbiculata, reniformia.

1729. CERASTIUM strictum.

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 18. fig. 1.

Cerastium foliis linearibus acuminatis glabris, pedunculis unifloris submentosis, capsulis globosis. LINN. spec. p. 629.

Myosotis foliis linearibus glabris. HALL. hist. tom. 1. n. 892. tab. 14. f. 1.

Alpine alpina subhirsuta linariae folio. SCHEUCHZ. it. alp. 11. p. 130.

Caryophyllus holosteus alpinus gramineus. BAUH. pin. prodr. 104.

Loc. In rupibus subhumidis alpium Valdensium, & montis Cenisii. PERENNE.

DESCR. Radix teres, & ramosa, cauliculos plures decumbentes gignit. Ex iis cauliculi floriferi eriguntur. Cauliculi non floriferi, & decumbentes, habent folia pubescentia, longe elliptica, acuminata, mollia, facile marcescentia. In cauliculis, sive ramis floriferis folia sunt linearia, aristata, utrinque glaberrima margine tamen levissime ciliato: quatuor solent esse conjugationes horum foliorum. Nodi toment. Folia unciam unam, & semissem longa, internodia vix unciae semissem distant. Cauliculi ramosi non sunt, longe nudi, & semel dichotomi. Quilibet ramus unum florem sustinet, intermediis interdum adiungitur. Bractee duae connatae, lanceolatae ad dichotomiam, atque similes circa medium alerius pedunculi, ita ut si biflora planta sit, unus bracteis destituatur, si triflora, intermedius: cauliculi teretes, glabri, sed post ultimam conjugationem lanuginosi. Pedunculi leviter tomentosi, magis adhuc calyx, qui albo tomento candicat. Petala lineata, calyce duplo majora, fere ad medium bifida, segmentis subovatis. Antherae luteae. Styli quinque, antheris paulo humiliores. Calyx post anthesim clauditur. Fructus cylindricus. Figura Cl. HALLERI nostrae plantae adumsum non respondet. Notae a Cl. LINNÆO datae pleraque conveniunt, sed fructus globosi non sunt, idcirco accuratè descripsimus, atque nostram iconem damus. Si nostrum minime pertinet ad strictum LINNÆI, erit novum triviale nomen nostrae assignandum.

1730. CERASTIUM aquaticum.

Cerastium foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. LINN. spec. p. 629. SCOP. Fl. Carn. p. 498. n. 7.

Alpine foliis ovato-cordatis, imis petiolatis, tubis quinis. HALL. hist. tom. 1. n. 885.

Siellaria agostica. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 546.

Alpine major. BAUH. pin. 250. CAM. epit. 851.

Loc. Vulgare est in agro Pedemontano ad fossas praesertim aquarum. PERENNIS.

1731. CERASTIUM manicum.

ICON. TAUR. Vol. XV. tab. 91. f. 5.

Cerastium glabrum, caule striato, foliis lanceolatis, pedunculis longissimis, capsulis globosis. LINN. syn. 12. p. 320.

Alpine caule ramoso nodoso, foliis lanceolatis lineatis, petiolis longissimis. HALL. hist. tom. 1. n. 883.

Aline caryophylloides glabra, florum pediculis longissimis. SEGU. *Veron.* 3. p. 178. tab. 4. f. 3.

Loc. In agris subhumidis, atque etiam in pratis collinis, & submontanis non infrequens est. *ANNUUM.*

1732. *CERASTIUM latifolium.*

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 91. f. 2.

Cerastium foliis ovatis submontanis, ramis subunifloris, capsulis globosis. LINN. *spec.* p. 629.

Myosotis foliis tomentosis ovatis. HALL. *hist. tom.* 1. n. 887.

Myosotis alpina latifolia. TOURN. *inst.* 245.

Caryophyllus holosteus alpinus latifolius. BAUH. *prodr.* 104.

Loc. In alpinis rara non est, atque nasci solet inter diffractos lapides. *PERENNE.*

1733. *CERASTIUM repens.*

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 49.

Cerastium foliis lanceolatis, pedunculis ramosis, capsulis subrotundis. LINN. *spec.* p. 628.

Stellaria repens. SCOP. *Fl. Carn. ed.* 2. n. 548.

Myosotis arvensis polygani folio. VAILL. *Paris* 141. tab. 30. f. 5.

Lychnis incana repens. BAUH. *pin.* 206.

Loc. Habeo inter indígenas a D. VALLE collectas. In valle *Ulcensi* legit D. CACCIA.

Dicitur nasci in valle *Valdensium* di S. Martino. *PERENNE.*

SPERGULA. LINN. *gen.* n. 519. *yst.* n. 386.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque aequalia, integra. Stamina decem. Styli quinque.

Capsula unilocularis, quinquevalvis.

1734. *SPERGULA arvensis.*

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 88.

Spergula foliis verticillatis, flaribus decandris. LINN. *spec.* p. 630.

Spergula frutu pendulo. Ejsdem *Fl. Lapp.* p. 190.

Spergula foliis verticillatis, seminibus rotundis. HALL. *hist. tom.* 1. n. 873.

Aline floribus decandris pentagynis, foliis verticillatis. SCOP. *Fl. Carn.* p. 499. n. 8.

Spergula foliis verticillatis, seminibus nudis. GER. *Fl. Galloprov.* p. 417. n. 1.

Stellaria arvensis. SCOP. *Fl. Carn. ed.* 2. n. 542.

Aline spergula dicta major. BAUH. *pin.* 251. TOURN. *inst.* 343.

Spergula. DOD. *pempt.* 527.

Loc. In arvis omnino vulgarissima. *ANNUA.*

1735. *SPERGULA saginoides.* tab. 64. fig. 1.

Icon TAUR. Vol. XIX. tab. 4. fig. 2.

Spergula foliis oppositis linearibus laevibus, pedunculis solitariis longissimis, caule repente. LINN. *spec.* p. 631.

Aline foliis linearibus connatis, pediculis longissimis unifloris. HALL. *hist. tom.* 1. n. 862.

Aline tenuifolia, pedunculis florum longissimis. VAILL. *Paris* 8.

Aline alpina repens, capillaceo folio, floribus solitariis albis pentapetalis, pediculo longa fulvis, petalis subrotundis, & integris. MICH. *hort. fl.* p. 5.

Loc. In herbidis umbrosis pascuis alpinum saepe occurrit: copiosissime supra thermas *Valderii.* *PERENNIS.*

DESCR. Caules procumbentes, rotundi, nodosi. Ad singulos nodos folia bina ex lineari subulata, ad nodos connata, splendide viridia, incurva, & singulae conjugationes foliorum ex una parte foliorum fasciculum protrudunt. Extremitates ramorum solent fasciculum foliorum, novum veluti caulem, producere, & pedunculum uniflorum novum raturum longitudine superantem, fere biuncialem. Calyx ex foliolis quinque viridibus, ovatis, margine membranaceo albicante, neque acutis, neque obtusis. Petala ovata, calyce majora, lineata, nihil emarginata, obrusa, alba. Filamenta decem albida, subulata, corolla dimidio breviora. Antheris didymis ex dilata purpura albicantibus. Styli quinque. Stygmata simplicia, aliquando tamen styli sex observati sunt.

CHERLERIA. LINN. *gen. n.* 506. *syn. n.* 565.

Calyx pentaphyllus. Squamæ quinque petaloideæ, emarginatæ. Stamina decem, alternis calyce insertis; Styli tres. Capsula unilocularis, trisperma.

1736 **CHERLERIA sedoides.**

ICON. TAUR. Vol. XIV. tab. 73. fig. 1.

Cherleria sedoides. LINN. *spec. p.* 608. HALL. *hist. tom. 1. n.* 859. SEGU. *veron. suppl. p.* 180. tab. 4. f. 3.

Sedum montanum perpusillum luteum. MORIS. *hist. 3. p.* 471. *sect. 12. tab. 6. fig. 14.*

Sedum montanum perpusillum. PARK. *theatr. 738.*

Lychnis alpina, mucrosis foliis densius stiposis, floribus parvis, calyce duriore. PLUK. *alm. 233. tab. 42. f. 8.*

Loc. Ubique in pascuis saxosis summorum alpium. *PERENNIS.*

SEDUM. LINN. *gen. n.* 513. *syn. n.* 575. TOURN. *tab. 140.*

Calyx pentaphyllus, aut profunde quinquesidus. Petala quinque aequalia. Stamina decem. Germina quinque cum totidem stylis, & squamis quinque nectariferis, quæ germinibus subjiciuntur. Fructus ex capsulis quinque polyspermis.

PLANIFOLIA

1737 **SEDUM Telephium.**

ICON. TAUR. Vol. XXI. tab. 102.

Sedum foliis planis ovatis serratis, cymis lateralibus corymbosis. SCOP. *Fl. Carn. p.* 491. *n. 2. ed. 2. n.* 553.

Sedum foliis planiusculis serratis corymbo folioso, caule erecto. LINN. *spec. p.* 616.

Sedum androgynum foliis confertis serratis, floribus dense umbellatis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 954.

Anacampteros vulgo Faba crassa. BAUH. *hist. III. p.* 681.

Telephium vulgare. BAUH. *pin. 287.*

Faba inversa, sive Crasula, an Telephium. LOB. *p.* 167.

Loc. Vulgaris ad muros, & in apricis, vel ad saxosa in montanis, nec non etiam in collibus Taurinensibus. LOBELIUS scripsit eam crescere in vineis cultus sylvis, marginibus saxosis Sabaudiae. *PERENNE.*

1738. **SEDUM Anacampteros.**

Sedum caule procumbente, foliis ovatis integerrimis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 956. *Emend. 4. n.* 186.

Sedum foliis cuneiformibus integerrimis, caulibus decumbentibus, floribus corymbosis. LINN. *spec. p.* 616.

Telephium VI. Cepaea Plinii. CLUS. *hist. 2. p.* 67.

Loc. Abunde prope Segusium, & circa Vinodii thermas. In rupestribus Courmajour, & in monte Perulo circa Criseul Cl. DAKA. In alpiis Cousis locis saxosis, & umbris sæpius occurrit. *PERENNE.*

1739. **SEDUM stellatum.**

Sedum foliis planiusculis ongulatis, floribus lateralibus sessilibus solitariis. LINN. *spec. p.* 617.

Sedum foliis subrotundis, caule ramoso, floribus sessilibus. HALL. *hist. tom. 1. n.* 957.

Sedum echinatum, vel stellatum flore albo. BAUH. *hist. III. p.* 680.

Sempervivum tertium. COL. *phytoz. 32. tab. 11.*

Loc. Secus viam ad aggeres lapidum locis umbris, aut subhumidis in valle Festrellarum, & circa Oppidum Borge. *ANNUUM.*

1740. **SEDUM alsinifolium** N. *tab. 22. fig. 2.*

Sedum erectum ramosum foliis planis, floribus albis longe pedunculatis. SPEC. PEDEM. *p. 15. tab. 3. f. 2.*

Loc. Nascitur inter *P. Perè*, & *Prales* secus viam in umbrosis lapidosis. Occurrit etiam circa *S. Damian*, in valle *Macrae*, nec non inter *Tendam*, & *Robilant*.
Cl. BELLARDI in montibus di *Rooschia*, *BIENNE*.

1741. *SEDUM cepaea*.

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 110. fig. 1.

Sedum foliis planis, caule ramoso, floribus paniculatis. LINN. *spec. p.* 617.

Sedum caulibus paniculatis, foliis ovatis planiusculis. HALL. *hist. tom. 1. n.* 958.

Sedum foliis planis, caule, & pedunculo ramosis, floribus lateralibus. ROY. *Leyd. p.* 456. n. 3.

Sedum paniculatum. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 83.

Cepaea. CAM. *epit. p.* 673.

Loc. In ericetis umbrosis in valle *Tanari* frequens, atque etiam ad vias passim occurrit in collibus *Antensis*, & *Liguriae*. *BIENNE*.

1742. *SEDUM gallioides*. POURR. in *epist. tab. 65. fig. 3.*

Loc. Supra *Garressio* loco dicto *il garbo della luna*. *BIENNE*.

DESCR. *SEDUM* hoc pro insigni varietate *SEDI cepae* olim habui, verum quum pro distincta planta *SEDI gallioidis* nomine miserit *Cl. POURRET*, egregium hunc virum secutus pro distincta planta recenseo. Haec autem sunt, quibus a *cepaea* distingui mereatur, discrimina. Non, uti *SEDUM cepaea*, procumbit, sed se se erigit. Folia inferiora terna, & quaterna sunt, deinde opposita, postrema alterna. Racemi florum etiam axillares, sed propiores. Petala purporascunt, & aristata sunt teretifolia.

1743. *SEDUM dasyphyllum*.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 51. fig. 5.

Sedum foliis oppositis ovatis obtusis carnosis, caule infirmo, floribus sparsis. LINN. *spec. p.* 618.

Sedum foliis conicis obtusis glaucis reticulatis, caule ramoso viscido. HALL. *hist. tom. 1. n.* 961.

JACQ. hort. vindob. tab. 153.

Sedum glaucum. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 84.

Sedum minus VII. CLUS. hist. p. 60.

Sedum parvum folio circinato, flore albo. BAUH. *hist. III. p.* 691.

Sedum minus folio circinato. BAUH. *pin. 283.*

Loc. In agro *Pedemoniano* ad umbras rupes, & eatum fissuris. Ad muros etiam Septentrioni expositos circa ipsam urbem frequentissimum. *PERENNE*.

1744. *SEDUM reflexum*.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 54. 55. fig. 1.

Sedum foliis subulatis sparsis, basi solutis, inferioribus recurvatis. LINN. *spec. p.* 618.

Sedum foliis semiteretibus acutis aristatis, caule supremo multifido umbellato. HALL. *hist. tom. 1. n.* 967.

Sedum minus luteum ramulis reflexis. BAUH. *pin. 283.*

Sedum minus folio flore se circumflectente. BAUH. *hist. III. p.* 693.

Loc. Ad muros montanos, & in saxosis montium, & collium admodum frequens. *PERENNE*.

VIR. *SEDI* species omnes, ocri excepto, aquosae, at attemperantes subausterae sunt, atque acidum principium evidentem continent. Earundem locus est in morbis biliosis, & urinae ardore. Frequentius in officiis recipiuntur *SEDUM anacamperos*, *reflexum*, *album*, atque *sempervivum sctorum*; hoc caeteris usitatus est, ejusdemque usus suo loco vindicabitur.

1745. *SEDUM rupestre*.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 51. f. 1. tab. 53. f. 4.

Sedum foliis subulatis quinquefariis confertis basi solutis, floribus cymosis. LINN. *syn. 12. p.* 317.

Sedum rupestre repens, foliis compressis. DILL. elsh. 143. tab. 256. f. 333.

Loc. Circa Ussey, Vinadii thermas, & in valle Augustae Praetoriae locis saxosis, & apricis. PERENNE.

1746. *SEDUM aestivum* N.

Sedum foliis ovato teretiusculis obtusis alternis, caule bifido, floribus luteis sessilibus.

Sedum minus teretifolium luteum. BAUH. pin. 283.

Sedum minus aestivum luteum. BAUH. hist. III. 693.

Sempervivum minus aestivum. LON. ic. 378.

Loc. In collibus saxosis. ANNUUM.

DESCR. Radix alba, tenuis, quae in caulem producitur procumbentem, ex quo prodeunt cauliculi, sive ramuli erecti, albo-purpurascens, teretes, glabri, digitales, etiam ramosi, ramo uno, aut altero. Rami autem, sive cauliculi, saepius simplices, attamen in duos longos ramos erectos abire solent. Folia in surculis primum prodeuntibus conferta, oblongas rosulas faciunt. Folia oblonga, sessilia, teretia, intus planiuscula, obtusa sine spinula. Flores lutei, subsessiles, singulares. Calycis foliola succulenta, foliis similia. Flos luteus, calyce paulo major. Siliquae quinque. Perala quinque acuminata, calyce longiora. In cauliculorum divisione flos unus solet sedere. Planta tota acida est.

1747. *SEDUM sexangulare.*

Sedum foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis, sexforiam imbricatis. LINN. spec. p. 620.

Sedum foliis teretibus ternatis, caulibus simplicibus trifidis. HALL. hist. tom. 1. n. 965.

Sedum foliis ovato-teretiusculis adnato-sessilibus imbricatis, floribus lateralibus, terminalibusque. GER. p. 428. n. 7.

Sempervivum minus vermiculatum insipidum. BAUH. pin. 284.

Sempervivum minimum. CAM. epit. 856.

Loc. In montanis, & siccioribus pratis frequentissime, atque etiam in pascuis sterilibus saxosis agri Pedemontani. PERENNE.

1748. *SEDUM acre.*

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 94. f. 1.

Sedum foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cymo visida. LINN. spec. p. 619.

Sedum foliis conicis confertis, caulibus ramosis, summis trifidis. HALL. hist. tom. 1. n. 966.

Sedum foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis. GOU. Flor. p. 244.

Sempervivum minimum vermiculatum acre. BAUH. pin. 283.

Sedum parvum acre, flore luteo. BAUH. hist. III. p. 694.

OFF. *Sedum vermiculare*, aut *acre*.

Loc. Locis aridis montanis non infrequens, potissimum in siccis pascuis collium calidiorum, ut *Liguriae*, & Comitatus *Nicaeensis*. PERENNE.

VIR. Acris, & caustica planta est, quae intus data vomitum excitat, atque etiam alvum ciet: attamen sero lactis infusa instar acrium nonnullarum stirpium in scorbuto veram utilitatem attulit. Ejus rectum in scorbuto usum desinient ea, quae dicta sunt, ubi actum est de sinapi, & cochlearia. Extrus adhibitum profuit in sordis ulceribus mundandis, & gangraena affectis partibus separandis, ejusdem narratur utilitates in ulceribus cancerosis abstergendis. SED. acris folia ad internum usum adhibentur a drachma semisse ad drachmas duas ex aqua, aut sero lactis decocta.

1749. *SEDUM saxatile* tab. 65. fig. 6.

ICON. TAUR. Vol. X. tab. 51. fig. 4.

Sedum caule ramoso prostrato, foliis teretibus ramosis, floribus longe sessilibus. HALL. hist. tom. 1. n. 964.

Sedum saxatile teretifolium flosculis luteis, conceptaculis seminum stellatis, & viridantibus. SCHEUCHZ. li. 6. p. 518.

Sedum (alpestre) foliis teretibus, floribus subumbellatis luteis. VILL. prosp. p. 49.

ALLIIONI FL. Pedem. Tom. II.

H h

Loc. Non infrequens in saxosis summorum alpium pascuis. Abunde in monte Cenisio, & supra Fenestrelles: ad humiliora juga etiam descendit. *ANNUUM*.

1750. *SEDUM atratum* tab. 65. fig. 4.

Icon. *TAUR.* Vol. X. tab. 51. fig. 3.

Sedum caule folioso erecto umbellato humillimo, foliis teretibus. Tom. 1. n. 963.

Sedum erectum floribus corymbosis fascigiatis. LINN. spec. pl. append. 1673.

JACQ. *Fl. Austr.* tab. 8.

Sedum saxatile atro-rubentibus floribus. BAUH. prodr. p. 132. SCHEUCHZ. *it. alp.* tom. 1. p. 48. tab. 6. f. 3. 4.

Loc. Similibus cum priori locis reperitur. *ANNUUM*.

1751. *SEDUM album* tab. 65. fig. 2.

Icon. *TAUR.* Vol. X. tab. 53. fig. 5. & Vol. XII. tab. 94. f. 9.

Sedum foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. LINN. spec. p. 619.

Sedum caule glabro, foliis teretibus, umbellis ramosis, floribus petiolatis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 959.

Sedum foliis teretibus obtusis, racemis dichotomis corymbosis, calycibus obtusis. SCOR. *Fl. Carn.* 491. n. 1. ed. 2. n. 556.

Sedum teretifolium. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 84.

Sedum minus folio longiusculo tereti, flore albo. BAUH. *hist.* III. p. 690.

Sedum minus teretifolium album. BAUH. pin. 283.

Sempervivo minare. MATTH.

Loc. In muris humilioribus frequens, etiam infra urbem. *PERENNE*.

1752. *SEDUM Nicaeense* † tab. 90. f. 1.

Sedum foliis subulatis sparsis, basi solutis, alternis, cyma bifida, floribus longe peduncularis.

Loc. Rarissima planta nascitur in scopulis prope Savorgia a Cl. BELLARDI lecta, & observata. *ANNUUM*.

DESCR. Caulis vix spithama longior, suberectus, subrubens, simplex. Folia subulata, sparsa, basi soluta, alterna. Flores subalbidi in summitate caulis, magni pro ratione plantae. Cyma bifida, petalis calyce duplo longioribus. Stamina basi dilatata. Antherae erectae, in medio sulcatae. Singuli flores uno versu dispositi veluti spicati, longe pedunculari; sed pedunculus in summis floribus brevis.

1753. *SEDUM annuum*.

Icon. *TAUR.* Vol. XII. tab. 94. fig. 1.

Sedum caule erecto solitario annua, foliis ovatis sessilibus gibbis alternis, cyma recurva. LINN. spec. p. 620.

Sedum foliis breviter ovalibus, caule laxo ramoso, floribus magnis albis. BAUH. pin. 396.

Sedum minimum, non acre flore albo. RAI. *Syn. ed.* 3. p. 270. tab. 12. f. 2.

Loc. Nascentur secus vias alpium, & montium, praesertim ad lapides. *ANNUUM*.

1754. *SEDUM hirsutum* N. Tab. 65. fig. 5.

Icon. *TAUR.* Vol. XII. tab. 94. f. 5. 6.

Sedum teretifolium hirsutum caule ramoso erecto, petalis aristatis, stamina superantibus, pedunculis unifloris.

Sedum Oederi ic. XXIV.

Loc. Abunde ad rupes circa Zuerse, & prope Moez. *BIENNE*.

DESCR. Ex radice fibrosa rosulae foliorum, atque ex iis cauliculi; folia fere teretia, intus planiuscula subhirsuta, apice rubentia. Caules pollicaris altitudinis, rubentes, teretes, non transparentes. Folia caulina alterna, erecta, sessilia, minus hirsuta, majora magis compressa. Sapor subacidus. Cauliculi primum dichotomi, deinde alterne ramosi in pedunculos simplices unifloros abeunt. Calyx ex quinque foliolis succulentis, ellipticis, acuminatis cum spinula subrubente. Flos patens, magnus, calyce major, ex petalis ovatis, aristatis, albis, linea purpurascente magna

subtus divisus, & subhirsutis. Antherae decem obscurae, didymae, filamentis albis insidentes. Germina quinque, plerumque striis rectis purpureis rubentia, dein alba cum toxidem stylis, quorum stigmata lutea sunt. Stamina stylis breviora. Petala vero stylis ipsos altitudine superant. Ad ramorum divisiones foliolum positum est. Pedunculi nudi sunt.

1755. *SEDUM* villosum.

Sedum caule erecta, foliis planiusculis, pedunculisque subpilosis. LINN. spec. p. 620.

Sedum hirsutum, & viscidum foliis linearibus obtusis planiusculis. HALL. hist. tam. 1. n. 962.

Sedum palustre subhirsutum purpureum. BAUH. pin. 185.

Sedum purpureum praense. BAUH. hist. III. p. 692.

Sedum minus 3. 1. *palustre.* CLUS. hist. p. 59.

Loc. In Sebastaïas uliginosis reperitur. In spongiosis vallis Locana Petrus MOLINERI. Franciscus PEYROLERI prope Ussey, & Ceresale in montibus dictis Galeata. ANNUUM.

CRASSULA. LINN. gen. n. 352. syst. n. 388.

Staminibus quinque a Sedo differt.

1756. *CRASSULA* rubens.

Crassula foliis fusiformibus subdepressis, cyma quadrifida foliosa, floribus sessilibus, staminibus reflexis. LINN. syst. 12. p. 226.

Sedum caule hirsuto, ramis simplicibus, floribus in alis sessilibus. HALL. hist. tam. 1. n. 960.

Sedum arvense flore rubente. BAUH. prodr. p. 132.

Sedum foliis subcylindricis obtusis alternis, caule erecta, cyma horizontali. GER. p. 428.

Sedum rubens. LINN. spec. pl. p. 619.

Sedum annuum minimum siliacum rubrum. MAGN. mansp. 233. c. ican.

Loc. Ubique in pascuis saxosis. ANNUA.

DESCR. Radix teres, tortuosa, simplex, demum fibrillas demittens. Caulis unicus, teres, digitalis, saepius ramosus, ramis erectis, plerumque simplicibus. Folia oblonga, semiteretia, linearia, sine spinulam non educeute, supra planiuscula, sessilia, succulenta, acida, glabra, cinerea, apice rubente. Folia ad lentem vitream subtilissime hirsuta, sed caulis evidentius. Rami toti floriferi, floribus sessilibus. Flores non vere in axillis foliorum, sed paullo superius ad latera eorundem positi. Calyx ex quinque brevibus foliolis, ovatis, acutis. Petala quinque lanceolata, aristata, alba, extus linea rubente divisa. Stamina quinque cum antheris globosis, rubris. Germina quinque, et ad eorum basim squamae quinque. Fructus stellatus, rubens ex siliculis quinque stylo permanente aristatis.

RHODIOLA. LINN. gen. n. 997. syst. n. 1124.

Flores sexu, & tota planta distincti. Masculo calyx tetraphyllus: petala quatuor: stamina octo: germen imperfectum cum subjectis squamulis. Foeminae calyx similis, sed quatuor petala obscura: germen ex siliquis saepius quatuor cum totidem squamulis subjectis, quae in siliquis univalves, polyspermas mutantur.

1757. *RHODIOLA* rosea. LINN. spec. p. 1465.

Sedum sexu distinctum foliis serratis, floribus densissime umbellatis. HALL. hist. tam. 1. n. 951.

Sedum roseum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 560.

Anacampteros radice rasam spirante major. TOURN. inst. 264.

Rhodiola odorata. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 647.

Rhodia radix. BAUH. pin. 186. BAUH. hist. III. p. 685. CLUS. hist. 2. p. 65. CAM. epit. 769. DOD. pempt. 347. LOR. p. 177. & MATTH.

OFF. Rhodia radix.

Loc. Locis saxosis subhumidis alpium non infrequens est, sicuti meminerunt LOBELIUS, & JOHANNES BAUBINUS. PERENNIS.

VIR. Cum Sedi genere viribus convenit. Gratum rosae odorem spirat radix, quae attemperans, atque acida est: dolorem capitis a sanguinis aestu productum extus applicata dicitur compescere. Apud nos neglecta radix est, quae alibi in scorbutico adhibetur.

C. FRUCTU PULPOSO

1. HYPOCARPIÆ.

CORIARIA. LINN. gen. n. 1003. SYN. n. 1129.

Flotes sexu, & tota planta distincti. Masculo calyx pentaphyllus: corolla pentapetala: stamina decem. Foeminae calyx pentaphyllus: corolla maris: styli quinque:

Semina quinque, petalis succulento-baccatis tecta.

1758 CORIARIA myrthifolia.

Coriaria foliis ovato-oblongis. LINN. spec. p. 1467.

Rhus myrthifolia monspeliaca. BAUH. pin. p. 414.

Rhus Plinii myrthifolia monspeliensium. LON. ic. 2. p. 98.

Loc. Ad sepes in Comitatu Nicaena vulgaris planta est. PERENNIS.

VIR. Valde adstringit. Non solet ad internum usum recipi, sed tinctorio, atque coriario operi inservit.

VITIS. LINN. gen. n. 250. SYN. n. 181. TOURN. tab. 384.

Flotes racemosi. Calyx quinque-dentatus. Stamina quinque. Petala apice non nihil coalita.

Bacca succulenta, subrotunda, unilocularis, semina quatuor, vel quinque continens.

1759 VITIS vinifera.

Icon. TAUR. Vol. VIII. tab. 84. & Vol. XXI. tab. 109.

Vitis foliis lobatis sinuatis nudis. LINN. spec. p. 293.

Vitis foliis semirilobatis hirsutis dentatis. HALL. hist. tom. 1. n. 825.

Vitis vinifera &c. BAUH. pin. 299.

Vitis silvestris labrusca. BAUH. pin. 299.

Loc. Vitis non modo colitur, sed *Labrusca*, sive silvestris ad sepes, & damera sponte nascitur. FRUTEX.

VIR. *Vitis labrusca* mater est plurium *Vitis* differentiarum, quae data opera excolumuntur. Ea omnia praebet *Labrusca*, quae *Vitis* culta; quinimo vinum ex ipsius acinis paratum, spirituosum maxime est. Quum tanta sit vini, & ex vino proficiscentium substantiarum utilitas, ex proposito ea omnia expendere placet, quae ad hanc rem pertinent. Quamvis vinosa potio non ex solis uvae acinis, sed etiam ex fructibus, ac farinis, quae fermentationem ineunt, possit obtineri, nostra disquisitio solummodo versabitur circa illam vini speciem, quae ex fructibus *Vitis viniferae* habetur. Quum enim uberrima sit nostra in regione *Vitis* cultura, nostrates non solent ex aliis fructibus, aut seminibus farinosis hoc potulentum parare.

Folia *Vitis*, succum acidum, leviter attemperantem, atque diureticum continent, ac ejusdem naturae humorem stillant vulnerati palmites. Hic epotus laudatus est ad diuresim blande pellendam, caloremque in ophthalmia temperandum, si eo oculus abluatur. Haec autem folia commendata sunt in alvi fluxu, dato succo expresso, vel eorumdem siccatorum pulvere dosi drachmae unius, aut alterius. Verum in hujusmodi morbo alia solent efficaciora medicamenta in usum venire. Folia insuper *Vitis* cuti applicata ipsius calorem mitigant, neque inurilia sunt in ea phlogosi, ac in eo cutis ardore, qui crutibus hydropicorum tumentibus,

& serum demum stillantibus supervenit. Quamvis adstringens vis mitis admodum sit, non omni carebit periculo huiusmodi applicatio, si Medici votum velit uberem per hanc viam seri evacuationem, aut propter vim motus in hisce partibus deficientem metus gangrenæ sit, morhique conditio tonica resolutio requiratur. Sarmenta, atque radices *VITIS viniferae* combusta non exiguum dant salis alkalini fixi quantitatem, qui alkalinorum lixivialium salium aliis locis enarratorum proprietates habet. Ex hisce jam patet acidum, atque salem alkalinum fixum copiose in *VITI vinifera* contineri, sed praeterea particulas etiam oleosas, & phlogisticas haberi, sicuti acinorum natura, indeque nata ex iisdem producta demonstrant. Varia autem est horum principiorum in acinis uvæ, vinnique genito proportio pro diversa soli natura, caeli conditione, fructuum maturitate, *VITIS* ipsius multiplici differentia, cultura, atque parandi vinum artificie. Neque mirum est nostra in regione plures adeo, dissimilesque vini species existere, quom tanta sit montium, collium, & agri dissimilitudo non solum ratione aspectus, & elevationis, sed maxime ratione diversitatis soli, in quo exculta *VITIS* est. Montes minores, qui ad radices alpium sunt, nisi radiis solis multum percutiantur, acerbam vinum dare solent, qui lente ad convenientem pervenit maturitatem; colles autem ad maturitatem uvam perducunt. Caeterum tum in montibus, cum in collibus multiplex emergit vini differentia speciatim pro varia natura soli, diversoque loci aspectu. In genere argillaceum solum dat vinum crassius, coloratus, neque stomacho commodum, sed flatuletum; solum argillaceo-calcareum praebet vinum, quod utique crassum est, sed potentius, magisque calefaciens; argillaceo-arenarium, dulce, & tenuius vinum gignit, sed quod facilius ad aciditatem vertit; terram, atque praesentim lapidem calcareum habentes colles dant vinum non quidem admodum crassum, sed neque tenue, multum autem sulphureum; colles demum, aut etiam montes lapidosi ex lapide non calcareo, sed siliceo, atque una arenarii vinum suppeditant minime crassum, sed maxime spirituosum. Vina generatim, quae habentur ex *VITE* culta in planitie, ac solo pingui, debilia, atque acida sunt. Vinum rubrum solet magis nutrire, plus calefacere, album vero facilius acescit, ac loci excretionem promovet. Haec itaque in variis locis adeo dissimilis substantiarum, ex quibus montes, & colles coalescunt, diversitas, ac diversitatis proportio (praeter *VITIS* ipsius differentes varietates), facit, ut adeo multae vini differentiae nostra in regione existant, quas minutius pertractare minime necessarium esse putamus. Vinum itaque componitur, praeter aquam, ex particulis oleosis pinguis, ex phlogisto, acido, & sale alkalino fixo, quod acido etiam naturae fixae fertur adhaeret. Acidum uberius inest botryone, sive racemis. Hæc diversae particulae, acinis, & racemis contentae, per fermentationem, ut notum est, eam mutationem, & compositionem subeunt, ex qua vinum emergit. Vinum autem sibi relictum, per fermentationem vel spontaneam, vel arte productam, demum in acetum mutatur. Prima igitur fermentatio vulgo dicitur *vinosa*, altera autem *acetosa*. In prima pingues, oleosae particulae attenuantur, aetherogeneae separantur, acidum paulo liberius redditur, atque hae particulae intime consociantur cum phlogisti expliciti substantia. Per alteram autem fermentationem, nimirum *acetosam*, fit iactura nonnullarum particularum phlogisti, oleosae etiam simul dissipantium: superest acidum principium partim fixum, partim attenuatum, retinens tamen adhuc aliquas oleosas, & phlogisti particulas. Vinum sponte in doliis, quibus continetur, deponit fixas substantias ad alkalinum salem, & acidum vini pertinentes cum crassioribus terreo-pinguis. Sedimentum hoc vini ab aetherogeneis aliis substantiis liberatum id constituit, quod vulgo *Cremor tartari* nuncupatur. Pars spirituosae per distillationem a vino separata constituit *spiritum vini*. *Aceti*, *spiritus vini*, & *cremoris tartari* multiplices usus proponemus, sed primum agendum est de acinorum, atque vini utilitate.

Acini itaque, si probe maturi fuerint, grata, & suavi dulcedine donantur: quo vero magis a maturitate distant, eo acerbiores ipsi sunt, ac forte acidum continent. Succus ex immaturis acinis expressus *Omphacii* nomen habet, quod utile est ad bilis alkaliescentiam corrigendam, alvumque firmandam. Dari potest huiusmodi succus aqua dilutus, sed plerumque syrupus ex eo paratur cum saccharo,

qui gratam aquae aciditatem impertitur, ac utilem inde potum praeberit in febribus ardentibus, biliosis, iisque potissimum, in quibus alvus est continenda. *Omphacium* instar succi limonum gratum, & commodum etiam est ciborum condimentum. Acinorum bene maturorum cibus egregie nutrit, atque muriatico-alkalescentem humorum indolem corrigit, & corpora ad pinguedinem disponit. Jure merito eorumdem usus commendatur scorbuticis, ac iis praesertim, in quibus acria antiscorbutica minus opportuna esse jam alibi adnotavimus. Porro etsi uvae cibus, sive pro alimento, sive pro medicamento proficius ait, tamen vel nimia copia, quae stomacho laborem inferat, vel stomachi imbecillitate, vel hominis dispositione flatulenta, dolores ventriculi, & intestinorum gignere potest propter motum fermentationis, quam in ventriculo init, aptum ad plurimum aërem extricandum, & colicam flatulentam producendam. Uvae bene maturae, & dulciores, solis, vel furni ope diligenter exsiccatae non modo nutrium, verum etiam inungentem, demulcentemque naturam acquirunt, propter quam decoctiones pectorales ad tussim leniendam, ac urinae incommoda mitiganda non infrequenter ingrediuntur.

Vinum egregium est potulentum coalescens ex optima compositione particularum diversi generis (quemadmodum dictum est), quod insignes praeberit utilitates ad usum pharmaceuticum, diaeteticum, & medicinale. Commodum est menstruum non modo ad principia activa praesertim plurimarum stirpium extrahenda, sed etiam ad varia medicamenta paranda ex iis substantiis miserialibus, quae penetrat, solvit, variaeque ratione cum iisdem coalescens permutat. Pro varia autem encheiresi, ad quam adhibetur, diversa vini species opportunior est, prout acido tactari, oleosis, aut phlogisticis particulis magis, minusve abundat. Vinum, nervorum, ac irritabilia fibrae actionem erigit, fibrarum nexum validiorem facit stomachi actionem auget, nec non ad bonam alimentorum concoctionem conducit corporum nutritionem promovet praesertim oleosa, & pingui substantia, corruptionem avertit, sanguini, & humoribus majorem coaciliat firmitatem, gignendisque spiritibus animalibus aptam materiam suppediat. Haec autem potissimum pertinent ad vinum, quod aequabili proportionem sua principia contineat. Quod autem acerbum est, concoctioni alimentorum non faver, colicosque dolores facile infert, nimis dulces, maximeque crassum, appetitum deiecit, & flatulentias gignit; nimia spirituosum, aëstem in capite producit, mukumque calefacit, ac instar opii caput afficit; vinum denique, quod suppressa libera fermentatione paratum sit, propter accumulatum aërem elasticum, atque nimias collecti principii phlogistici particulas caput laedit, atque diras flatulentias generat. Vini boni conveniens usus in aignis omnino praeberit utilitates ad vitam hominum conservandam: rectum autem ipsius usum, ejusdemque eligendi qualitatem aegri constitutio debet definire. Abusus porro maxime perniciosus est, atque gravissima mala post se trahit; fibras indurando irritabilitatem partium delet, nimiam phlogistici quantitatem humoribus impingit, serum, & sanguinem cogendo vasis impermeabile fluidum reddit, secretiones ea de causa perturbat, & imminuit, in capite plethoram parit: primum pervertit, atque perturbat opportunam spirituum animalium separationem, qui apti sint ad oeconomiae animalis officia convenienter regenda, Postea etiam, densatis humoribus, fibrarum induratione, ac minimorum vasorum obstructione labefactat eorumdem secretionem. Ex hisce intelligitur, cur vini abusus appetitum dejiciat, rheumatismum, morbosque inflammatorios faciles reddat, podagrae, & calculis gignendis aptam praebeat materiam, impotentes denique homines faciat, & ad hydropem disponat, sensum denique hebetudo, somnolentia, tremor, apoplexia, paralysis, vini potatoribus superveniant. Vinum autem praecise medicamentum erit ad vires instaurandas, & magnum antisepticum habendum est in febribus putridis, aut petechialibus non inflammatoriis. Plures medicamentosi vini species in officinis existunt, quarum efficacia partim ex viro proficiunt, partim ex iis substantiis, quarum activa principia vinum extrahit. Hujusmodi vina medicata parari solent ad stomachum roborandum, urinam ciendam, cachexiam superandam, scorbuticam labem corrigendam, atque ad menses pellendos, nec non tubulos renales expediendos. Pro varia autem indicatione diversae vini species eliguntur, & consueverunt Medici ad vina diuretica insti-

tuenda, & ad oculorum collyria album vinum antepone. Epithemata, quæ viuum recipiunt, scrobiculo cordis applicita vomitum interdum sustulerunt, atque stomacho robur addiderunt. In fotu vinum recipitur ad dissipandos tumores aedematosos, non phlogisticos, caute tamen hujusmodi fots administrandi sunt, ne materia tumorem faciens ad nobiliores partes repellatur. Convenit hujusmodi externus usus in partium debilitate, sed hunc usum adhuc efficacius præstant botryones ipsi fermentantes. Propter hunc finem in artuum debilitate, ac inferiorum partium seroso tumore, imo in ipsa paralyti incipiente, aut leviori immersio facta in acervo fermentantium botryonum maxime juvat, si revera morbus ex laxitate, & debilitate partium pendeat, atque medicamenta corroborantia requirat, aut permittat.

Acetum ex bono vino, & per convenientem fermentationem elicited opera acidi vinosi cum sale alkalino attenuati, & actuari redditi cum phlogisti portione coarctati, vires habet aptas ad usus multiplices. Magnum antisepticum est, resque varias, quas penetravit, a corruptione præservat: gummi-resinas solvit, cum terris calcareis, atque alkalinis nonnullis substantiis concretescentes sales neutros gignit, spiritui vini junctum ætheris speciem constituit, cuprum, & plumbum penetrat, solvit, atque in terram salinam metallicam permutat: sanguinem, & serum solvit, calorem attemperat, alkaliescentiam humorum corrigit, lotiisque secretionem promovet. Recte commendatur aceti usus in mania, melancholia, hydrophobia, febribus ardentibus, putridis, petechialibus, pestilentibus, nimia corpulentia, cachexia calida, ac generatim iis in morbis, qui solventia attemperantia, nec non acida antiseptica requirunt; pro varia autem ægrorum, & morbi conditione variae substantiæ aceto etiam adjuvantur. Opiatorum, & narcoticarum substantiarum magnum antidotum est extus applicitum, atque intus datum. Cum humores solvat, atque salem muriaticum actuosiorem reddat, salinaque recrementa per tubulos renales urgeat, aceti familiaris usus nocebit iis, qui sale muriatico redundant, fibræ multum irritabilis sunt, & muco parum obducta vasa habent. Infensus etiam est iis, qui renum, & vesicæ morbis cruciantur, nisi agatur tantum de muco tenaci solvendo. In inflammatione oculorum, variisque cutis foeditatibus, & pustulis vulgare remedium est acetum aqua insillare, & eo partem abluere, sed maxima cum circumspectione hunc in finem utendum aceto est, quum, licet discutiatur, & attemperet, materiam tamen morbosam ad interiores partes repercutiat; hæc autem cautela severius adhuc tenenda erit in usu aceri, quo foveatur pars aliqua cum calore dolens, aut inflammata. Frequens porro, & notus aceti usus est ad ærem corruptivis particulis scatentem emendandum, naribus attractum acetum efficaciter sublevar homines, qui in lypothimiam incidunt, si præsertim ea ex suscepto vapore sulphurearum particularum proficiantur. Acetum sufficienti quantitate aquæ diluendum, & saccharo etiam condurum in usum internum recipi consuevit. Quemadmodum curandum est, ut ex bono vino paratum acetum habeatur, ita rejiciendum ab usu medicinali est illud, quod ex vino habetur corruptionem passo. Si destillatione, gelu, aliave ratione concentratum fuerit, cum particulas suas habeat minori aquæ quantitate dilutas, longe efficacius evadit.

Spiritus vini nihil aliud est nisi phlogistum cum addita fortasse acidi tenuissimi portione aquæ junctum. Hic spiritus, si purissimus fuerit, phlogistum tenet adeo volatile, ut in libero aëre flammam facile gignat: superabundante autem aqua exurit repetita præsertim destillatione. Resinas, balsama, & olea essentialia intime solvit, & ea propter extrahendis plurimorum vegetabilium principis activis, variisque medicamentis, usibusque mechanicis maximi est adjuvanti. Substantias gummosas non attingit: cum acidis jungitur, eaque edulcorat: sales plerosque neutros respuit, sibi autem adjungit alkalinos sales lixiviales, & volatiles. Pingua vix aggreditur, ut solvat, nisi olea jam attenuari incipiant: partes animales, & vegetabiles incorruptas servat, sed earumdem fibras coarctat, atque indurat. Sanguinem, & serum cogit, nervorum actionem, fibrarumque irritabilitatem momento fere temporis erigit, sed eos omnes malos effectus, quos parit vini abusus, citissime adducit. Purus spiritus vini ad usum internum non venit, sed eo varii liquores cardiaci, atque tincturae medicinales variarum rerum additione parantur, quæ confidentius, frequentius, aut castiga-

tius, & rarius adhiberi possunt, & debent pro spiritus vini vehementia, atque natura rerum, quarum principia activa idem extrahit. Juvant maxime hujusmodi tincturae ad vires vitales prompte instaurandas in lypothimia, & syncope, & ad vires stomachi erigendas, aut excitandas. Monemus autem remedia spiritu vini parata non esse in usum diutinum deducenda, aut, si adhibeantur, convenienti menstruo esse plurimum diluenda. In stomachi autem morbis saepius errant Medici spirituiosa, & corroborantia praescribentes, quum ad causam morbi debita diligentia non advertant. Ea vero saepius tonicorum medicaminum usum interdicit, quum posita sit in vasorum minimorum infarctu, nervorum spasmu, & partium irritabilium stimulo, uti ex animi pathemate, in materia rheumatica, aut exanthematica ad cutim deducenda, in proximorum viscerum vitio, atque plethora partiali, quam menses, aut haemorrhoides non fluentes facile inferunt. Utilior est externus spiritus vini usus, qui etiam familiaris est in contusionibus, atque vulneribus praesertim cum contusione conjunctis. In primo casu fortiter actionem vasorum erigendo sanguinem in circuitum pellit, & suppurationem resolvit, in altero vero juvat etiam minimorum vasorum hiantia oscula claudendo. Prodest insuper ambustam partem, si quidem combustio levis sit, aut spiritu vini oblinire, aut lineolum spiritu vini madidum imponere, in paulo graviore combustione magnam, & vehementem inflammationem produxisse observavi. Gangrenae progressum cohibet non modo corruptionem continendo, verum etiam vim vitae, & humorum circuitum in parte, quae nondum petiit, excitando, instaurandoque. Planum autem est generatim in iis gangrenae speciebus, quae nascuntur ex decubitu vitiosi humoris, (cujus suppuratio curanda sit), ex violenta inflammatione, aut ex malo erysipelate, spiritus vini usum aut non convenire, aut alia etiam esse adjicienda pro rei opportunitate. Partes debiles, laxae, torpidae, aut seroso tumore detentae cum utilitate spiritu vini conficiantur: paralyticae praeterea, & ex nervorum debilitate tremulae aliquam etiam utilitatem ab eo recipiunt, attamen perraro hisce in casibus solus spiritus vini in usum venit, sed adhibentur medicinae multiplices, balsama diversa, salia volatilia oleosa, atque olea essentialia vegetabilium in spiritu vini soluta continentes. Usitatum medicamentum est spiritus vini camphoratus in paronychia incipiente, contusionibus, & edematosis partialibus tumoribus resolvendis. In visus debilitate, qui vere pendeat ex fibrarum laxitate, utile admodum est oculis ablueret aqua, cui guttae aliquot spiritus vini fuerint instillatae. Si causa morbum externum faciens nascatur ex humorum spissitudine inflammatoria, aut acri phlogistico principio, & fibrarum caruearum, vel nervearum tensio adsit, eo erit abstinendum. Haec autem monita praesertim pertineant ad rheumatismum, partium tumores, atque ad eas paralyseos species, quae non in vera nervorum resolutione positae sunt, sed in eorundem impedita actione per compressionem, & spasmus nervorum ex materia acri, & stimulante.

Crystallus tartari, sive cremor tartari ab aetherogeneis vini foecibus depuratus singularis species est salis neutri nata ex alkali fixo minerali, quod maxime saturarum est acido forti, oleosas tamen aliquas particulas conjunctas habente. Tanta autem est quantitas acidi, ut haec salis neutri species ad acidiorum naturam maxime accedat. Hae duae substantiae non ita facile divelli ab invicem possunt. Aqua frigida vix aliquam crystallorum partem solvit, aut solutam tenet; ebulliens porro requiritur ad cremorem tartari solvendum, eaque saltem in vigecupla proportionem. Hic sal attemperat, humores incidendo solvit, bilem alkaliescentem corrigit, urinae secretionem promovet, atque vasa generatim obstructa aperit. Jure merito laudatur ad ciborum appetitum excitandum, si cibi fastidium ex biliosis, corruptivae particulis veniat: ad icterum superandum, hepatis, lienis, & mesenterii obstructions tollendas, atque hydropem etiam curandum, si ex causa, ut dicitur, calida pendeat, quae exposulet liberam alvum, atque corruptae bilis evacuationem. Convenit maxime in cachexia, quae febres putridas subsequitur, maximeque si adsint adhuc biliosa corruptivae indoliscrementa humorum inquinantia. Generatim in febribus ardentibus, & biliosis cum insigni calore conjunctis opportunissimus est cremoris tartari usus. Caeterum, si memoratae febres adjunctam habeant earum particularum septicarum conditionem,

quas natura debeat, & velleit per cutis viam eliminare, neutiquam convenit. Potio recipiens crystallos tartari, & nitrum data etiam utiliter est aliquot horis ante accessionem ad febres intermittentes tollendas, neque irritio successu; sed hujusmodi remediū genus praesertim prodest in iis febribus intermittētib; in quibus bilis aliquis aestus adest. Utiliter adicitur remediis purgantibus ad eorum actionem acuendam, & expeditiorem reddendam: purgantium enim principia resinosa solutiora reddit, prohibetque, ne diutius, quam par est, rugis intestinorum inhaereant. Aggreditur etiam hic sal ferrum ipsum, atque medicamentis tonico-diureticis patandis inservit. Si pro alterante, ut dicitur, cremor tartari praescribatur, dosis esse poterit a scrupulo uno ad drachmas duas. Quoniam autem & ipse solus exhibitus alvum movet (quod purgantis genus maxime confert ad bilem corruptam evacuandam) majori tunc quantitate imperatur, a drachmis nimirum tribus ad drachmas sex. Circa crystallosum tartari usum animadvertimus ab eo vim ventriculi concoctricem debilitari, sive quod succi gastrici activum principium absorbeat, sive oscula in cavum ventriculi hiantia constringat, sive vim fibrarum irritabilem vitiet, ac labefaciet. Ejusdem ideo protractus, aut inopportuus usus appetitum dejicit, atque stomachum imbecillum reddit, neque prodesse poterit, si agatur de homine debili, sene, frigido, pituitoso, effaeco. Quemcumque autem in finem praescribatur, (nisi exigua dosis fuerit), aut sub forma solida convenienti conserva, aut electuario exceptus exhibendus est, aut dandus in calida portione solutus. Extat in officinis tartarus tartarizatus, sive tartarus solubilis natus ex alkali lixiviali, & acido tartari. Haec neutri salis species longe facilius in aqua solvitur, minus stomacho gravis est, lotii vias facilius subit, atque crystalli tartari eundem Medici anteponunt, praesertim si scopo diuretico ducti praescribant.

HEREDERA. LINN. *gen. n. 249. syst. n. 280. TOURN. tab. 384.*

Flores in umbella simplici, calyce multipartito cincta. Calyx proprius, ovarium amplectens, quinquefidus. Stamina quinque. Petala patentia, apice non coalita.

Bacca globosa, plerumque pentasperma.

1760 **H**EDERA helix.

ICON. TAUR. Vol. II. tab. 119.

Hedera foliis ovatis, lobatisque. LINN. *spec. p. 292.*

Hedera communis major, & minor. BAUH. *hist. II.*

Hedera arborea. BAUH. *pin. 305.*

Hedera helix, & Hedera arborea. MATTH.

VERN. Brassaboch.

Loc. Notissimus frutex, arborum adularum truncos, aut muros antiquos plerumque salit, aut junior serpit in umbrosis sepibus. FRUTEX.

VIR. Folia adstringunt, sed usui interno non inserviunt: externe adhibentur cauteriis imposita.

RHAMNUS. LINN. *gen. n. 235. syst. n. 264. TOURN. tab. 366. 383. 403.*

Calyx monophyllus, quadri, vel quinquefidus, interne coloratus. Petala quatuor, vel quinque. Stylus simplex, aut etiam stygmata tria. Fructus bilocularis, aut trilocularis, loculis monospermis. Dantur in quibusdam speciebus flotes sexu distincti.

SPINOSI

1761 **R**HAMNUS catharticus.

ICON. TAUR. Vol. VII. tab. 82.

Rhamnus spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. LINN. *syst. 12. p. 178.*

ALLSONI Fl. Pedem. Tom. II.

K k

Rhamnus spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, corollarum laciniis tubo longioribus. GER. Fl. Galloprov. p. 461. n. 1.

Rhamnus foliis spinosis ovato-lanceolatis serratis. HALL. hist. tom. 1. n. 824.

Rhamnus catharticus. BAUH. pin. 478.

Spina inferior. MATTH.

OFF. *Rhamnus catharticus*, *Rhamnus solutivus*, s. cervi spina.

Loc. In sylvis apricis *Taurinensibus*, & in montanis ad sepes rarus non est. FRUTEX.

VIR. Fractus RHAMNI *cathartici* ad viridem colorem obtinendum colligi solent: viridis etiam color præbet ipse cortex. Baccæ patenter alvum movent, atque inter hydrotica medicamenta enumerantur. Ex aqua decoquantur a decem ad viginti: exsiccatarum pulvis exhibetur a drachma semisse ad drachmam unam & semis. Succus autem e baccis expressis summa dosis esse potest uncia una. Cortex medius RHAMNI *cathartici*, quemadmodum cortex Sambuci, fortiter etiam alvum movet, sed solet una vomitum excitare, neque in usum recipitur. Saepius autem Medici utuntur syrupo de baccis RHAMNI *cathartici* ab uncia una ad uncias duas. Multum interdum profuit hic syrupus in cachexia, anasarca, & ascite incipiente, quando nimirum exiit serosa colluvies alvo evacuanda. Quum validum sit remedium, subijcimus caute generatim servandis in administratione remedium evacuantium hydroticorum ad hydropis curationem. Inter omnia primum videndum est ex cognita causa morbi, & aegri positione, num tonicis, corroborantibus, durescicis, deobstruentibus, aut alterius generis remediis curatio sit instituenda. In ascite, qui tympanizem subsequatur, aut jungatur eidem opposita non sunt hydrotica, neque danda, si vires vitales non regant, si serum effusum sit, si febris teneat, aut morbus ex pulmonum infarctu originem suam trahat, aut nascatur ex metastasi materiae phlogisticae in morbis acutis, aut vetustis in abdomine congestionibus. Non desunt, qui podagricis utilem medicinam esse dixerint syrupum de RHAMNO, sed vix crediderim evenire posse, ut podagricis proficuum medicinam præbeat, nisi agatur de conjuncta serosa, aut pituitosa colluvie tale medicamentum requirente.

1762. RHAMNUS infectorius.

Rhamnus spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, caulibus procumbentibus. LINN. mant. p. 49.

Rhamnus catharticus minor. BAUH. pin. 478.

Loc. In Liguria lectus missus est. FRUTEX.

VIR. Baccæ similem naturam habent, & ad tinctorium usum etiam præferuntur.

1763. RHAMNUS alaternus.

Rhamnus inermis floribus dioicis, stigmate triplici, foliis serratis. LINN. spec. p. 281.

Rhamnus spinis geminis deciduis, foliis lanceolatis serrato-spinosis. GOV. hort. monsp. p. 112. n. 2.

Alaternus L. CLUS. hisp. 56. TOURN. inst. 495.

Spina bourgi Monspeliennum. BAUH. hist. l. p. 542.

Loc. In agro, & collibus *Nicaensium* abunde provenit. FRUTEX.

VIR. Hujusce RHAMNI folia fortiter adstringunt, sed vix in usum veniunt.

1764. RHAMNUS lycioides.

Rhamnus spinis terminalibus, foliis linearibus. LINN. spec. p. 279.

Rhamnus tertius flore herbaceo, baccis nigris. BAUH. pin. 477.

Loc. Habui ex Liguria. FRUTEX.

ACULEATI

1765. RHAMNUS paliurus.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 23.

Rhamnus aculeis geminis inaequalibus, foliis trinerviis subternatis, pedunculis solitariis, fructibus margine membranaceo clypeiformibus. GOV. h. 112. n. 4.

Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso. BAUH. pin. 477.

Paliurus. DOD. *pempt.* 376.

Ramno tertio. MATTH.

OFF. *Paliurus*.

LOC. incolit Comitatum *Nicaeensem*, sed & nascitur circa *Augustam Praetoriam*, & *Montemagno* in *Monteferrato*. FRUTEX.

VIR. Fructus acerbis, & stipitici sunt; iis utuntur Medici ad alvi fluxum cohibendum, at praesertim commendantur ad renes sabulo expurgandos, calculumque pellendum. Vim aliquam diureticam tonicam adstringenti adjungunt, atque uvæ usi vices supplere posse opinamur. Solent a drachmis duabus ad unciam semis. ex aqua decoqui diutina ebullitione, ut fixa activa principia extrahantur.

1766. RHAMNUS zizyphus.

ICON. TAUR. Vol. IX. tab. 99.

Rhamnus aculeis geminis subaequalibus, foliis oblique ovatis trinerviis serratis, pedunculis confertis. GOU. hort. monsp. 113. n. 5.

Rhamnus aculeis geminatis altero recurvo, floribus digynis, foliis ovato-oblongis glabris.

LINN. syst. 12. p. 480.

Giuggioleno, ossia *Zizole*. MATTH.

OFF. *Jujubae*.

LOC. Habitat in Comitatu *Nicaeensi*. ARBOR.

VIR. *Jujubae* leviter attemperant, demulcent, & emolliunt, atque in tussi ad stimulum leniendum decoctiones pectorales ingredi solent.

I N E R M E S

1767. RHAMNUS alpinus.

Rhamnus inermis floribus dioicis, foliis duplicato-crenatis. LINN. spec. p. 280.

Rhamnus inermis, foliis ovatis crenulatis. HALL. hist. tom. 1. n. 823.

Frangula alpera polycarpus. BAUH. prodr. 160.

Alnus nigra polycarpus. BAUH. pin. 428.

LOC. Passim in sylvestribus umbrosis montanis. FRUTEX.

1768. RHAMNUS pumilus.

Rhamnus inermis repens, floribus hermaphroditis, foliis serratis. LINN. syst. 12. p. 179. *man.* 49.

Frangula monono pumila saxatilis, folio subrotundo. TOURN. inst. 612.

Rhamnus rupetris. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 164. n. 262. tab. 5.

LOC. E summorum rupium fissuris supra *Cesane*, & in montibus editioribus vallis di *Bardonache*, in alpinis di *Pragelos*, & in monte *Cenisio*. FRUTEX.

1769. RHAMNUS frangula.

ICON. TAUR. Vol. VII. tab. 83.

Rhamnus inermis floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. LINN. spec. p. 280.

Rhamnus inermis foliis ovato-lanceolatis integris, floribus quinquefidis androgynis. HALL. hist. tom. 1. n. 821.

Frangula. MATTH.

OFF. *Frangula*.

LOC. In sylvis umbrosis subhumidis vulgarissima. FRUTEX.

VIR. *Frangulae* cortex medius fortiter vomitur, & alvum movet, daturque a drachma semisse ad drachmas duas validis, & robustis hominibus iis in morbis, in quibus corticem RHAMNI, & Sambuci dari posse diximus. Semen ad diuresim pellendam laudatur a drachma semisse ad drachmam unam. Folia, & baccae viridi colore tingunt.

PHYTOLACCA. LINN. *gen. n.* 521. *syn. n.* 588. TOURN. *tab.* 151.

Calyx nullus. Corolla persistens. Stamina ab octo ad decem. Bacca octo, aut decem-locularis, loculis monospermis.

1770 PHYTOLACCA decandra.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 56.

Phytolacca floribus decandris, decagynis. LINN. *spec. p.* 631.

Phytolacca fructu petiolato decemfido. HALL. *hist. tom. 1. n.* 1007.

Blitum americanum. MUNT. *phyt. curios. f.* 112.

Off. Solanum racemosum, s. Phytolacca.

Loc. Adeo frequens planta est ad muros, & sepes secus vias in submontanis etiam incultis, & in agro Pedemontano, ut pro indigena haberi possit. PERENNIS.

Vir. Acris, & virulenta suspecta planta est, quae ad usum internum non venit. Folia ulcetibus cancerosis imposita fuisse sine ulla utilitate vidi, sed tamen dolores mitigatos fuisse observavi. Baccæ rubrum colorem suppeditant.

RUBUS. LINN. *gen. n.* 557. *syn. n.* 632. TOURN. *tab.* 385.

Calyx quinquefidus, persistens. Stamina plura, breviter calyci inserta. Germina numerosa, stylo laterali brevi praedita. Bacca ex acinis succulentis, monospermis, composita.

1771 RUBUS idaeus.

Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 86.

Rubus caule spinoso suberecto, foliis quinatis, & ternatis subtus tomentosis, fructibus hirsutis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1108.

Rubus foliis quinato-pinnatis, ternatisque, caule aculeato. LINN. *spec. p.* 706.

Rubus framboesienus. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 135.

Rubus idaeus spinosus. BAUH. *pin.* 479. BAUH. *hist. II. p.* 59.

Rovo idco. MATTH.

Off. Rubus idaeus.

Vern. Ampole.

Loc. In montanis, & subalpinis lapideosis frequens est, sitimque pluries hujus stirpis fructu temperavimus. FRUTEX.

Vir. Fructus grate acidi sunt, sitim temperant, humorum alkalescentiam corrigunt. Exiat in officinis syrupus de RUBO idaeo, cujus usus frequens est in faucium ardore; gargismata etiam, quae in morbis faucium interdum praescribuntur, solent syropo de RUBO idaeo edulcorati.

1772. RUBUS caesius.

Rubus foliis ternatis subnudis, lateralibus bilobis, caule tereti aculeato. LINN. *spec. p.* 706. SCOP. *Fl. Carn.* 590.

Rubus caule aculeato prostrato, foliis ternatis, subtus hirsutis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1110.

Rubus repens fructu caesio. BAUH. *pin.* 479.

Rubus minor. DOD. *pempt.* 742.

Loc. Circa ivermas Valderii, atque in alpinis secus torrentes occurrit. Secus Duriam in agro Taurinensi Cl. BELLARDI SUFFRUTEX.

1773. RUBUS fruticosus.

Rubus foliis ternatis, & quinatis, costa spinosa, fructu nigro, & laevi. CRANTZ. *fasc. 2. ed. 2. p.* 82.

Rubus foliis quinato-digitatis, ternatisque, caule, petiolisque aculeatis. LINN. *spec. p.* 707. SCOP. *Fl. Carn. p.* 591. n. 4.

Rubus caule spinoso serpente, foliis quinatis, & ternatis subtus tomentosis, bacca laevi. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1109.

Rubus vulgaris, s. Rubus fructu nigro. BAUH. *pin.* 479.

Rubus major fructu nigro. BAUH. *hist.* II. p. 37.

Rovo. MATTH.

Off. Rubus.

Vern. Ronçe; Fructus autem dicuntur More.

Loc. Ad sepes vulgaris. *FRUTEX.*

1774. RUBUS saxatilis.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 71.

Rubus caule herbacea, foliis ternatis glabris, acinis baccarum distinctis paucissimis.

HALL. *hist. tom. 2. n. 1111.*

Rubus foliis ternatis nudis, flagellis repantibus herbaceis. LINN. *syn.* 12. p. 349.

Rubus alpinus humilis. BAUH. *hist.* II. p. 61.

Rubus saxatilis alpinus. CLUS. *Pannon.* p. 115. 116.

Loc. In saxosis irriguis alpium, atque etiam in pratis subhumidis. *SOFFRUTEX.*

Vit. RUBI idaei fructibus substitui potest; caeterum omnes RUBI species, quod ad folia pertinet, adstringenti virtute conveniunt.

RHUS. LINN. *gen. n.* 331. *syn. n.* 366. TOURN. *tab.* 381.

Calyx quinquefidus. Stamina quinque. Stigmata tria. Bacca coriacea; monosperma.

1775. RHUS Coriaria.

Icon. TAUR. Vol. II. tab. 136.

Rhus foliis pinnatis obtusiuscule serratis ovalibus, subtus villosis. LINN. *spec.* p. 379.

Rhus foliis pinnatis, floribus diaicis. GER. p. 534. n. 1.

Rhus folio ulmi. TOURN. *inst.* p. 611. BAUH. *pin.* 414.

Rhu. MATTH.

Off. Rhus, s. Summach.

Loc. In collibus Taurinensibus circa Baudissè. *FRUTEX.*

1776. RHUS cotinus.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 39.

Rhus foliis simplicibus obovatis. LINN. *spec.* p. 383. GER. 535.

Rhus racemis plumosis, foliis ovatis. HALL. *hist. tom. 1. n. 827.*

Rhus Coccygria. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 368.*

JACQ. *Fl. Austr. tab.* 210.

Cotinus coriaria. DOD. *pempt.* 780.

Coccolinea, s. Coccygria. BAUH. *pin.* 415.

Coccinus Coccygria Theophrasti. LÖB. *ic.* 99.

Cotino. MATTH.

Off. Cotinus coriaria, s. Coccygria.

Loc. Frequens in montibus Liguriae, Astensis, & Comitatus Nicaeensis, atque ad sepes etiam in montibus di Varallo; nascitur in agro Derionensi, monte Crea, atque inter Susa, & Bussalino. *FRUTEX.*

Vit. Utraque Rhus adstringens principium habet, atque arti coriariae suam praebet utilitatem.

MELIA. LINN. *gen. n.* 473. *syn. n.* 523. TOURN. *tab.* 387.

Calyx quinqueidentatus, persistens. In medio floris nectarium cylindraceum, multidentatum, decem antheras sustinens brevissime pedicellatas. Stylus unus.

Fructus est drupa firma, in loculis continem totidem semina.

1777. MELIA Azedarach.

Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 38.

Melia foliis bipinnatis. LINN. *spec.* p. 550.

Azedarach. DOD. *pempt.* 848.

Arbor Fraxini folia, flore caeruleo. BAUH. *pin.* 415.

Loc. Circa Nicetam collectam habui. *FRUTEX.*

ALLIONI *Fl. Pedem. Tom. II.*

PRUNUS. LINN. *gen.* n. 346. *syn.* n. 620. TOURN. *tab.* 401.

Calyx quinquefidus. Stamina plura, calyci inserta. Stigma orbiculatum. Fructus pulposus, subrotundus, unicam ossiculum continens non foraminosum.

1778 PRUNUS padus.

ICON. TAUR. Vol. XXII. *tab.* 25.

Prunus floribus racemosis, foliis deciduis basi subius biglandulosis. LINN. *spec.* p. 677.

Padus foliis ovato-lanceolatis serratis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1086.

Prunus racemosa. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 107.

Cerasus racemosa sylvestris fructus non eduli. BAUH. *pin.* 431.

Pseudo-Ligustrum. DOD. *pempt.* 777.

OFF. *Cerasus racemosa.*

Loc. In sylvis, & ad sepes locis collinis, & montanis. FRUTEX.

VIR. Avibus in alimentum cedunt baccae. Ligni fortis decoctio dictum est valere ad loem veneream, nullo attamen in usu est.

1779. PRUNUS Mahaleb.

ICON. TAUR. Vol. XVII. *tab.* 98.

Prunus floribus terminalibus corymbosis, foliis ovatis. LINN. *syn.* 12. p. 341.

Cerasus foliis subrotundis serratis, petiolis multifloris. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1084.

JACQ. *Fl. Austr.* *tab.* 727.

Cerasus sylvestris amara Mahaleb pumata. BAUH. *hist.* I. *part.* 1. p. 227.

Mahaleb. CAM. *epit.* p. 91. CLUS. *hist.* p. 64.

Prunus odoratus. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 108.

Ceraso affinis. BAUH. *pin.* 431.

Mahaleb. MATTH.

OFF. *Cerasus amara.*

Loc. Ad sepes in montanis vallis *Augustae Praetoriae*, & in sylvis circa *Segusium* abunde; neque infrequens in montanis *Nicaeensis* Comitatus, & vallium calidiorum. FRUTEX.

VIR. Baccae ingratum sorem habent, & amarissimae sunt. Ligni materia pulchre rubella, & odorata ad utensilia adhibetur. Eadem ad ratiem caninam laudata est, sed nullis certis experimentis.

1780. PRUNUS Cerasus.

ICON. TAUR. Vol. XIII. *tab.* 85.

Prunus umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis glabris. LINN. *syn.* 12. p. 342.

Cerasus foliis glabris serratis ovato-lanceolatis, mucrone producto. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1089.

Prunus floribus umbellatis subpedunculatis ovato-lanceolatis glabris. CRANTZ. *fasc.* 2. p. 58.

Loc. Vulgatis in sylvis montium, & collium. ARBOR.

VIR. Hujusce *Cerasi* fructus acidissimi sunt. Haec *Ceraso* cultae originem dedisse videtur.

1781. PRUNUS avium.

ICON. TAUR. Vol. XXII. *tab.* 24.

Prunus umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis subius pubescentibus. LINN. *spec.* p. 680.

Cerasus foliis ovato-lanceolatis serratis, inferne subhirsutis, mucrone producto. HALL. *hist.* tom. 1. n. 1082.

Prunus (Ceraso offic.) floribus umbellatis subpedunculatis ovato-lanceolatis. CRANTZ. *fasc.* 2. *ed.* 2. p. 94.

Prunus Cerasus. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 105.

Cerasus sylvestris fructu rubro, & nigro. BAUH. *hist. part.* 1. p. 220.

Cerasus major, s. sylvestris fructu subdulci, nigro colore inficiente. BAUH. *pin.* 450.

OFF. *Cerasus nigra.*

VERN. *Cerese negre.*

LOC. In sylvis montanis passim. *ARBOR.*

VIR. Ex contusis cum pulpa nucleis post fermentationem aqua, & spiritus ardens paratur, quorum usus frequentissimus apud nos est ad exhilarandum potissimum in frigidis morbis ventriculi, & capitis: sæpius pro aliorum cardiacorum, & cephalicorum vehiculo adhibetur. Cavendum tamen, ne ex abusu aque potissimum valde spirituosæ damna ea sequantur, quæ ex aliorum spirituosorum usu solent observari.

1782. PRUNUS domestica.

Prunus pedunculis solitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis mucicis. LINN. *spec.* p. 680.

Prunus foliis serratis hirsutis ovato-lanceolatis, floribus longe petiolatis. HALL. *hist. tam.* 2. n. 1079.

Prunus. BAUH. *pin.* p. 443.

Prunus (*Pruna offic.*) *pedunculis* &c. LINN. CRANTZ, *fasc.* 2. *ed.* 2. p. 94.

Pruna. MATTH.

OFF. *Prunus.*

VERN. *Prune, oppure Brigne.*

LOC. In sylvis *Liguriae*, & *Comitatus Astensis.* *ARBOR.*

VIR. Hojvice PRUNI fructus acerbi, & stiptici sunt, atque negliguntur.

1783. PRUNUS spinosa.

Icon TAUR. Vol. XXIV. tab. 95.

Prunus pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. LINN. *spec.* p. 681.

Prunus spinosa foliis glabris serratis ovato-lanceolatis, floribus breviter petiolatis. HALL. *hist. tam.* 2. n. 1080.

Prunus (*acacia germ. offic.*) *spinosa foliis lanceolatis, pedunculis solitariis.* CRANTZ. *fasc.* 2. *ed.* 2. p. 93.

Prunus sylvestris. BAUH. *pin.* 444. TABERN. *ic.* 992.

Pruno selvatico. MATTH.

OFF. *Prunus sylvestris.*

VERN. *Brignole, o Brignèue.*

LOC. Ad sepes, & apricas sylvas abunde in agro *Pedemoniano*, & montibus humilibus. *FRUTEX.*

VIR. Succus ex immaturis fructibus expressus, & inspissatus dat *Acaciam Germanicam*, quæ valde adstringit, atque efficax medicamentum sistit in seri, & sanguinis fluxibus cohibendis, in gingivarum laxitate, raucedine, vulvæ, vaginæ, & ani procidentia. *Terræ catechu* substitui potest, atque eas præbet utilitates, quæ radicibus tormentillæ tributæ sunt. Cortex in pulverem trius drachmarum duarum pondere cum successu imperatur ad febres intermittentes tollendas. Eas autem superare potest febres intermittentes, quæ citra obstructions sunt, atque stipticis adstringentibus cedere possunt: probabile etiam est amara aromatica huic cortici adjuncta ejusdem vim extendere posse.

1784. PRUNUS insititia.

Prunus pedunculis geminis, foliis ovatis subius villosis convolutis, ramis spinoscentibus. LINN. *spec.* p. 680. HALL. *hist. tam.* 2. n. 1081.

Pruna sylvestria præcocia. BAUH. *pin.* 444.

LOC. Ad sepes in vallibus di *Bardouche*, *Cesane*, & *Quairas* occurrit. *FRUTEX.*

AMYGDALUS. LINN. *gen.* n. 545. *yst.* n. 619. TOURN. *tab.* 401.

Differt a Pruno ossiculo foraminoso.

1785 **AMYGDALUS communis.**

Amygdalus foliis serratis infimis glandulosis, floribus sessilibus geminis. LINN. *spec.* p. 677.

Amygdalus sylvestris. BAUH. *pin.* 442.

Mandorle. MATTH.

OFF. *Amygdalus dulcis*, sive sativa.

VERN. *Amandole douce.*

Loc. In agro *Nicacensi*, & in vineis etiam circa *S. Jean de Maurienne* adinventur: in rupibus pariter, locisque minime cultis, ita ut vere indigena, atque spontanea planta videatur. *FRUTEX.*

VIA. Fructus edules sunt, ac oleoso-mucilaginosam substantiam continent, quæ demulcet, & attemperat. Ex iis confusis paratur emulsio, cujus usus frequens est in acutis febribus, & in urinae ardore. Extat in officinis butyrum AMYGDALARUM dulcium, quo Medici utuntur in faucium ardore, & tussi lenienda. Juvat etiam in morbis stomachi, si inungentia requirantur. Oleum AMYGDALARUM dulcium frequentis usus est non modo ad tussis mitigationem, sed etiam ad alvum ciendam iis in casibus, in quibus purgantia medicamenta suspecta sunt. In doloribus ventriculi, & intestinorum familiare remedium est hujusmodi oleum, sed quum facile ranciditatem contrahat, recens expressum debet adhiberi; tensæ etiam, & contractæ partes oleo AMYGDALARUM utiliter illiniuntur. AMYGDALÆ amaræ avibus generatim exitiales sunt: ex iis expressum oleum anihelmynticum habetur, ac prodesse in surditate, atque maculas cutis abigere dicitur.

2. EPICARPIÆ.

RIBES. LINN. *gen.* n. 147. *yst.* n. 178. TOURN. *tab.* 409.

Calyx quinquefidus, persistens. Stamina quinque, e calyce nata. Stylus bifidus.

Bacca globosa, umbilicata, polysperma.

1786 **RIBES alpinum.**

ICON. TAUR. Vol. XIII. *tab.* 42.

Ribes inerme racemis erectis, bracteis flore longioribus. LINN. *spec.* p. 191.

Ribes inerme floribus planis, bracteis florum longitudine. HALL. *hist. tom.* 1. n. 817.

JACQ. *Fl.* *tab.* 47.

Ribes vulgare dulci fructu. CLUS. *hist.* 119.

Ribes montana altera. BAUH. *prodr.* 162.

Ribes minor fructu rubro. BESL. *hort. opt. arb. vern.* fol. 14. f. 5.

Ribes sylvestre. CAM. *hort.* p. 141.

Grossularia vulgaris fructu dulci. BAUH. *pin.* 455.

Ribes alpinum dulce. BAUH. *hist.* II. p. 98.

Loc. In dumetis, & montanis proximis pratis circa *Vindii* thermas, & ad montem *Cenisium*. Sæpe etiam occurrit in sylvis *Maurianensibus*. *FRUTEX.*

1787. **RIBES rubrum.**

Ribes inerme racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. LINN. *spec.* p. 190.

Ribes inerme floribus planiusculis, stipulis minimis. HALL. *hist. tom.* 1. n. 818.

Grossularia rubra. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 1. n. 269.

Grossularia multiplici acino, seu non spinosa hortensis rubra. BAUH. *pin.* p. 455.

Ribes vulgare acidum. BAUH. *hist.* II. p. 97.

Ribes vulgare. MATTH.

OFF. *Ribes.*

VERN. *Uva uramè.*

Loc. Inter *Braman*, & le petit *Montenis* loco dicto la plaine; abunde nascitur in alpestribus sylvis *Mauritoniensibus*, & monte *Cenisio* supralles *Ferrieres*. *FRUTEX*.
VIR. Fructus *RIBIS* grate acidus, & edulis est; ex eu syrupus, & gelatina parantur ad usum medicinale. Ad hunc fructum ea etiam pertinent, quæ indicata sunt circa usum fructus *rubi idæi*, atque *berberis*.

1788. *RIBES* nigrum.

Ribes inerme racemis pilosis, floribus oblongis. LINN. spec. p. 291.

Ribes inerme olidum calyce oblongo, petalis ovatis. HALL. hist. tom. 1. n. 819.

Grossularia non spinosa fructu nigro. BAUH. pin. 455.

Ribes nigrum vulgo dictum folio olente. BAUH. hist. II. p. 98.

Ribes nigrum. LOB. adv. p. 445. ic. 202.

OFF. *Grossularia olens*, s. *Ribes nigrum*.

Loc. Nascitur in valle *Più*, & monte *Cenisio*. *FRUTEX*.

VIR. Fructus laudati sunt ad urinam pellendam. Vinum, cui folia infusa fuerint cum expressione, tribuitur vis antilissica. Intus autem, & extus adhibendum est. Coetici etiam adscriptæ vires diureticæ sunt, atque in Gallia magna fama hujusce remedi extitit, quæ nunc perisse videtur.

1789. *RIBES* grossularia.

Ribes ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, baccis hirsutis. LINN. spec. p. 291.

Grossularia fructu minimo hispido margoviarum fere colore. RAJ. hist. 1484.

Loc. Haec etiam *RIBIS* species abunde utitur circa *Vinadii* thermas. In montibus alpium *Cotiarum* ad vias in lapidosis frequenter occurrat. *FRUTEX*.

1790. *RIBES* uva crispa.

Ribes ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bracteæ monophyllæ. LINN. spec. p. 292.

Ribes ramis aculeatis, foliis rotunde lobatis. HALL. hist. tom. 1. n. 820.

Ribes spinosum. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 470.

Grossularia simplicifolia, seu *sylvestris spinosa*, BAUH. pin. 455.

Uva crispa, seu *Grossularia*. BAUH. hist. I. part. 2. p. 47.

Uva spino. MATTH.

OFF. *Grossularia*, s. *Uva crispa*.

VERN. *Griselle*.

Loc. In montibus *Gorrexianis* vidit Cl. DANA. *FRUTEX*.

VIR. Edules sunt fructus *Grossulariorum* fatinosi, & subadstringentes, sed solent a nostratibus negligi.

MYRTUS. LINN. gen. n. 543. syn. n. 617. Tourn. tab. 409.

Calyx quinquefidus, sive quadrifidus. Petala quinque, vel quatuor. Stamina plura, calyce inserta. Stigma obtusum. Bacca 2-vel 3-locularis.

1791. *MYRTUS* cummanis.

Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 70.

Myrtus floribus solitariis involucre diphylla. LINN. spec. p. 673.

Myrtus communis italica. BAUH. pin. 462.

Myrtus vulgaris sylvestris. BAUH. hist. I. p. 510.

B. *Myrtus foliis minimis, & mucronatis.* BAUH. pin. 469

C. *Myrtus minor vulgaris.* BAUH. pin. 469. GARID. aix. tab. 67.

Miro. MATTH.

OFF. *Myrtus*.

Loc. In sylvis apricis *Nicoensibus* maxime vulgaris est. Varietas c. *Sevonnæ* reperitur, eandemque legit circa *Montalban* *Nicaensium* Cl. BELLARDI. *FRUTEX*.

VIR. Tota planta valide adstringit, & aromatica est, at major aromatis quantitas fructu inest. Veteres magni MYRTUM fecerunt. Praestans revera planta est ad tonum fibrarum firmandum sive intus, sive extus adhibeatur. Fructus MYRTI foliis etiam

anteponuntur. Adhibita igitur MYRTUS est ad alvi fluxum sistendum, ad fluorem album mulierum, & gonorrhæam contumacem finiendam. Relaxatas partes constringit, & firmat: idcirco in uvulae relaxatione, vaginae, atque ani procidentia efficacem praebeat utilitatem. In usum venit forte decoctum foliorum, aut fructuum. Extracium etiam ex fructibus paratur, cujus dosis est a drachma semisse ad drachmam unam. Oleum per expressionem, aut infusionem elicium ad externos usus impenditur. In iis morbis, qui valida adstringentia exposculant, efficax MYRTUS est, sed ejusdem incautum, & inopportunum usum etiam gravia mala sequuntur, quae alias advertimus.

ROSA. LINN. *gen. n.* 556. *yst. n.* 631. TOURN. *tab.* 408.

Getmen coriaceum, pulposum, rotundum, vel ovatum coronatur calyce pentaphyllo, foliis aut semipinnatis, aut ab uno tantum latere appendice auctis. Stamina numerosa. Tubae inferius natae, in summo fructu apparent plurimae, breves, villosae. Fructus pulposo-coriaceus, unilocularis, semina plurima continet.

GERMINIBUS SUBGLOBOSIS.

1792. ROSA foetida.

ICON. TAUR. Vol. XV. tab. 75.

Rosa calycis foliolis semipinnatis, pomo globoso inermi, foliorum dentibus dentatis.

HERM. *dist. de ros. p.* 18. n. 13.

Rosa lutea simplex. BAUH. *pin. p.* 483.

Loc. In collibus circa Alliano. FRUTEX.

1793. ROSA cinnamomea.

ICON. TAUR. Vol. XVII. tab. 89.

Rosa germinibus globosis, pedunculis glabris, caule aculeis stipularibus, petiolis subinermibus. LINN. *spec. p.* 703.

Rosa odore cinnamomi simplex. BAUH. *pin.* 483.

Rosa cinnamomea floribus subrubentibus, spinosa. BAUH. *hist. II. p.* 39.

Rosa calycis foliolis integris, germine ovato, caule subinermi. HERM. *ros. p.* 7. n. 2.

Loc. D. VALLE reperit in sylvis montis Chapé prope Exilles. FRUTEX.

1794. ROSA spinosissima.

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 51.

Rosa calycis foliolis integris, germine globoso, pedunculis, petiolis, cauleque aculeatis. HERM. *ros. p.* 6. n. 1.

Rosa germinibus globosis glabris, pedunculis hispidis, caule, petiolisque aculeatissimis. LINN. *yst. 12. p.* 348.

JACQ. *Vindob.* 89.

Rosa campestris spinosissima flore albo odorato. BAUH. *pin.* 483.

Rosa campestris odorato flore. CLUS. *hist. p.* 116.

Rosa germinibus globosis glabris, pedunculis, caule, petiolisque aculeis confertis. CRANTZ. *far. 2. ed. 2. p.* 84.

Loc. Locis alpinis saxosis apricis nascitur. FRUTEX.

1795. ROSA villosa.

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 52. 53.

Rosa (pomifera) calycis foliolis semipinnatis, germine globoso aculeato, foliis utrinque tomentosis. HERM. *ros. p.* 16. n. 11.

Rosa germinibus globosis, pedunculisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomentosis. LINN. *yst. 12. p.* 348.

Rosa spinis rectis, foliis quinque tomentosis, pinnis rotundis spinosis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1105.

Loc. Non intrequeus locis apricis subalpinis. FRUTEX.

1796. ROSA arvensis.

Rosa germinibus globosis, pedunculisque glabris, caule, petiolisque aculeatis, floribus cymosis. LINN. mant. alt. p. 245. OED. dan. tab. 398.

Rosa (candida) arvensis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 609. BAUH. pin. 484.

Rosa sylvestris altera minor flore albo. RAY. angl. 3. p. 455.

Loc. Ad vias, & oras sylvarum. FRUTEX.

GERMINIBUS OVATIS.

1797. ROSA gallica.

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 50.

Rosa germinibus ovatis, pedunculisque hispidis, caule, petiolisque hispido-aculeatis. LINN. spec. p. 704.

Rosa aurantiaca germinibus ovatis, pedunculisque hispidis, petiolis, medioque caule aculeatis. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 86.

Rosa rubra multiplex. BAUH. pin. 481. TOURN. insu. p. 637.

Rosa rubra flore semiplena. BAUH. hist. II. 34.

Rosa rubra. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 130.

Loc. Ad vias, & sepes in collibus quandoque occurrit. FRUTEX.

1798. ROSA alpina.

ICON. TAUR. Vol. XXII. tab. 54.

Rosa germinibus ovatis glabris, pedunculis, petiolisque hispidis, caule inermi. LINN. syst. 12. p. 348.

Rosa inermis foliis septenis glabris, calycis segmentis indivisis. HALL. it. helv. 2. n. 27. hist. tom. 2. n. 1107.

JACQ. Fl. Austr. tab. 379.

Rosa rubello flore simplici non spinosa. BAUH. hist. II. p. 39.

Loc. Locis lapideis alpium frequens. FRUTEX.

1799. ROSA canina.

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 51. & Vol. XXII. tab. 50.

Rosa germinibus ovatis, pedunculisque glabris, caule, petiolisque aculeatis. LINN. spec. p. 704. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 84.

Rosa spinis aduncis, foliis septenis, calycibus tomentosis segmentis pinnatis, & semipinnatis, tubis brevissimis. HALL. hist. tom. 2. n. 1101.

Rosa calycibus semipinnatis, caule aculeato erecto, ramis multifloris. SCOP. Fl. Carn. p. 587. n. 4. ed. 2. n. 604.

Rosa glaberrima calycis ovati foliolis semipinnatis, caule, petiolisque aculeatis. HERM. ros. p. 11. n. 6.

Rosa canina vulgo dicta. DOD. pempt. 187.

Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato. BAUH. pin. 483.

OFF. Cynorrhodon.

VERN. Grattacuy.

Loc. Ad sepes, & vias ubique vulgaris. FRUTEX.

VIZ. Radix ROSÆ caninae, uti etiam spongiola, quam cynips ROSÆ excirat Bedeguar nomine nota, Sanatorum a Siculis appellata dicuntur valere adversus mortuus canis rabidi, atque animalium venenatorum, sed hae vires ab experientia non confirmantur. Fructus ROSÆ caninae, qui cynorrhodi nomen habent, adstringunt, atque aliquam etiam vim diureticam habent. Vino etiam, dum illud paratur, a nonnullis adjiciuntur, hocque vinum calculosis proficuum habetur. Conserva etiam extat cynorrhodi, cujus usus est in alvi fluxu coarctando.

1800. ROSA alba.

ICON. TAUR. Vol. XXII. tab. 51.

Rosa germinibus ovatis glabris, pedunculis hispidis, caule, petiolisque aculeatis. LINN. spec. p. 705.

Rosa calycibus semipinnatis, caule aculeato diffuso, ramis unifloris. SCOP. Fl. Carn. p. 587. n. 3.

Rosa calycis foliolis semipinnatis glabris, germine ovato glabro, pedunculo spinoso.

HERM. ros. p. 14. n. 8.

Rosa alba vulgaris major. BAUH. pin. 482.

Loc. Ad sepes in collibus. FRUTEX.

1801. ROSA collina. JACQ. Fl. Austr. tab. 197.

Loc. In dumetis collium Taurinensium. FRUTEX.

Oss. A camina distinguitur præsertim foliis crassis, minus nitentibus, subtus constanter hirsutis. Folia sunt quina, argute serrata, atrovirentia.

1802. ROSA pumila. JACQ. Fl. Austr. tab. 198.

Rosa austriaca. CRANTZ. fasc. 86.

Rosa pumila pannonicæ, flore rubello. BAUH. hist. II. p. 35.

Rosa sylvestris pumila rubens. BAUH. pin. 483.

Loc. Vulgaris est locis apricis summorum collium. Inter Chivasso, & Cigliano secus arva, & in ericetis non infrequenter occurrit. SUFFRUTEX.

Oss. Folia sæpius quina, ovata, aut subrotunda, duplicato-serrata, conniventia, virentia, glabra, subtus hirsuta: ubique glandulæ minutæ ferrugineæ. Aculei rari in petiolis. Flores pauci.

1803. ROSA rubiginosa.

Rosa germinibus globosis, petiolisque aculeatis, aculeis recurvis, foliis subtus rubiginosis. LINN. mant. p. 564.

Rosa spinis aduncis, foliis subtus rubiginosis. HALL. fl. 1103.

JACQ. Fl. Austr. p. 31. tab. 50.

Rosa sylvestris odorata. DOD.

Loc. In collibus calidioribus Montisferrati, atque Liguriæ ad vias, & sepes occurrit. SUFFRUTEX.

PUNICA. LINN. gen. n. 544. syst. n. 618. TOURN. tab. 407.

Germen exhibet calycem campanulatum, quinquefidum, coloratum. Stamina plura, calyci inserta. Stylus simplex cum stigmatibus capitato. Germen evadit fructus pomiformis, plerumque novemlocularis, segmentis calycis coronatus, sub cortice levi semina continens in pulpa succulenta nidulantia.

1804. PUNICA granatum.

Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 73.

Punico foliis lanceolatis, caule arboreo. LINN. spec. p. 676.

Punico spinoso foliis nitentibus ellipticis integerrimis, floribus sessilibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1098.

Malus punica sylvestris. BAUH. pin. 438.

Punica sylvestris. CORD. hist. 184.

Punica spinosa. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 483.

OFF. *Malus punica*, s. *granatum*.

VERN. *Pôm granâ*.

Loc. Frequens in Comitatu Nicaensi, atque ad rupes, & muros circa Castella in Comitatu Asensu, & Montisferrato. FRUTEX.

VIR. Mali PUNICÆ succus attemperat, bilem corrigit; si convenientem maturitatem fructus adepti sint, dulcior est, quam rubi rubri acini. Cortex malorum PUNICARUM, sive mollicorum validum adstringens est iis dicatum usibus, qui assignati sunt tormentillæ, myrtique foliis.

MESPIUS. Tab. 410.

Germen calyce quinquefido coronatur. Stamina numerosa, calyci inserta.
 Styli persistentes tot, quot semina. Bacca umbilicata, in qua absque
 cartilagineis loculis totidem semina nidulamur.

1805. **MESPIUS** aria.

Icon. TAUR. Vol. VIII. tab. 28.

Crataegus foliis ovatis incisiss serratis, subtus tomentosis. LINN. syn. 12. p. 342.

Mespilus foliis ovatis serratis, subtus tomentosis. HALL. hist. tom. 2. n. 1089.

Mespilus floribus digynis, foliis ovatis, subtus tomentosis. SCOP. Fl. Carn. p. 584. n. 4.

Sorbus foliis ovalibus serratis, facie splendens, dorso tomentosis, fructu biloculari.

CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. tab. 11. fig. 2. p. 86.

Mespilus aria. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 591.

Aria. LUGD. 202.

Crataegus folio subrotundo serrato, subtus incano. TOURN. inst. p. 633.

Alni effigie lanato folio, major. BAUH. pin. p. 452.

Sorbus alpina. BAUH. hist. I. 65.

Loc. In jugis alpium Sabaudiae Joannes BAUHINUS crescere scripsit. In subalpinis,
 & montanis apricis locis frequens planta est. ARBOR.

1806. **MESPIUS** torminalis.

Crataegus foliis cordatis septemlobis, lobis infimis divaricatis. LINN. spec. p. 681.

Mespilus foliis serratis septilobis, lobis primis divergentibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1088.

Sorbus folio septangulo, fructu ovato biloculari. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 85.

Crataegus folio laciniato. TOURN. inst. p. 633.

Mespilus apii folio, sylvestris non spinosa, sive Sorbus torminalis. BAUH. pin. 454.

Sorbus torminalis, & Crataegus Theophrasti. BAUH. hist. I. p. 63.

Loc. In montanis, & collinis sylvis passim. ARBOR.

1807. **MESPIUS** oxyacantha.

Icon. TAUR. Vol. XXIV. tab. 94.

Crataegus foliis obtusis subtrifidis serratis. LINN. spec. p. 683.

Mespilus spinosa foliis glabris serratis retusis-trifidis. HALL. hist. tom. 2. n. 1087.

JACQ. Fl. Austr. tab. 292. f. 2.

Mespilus floribus digynis, foliis obtusis bifidis serratis. SCOP. Fl. Corn. ed. 1.
 p. 585. n. 5.

Mespilus apii folio sylvestris spinosa, sive oxyacantha. TOURN. inst. p. 642.

Oxyacantha vulgaris, sive spinus albus. BAUH. hist. I. p. 49.

Loc. In sylvis, dumetis, & ad sepes ubique. FRUTEX.

1808. **MESPIUS** monogyna.

Crataegus monogyna. JACQ. Fl. Austr. tab. 222. f. 1.

Mespilus decima tertia. DUHAM. arbr. 2. p. 20.

Mespilus sylvestris foliis trifidis splendens. VAILL. bot. p. 121.

Oxyacantha spinosa minore folio. BARREL. ic. n. 563.

Loc. Ad sepes prope Villafranco.

Obs. Hujus folia magis nitentia, glaberrima, in tres, aut quinque lobos profunde
 secta: pedunculi glabri, calycis laciniae reflexae. Fructus constanter monospermus.

1809. **MESPIUS** azarolus.

Crataegus foliis obtusis subtrifidis subdentatis. LINN. spec. p. 683.

Mespilus apii folio laciniato. BAUH. pin. 453.

Mespilus Aronio veterum. BAUH. hist. I. p. 67.

Loc. Comitatus Nicaeensis indigena planta est. ARBOR.

1810. *MESPILUS aucuparia*.

ICON. TAUR. Vol. VIII. tab. 29.

Sorbus foliis pinnatis utrinque glabris. LINN. spec. p. 683.

Sorbus foliis pinnatis, fructu pomiformi quinque-loculari. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 88. tab. 1. fig. 4.

Mespilus floribus trigynis, foliis pinnatis glabris. SCOP. Fl. Carn. p. 384. n. 3.

Mespilus aucupario. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 593.

Mespilus foliis pinnatis utrinque glabris. HALL. hist. tom. 2. p. 32. n. 1091.

Sorbus aucuparia. BAUH. hist. I. 62. TOURN. inst. p. 634.

Sorbus sylvestris, foliis dromedariæ similis. BAUH. pin. p. 415.

Sorbus sylvestris alpino. LÖB. ic. 107.

Sorbo selvaico. MATTH.

VERN. Tomoriar.

Loc. Frequens est in montanis, & subalpinis. ARBOR.

VIR. Apud alpicolas dolia parantur ex hoc ligno ad vinum continendum, cui tribuuntur vires diureticae, & deobstruentes, referente CL. BELLARDI. ARBOR.

1811. *MESPILUS domestica*.

Sorbus foliis pinnatis subius villosis. LINN. spec. p. 684.

JACQ. Fl. Austr. tab. 447.

Sorbus foliis pinnatis, fructu pyriformi quinque-loculari. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 87. tab. 11. fig. 3.

Mespilus (sorbus) foliis pinnatis villosis. HALL. tom. 2. n. 1092.

Sorbus sativo. BAUH. pin. p. 415. TOURN. inst. p. 633.

Sorbus. BAUH. hist. I. 59.

Sorbo. MATTH.

Loc. In sylvis collium. ARBOR.

1812. *MESPILUS germanica*.

ICON. TAUR. Vol. XXI. tab. 107.

Mespilus inermis foliis lanceolatis subius tomentosis, floribus sessilibus solitariis. LINN. spec. p. 684.

Mespilus foliis elliptico-lanceolatis serratis, calycibus longissimis persiseminibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1094.

Mespilus foliis oblongis argute serratis, bacco pyriformi truncato. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 88.

Mespilus germanica folio laurino non serrato, sive Mespilus sylvestris. BAUH. pin. 453. TOURN. inst. p. 641.

Mespilus vulgaris. BAUH. hist. I. 69.

Nespolo 2. MATTH.

OFF. *Mespilus vulgaris*.

VERN. Nespo.

Loc. Frequens in sylvis calidioribus, atque uberrime in sylvis collium *Monisferrati*, *Genuesi* ditioni proximorum. ARBOR.

VIR. Fructus hujusce plantae ad summam maturitatem quem devenierint, edules sunt, sed semper aliquam habent acerbicatem; farinosi percipiuntur, & parum gustui suaves, *MESPILI* species pleraeque fructum farinosum, & adstringentem habent, qui a rusticis ad alvi fluxum sistendum comedi solet.

1813. *MESPILUS pyracantha*.

ICON. TAUR. Vol. XIV. tab. 80. & Vol. XVI. tab. 101.

Mespilus spinoso foliis lanceolato-ovatis crenatis, calycibus fructus obtusis. LINN. spec. p. 685.

Mespilus oculosa amygdali folio. TOURN. inst. p. 642.

Oxyacantha Diascoridis, sive spino ocuta pyrifolio. BAUH. pin. 454.

Pyrocomha quibusdam. BAUH. hist. I. 51.

Rhamnus serius Diascoridis. LÖB. ic. 182.

OFF. *Pyracantha*.

Loc. Ad sepes in Sabaudia vulgaris est. FRUTEX.

1814. *MESPILUS* *amelanchier*.

Icon. TAUR. Vol. XVII. tab. 97.

Mespilus inermis foliis ovalibus serratis, caudiculis hirsutis. LINN. spec. p. 685.

Pyrus foliis ovatis serratis, subius tomentosis calvescentibus. HALL. hist. tom. 2. p. 34. n. 1095.

Mespilus floribus pentagynis, racemis terminalibus, foliis ovato-lanceolatis acutis crenatis, caule inermi. SCOP. Fl. Carn. p. 583. n. 1.

JACQ. Fl. Austr. tab. 300.

Sorbus foliis ovalibus serratis carinatis, fructu globoso multiloculari. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 90.

Alni effigie, lanato folio, minor. BAUH. pin. 452.

Mespilus folio roundiore, fructu nigro subdulci. TOURN. inst. p. 642.

Vitis idaea III. CLUS. hist. 1. p. 76.

Amelanchier gallo-provinciae. BARR. ic. 527.

Pyrus amelanchier. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 492.

Loc. In montosis Sabaudiae Joannes BAUHINUS. Passim occurrit locis subalpinis, & sylvis apricis. FRUTEX.

1815. *MESPILUS* *Chamaemespilus*.

Mespilus inermis foliis ovalibus acute serratis glabris, floribus corymboso-capitatis. LINN. syst. 12. p. 343.

Mespilus foliis ovatis serratis glabris. HALL. hist. tom. 2. n. 1090.

Sorbus fruticosa foliis oblongo-ovalibus serratis, fructu ovato biloculari. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 83. tab. 1. fig. 3.

JACQ. Fl. Austr. tab. 231.

Craiaegus foliis ovalibus glabris acute serratis, caule inermi. JACQ. vind. p. 243. n. 41.

Cataeaster folio oblongo serrato. BAUH. pin. 452.

Loc. In alpihus edulis frigidis. FRUTEX.

1816. *MESPILUS* *cotoneaster*.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 61. fig. 1.

Mespilus inermis foliis ovatis integerrimis, subius tomentosis. LINN. syst. 12. p. 343.

Mespilus foliis ovato-acuminatis integerrimis, subius lanatis, bacca globosa. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 81. tab. 11. f. 1.

Mespilus foliis ovatis integris subius tomentosis. GER. p. 474. n. 3.

Mespilus folio subrotunda, fructu rubra. TOURN. inst. p. 642.

Cotoneaster folio rotunda non serrato. BAUH. pin. 452.

Cotoneaster. BAUH. hist. I. 73.

Loc. Haec *MESPILUS* species similibus locis nascitur, sed editioribus, & alpinis. FRUTEX.

PYRUS. LINN. gen. n. 550. syst. n. 526. TOURN. tab. 404.

A *Mespilo* differt stylis constanter quinis, totidemque loculis membranaceis, quorum quodlibet semina bina continet.

1817. *PYRUS* communis.

Pyrus foliis serratis, floribus corymbosis. LINN. syst. 12. p. 344.

Pyrus foliis ovato-lanceolatis serratis glabris. HALL. hist. tom. 2. n. 1096. p. 35.

Sorbus foliis serratis, fructu turbinate quinqueloculari. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 93. VERN. PRUS.

Loc. In sylvis collium, atque ad sepes interdum in montanis. ARBOR.

1818. *PYRUS* *malus*.

Pyrus foliis serratis, umbellis sessilibus. LINN. spec. p. 686.

Pyrus foliis ovatis acuminatis, subius hirsutis, petiolis florigeris brevissimis. HALL. hist. tom. 2. p. 35. n. 1097.

Sorbus foliis serratis, fructu sphaerico quinqueloculari. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 93.

VERN. Pom.

Loc. In sylvis, & ad sepes superiori frequentior. ARBOR.

1819. PYRUS cydonia.

Pyrus foliis integerrimis, floribus solitariis, LINN. spec. p. 687.

JACQ. Fl. Austr. tab. 342.

Sorbus foliis rotundis integerrimis, fructu lanato quinqueloculari. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 93.

Malus cotonea sylvestris. BAUH. pin. 435.

Cotogno. MATTH.

OFF. *Malus cotonea*.

VERN. Pom Codogn.

Loc. Ad sepes in provincia *Montisregalis, Liguria*, & Comitatu *Astensi*. Circa *Buntigliera* frequentem esse adnotavit Ill.^m Comes FREHLINI indefessus Botanophilus, qui propriis sumptibus hortum botanicum alit, colit, atque exoticis stirpibus locupletavit. FRUTEX.

VIR. Non modo sponte nascitur, sed data opera colitur propter fructus, qui saccharo, aut musto conditi, grati, & sapidi sunt. Conserva *Cydoniorum* efficaciter inservit ad alvi fluxum cohibendum, atque illum maxime, quem fibrarum debilitas sustentat; tonum etiam ventriculi erigit. Succus ex fructibus expressus cum addita aliqua aqua aromatica datur unciae unius dosi ad tollendum alvi fluxum. Mucilago ex seminibus cum aqua appropriata educta optimum demulcens praeberet medicamentum, quo medici utuntur in faucium asperitate, urinae ardore, atque abraso muco intestinorum. Extus etiam prodesse dicitur, si fussae, aut excoriatae partes illiniantur.

CLASSIS VIII

PLANTÆ FLORE HEXAPETALO.

I. DIANTHERÆ.

ORCHIS. HALL. *hist.* tom. 2. p. 131. TOURN. *tab.* 247. 248.

Petala quinque, quorum duo interiora sunt, galeam constituunt; sextum petalum barbae in modum descendit. Srylus antice bilocularis continet in loculis primum clausis, deinde hiantibus antheras duas petiolatas, sive filamento instructas.

BULBIS INDIVISIS.

- 1820 **O**RCHIS bifolia.
Icon. TAUR. Vol. VI. tab. 129. 131.
Orchis bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo, cornu longissimo, petolis parentibus. LINN. spec. p. 1331.
Orchis radicibus oblongis, labello lineari. HALL. hist. tom. 2. n. 1285., Act. Helv. vol. 4. p. 162.
Orchis labio lanceolato simplici, cornu setaceo longissimo subangulato. SCOP. Fl. Carn. p. 244. n. 1. ed. 2. n. 1102.
Testiculi species V. CAM. epit. p. 625.
Orchis olba bifolia, calcare oblongo. BAUH. pin. 83. VAILL. tab. 30. f. 7.
Loc. Ubique in sylvis frequentissima. PERENNIS.
1821. ORCHIS globosa.
Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 117. f. 1.
Orchis radicibus subrotundis, spico densissima, petalis exterioribus aristatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1272. tab. 27. & Helv. 2. n. 31.
Orchis bulbis indivisis, nectarii labio trifido, medio trilobo, cornu brevi, petolis apice subulatis. LINN. spec. p. 1332.
Orchis bulbis indivisis, nectarii cornu brevi, labio trifido, petolis in setam apice spatulatam abeuntibus. JACQ. Vind. obs. 88. p. 292.
Orchis rotundus. DALECH. lugd. p. 1556.
Loc. In pratis editionum alpium abunde, & in monte Cenisio. PERENNIS.
1822. ORCHIS pyramidalis.
Orchis radicibus subrotundis, spica densa, calcare longissimo labello bicorni, aequaliter tripartito. HALL. hist. tom. 2. n. 1286. Act. Helv. Vol. IV. p. 163.
Orchis bulbis indivisis, nectarii labio bicorni, trifido aequali integerrimo, cornu longo, petolis sublancoatis. LINN. syn. 12. p. 589. JACQ. Vindob. p. 292. & Fl. Aust. tab. 266.
Orchis militaris montana, spico rubente conglomerata. TOURN. inst. VAILL. tab. 31. f. 38.
Orchis labio trifido auriculato, cornu setaceo longissimo tereti. SCOP. Fl. Carn. p. 245. n. 2. ed. 2. n. 1105.

Orchis flore conglomerato. RIV. tab. 14.

Loc. In pratis abunde inter Lucengo, & Ducent. PERENNIS.

1813. ORCHIS cotiophora.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 112. fig. 2.

Orchis radicibus subrotundis, galea connivente, labello trifido reflexo. HALL. hist. tom. 2. n. 1284. it. hercyn. n. 7. Act. Helv. Vol. 4. p. 136.

Orchis bulbis indivisis, nectarii labio trifido reflexo crenato, cornu brevi, petalis conniventibus. LINN. spec. p. 1332.

JACQ. Fl. Austr. tab. 122.

Orchis labio trifido reflexo: lacinii inaequalibus, cornu conico germinibus brevior.

SCOP. Fl. Carn. p. 246. n. 3. ed. 2. n. 1107.

Orchis hirci odore minor. BAUH. pin. 82. VAILL. tab. 31. fig. 30. 31. 32. 37.

Orchis cimicino. CRANTZ. fasc. 6. ed. 2. p. 498.

Loc. In pratis siccioribus collium Liguriae non infrequens est. PERENNIS.

1814. ORCHIS hircina.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 117. f. 2.

Orchis radicibus subrotundis, labello longissimo tripartito plicato. HALL. hist. tom. 2. n. 1268. tab. 25.

Satyrium bulbis indivisis, foliis lanceolatis, nectarii lobio trifido, intermedio lineari, obliqua praemorsa. LINN. syst. 12. p. 591.

Orchis hircina. CRANTZ. fasc. 6. ed. 2. p. 484.

Orchis hircina. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1113.

JACQ. Fl. Austr. tab. 167.

Orchis barbata odore hirci, brevior, & latiore folio. BAUH. pin. 20. VAILL. tab. 30. f. 6.

Orchis barbata foetida. RIV. tab. 18.

Loc. Sylvosis, & apicis locis collium Taurinensium, & Liguriae, sed frequens non est. PERENNIS.

1815. ORCHIS morio.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 113. fig. 1.

Orchis radicibus subrotundis, galeae petalis lineatis, labello trifido crenato, medio segmento emarginato. HALL. hist. tom. 2. n. 1282. tab. 33. Act. Helv. Vol. 4. p. 152.

Orchis bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido, crenulato cornu obtuso odoscedente, petalis obtusis conniventibus. LINN. syst. 12. p. 589.

Orchis labio quadrifido crenato, cornu obtuso rugoso, germinibus brevior. SCOP. Fl. Carn. 247. n. 5. ed. 2. n. 1110.

Orchis morio foemina. BAUH. pin. 82. VAILL. tab. 3. f. 13. 14. SEGU. tab. 15. f. 7.

Orchis morio foemina, colcare exuberante, bifariamque diviso. SEGU. p. 26. tab. 15. f. 8.

Specie di testicolo IV. MATTH.

Loc. In pratis, & pascuis apricis uberrime locis collinis, & montanis. PERENNIS.

1816. ORCHIS mascula.

Orchis radicibus subrotundis, petalis linearibus reflexis, labello trifido, segmento medio longiori bifido. HALL. hist. tom. 2. n. 1283. tab. 83. Act. Helv. Vol. 4. p. 154.

Orchis bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato, cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis. LINN. spec. p. 1333.

Orchis labio quadrifido crenato: cornu obtuso laevi germinum longitudine. SCOP. Fl. Carn. p. 248. n. 6. ed. 2. n. 1111.

Orchis morio mas, foliis maculosis. BAUH. pin. 818. VAILL. tab. 31. fig. 11. 12.

n. *Orchis morio foliis non maculatis flore roseo*. SEGU. p. 25. tab. 15. f. 6.

OFF. ORCHIS, sive SATYRIUM.

Loc. In pratis umbris subhumidis montium, & collium. PERENNIS.

Viz. Radices hujusce ORCHIDIS siccae dant Salep Persarum. Similia autem principia, autemque utilitates etiam suppediunt pleraque ORCHIDUM radices. Anteponi autem merentur ORCHIS morio, maculata, latifolia, militaris, pyramidalis. Satyrio veterum, sive Salep Persarum adscriptae vires sunt aphrodisiacae, instau-

rantes. Licet autem minime negemus glutinosam nutritiam substantiam ab hisce radicibus suppeditari, minime tamen putamus veras extimulantes aphrodisiacas qualitates inesse. Radices ORCHIDIS miti glutine demulcent, atque acres particulas involvunt, vereque prosunt in morbis intestinorum, atque viarum lotii cum abrado muco, in fluore albo mulierum, atque phrysi, si acres, & muriaticae particulae sint involvendae. Siccatae radices in pulverem redactae, atque in aqua extensae uberem mucilaginem largiuntur utilem ad nutriendum, & demulcendum.

1817. ORCHIS ustulata.

Icon. TAUR. Vol. VI. tab. 134. & Vol. IX. tab. 120. f. 2.

Orchis radicibus subrotundis, labello quadrifido, calcare brevissimo. HALL. hist. tom. 2. n. 1273. tab. 28.

Orchis bulbis indivisis, nectarii labio quadrifida punctis acabra, cornu obtuso, petalis distinctis. LINN. spec. p. 1333.

Orchis labio quadrifido maculato, cornu germinibus, & bracteo brevior. SCOP. Fl. Carn. p. 246. ed. 2. n. 1102.

Orchis militaris praenensis. SEGU. p. 123. tab. 15. f. 4.

Orchis amacno. CRANTZ. fasc. 6. ed. 2. p. 490.

Loc. In pratis subhumidis collium, & montium humiliorum frequentissima. PERENNIS.

1818. ORCHIS variegata N.

Orchis radicibus subrotundis, apica brevissima, labello breviter quadrifida, circumscissato, punctato. HALL. hist. tom. 2. n. 1275.

Orchis militaris praenensis elatior, floribus variegatis. SEGU. tab. 2. p. 123. tab. 15. f. 3.

Loc. In lapidosis montanis subhumidis ad alpes Valdenses pertinentibus non infrequens. PERENNIS.

1819. ORCHIS pallens.

Orchis pallens. JACQ. Fl. Austr. tab. 45.

Orchis radicibus subrotundis petalis galea lineatis, labello trifido integerrimo. HALL. hist. tom. 2. n. 1281. Act. Helv. Vol. 4. p. 153.

Orchis bulboso floribus flavescens. SEGU. Suppl. p. 247. tab. 8. f. 3.

Loc. In monte Cenisio, & montibus supra Giaveno. PERENNIS.

1820. ORCHIS muscaria.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 3. fig. 1.

Orchis radicibus subrotundis, labello sericea bisulca, brachiolis brevibus subulatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1265. tab. 24. Act. Helv. vol. 4. 187.

Orchis radicibus subrotundis, caule foliata, apicae rariae, labello holosericeo, margine conflexo, opice secta. CRANTZ. fasc. 6. ed. 2. p. 481.

Orchis muscaria. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1114.

Orchis muscae corpus referens, sive galeo, & alis herkidis. VAILL. p. 147. tab. 31. f. 17. 18.

Loc. In sterilibus graminosis collium Tauvinensium, Liguriae, & ad oras sylvarum. PERENNIS.

1821. ORCHIS arachnites.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 3. f. 2.

Orchis radicibus subrotundis, labello holosericeo emarginato appendiculato. HALL. hist. tom. 2. n. 1266. Act. Helv. vol. 4. p. 138.

Orchis radicibus subrotundis, labello holosericeo quadrato infimo processu luteo sursum conflexo. CRANTZ. fasc. 6. ed. 2. p. 483.

Orchis arachnites. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1115.

Orchis facum referens major, foliis superioribus candidis, & purpurascens. BAUH. pin. 83. VAILL. tab. 30. f. 10. 11. 12. 13.

Orchis araneam referens. SEGU. suppl. p. 244. tab. 8. f. 1.

Orchis fuciflora galea, & alis purpurascens. BAUH. hist. II. p. 766.

Loc. Similibus locis cum priore nascitur, sed haec frequentior est, atque abunde occurrit in collibus calidioribus, uti Liguriae, Montisferrati, & Nicaeae. PERENNIS.

1832. ORCHIS monorchis.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 53.

Orchis bulbo unico subrotundo, labello cruciformi. HALL. hist. rom. 2. n. 1262., & lin. Hercin. n. 6.

Ophrys bulbo globoso, scapo nudo, nectarii labio trifido cruciato. LINN. spec. p. 1342.

Orchis ad caulem coelo unico, petalis interioribus, externis longioribus. CRANTZ. fasc. 6, ed. 2. p. 478.

Orchis trifolia floribus spicatis herboceis. SEGU. p. 131. tab. 16.

Monorchis bifolia flore pallide virente. MENTZ. pugill. f. 5.

Monorchis montana minimo, flore obsoleto vix conspicuo. MICH. nov. gen. p. 30. tab. 26.

Loc. In graminosis humidis montanis, & collinis. PERENNIS.

1833. ORCHIS lingua.

Orchis radicibus subrotundis, galeo conglutinata, longissime rostrata, labello trilobato ovato lanceolato. HALL. hist. rom. 2. n. 1267. Act. Helv. Vol. 4. p. 141.

Seropias bulbis subrotundis, nectarii labio trifido acuminato petalis longiore glabro. LINN. spec. p. 1344.

Orchis lingua. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1104.

Orchis montana italica, flore ferrugineo, lingua oblonga. BAUH. pin. 84. prodr. 29. SEGU. suppl. 248. tab. 8. f. 4.

Orchis macrophylla. COL. cephr. p. 321. 322.

Loc. In pratis, & pascuis subhumidis Liguriæ frequens; etiam oritur in collibus Taurinensibus. Abunde circa Druent. Cl. BELLARDI in pascuis di Giliانو, & Bugellensibus frequenter occurrere observavit. PERENNIS.

1834. ORCHIS militaris.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 121.

Orchis bulbis indivisis nectarii labio quinquefido punctis scabro, cornu obtuso, petalis confluentibus. LINN. spec. p. 1333.

Orchis bulbis indivisis nectarii labio quinquefido lineari punctis scabro, petalis confluentibus. HUDS. p. 335. n. 8.

Orchis radicibus subrotundis, barbae quinquefidae, brochiolis longis, galea confluent, cucullis purpureis. CRANTZ. fasc. 6. ed. 2. p. 501.

Orchis labio quinquefido maculato, bractea colorata, cornu, & germinibus brevior. SCOP. Fl. Carn. p. 249. n. 8. ed. 2. n. 1112.

JACQ. Fl. Austr. tab. 307.

Orchis latifolia, hianse cucullo major. TOURN. inst. 432.

Cynorchis latifolia, hianse cucullo major. BAUH. pin. p. 80.

Orchis galea, & alis fere cinereis. BAUH. hin. II. p. 755.

Loc. Ubique ad oras sylvarum locis montanis, & collinis. PERENNIS.

1835. ORCHIS antropophora.

Orchis radicibus subrotundis, spica longa, flore inermi, labello perungusto quadrifido. HALL. hist. rom. 2. n. 1264. tab. 23. Act. Helv. Vol. 4. p. 136.

Ophrys bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio lineari tripartito, medio elongato bifido. LINN. spec. p. 1343.

Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, foemina. VAILL. tab. 31. f. 19. 20.

Orchis antropophora Oreades. COL. cephr. 1. p. 320. GARID. Aix. tab. 70. 71.

Loc. In dumetis umbrosis Uneliæ quandoque occurrit; frequenter ad Oppidum Ponte d'Assio; inter Garrexium, & Ormeam Ignatius MOLINERI. Etiam in collibus Taurinensibus semel legit Franciscus PEYROLERI. PERENNIS.

1836. ORCHIS fusca.

Orchis fusca. JACQ. Fl. Austr. p. 4. tab. 307.

Orchis radicibus subrotundis, spica longa labello quadrifido, brochiolis angustis, cucullis laeis serratis. HALL. hist. helv. n. 1276.

Orchis magna laeis foliis, galea fusca, seu nigricante. BAUH. hin. II. p. 759.

Loc. In collibus Ligurum nascitur. Prope Ussey Cl. BELLARDI. PERENNIS.

1837. ORCHIS alpina.

Orchis radicibus subrotundis, labello ovato, utrinque deniculo natato. HALL. hist. tom. 2. n. 1263. tab. 22.

Orchis bulbis ovatis, scapo nudo, foliis subulatis, nectarii labio indiviso obtuso, utrinque unidentato. LINN. spec. p. 1342.

JACQ. Vindob. p. 295. tab. 9.

Orchis graminea bulbis ovatis, foliis subulatis, scapo nudo humili, flore cernuo. CRANTZ. fasc. 6. ed. 2. p. 480.

Chamaeorchis alpina gramineo folio. BAUH. pradr. 29.

Loc. In monte Cenisia abunde, atque in alpinis Safau, & Grassoney. In Tarantasiae alpinis legit Cl. BELLARDI. PERENNIS.

1838. ORCHIS albidula.

Icon. TAUR. Val. XV. tab. 119. fig. 1.

Orchis radicibus confertis rerebibus, calcare brevissimo, labello trifido. HALL. hist. tom. 2. n. 1270. Act. Helv. Vol. IV. p. 143.

Sayrium (albidula) bulbis fasciculatis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido acuto, intermedia obtusa. LINN. syn. 12. p. 591.

Orchis labio trifida, laciniis acuis integris, cornu obtuso divergente, germinibus brevior. SCOP. Fl. Carn. 25. n. 10.

Orchis albidula. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1124.

Sayrium bulbis fasciculatis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido: laciniis lateralibus acutis, intermedia obtusa. JACQ. Vind. p. 294. n. 92.

Pseudorchis alpina flore herbacea. MICHL. nov. gen. tab. 26.

Loc. In herbidiis, & saxosis. PERENNIS.

BULBIS PALMATIS.

1839. ORCHIS lasifolia.

Icon. TAUR. Val. VI. tab. 137.

Orchis radicibus palmatis, caule fistuloso, bracteis maximis, labello trifido serrato, medio segmento obtuso. HALL. hist. tom. 2. n. 1279. Act. Helv. Vol. IV. p. 150.

Orchis bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conica, labia triloba lateribus reflexis, bracteis flare longioribus. LINN. spec. p. 1334.

Orchis palmata pratensis masculata. BAUH. pin. 85. VAILL. tab. 30. f. 14. 15. tab. 31. f. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10.

Orchis labio trilobo crenato, cornu crasso cylindraceo, bracteis flore longioribus. SCOP. Fl. Carn. p. 250. n. 9.

Loc. Ubique in humentibus pratis. PERENNIS.

Obs. Varietates hujus speciei plurimae sunt: eas egregie persequutus est Cel. HALLERUS loc. cit.

1840. ORCHIS sambucina.

Orchis bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conica, labio ovato subtiliobo, bracteis longitudine florum. LINN. spec. p. 1334.

JACQ. Fl. Austr. tab. 108.

Orchis radicibus palmatis, bracteis coloratis, labello circumseriato trilobato, lobo medio emarginato. HALL. hist. Helv. n. 1280.

Orchis pannonica octava. CLUS. hist. 269.

Orchis palmata sambuci odore. BAUH. pin. 86.

Loc. In pratis montanis. PERENNIS.

1841. ORCHIS incarnata.

Orchis radicibus palmatis, bracteis coloratis, labello circumseriato trilobato, lobo medio emarginato. HALL. hist. tom. 2. n. 1280.

Orchis bulbis palmatis, nectarii cornu conico, labello obsolete trilobo serrato, petalis dorsalibus reflexis. LINN. spec. p. 1335.

ALLIIONI Fl. Pedem. Tom. II.

P p

Orchis palmata lutea, labio floris maculato. SEG. suppl. p. 249. tab. 8. f. 3.

Loc. In monte Cenisio, & montibus supra Giaveno legi; Frequens in pratis montanis alpium maritimarum. PERENNIS.

1842. ORCHIS maculata.

ICON. TAUR. Vol. VI. tab. 136. 138.

Orchis radicebus palmatis, coule solido, labello trifida serrato, medio segmento ocuminato. HALL. hist. tom. 2. n. 1278. Act. Helv. vol. 4. p. 149.

Orchis bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus brevior, labio plano, petalis dorsalibus erectis. LINN. syst. 12. p. 590.

Orchis labio trifido maculato, cornu canica germinibus brevior. SCOP. Fl. Carn. p. 251. n. 2. ed. 2. n. 1119.

Orchis palmata, montano maculata. BAUH. pin. 85. VAILL. tab. 31. fig. 9. 10.

Palmato maculata. RIV. tab. 8.

Loc. In pratis montanis abunde ubique. PERENNIS.

1843. ORCHIS conopsea.

ICON. TAUR. Vol. VI. tab. 135. & Vol. XV. tab. 110. f. 2.

Orchis radicebus palmatis, calcare longissimo, labello trifido obtuso unicolore. HALL. hist. tom. 2. n. 1287. Act. Helv. vol. 4. p. 164.

Orchis radicebus palmatis, nectarii cornu setaceo, germinibus longiore, labia trifido, petalis duobus potentissimis. LINN. spec. p. 1335. JACQ. Vind. p. 293.

Orchis palmata minor, calcaribus oblongis. BAUH. pin. 85. VAILL. tab. 30. f. 8.

Palmata angustifolia non maculata. RIV. tab. 11.

Loc. In pratis alpium frequentissime. PERENNIS.

1844. ORCHIS odoratissima.

ICON. TAUR. Vol. XV. tab. 119. f. 3.

Orchis radicebus palmatis, flare canale, labello obtuse trifido, calcare germine brevior. HALL. hist. 2. n. 1274. Act. Helv. Vol. 4. p. 148.

Orchis bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo brevior, labio trilobo, foliis linearibus. LINN. syst. 12. p. 590. JACQ. Fl. Austr. tab. 264.

Orchis palmata angustifolia minor odoratissima. BAUH. pin. 86. prodr. 30. tab. 30.

Orchis palmato caryophyllata. BAUH. hist. II. p. 777.

Loc. In pratis subhumidis collium, & montium. PERENNIS.

1845. ORCHIS nigra.

ICON. TAUR. Vol. XV. tab. 119. fig. 3.

Orchis radicebus palmatis, spica densissima, flore resupinato, calcore brevissimo. HALL. hist. tom. 2. n. 1271. Act. Helv. vol. 4. p. 144.

Satyrum (nigrum) bulbis palmatis, foliis linearibus, nectarii labio resupinato trilobo, intermedia majore. LINN. syst. 12. p. 591.

Satyrum bulbis palmatis, foliis linearibus, floribus inversis, nectarii labio integerrimo. JACQ. Vind. p. 293. n. 91. & Fl. Austr. tab. 368.

Orchis miniata. CRANTZ. fasc. VI. ed. 2. p. 487. n. 91.

Orchis nigra. SCOP. fl. Carn. ed. 2. n. 1123.

Orchis palmato angustifolia, flore nigro. SCHEUCHZ. it. 1. p. 45. it. 4. p. 339. SEGU. p. 133. tab. 15. f. 17.

Palmata Christi minore. MATTH.

Loc. In pascuis alpinis, & montanis abunde. PERENNIS.

1846. ORCHIS viridis.

ICON. TAUR. Vol. XV. tab. 118. f. 2.

Orchis radicebus palmatis, galea canivente, labello trisulca, calcore brevissimo. HALL. hist. tom. 2. n. 1269. Act. Helv. 4. p. 147.

Satyrum (viride) bulbis palmatis, foliis oblongis obtusis, nectarii labio lineari trifido, intermedia obsoleta. LINN. spec. p. 1337.

Orchis viridis. CRANTZ. fasc. VI. ed. 2. p. 491.

Orchis viridis. SCOP. fl. Carn. ed. 2. n. 1122.

Orchis palmato botrochites. BAUHL. pin. 36. VAILL. tab. 31. f. 8. 7. 8.

Orchis palmata flore viridi. BAUM. prodr. 30. SEGU. Veron. 2. p. 133. tab. 16. f. 18.

Loc. in umbrosis montium, & collium, ubi tamen sylvae densae non sunt.

PERENNIS.

CYPRIPEDIUM. LINN. gen. n. 906. syst. n. 1015. TOURN. tab. 249.

Petala quatuor, non tamen in galeae modum conniventia, duobus exterioribus, duobus magis interioribus. Quicquid, sive inferius petalum calceum lignum

refert. Ad latera tubae unguis duo solidi, divergentes, curvuli,

triangulares: sub unoquoque horum amthera sessilis, deorsum bilocularis.

1847 CYPRIPEDIUM calceolus.

Cypripedium radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis coulinis. LINN. spec. p. 1346.

Calceolus radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1300.

Elleborine recentiorum L. CLUS. hist. p. 272.

Calceolus. RIV. t. 1.

Calceolus Marianus. DOD. pempt. 180. GARID. tab. 18.

Loc. in montibus di Lanzo: in sylvis supra Pralugnan: in alpinis di Faussignat non infrequens. PERENNIS.

EPIPACTIS. HALL. hist. tom. 2. p. 147. TOURN. tab. 249.

Flos Orchidis, sed stylus, sacculorum loco, foveolas binas habet, quarum quaelibet fovet antheram sessilem.

1848 EPIPACTIS abortiva.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 50.

Epipactis aphylla, calcare longo, labello ovato lanceolato. HALL. hist. tom. 2. n. 1288. tab. 36.

Orchis bulbis fasciculatis filiformibus, nectarii labio ovato integerrimo, coule ophylo.

LINN. syst. 12. p. 591.

Serapias abortiva. SCOP. Fl. Corn. ed. 2. n. 1130.

JACQ. fl. austr. tab. 193.

Limodorum austriacum. CLUS. Pannon. p. 241.

Loc. in dumetis, & sterilibus calidiorum collium Liguriae, & Montisferrati. Etiam in valle Segusii supra Bussolino observavit Ignatius MOLINERI. PERENNIS.

1849. EPIPACTIS nidus avis.

Icon. TAUR. Vol. XXVI. tab. 77.

Epipactis aphylla, flore inermi, labello bicorni. HALL. hist. tom. 2. n. 1290. tab. 37.

Ophrys bulbis fibrose fasciculatis, coule vaginato aphylo, nectarii labio bifido. LINN. syst. 12. p. 592.

Nidus. RIV. tab. 7.

Loc. In sylvis umbrosis, non tamen domosis collium Taurinensium. Similibus locis in Comitatu Nicoensi circa Sospello, & in pinetis circa Lanebourg. PERENNIS.

1850. EPIPACTIS ovata.

Icon. TAUR. Vol. VI. tab. 130.

Epipactis foliis binis ovatis, labello bifido. HALL. hist. tom. 2. n. 1291.

Ophrys bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. LINN. spec. p. 1340.

Bifolium. RIV. tab. 7.

Offici. MATTH.

Off. Ophrys, sen bifolium.

Loc. Vulgatissima in sylvis. PERENNIS.

1851. EPIPACTIS cordata.

Epipactis foliis ovatis cordatis, labello bifido postice bidentato. HALL. hist. tom. 2. n. 1292.

Ophrys bulbo fibrosa, caule bifolio, foliis cordatis. LINN. spec. p. 1340.

Ophrys minima. BAUH. pin. 87. pradr. 31.

Ophrys foliis cordatis. GAGNEBIN. Act. Helv. tom. 2. p. 70.

Ophrys bulbo fibroso, caule foliosa, foliis cordatis, nectarii labia bifido. HUDS. p. 338. n. 4.

Loc. In sylvis umbrosis subhumidis Vallis Ursinæ, Tetonnoir dictis, & supra Courmayeur. Frequens in Helvetio, rarissima apud nos est. PERENNIS.

1852. EPIPACTIS spiralis.

ICON. TAUR. Vol. XV. tab. 118. fig. 2.

Epipactis bulbis cylindricis, spica spirali, labello crenulato. HALL. hist. tom. 2. n. 1294.

Ophrys bulbis aggregatis oblongis, caule subfoliato, floribus spirali secundis, nectarii labio indiviso crenulato. LINN. syst. 12. p. 592.

Serapias spiralis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1235.

Orchis spiralis. RIV. tab. 14. alba odorata. BAUH. hist. II. p. 769.

Orchiontrum autumnale proterse spirale album odoratum. MICH. nov. gen. p. 30. SEGU. supplem. p. 253. tab. 8. f. 9.

Loc. In pascuis sterilibus montanis, collinis, atque etiam planitie, quæ montibus jam proxima est. PERENNIS.

1853. EPIPACTIS repens.

Epipactis foliis petiolatis ovato-lanceolatis, floribus tetrapetalis. HALL. hist. tom. 2. n. 1295.

Satyrium bulbis fibrosis, foliis ovatis radicalibus, floribus secundis. LINN. spec. p. 1339.

Orchis minor flare alba, radice geniculata. CAM. hort. p. 3. n. 35.

Pseudorchis radice repente, foliis maculatis. MENZ. plant. rar. tab. 3.

Loc. In pinetis umbrosis inter Lanchourg, & Modone, necnon circa Oulx loco dicto Sapé. PERENNIS.

1854. EPIPACTIS longifolia.

Epipactis foliis ensiformibus caulinis, floribus pendulis, labello obtuso per oros plicato. HALL. hist. tom. 2. n. 1296.

Serapias bulbis fibrosis, foliis ensiformibus sessilibus, floribus pendulis. LINN. syst. 12. p. 593.

Epipactis (palustris) caule folioso multifloro, labello articulo vomeriformi, floribus pendulis. CRANTZ. fasc. 6. ed. 2. p. 462. tab. 1. fig. 3.

Serapias bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso petalis brevioribus, fructibus erectis. HUDS. p. 341. n. 2.

Serapias bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso longitudine petalarum. GER. p. 133. n. 3.

Helleborine. RIV. tab. 3.

Loc. In pratis humidis ad montium radices, atque etiam in collibus Taurinensibus occurrat. PERENNIS.

1855. EPIPACTIS latifolia.

ICON. TAUR. Vol. VI. tab. 139.

Epipactis foliis emplexicaulibus ovato-lanceolatis, labello lanceolato. HALL. hist. tom. 2. n. 1297.

Serapias bulbis fibrosis, floribus erectis, bractea brevioribus. LINN. spec. p. 1344.

Helleborine latifolia montana. BAUH. pin. 186.

Helleborines recentiorum genus III. CLUS. Pannon. p. 276.

Helleborine altero, flore ararubente. BAUH. pin. 186.

Loc. Sylvas collium, & montium frequens inhabitat. PERENNIS.

1856. EPIPACTIS grandiflora.

ICON. TAUR. Vol. XIX. tab. 16.

Epipactis caule paucifloro, lineis in obtuso labello levibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1298.

Serapios bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis, nectarii labio obtuso petalis brevioribus. LINN. *synt.* 12. p. 394.

Helleborine flore albo, vel Damasonium montanum latifolium. BAUH. *pin.*

Helleborine alba, borbo luteola. RIV. *tab.* 4.

Loc. Nihil in sylvis umbrosis montium, & collium frequentius. *PERENNIS.*

1857. *EPIPACTIS rubra.*

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 116.

Epipactis coule pauciflora, labello lanceolato lineato lineis undulatis. HALL. *hist. tom.* 2. n. 1299.

Serapias bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis, nectarii labio ovato. LINN. *synt.* 12. p. 394.

Helleborine montana angustifolia purpurascens. BAUH. *pin.* 187.

Damasonium flore roseo. RIV. *tab.* 6.

Helleborine longifolia paucis purpureis floribus. EKUM. p. 274.

Loc. In sylvis umbrosis montium Comitatus Nicaeensis minime rara est. In valle di Lonze legit Franciscus PETROLERI. Nascitur etiam circa Bruin. *PERENNIS.* Oes. Pnsd esse varietatem grandiflorae.

II. HEXASTEMONES.

A. EPICARPIÆ

HEMEROCALIS. LINN. *gen.* n. 391. *synt.* n. 429. *TOURN.* *tab.* 294.

Calycis loco bracteae. Flos ex angusto principio sensim in Campanae formam ampliatus. Stamina duo superiora approximata, reliqua petalorum ductum sequuntur.

1858. *HEMEROCALIS liliastrum.*

Icon. TAUR. Vol. XVIII. tab. 40.

Anthericum foliis planis scapo simplicissimo, corollis campanulatis, staminibus declinatis. LINN. *spec.* p. 445.

Hemerocalis floribus postulis secundis. HALL. *hist. tom.* 2. n. 1230.

Anthericum petalis conniventibus, floribus secundis campanulatis. GER. p. 154. n. 1.

Liliastrum alpinum minus. *TOURN.* *inst.* p. 369.

Phalangium magno flore. BAUH. *pin.* p. 29.

Phalangium flore lili. BAUH. *hist.* II. 636.

Phalangium allobrogicum majus. CLUS. *hist. opp.* 2.

Ornithogolum liliiforme. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 278.

Loc. In pratis pinguibus, sed tamen lapidosis alpium. *PERENNIS.*

AMARYLLIS. LINN. *gen.* n. 367. *synt.* n. 402. *TOURN.* *tab.* 207.

Flos ex sinu magnae spathae prodit. Corolla in plerisque ringens. Stamina declinata.

1859. *AMARYLLIS lutea.*

Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 43.

Amoryllis spatha uniflora, corolla aequali, staminibus strictis. LINN. *synt.* 12. p. 236.

Amoryllis spatha uniflora, corolla aequali, genitalibus strictis. GOU. *hort.* 165. n. 1.

Colchicum luteum 1. *majus.* BAUH. *pin.* p. 69.

Loc. In pratis circa Sinano, atque colle Taurinensi *Superga* dicto. *PERENNIS.*

PANCRACTIUM. LINN. *gen. n.* 365. *syn. n.* 400.

Calyx est spatula. Nectarium infundibuliforme, 12-fidum,
fructui impositum, stamina sustinens.

1860. **PANCRACTIUM** maritimum.

Pancratiun spatula multifloro, petalis planis, foliis lingulatis. LINN. *spec. p.* 418.

Narcissus maritimus. BAUH. *pin. p.* 54.

Pancratiun monspessulanum, multis scilla albo porva. BAUH. *hist. II.* 611.

Lilio-Narcissus albus maritimus minor. MORIS. *hist. p.* 365. *t. 4. tab. 10. fig. 28.*

Narcissus marinus. DOD. *pempt. p.* 229.

Loc. Ad rupes prope litus maris ubique frequens. PERENNE.

NARCISSUS. LINN. *gen. n.* 364. *syn. n.* 399. *TOURN. tab.* 185.

Calyx est spatula uniflora. Corolla 6-petala instructa nectario infundibuliformi integro,
aut leviter sexfido, interius ferente stamina sex.

1861. **NARCISSUS** poeticus.

Narcissus spatula uniflora, nectario rotato brevissimo scorioso crenulato. LINN. *spec. p.* 414.

Narcissus uniflorus, foliis ensiformibus, scypho brevissimo. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1250.

Narcissus albus circulo purpureo. BAUH. *pin. p.* 48.

Narcissus medio purpureus. DOD. *pempt. 223.* BAUH. *hist. II.* 600.

*Loc. In pratis montanis subhumidis abunde. Joannes BAUHINUS in Sabaudia prope
Cormon. PERENNIS.*

1862. **NARCISSUS** pseudo-narcissus.

Narcissus spatula uniflora, nectario campanulato erecto crispo aequante petala ovata.
LINN. *spec. p.* 414.

Narcissus foliis ensiformibus, scapo unifloro, scapo undulato serrato petalis aequali.
HALL. *hist. tom. 2. n.* 1252.

Narcissus sylvestris. LAM. *Fl. Franc., tom. 3. n.* 390.

Narcissus sylvestris pallidus calyce luteo. BAUH. *pin. 52.*

Narcissus luteus sylvestris. DOD. *pempt. 227.*

Loc. In pratis, & apricis sylvis collium Tourinensium. PERENNIS.

1863. **NARCISSUS** bicolor.

Narcissus spatula unifloro, nectario campanulato, margine patulo crispo aequante petala.
LINN. *spec. p.* 415.

Narcissus major totus luteus, calyce proelongo. BAUH. *pin. 52.*

Loc. Inhabitat colles Taurinenses. PERENNIS.

1864. **NARCISSUS** tazetta.

Icon. TAUR. Vol. XXV. tab. 17.

Narcissus spatula multiflora, nectario campanulato truncato brevior petalis, foliis planis.
LINN. *spec. p.* 416.

Narcissus medio luteus, copioso flore: odore grovi. BAUH. *pin. p.* 50.

Narcissus lousifolius flore prorsus albo. CLUS. *hist. 1. p.* 155.

Narcissus multiflorus. LAM. *Fl. Franc., tom. 3. p.* 391.

Loc. Nicoenium collium indigena. PERENNIS.

GALANTHUS. HALL. *hist. tom. 2. p. 123.* TOURN. *tab. 208.*

Calyx est spatha. Corolla ex tribus petalis, exterioribus majoribus, interioribus minoribus, omnibus apice incrassatis, & oris ex ambitu circuli spongiosi, qui germen terminat. Stamina sex aequalia. Stigma seraceum.

1865 GALANTHUS vernus.

ICON. TAUR. Vol. VII. *tab. 108.*

Leucojum spatha uniflora stylo clavato. LINN. *spec. p. 414.*

Galanthus uniflorus petalis subaequalibus. HALL. *hist. tom. 2. n. 1253.*

JACQ. *Fl. Austr. tab. 312.*

Leucojum bulbosum. CLUS. *hist. p. 168.*

Narcissus septimus. CAM. *epit. 957.*

Narcisso Leucojum vulgare. TOURN. *inst. 387.*

Leucojum bulbosum primum. TABERN. *ic. 613.*

Leucojum bulbosum vulgare. BAUH. *pin. 55.*

Leucojum bulbosum hexaphyllum cum unico flare, rarius bino. BAUH. *hist. II. p. 590.*

Narcisso sexta. MATTH.

Loc. Locis umbrosis, & irriguis collium, & montium martio mense floret.

PERENNIS.

1866 GALANTHUS nivalis.

ICON. TAUR. Vol. XXVI. *tab. 87.*

Galanthus nivalis. LINN. *yst. p. 234.* SCOP. *1. p. 233.*

JACQ. *Fl. Austr. tab. 313.*

Galanthus uniflorus. HALL. *hist. n. 1254.*

Leucojum bulbosum praecox minus. CLUS. *hist. p. 168.*

Leucojum bulbosum alterum. TABERN. *ic. 614.*

Leucojum bulbosum trifidum minus. BAUH. *pin. 56.*

Narcissus sextus. CAM. *epit. 956.*

Erangelia. RENCALM. *spec. p. 97.*

Loc. In agro Novariensi versus Mediolanum. PERENNIS.

B. HYPOCARPIÆ.

ALLIUM. LINN. *gen. n. 370. syn. n. 405.* TOURN. *tab. 206.*

Spatha communis membranacea, subrotunda, cornuta. Flores in umbella simplici;

Petala sex aequalia; Stamina vel simplicia, vel alterne trifida;

Stigma acutum.

FOLIIS CAULINIS PLANIS

1867 ALLIUM rotundum.

Allium caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspidatis, umbella subglobosa, floribus lateralibus nutantibus. LINN. *spec. p. 423.*

Allium radice multiplici, foliis gramineis, spica sphaerica, staminibus alterne trifidis.

HALL. *hist. tom. 2. p. 105. n. 1219.*

Loc. Habeo ex Comitatu Nicaeensi. PERENNE.

1868 ALLIUM victorale.

ICON. TAUR. Vol. X. *tab. 75.*

Allium caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, staminibus lanceolatis, corolla longioribus, foliis ellipticis. LINN. *spec. p. 424.*

Allium radice oblonga reticulo obducta, foliis ovato-lanceolatis, umbella sphaerica. HALL. *hist. tom. 2. n. 1219.*

JACQ. *Fl. Austr.* tab. 216.

Allium plantagineum. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 262.

Allium montanum latifolium maculatum. BAUH. *pin.* 74.

Allium alpinum. BAUH. *hist. II.* p. 566.

Allium anguinum. CAM. *epit.* 329.

Allia serpentina. MATTH.

Loc. In montibus la Tourneise, & di Melano Sabaudiae. PERENNE.

1869. ALLIUM rosenm.

ICON. TAUR. Val. XXIV. tab. 42.

Allium caule planifolia umbellifero, umbella fastigiata, petalis emarginatis, staminibus brevissimis simplicibus. LINN. *yst.* 12. p. 238.

Allium caule planifolia umbellifero, umbella fastigiata, filamentis simplicibus basi dilatatis. GER. p. 150. n. 1.

Allium foliis ensiformibus, radice bulbis nupata, flaribus amplis umbellatis. SAUV. *monsp.* 42.

Allium sylvestre, seu molli minus, roseo flare. MAGN. *monsp.* 2. tab. 10. & TOURN. *inst.* p. 385.

Loc. In olivetis, & arvis Unellae, & Comitatus Nicaeensis passim. PERENNE.

1870. ALLIUM arenarium.

Allium caule planifolio bulbifera, vaginis teretibus, spatha mutica, staminibus tricuspidatis. LINN. *spec.* p. 426.

Allium foliis ciliatis, umbella bulbifera, staminibus alterne trifidis. HALL. *hist.* tom. 2. p. 106. n. 1222. tab. 2.

Allium montanum bicorne latifolium, flore dilute purpurascens. BAUH. *pin.* p. 74.

Allium sylvestre amphycorpon, foliis porroceis, flaribus, & nucleis purpureis. RAL. *syn.* 2. p. 230.

Parvar planifolium, staminibus alterne trifidis, umbella bulbifera Ruppil. HALL. 154. tab. 2. fig. 2.

Loc. Secas torrenates, proximaque prata circa Tendom. PERENNE.

1871. ALLIUM carinatum.

ICON. TAUR. Val. XXV. tab. 52.

Allium caule planifolio bulbifero, staminibus subulatis. LINN. *spec.* p. 426.

Allium caule sobolifero, foliis succulentis, spatha bicorni, umbella bulbifero. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1224.

Loc. In monte Cenasio, & circa Fencarelles lectum est. PERENNE.

FOLIIS CAULINIS TERETIBUS

1872. ALLIUM sphaerocephalon.

ICON. TAUR. Val. VII. tab. 110.

Allium caule teresifolio umbellifero, foliis semiteretibus, staminibus tricuspidatis corolla longiaribus. LINN. *spec.* p. 426.

Allium radice gemella, foliis fistulosis, capite sphaerico, staminibus alterne trifidis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1220.

Allium, s. Maly montanum purpureo flore. CLUS. *hist.* p. 195.

Loc. Ad rupes supra Ussey, & in montibus, alpiisque, locis saxosis, atque rupetribus apricis. PERENNE.

DESCR. Caules glauci, teretes, non striati, laeves, rotundi. Vaginae virides ad imum caulem educunt. Folia superius plana, inferius convexa, quae deinde semiteretia canaliculata evadunt, caulis altitudinem aequantia, aut aliquantulum superantia. Vaginae florales non caudatae, una amplior, & bifida. Capitulum breviter conicum, sive ex subrotundo conicum, interiorum enim florum pedunculorum continuo longiores sunt, atque densam imbricatam umbellam efformant. Pedunculi inferiorum florum longitudine petalorum. Petala rubentia, carina obscuriori, per aetatem vincta fiunt, & diu persistunt, & post florescentiam magis connivent. Petala ovata, alterna, & exteriora paulo breviora, & angustiora.

Hisce stamina simplicia respondent; aliis autem trifida. Antherae staminibus impositae, obscurae, sulcatae. Stamina extra florem prodeuntia. Filamenta staminum superius purpurascens. Stylus interne purpureus, longe extra florem productus, stygmate ex luteo albicante. Petala non aristata. Capsuliferum est.

1873. ALLIUM descendens.

Allium caule subterrefolio umbellifero, pedunculis exterioribus brevioribus, staminibus tricuspidatis. LINN. spec. p. 427.

Loc. In valle Stasora agri *Derionensis* locis aridis. PERENNE.

Obs. Habet constanter ad caulis originem duos adnatos bulbulos; folia fistulosa supra canaliculata; caulem bipedalem; vaginam quadrifidam. Sed in ALLIO sphaerocephalo folia minus fistulosa, supra parum canaliculata, fere plana; petala nunquam sunt patentia. Radix bulbosa unica, neque adnatos bulbulos habet.

1874. ALLIUM flavum.

Icon. TAUR. Vol. XXV. tab. 69.

Allium caule teretifolio umbellifero, floribus pendulis, petalis ovatis, staminibus corollae longioribus. LINN. spec. p. 428.

JACQ. Fl. Austr. tab. 141.

Allium junceifolium bicornne luteum. TOURN. inst. p. 384. BAUH. pin. p. 75. prodr. 27.

Loc. In valle Quicras, eundo versus *Guillestre* aeperit *Ignosius MOLINERI*. PERENNE.

1875. ALLIUM pallens.

Icon. TAUR. Vol. XVIII. tab. 97. f. 2.

Allium caule subterrefolio umbellifero, floribus pendulis truncatis, staminibus simplicibus corollam aequantibus. LINN. spec. p. 427.

Allium montanum bicornne flore pallido odoro. BAUH. pin. 75.

Loc. In colle S. Albani prope *Nicaeam*. PERENNE.

1876. ALLIUM paniculatum.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 77.

Allium caule subterrefolio umbellifero, pedunculis capillaribus effusis, staminibus subulosis, spatha longissima. LINN. syn. 12. p. 239.

Allium radice duplici, foliis succulentis, spatha bicorni, umbellae radii pendulis. HALL. hist. tom. 2. n. 1225.

Allium montanum bicornne, floribus triquetris purpureis, pedunculis longis, & reflexis. SEGU. Veron. 2. p. 70.

Loc. Incolit etiam rupes calidiores, & humiliores, sed tamen alpes ascendit; frequens in montibus di *Viù*, & *Longe*. PERENNE.

1877. ALLIUM vineale.

Icon. TAUR. Vol. XII. tab. 34.

Allium caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis. LINN. spec. p. 428.

Allium radice multiplici, foliis fistulosis, capite sphaerico bulbifero, staminibus osterne trifidis. HALL. hist. tom. 2. n. 1221.

Allium sylvestre campestre purpurascens. BAUH. pin. 74.

Allium sylvestre tenuifolium. DOD. pempt. 683.

Ampeloprasum. MATTH. p. 552. valgr.

Loc. Frequentissimum in arvis collium, & praecipue secalinis. PERENNE.

1878. ALLIUM oleraceum.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 65.

Allium caule teretifolio bulbifero, foliis scabris semiteretibus rubus sulcatis, staminibus simplicibus. LINN. spec. p. 429.

Allium bulbo simplici, foliis fistulosis, spatha bicorni, umbella bulbifera. HALL. hist. tom. 2. n. 1223.

Allium virescens. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 259.

ALLIONII Fl. Pedem. Tom. II.

R r

Allium montanum bicorne, flore exalbido. BAUH. pin. 75.

Allium sylvestre bicorne, flore viridi. BAUH. hist. II. p. 561.

Loc. Locis saxosis collinis frequens est. PERENNE.

SCAPO NUDO

1879. ALLIUM senescens.

Icon. TAUR. Vol. XVIII. tab. 110. & Vol. XX. tab. 68.

Allium scapo nudo oncipiti, foliis linearibus, subius convexis laevibus, umbella subrotundo, stominibus subulosis. LINN. spec. p. 430.

Allium radice bulboso, foliis graminis, umbella erecta non bulbifera, vaginis brevissimis. HALL. Helv. 297. all. 16. n. 2.

Allium montanum, foliis narcissi, major. BAUH. pin. p. 75. Tourn. inst. p. 384.

Allium coule oncipiti teretiusculo, foliis ensiformibus, hinc poullo convexioribus. GMEL. sibir. 1. p. 53. tab. 2. fig. 2.

Allium saxatile Acori radice, flore purpureo. BOCC. mus. 2. p. 84. tab. 79.

Allium petroco umbelliferum. BAUH. hist. II. p. 564. tab. 564.

Loc. In rupibus alpium frequens est; copiose in monte Cenisio. PERENNE.

DESCR. Bulbus simplex, oblongus, fibras teretes, albas demittit, & novam sobolem ex imo bulbo generans. Ex eodem bulbo duo, aut tres caules nascuntur. Folia radicalia sex plerumque erecta, glabra, viridia, linearia, succulenta, supra plana, subius aliquantum convexa, & paullisper comorta. Inter folia erigitur scapus nudus, cubitalis, aut pedalis, firmus, minime cavus, tortuosus, teres, sed non vere compressus, & in costam acutam utrinque attenuatus. Spatha bifida, concava, striis viridibus notata, brevis, acuminata. Umbella florum numerosa, hemisphaerica. Pedunculi omnes subaequales, teretes, unciae unius circiter longitudine. Flores non penduli. Petala florum ex albo purpurascencia, ovata, concava, fere duorum ordinum, exterioribus paullo brevioribus, magis concavis, & fere carinatis, interioribus minus concavis. Petala erecta, parum patentia. Stamina ex lata basi sensim acuminata, plana, germen comprehenderia, primum albidum, dein levi purpura tincta, longitudine petalorum. Antherae quadrisulcae, oblongae, primum luteae cum aliqua rubedine, deinde fusco-purpureae. Exteriorum petalorum stamina paullo breviora. Stylus longitudine staminum. Odor, & sapor ALLII, sed debdior.

1880. ALLIUM angulosum.

Icon. TAUR. Vol. XII. tab. 32.

Allium scapo nudo oncipiti, foliis linearibus canaliculatis subius angulatis, umbella fastigiosa. LINN. spec. p. 430.

JACQ. Fl. Austr. tab. 433.

Allium radice senescente lignoso transverso, umbella erecto. HALL. all. 16.

Allium umbelliferum pratense. BAUH. hist. II. p. 564. tab. 564.

Cepo scapo nudo subungulato forcto, foliis linearibus subius angulosis, stominibus corolla brevioribus. GMEL. sibir. 1. p. 58. tab. 14. f. 2.

Loc. In pratis circa Novarion; inter Druent, & la Veneria. PERENNE.

Obs. Celeberrimus HALLERUS (hinsoriae plantarum n. 1227.) senescens cum anguloso conjungit, certa discrimina vix reperio. Angulosum differre videtur loco natali, floribus majoribus, majori plantae altitudine, atque foliis minime flexuosis.

1881. ALLIUM nigrum tab. 25. fig. 1.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 73. 74.

Allium scapo nudo tereti, foliis linearibus, umbella erecto, petalis erectis, spotho mucronata bifida. LINN. spec. p. 430.

Allium narcissifolium. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 163.

Allium monomonum bicorne latifolium, flore magno dilute purpurascence. RUDE. elys. 2. p. 160. f. 21.

Loc. Circa lacum Avilianae, & in alpihus di Lonçe. In monte Vermelino prope Limone, Col de la Croix, prope la Cionale. PERENNE.

DESCR. Caulis primo rotundus, anceps, obtusissime quadrangularis, postea compresso-tetragonus, utrinque acutus, nudus, tortuosus. Folia glabra, carinata cum costa acuta, subtus striata, duorum etiam palmorum longitudine, linearia, acuminaia, odore ALLII, saepius quinque vaginantia. Caulis nudus per duos palmos ultra foliorum altitudinem: vaginæ bifida, quadricornis; pedunculi rotundi, erecti, unciales; flores a duodecim ad quindecim, & ultra, Florum petala ovata, exteriora majora, tria interiora minora, emarginata cum spinula, quæ evidentior est in exterioribus. Stamina alba, simplicia, petalis breviora. Stylus brevis, tri-cornis. Fructus magnus, tricapularis. Loculus quilibet habet duo magna semina nigra, ex una parte plana, ex altera rotunda. Capitula odorem *Cepæ* exhibent; folia ALLII odorem. Radix fibrosa odorem *Cepæ*, & ALLII habet.

1882. ALLIUM ursinum.

ICON. TAUR. Vol. XIV. tab. 95.

Allium scapo nudo triquetro, foliis lanceolatis, petiolatis, umbella fastigiata. LINN. *spec.* p. 431. MANT. *obs.*

Allium foliis radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis, floribus umbellatis. HALL. *hist. tom. 2.* n. 1228.

Allium petiolatum. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 261.

Allium sylvestre latifolium. BAUH. *pin.* 74.

Allium ursinum. CAM. *epit.* 330.

Loc. Nihil in sylvis opacis frequentius. *PERENNE.*

1883. ALLIUM triquetrum.

Allium scapo nudo, foliis triquetris, suaminibus simplicibus. LINN. *spec.* p. 431.

Allium caule triangulo. TOURN. *inst.* 389.

Moly parvum caule triangulo. BAUH. *pin.* 75.

Moly caule, & foliis triangularibus. PARK. *par.* 142. *tab.* 143. *f.* 4.

Loc. Ex alpinis Pinadii misit CI. GIAVELLI. *PERENNE.*

1884. ALLIUM schoenoprasum.

ICON. TAUR. Vol. X. tab. 76.

Allium radice multiplici, foliis radicalibus teretibus scapi longitudine; floribus umbellatis, cylindricis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1226.

Allium scapo nudo folia adaequante teretia subulato-filiformia. LINN. *syn.* 12. p. 240.

Porrum sectivum juncifolium. BAUH. *pin.* 72.

Schoenoprasum. DOD. *pempt.* 689.

Loc. In pratis montanis, & alpinis frequenter occurrit. *PERENNE.*

VIR. Oleracci, & *Schoenoprasum* radices etiam edules sunt, sed ad usum culinae ALLIUM sativum, & *scorodoprasum* veniunt. ALLIUM ursinum apud nostrates nullo in usu est propter summam odoris vehementiam. ALLII genus continet principia oleosa, & acrida, caustica, & rubefaciencia. Bubones pestilenciales utiliter aperire dicuntur ALLII radices, eadem vermibus insensae habentur, atque urinam pellere dicuntur, condimentum non contemnendum eae faciunt, sed frequens usus acrem, & causticam naturam in humoribus inducit. Ex radicibus ALLII contrusum rubefaciens extretum medicamentum parari potest, quod sinapismatum vires supplere poterit.

LILIUM. LINN. *gen. n.* 371. *syn. n.* 406. TOURN. *tab.* 195. 196.

Corolla hexapetala, campanulata. Nectarium est linea longitudinalis in quolibet petalo. Stigma trigonum. Capsula oblonga, sulcata, trigona, trilocularis, trivalvis.

1885. LILIUM bulbiferum.

ICON. TAUR. Vol. VII. tab. 112.

Lilium foliis sparsis, corollis campanulatis erectis intus scabris. LINN. *spec.* p. 443.

JACQ. *Fl. Austr.* *tab.* 226.

Lilium caule folioso, foliis sulcatis gramineis, floribus campaniformibus, intus floccosis.
HALL. *hist. tom. 2. n. 1232.*

Lilium purpureo-croceum majus. BAUH. *pin. 76.*

Lilium rubens, vel croceum majus. BAUH. *hist. II. p. 688.*

2. *Lilium purpureo-croceum minus.* BAUH. *pin. 77.*

Loc. Ad oras sylvarum locis præcipue præcipitibus in editioribus collibus *Taurinensibus*, & apricis montanis. *PERENNE.*

1886. **LILIUM martagon.**

Icon. *TAUR. Vol. VII. tab. 212. 213. 214.*

Lilium foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. LINN. *spec. p. 435.* HALL. *hist. tom. 2. n. 1233.*

JACQ. *Fl. Austr. tab. 351.*

Lilium montanum floribus reflexis. BAUH. *pin. 77.* CARID. *Aix. tab. 53.*

Lilium sylvestre. DOD. *pempt. 201.*

Loc. In dumetis, & sylvis *Taurinensibus*, ac subalpinis. *PERENNE.*

1887. **LILIUM pomponium.**

Lilium foliis sparsis subulatis, floribus reflexis, corollis revolutis. LINN. *spec. p. 434.*

MILL. *dict. 165. f. 2.*

Lilium rubrum. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p. 283.*

Lilium rubrum angustifolium. BAUH. *pin. p. 78.*

Loc. In Comitatu *Nicaeensi* frequens. *PERENNE.*

FRITILLARIA. LINN. *gen. n. 372., syn. n. 407.* TOURN. *tab. 201.*

Corolla hexapetala, campanulata. Nectarium est fovea supra ungues cujusvis petali.

Stigma trifidum, patens. Capsula trigona, trilocularis, trivalvis.

Semina plana.

1888. **FRITILLARIA meleagris.**

Icon. *TAUR. Vol. XVIII. tab. 50.*

Fritillaria caule subuniflora, foliis annuis alternis. LINN. *spec. p. 436.*

JACQ. *Fl. Austr. append. tab. 32.*

Fritillaria caule pauciflora, foliis caulinis gramineis alternis. HALL. *hist. tom. 2. n. 1235.*

Fritillaria scapo uniflora, foliis alternis. SCOP. *Fl. Carn. p. 238. n. 1.*

Fritillaria lutea maxima italica. PARK. *parad. p. 43.*

Loc. In pratis alpium *Monregalerium, Tendae*, & vallis *Quairas.* Cl. *BELLARDI* etiam vidit in pratis di *Ussey* loco dicto la *Marcionà.* *PERENNIS.*

Obs. Flos hexapetalus tribus interioribus paullo longioribus. Petala extus ex luteo virent sublutea, versus basim omnia fovea excavata, ex qua in externa facie gibba protuberant, venis viridibus percursa; color interior petalorum luteus, tessellis purpureis maculatus, unguibus petalorum aequaliter dilute purpureis. Caulis rotundus, foliis alternis sessilibus, erectis, semiaimplexicaulibus, non vaginantibus donatus. Varietas purpurea in luteam mutata est.

UVULARIA. LINN. *gen. n. 373., syn. n. 408.*

Corolla hypocrateriformis, petalis lanceolatis, angustis. Nectarium est fovea oblonga, ad basim petalorum insculpta. Stylus semirrhizoides, stigmatibus reflexis.

Filamenta sex brevissima. Capsula oblonga, trilocularis.

Semina subrotunda, compressa.

1889. **UVULARIA amplexifolia.**

Uvularia foliis amplexicaulibus. LINN. *spec. p. 436.*

Uvularia foliis amplexicaulibus. HALL. *hist. tom. 2. n. 1237.*

Polygonatum latifolium ramosum, flore albo minore, germanicum. BARR. *ic. 720.*

Polygonatum latifolium ramatum. CLUS. p. 166-67. *hist.* p. 176. BAUH. *pin.* p. 303.
BAUH. *hiz.* III. p. 331.
Loc. In sylvis umbrosis alpium. *PERENNIS.*

ERYTHRONIUM. LINN. *gen.* n. 375., *syn.* n. 410. *TOURN.* tab. 103.

Corolla campanulata petalis lanceolatis, supra medium reflexis. Nectarium constituunt tubercula duo, petalis interioribus juxta basim adnata. Stamina sex minima.
Stigma trifidum. Capsula subrotunda, trilocularis.
Semina oblonga.

1890 *ERYTHRONIUM dens canis.*

Icon. TAUR. Vol. VII. tab. 122.

Erythranium. LOB. *adv.* p. 64. LINN. *spec.* p. 437. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1134.

JACQ. *Fl. Austr.* append. tab. 9.

Erythronium maculosum. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 186.

Dens canis latiore, rotundioreque folio. BAUH. *pin.* 87.

Satyrium quorundam erythranium bifolium flore unico radiato purpureo. BAUH. *hist.* II. p. 680.

n. *Dens canis angustiore, longioreque folio.* BAUH. *pin.* 87.

Loc. Non solum in collibus *Taurinensibus*, uti observavit LOBELIUS, sed etiam in agri *Taurinensis* sylvis umbrosis, & similibus locis ad radices montium subalpinorum abunde provenit. *PERENNE.*

TULIPA. LINN. *gen.* n. 376. *syn.* n. 411. *TOURN.* tab. 199. 200.

Corolla campanulata basi late cava, petalis oblongo cuspidatis, concavis. Stigma triangulare angulis divisis. Capsula trigona, trivalvis. Semina plana.

1891 *TULIPA sylvestris.*

Tulipa flore subnante, foliis lanceolatis. LINN. *spec.* p. 438.

Tulipa filamentis subulatis, inferne villosis. GER. p. 148. n. 1.

Tulipa minor lutea, italica, & gollica. BAUH. *pin.* 63. GARID. *Aix.* p. 475.

Tulipa minor lutea Narbonensis. BAUH. *hist.* II. p. 677.

Tulipa Narbonensis. CLUS. *hist.* p. 151.

Loc. Felix VALLE legit in alpiibus *Exilliarum.* Nascitur etiam in pratis alpinis *Vindiansibus*, *Valderianis*, atque *Tendae*, montis *Cenisii*, & *Fenescellarum.*
PERENNIS.

ASPHODELUS. LINN. *gen.* n. 379., *syn.* n. 417. *TOURN.* tab. 178.

Corolla hexapetala, stellata, petalis basi conglutinatis. Filameota ex origine calycis, basi latiora, & circa germen in globum disposita. Stigma capitatum.

Capsula carnosa, subrotunda, triloba, trilocularis, polysperma.

1892 *ASPHODELUS ramosus.*

Asphodelus caule nudo, foliis ensiformibus carinatis laevibus. LINN. *spec.* p. 444.

Asphodelus albus ramosus, & non ramosus mas. BAUH. *pin.* 28.

Asphodelus I. II. CLUS. *hist.* p. 197.

Asphodelo. MATTH.

Loc. Frequens in apricis editiorum collium *Taurinensium*, praecipue secus sylvas.

Cl. BELLARDI in sylvis elatioribus di *Borgomasino.* *PERENNIS.*

1893 *ASPHODELUS fistulosus.*

Asphodelus caule nudo, foliis strictis subulatis striatis subfistulosis. LINN. *spec.* p. 444.

JACQ. *Hort. Vindob.* tab. 77.

Asphodelus caule nudo, foliis surcatis. ROY. *Lugd.* 34.

ALLIONI Fl. Pedem. Tom. II.

S 3

Asphodelus minor. CLUS. hist. 1. p. 197.

Asphodelus foliis fasciatis. BAUH. pin. 99.

Loc. in *Liguria montibus Savonae proximis* repetit *Peurus MOLINERI. PERENNIS*.

SCILLA. LINN. gen. n. 378. syst. n. 415. TOURN. tab. 196.

Bractee loco calycis. Corolla patens. Filamenta non lata, sed filiformia.

1894 SCILLA maritima.

Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 24.

Scilla nudiflora bracteis refractis. LINN. spec. p. 442.

Ornithogalum maritimum, s. *Scilla radice rubra*. TOURN. inst. p. 381.

Scilla ruffa magna vulgaris. BAUH. hist. II. p. 615.

Scilla vulgaris radice rubra. BAUH. pin. 73.

Scilla foemina PLINII.

Ornithogalum maritimum. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 274.

B. *Scilla radice alba*. BAUH. pin. 73.

Ornithogalum maritimum, s. *Scilla radice alba*. TOURN. inst. 381.

Scilla mascula PLINII.

Scillae magnae albae. BAUH. hist. II. p. 615.

Scilla. MATTH.

OFF. Squilla.

Loc. Ad maris litus, arenosa, & tupes inhabitat. *PERENNIS*.

VIR. SCILLÆ radix usitatum in officiis remedium constituit vere efficax ad urinam pellendam. Vis activa posita est in principio quodam volatili acri, & fere caustico. Saporis amari est, & acris nauseam gignentis. Cuti applicita haec radix eam rubefacit, insus vero assumpta, nisi intra exiguum dosim Medicus se continet, ac detur refracta dosi, nauseam, vomitum, atque etiam alvum movet. Ad sanguinem autem delatae actuosae SCILLÆ particulae potenter mucum incidunt, atque lotii secretionem urgent. Quum igitur summa virtutis posita sit in particulis volatilibus, solent farinae pasta involutae laminae radices hujusce plantae diligenti igne in clibano exsiccari, ut minor fiat harum particularum perditio: ea ratione exsiccatae in pulverem deinde teruntur, quae praeparatio in officiis nomen habet SCILLÆ praeparatae. SCILLÆ maxime proficiuus usus est in asthmate humido, atque in hydropse, qui sequitur congestam in pulmonibus viscidam, lentamque pituitam; interdum etiam in aliis hydropis speciebus ad suppressam urinam revocandam Medici SCILLAM adhibent, ut symptomati medeantur, suamque affert utilitatem, licet causam morbum facientem non auferat. Causa autem morbi semper ante oculos habenda est: haec enim interdum omnino SCILLÆ usum interdicat. Caveant igitur tyrones, ne urinas pellere hoc remedio studeant in hydropse, qui sequitur reperiussa cutis exanthemata, speciatim autem morbillos, & scarlatinam. Neque aptum remedium est generatim in tympanite etiam ascitim jam inducente: male etiam dabitur SCILLA, si urinae suppressio ex asthmate siccato veniat, aut acris humor pulmones lacessens oppressionem inferat, urinaeque suppressionem. Ex suppressa cutis perspiratione phlegmatia interdum suboritur lotii separationem auferens, sed ea per hoc remedium non restituitur. Alias ex phlogistica sanguinis demitate urinae separatio non habetur, at ea tali auxilio, ut planum est, minime promovenda. Ascites pro diversitate causarum multiplicem curandi rationem exposulat: si viscerum, tenacesque serosi humores collecti morbum faciant, catharticis, atque hydropicis remediis securius valetudo obtinetur, quam iis, quae urinam movent; si viscerum obstructions asciti originem dederint, major mihi fiducia est in deobstruentibus, & saponaceis, atque signatim in extracto *hellebori nigri*, quam in SCILLÆ radice. In leucophlegmatia, licet sua carere non possit utilitate hujusmodi radix, saepius tamen magis profuisse visa sunt pro ratione causarum, ac aegri constitutione resolutiva diaphoretica, tonica corroborantia, uti martialia, aut purgantia hydrotica. In genere monemus tyrones, ne SCILLAM exhibeant iis, quos febris tenet, aut quibus laesa existant viscera, aut urinae rutillae, aut qui obnoxii sunt nervorum spasmis. Dia etiam in ejusdem usu petisendum

non est, nam stomachum dejecit, & in febriculam, ac tabem aegros deducet. Quatuor, aut quinque grana una dosi exhibita solent vomitum, & alvum movere; idcirco si pro alterante adhibetur ad urinam movendam, duorum granorum dosis sufficere solet, eaque pluries intra nichilominus repetenda, inque minori dosi progrediendum est usque donec medicamenti usus requiritur. Speciatim commendamus SCILLAM in asthmate humido, atque hydrope genito ex viscido mucus pulmones infarciens. Extat in officinis *oxymel*, *vinum*, & *acetum scilliticum*: *vinum*, & *acetum* ad eisdem usus, quos praebet SCILLA *praeparata*, a Medicis imperantur, sed aegroti difficile ferunt, vomitu excitato, nisi convenienti vehiculo diluantur. *Oxymel* tandem *scilliticum* fortiter humores incidit, atque urinam pellit, non modo autem in hydrope administratur ab uncia semisse ad unciam unam, sed vatis mixturis adfici solet in asthmate humido, & pituitoso pulmonum infarctu, tum ad urinam pellendam, tum ad sputa educenda. Cavendum autem ab ejusdem usu, si morbus sit naturae phlogisticae, aut nervi spasmo afficiantur, sive ille per consensum ex nervorum motibus convulsivis veniat, sive pendeat ex stimulo materiae acris irritantis.

1895. SCILLA bifolia.

Scilla floribus erectiusculis paucioribus. LINN. *synt.* 12. p. 243.

Phalangium radice bulbosa, foliis latissimis obtusis, spica pauciflora, stipulis minimis.

HALL. *hist.* tom. 2. n. 1211.

Anthericum bifolium. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 414.

JACQ. *Fl. Austr.* tab. 117.

Hyacinthus stellaris bifolius germanicus. BAUH. *pin.* 45.

Hyacinthus stellatus bifolius vernus dumetorum flore coeruleo. BAUH. *hist.* II. p. 579.

Ornithogalum bifolium. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 274.

Loc. In umbris secus *Duriam*, & *Suram*, & in dumetis collium *Tourinensium*. PERENNIS.

1896. SCILLA italica.

ICON. *TAUR.* Vol. XXV. tab. 12.

Scilla corymbo conferto subconico. LINN. *spec.* p. 443. *man.* alt. obs.

Hyacinthus stellaris italicus. BESL. *Eyst. vern.* 42. f. 1.

Hyacinthus stellaris spicatus cinereus. BAUH. *pin.* 46.

Loc. Locis lapideosis non macilentis, & umbris Comitatus *Nicoensis*. PERENNIS.

1897. SCILLA autumnalis.

ICON. *TAUR.* Vol. XIX. tab. 98.

Scilla foliis filiformibus linearibus, floribus corymbosis, pedunculis nudis ascendentibus longitudine floris. LINN. *spec.* p. 443.

Anthericum autumnale. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 415.

Hyacinthus stellaris autumnalis minor. BAUH. *pin.* 47.

Hyacinthus autumnalis major, & minor. CLUS. *hist.* 185. BAUH. *hist.* II. p. 574.

Ornithogalum autumnale. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 274.

Ornithogalum autumnale minus floribus caeruleis. TOURN. *inst.* p. 381. GARID. *Aix.* tab. 73.

Loc. Nascitur in pratis non irriguis prope *Moncastello* loco dicto il *Cassinot* di *Rangon*, observante *Ignatio MOLINERI*. PERENNIS.

ORNITHOGALUM. LINN. *gen.* n. 377., *syn.* n. 414. TOURN. *tab.* 203.

Bracteae loco calycis. Filamenta lata, alterna, saepe tricuspidata.

1898. ORNITHOGALUM luteum.

ICON. *TAUR.* Vol. XV. tab. 30. fig. 2.

Ornithogalum scapo onguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. LINN. *spec.* p. 419.

Phalangium radice bulbosa, stipulis maximis hirsutis, floribus umbellatis, petiolis unifloris. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1213.

Ornithogalum scapo angulato, bracteis binis umbella longioribus, pedunculis simplicissimis. GOU. hort. monsp. 171. n. 1.
Fritillaria caule diphylla, petalis patentibus. GER. Fl. Gallopr. p. 148. n. 1.
Ornithogalum luteum. BAUH. pin. 171. TOURN. inn. 379. GARID. aix. 343. tab. 74.
 Loc. In aridis collum. PERENNE.
 OBS. ORNITHOGALUM minimum LINNÆ a luteo non videtur differre.

1899. ORNITHOGALUM pyrenaicum.

ICON. TAUR. Vol. VI. tab. 126.
Ornithogalum racemo longissimo, filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus æqualibus, fructiferis scapo approximatis. LINN. spec. p. 440. GOU. Illustr. p. 26.
 JACQ. Fl. Austr. tab. 103.
Phalangium longissime spicatum, filamentis latis lanceolatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1210.
Ornithogalum floribus racemosis, filamentis lanceolatis, pedunculis simplicibus. SCOP. Fl. Carn. p. 242. n. 1. ed. 2. n. 409.
Ornithogalum flavescens. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 277.
Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. BAUH. pin. 70.
 Loc. Frequens in pratis subhumidis montanis, & subalpinis; etiam ad collina loca descendit, atque nascitur in collibus Taurinensibus. PERENNE.

1900. ORNITHOGALUM Narbonense.

Ornithogalum racemo oblongo, filamentis lanceolatis membranaceis, pedunculis, floribusque patentibus. LINN. spec. p. 440.
Ornithogalum majus spicatum flore alba. BAUH. pin. 70.
Ornithogalum Narbonense. DOD. pempt. 222.
Ornithogalum Narbonense. JACQ. Fl. Austr. tab. 103.
 Loc. Inet segetes collium Taurinensium non infrequens. PERENNE.

1901. ORNITHOGALUM umbellatum.

ICON. TAUR. Vol. VII. tab. 124. f. 1.
Ornithogalum floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis emarginatis. LINN. spec. p. 441.
 JACQ. Fl. Austr. tab. 343.
Ornithogalum stipulis maximis, petiolis lateralibus longissimis. HALL. hist. tom. 3. n. 1215.
Ornithogalum umbellatum medium angustifolium. BAUH. pin. 70.
Ornithogalum vulgare, & verius majus, & minus. BAUH. hist. II. p. 620.
Ornithogalum (umbellatum) floribus corymbosis, etaminibus simplicibus. VILL. prosp. p. 18.
 Loc. Primovete in pascuis, & ad vias, & secus agros. PERENNE.

ANTHERICUM. LINN. gen. n. 380. syst. n. 418. TOURN. tab. 193.

Differt a Scilla florum petalis suberectis, diu persistentibus, stigmatibus tribus, & siliquis tribus, capsulam trilocularem mentientibus.

1902. ANATHERICUM serotinum.

ICON. TAUR. Vol. VII. tab. 124. f. 2.
Anthericum foliis planiusculis, scapo unifloro. LINN. spec. p. 444.
Phalangium foliis crassius, scapo unifloro. HALL. hist. tom. 2. n. 1209.
Bulbocodium alpinum juncifolium flore unica intus albo, extus squalide rubente. RAI. syn. p. 374. tab. 17. f. 1.
Narcissus serotinus. CLUS. hist. p. 162.
 Loc. Abunde nasci observavi in supremis nivosis jugis circa arcem Fenearellarum, & supra 'l Vallon: neque similibus locis infrequens est in monte Centisio, atque alpinis di Lanzo, e di Viù. PERENNE.

1903. ANATHERICUM ramosum.

ICON. TAUR. Vol. XXVIII. tab. 60.
Anthericum foliis planis, scapo ramoso, corollis planis, pistillo recto. LINN. spec. p. 445.
 JACQ. Fl. Austr. tab. 161.

Phalangium radicibus teretibus, foliis duris gramineis, caule ramoso laxe paniculato.

HALL. hist. tam. 2. n. 1208.

Anthericum petalis patentibus planis. GER. Fl. Gallopr. p. 133. n. 2.

Ornithogalum ramosum. LAM. Fl. Franc., tam. 3. p. 279.

Phalangium ramosum porvo flore. BAUM. pin. 29. TOURN. inst. 378.

Phalangium quibusdam parva flore ramosum. BAUM. hist. II. p. 633.

Loc. Frequens est in sylvis di Lucengo. *PERENNE.*

1904. **ANTHERICUM** liliago.

Anthericum foliis planis, scapo simplicissimo, corollis planis, pistillo declinata. LINN. spec. p. 445. JACQ. Vindob. tab. 83.

Phalangium radicibus teretibus, foliis radicalibus carinosis ensiformibus, petiolis unifloris. HALL. hist. tam. 2. n. 1207.

Anthericum petalis patentibus planis. GER. p. 135. n. 2.

Phalangium parva flore non ramosum. BAUM. pin. 29.

Phalangium pulchrius non ramosum. BAUM. hist. II. p. 645.

Ornithogalum gramineum. LAM. Fl. Franc., tam. 3. p. 278.

Liliago. CORD.

Phalangium on *Maly Plin.* LON. p. 18.

Loc. In sylvis Tourinensis, & subalpinis. *PERENNE.*

NARTHECIUM. MOHR. Eph. nat. cur. 1742. p. 384.

Flos Antherici, minime nudus, sed calyce instructus.

1905 **NARTHECIUM** calyculatum.

Anthericum foliis planis, scapo simplicissimo, corollis campanulatis, staminibus declinatis. LINN. syn. 12. p. 244.

Anthericum filamentos glabris. HALL. hist. tam. 2. n. 1205.

Anthericum (pseudasphodelus) foliis ensiformi-linearibus, racemis oblongis, filamentis glabris. JACQ. Vindob. p. 233. n. 31.

Nartheicum. GER. p. 142. n. 1.

Nartheicum calyculatum. LAM. Fl. Franc., tam. 3. p. 298.

Phalangium alpinum palatre Iridis folio. TOURN. inst. 368. SCHEUCHZ. it. alp. 2. p. 139. SEGU. Veron. 2. p. 61. tab. 14.

Pseudasphodelus alpinus. BAUM. pin. 29. secundus. CLUS. hist. p. 198.

Loc. In pascuis spongiosis paludosis alpium, & montium ubique frequens. *PERENNE.*

APHYLLANTHES. LINN. gen. n. 369. syst. n. 404. TOURN. tab. 430.

Calyx ex squamis imbricatis compositus, tubulosus. Corolla cariophyllea, peralis in tubum superius limbo patente instructum dispositis. Stigma trifidum. Capsula tubinata, triangularis, trilocularis. Semina ovata.

1906 **APHYLLANTHES** monspeliensis.

Icon. TAUR. Vol. XVII. tab. 29.

Aphyllantes monspeliensis. LINN. spec. p. 422.

Caryophyllus caeruleus monspeliensis. BAUM. pin. 209.

Aphyllantes monspeliensis. LON. odv. 194. BAUM. hist. III. p. 336.

Loc. In pascuis siccis agri Nicaeensis. *PERENNIS.*

VERATRUM. LINN. *gen. n.* 1013. *syn. n.* 1144. TOURN. *tab.* 145.

Corolla patens, persistens, unguibus conglutinatis. Germina tria cum totidem styliis. Capsulae tres distinctae, univalves, polyspermae; semina plana. In nostra specie adunt flores masculi cum germinis rudimento, & flores foeminei cum staminibus castratis.

1907 **VERATRUM** album.

Veratrum racemo supra decomposito, corollis erectis. LINN. *spec. p.* 1479.

JACQ. *Fl. Austr. tab.* 335.

Veratrum spica paniculata, floribus maribus, & foeminis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1204.

Veratrum flore subviridi. TOURN. *inn.* 172.

Helleborus albus flore subviridi. BAUH. *pin.* 186.

Helleborus albus. BAUH. *hist. III. p.* 633.

Elleboro bianco. MATTH.

VERN. *Vrairo*, o *Varaso*.

OFF. *Veratrum*, sive *Helleborum album*.

Loc. In pratis alptiis, & subalpinis praecipue irriguis admodum frequens. *PERENNE.*

VIR. Dirum hujusce stirpis venecum norunt & ipsi Alpicolae, qui affirmant, neque impune bibi aquam, quae per VERATRI radices transierit. Licet in mania, hydrophobia, aliisque gravissimis morbis a quibusdam adhibita sint multa praeparata ex radicibus VERATRI, sive *Hellebori albi*, cum maxime virulentum, & periculosum medicamentum sit, eo erit omnino abstineendum. Vis deleteria posita est in volatilibus acerrimis, ac urentibus particulis, quae stomachi inflammationem, convulsiones, & corruptivam sanguinis resolutionem prompte inferunt. Etiam scrupuli unius dosi radices *Hellebori albi* mortem intulerunt.

BERBERIS. LINN. *gen. n.* 399. *syn. n.* 438. TOURN. *tab.* 385.

Calyx hexaphyllus. Germen cum stigmate orbiculato, magno, evadit bacca disperma.

1908 **BERBERIS** vulgaris.

ICON. *TAUR. Vol. X. tab.* 47.

Berberis pedunculis racemosis. LINN. *spec. p.* 471.

Berberis racemifera foliis ciliatis. HALL. *hist. n.* 828.

Berberis dumetorum. BAUH. *pin.* 454.

Berberis vulgo, quae Oxyacantha putata. BAUH. *hist. I. part. 2. p.* 52.

Crespino. MATTH.

OFF. *Berberis*, sive *Oxyacantha*.

Loc. Ad sepes vulgarissima. *FRUTEX.*

VIR. Fructus, qui acidi sunt, in morbis a putredine optimum remedium faciunt, ac ea, quae monuimus circa acetosellae utilitatem, transferri ad fructus BERBERIS possunt. Usitatior praeparatio est syrupus, quo potiones grate acidae reddantur. Folia cum aliqua acerbitate adstriunt, utiliterque adhibentur ex aqua decocta sive ad laxas gingivas firmandas, sive ad alvi fluxum cohibendum. Cortex radicis flavo colore usum tiocctorium praebet; humores etiam solvit, alvum ciet, atque in ictero laodatur.

ASPARAGUS. LINN. *gen. n.* 382. *syn. n.* 420. TOURN. *tab.* 154.

Calyx nullus. Corollae campaniformis unguis coaliti. Germen evadit bacca trilocularis, hexasperma.

1909 **ASPARAGUS** officinalis.

ICON. *TAUR. Vol. VII. tab.* 128.

Asparagus caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. LINN. *syn. 12. p.* 245.

Asparagus foliis filiformibus stipulatis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1239.

Asparagus hortensis, & *pratensis*. BAUH. *hist.* III. 725.

VERN. *Spars.*

Loc. In pascuis, & sylvis caeduis agri *Taurinensis* secus flumen *Stura*, & *Dora*.
PERENNIS.

VIR. ASPARAGI *sativi* radix inter aperientes locum habet, blande extimulat, & lotii copiam auget. Mice diureticum est, cui paullo gravioris morbi curationem fidere Medicus nequeat.

1910. ASPARAGUS acutifolius.

ICON. TAUR. Vol. XIX. tab. 22.

Asparagus caule inermi angulato frutescente, foliis aciformibus rigidulis perennantibus mucronatis aequalibus. LINN. *syst.* 12. p. 245.

Asparagus foliis acutis. BAUH. *pin.* p. 490. TOURN. *inst.* p. 300.

Carruda. BAUH. *hist.* III. 726.

Carruda prior. CLUS. *hist.* 2. p. 177.

Loc. Uberrime nascitur in Comitatu *Nicasensi*, & Principatu *Unellae*. SUFFRUTEX.

PEPLIS. LINN. *gen.* n. 402., *syst.* n. 442.

Calyx 12-fidus. Petala sex, interdum nulla. Capsula bilocularis, polysperma.

1911. PEPLIS portula.

Peplis floribus apetalis. LINN. *spec.* p. 474.

Peplis petalis sensu, saepissime apetalis. HALL. *hist.* *rom.* 1. n. 856.

Alsine palustris minor serpillifolia. BAUH. *pin.* 251.

Loc. Ad lacus, & loca paludosa, ubi aquae inundant. PERENNIS.

POLYSTEMONES.

BUTOMUS. LINN. *gen.* n. 455., *syst.* n. 502. TOURN. *tab.* 243.

Involuerum umbellae triphyllum. Petala duorum ordinum, exteriora mucronata, duriora.

Stamina oovem. Siliquae sex, uniloculares, polyspermae.

1912. BUTOMUS umbellatus. LINN. *spec.* p. 532.

ICON. TAUR. Vol. XVII. tab. 43.

Juncus floridus major. BAUH. *pin.* 112.

Juncus floridus. BAUH. *hist.* II. p. 324.

Gianco florido. MATTH.

Loc. Secus lacus di *Avigliana*, *Candia*, *Vivane* nascitur. D. CACCIA in aquosis *Vicinovi* collegit, & prope *Piobesi*. Frequens etiam in fossis aquarum lente fluentium iis in regionibus, quibus *Oryza* colligitur. PERENNIS.

LYTHRUM. LINN. *gen.* n. 532., *syst.* n. 604. TOURN. *tab.* 159.

Calyx cylindricus, denticulis 6. 8. vel 12. instructus. Petala saepius sex, interdum quatuor.

Stamina 2 sex ad duodecim. Capsula bilocularis, polysperma.

1913. LYTHRUM salicaria.

ICON. TAUR. Vol. XIII. tab. 105.

Lythrum foliis oppositis cardato-lanceolatis, floribus spicatis dedecandris. LINN. *spec.* p. 640.

Salicaria foliis lanceolatis subhirsutis, floribus spicatis. HALL. *hist.* *rom.* 1. n. 854.

Lythrum foliis oppositis, & verticillatis, floribus spicatis. GER. *Fl. Gallopr.* p. 459. n. 1.

Salicaria spicata. LAM. *Fl. Franc.* *rom.* 3. p. 103.

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis. TOURN. *inst.* 253.

Lysimachia spicata purpurea. BAUH. *pin.* 246.

Lysimachia purpurea quibusdam spicata. BAUH. *hist.* II. p. 904.

Lysimachia alba. MATTH.

OFF. *Lysimachia purpurea*, aut *salicaria*.

Loc. Ad fossas, & aquosa vulgaris est. *PERENNE*.

VIR. Tota planta modice abstergit, ac efficaciter adstringit vere utilis in dysenteria, & alvi fluxu cohibendo, & adstringentium usu curando. Aut herba ex aqua decoquitur, aut succus expressus exhibetur ab uncia una ad uncias tres.

1914. *LYTHRUM hyssopifolia*.

Icon. TAUR. Val. XVII. tab. 37. f. 1.

Lythrum falii alternis linearibus, flaribus hexandris. LINN. spec. p. 642.

JACQ. Fl. Austr. tab. 133.

Salicaria falii linearibus, floribus per alas sessilibus. HALL. hist. tam. 1. n. 855.

Salicaria hyssopifolia. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 103.

Salicaria hyssopifolia latiore. TOURN. inst. 253. RUP. Jen. p. 147.

Hyssopifolia. BAUH. pin. 218.

Loc. In humidis, & sabulosis potissimum torrentis Paillon in agro Nicaeensi frequentissima; similibus locis etiam in Liguria occurrit, neque deest locis inundatis, & exsiccatis in ipso agro Pedemontano, uti circa la Marsaja, Frassasca, & secus flumen la Dara in valle Seguzina. *ANNUUM*.

1915. *LYTHRUM thymifolia*.

Lythrum falii alternis linearibus, flaribus tetrapetalis. LINN. spec. p. 642.

Salicaria minima tenuifolia. TOURN. inst. 254.

Salicaria thymifolia. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 104.

Hyssopifolia minor, s. potius thymifolia maritima. BAUH. hist. III. p. 322.

Loc. In sabulosis fluminis Paillon. *ANNUUM*.

CLASSIS IX.

PLANTÆ FLORE POLYPETALO

DRYAS. LINN. *gen. n.* 562., *syst. n.* 637.

Convenit cum caryophyllata calyce, & fructu: differt petalis, in nostra, pluribus, quam quinque.

1916 **D**RYAS octopetala.

ICON. TAUR. Vol. XV. tab. 60. f. 1.

Dryas foliis simplicibus. LINN. *syst.* 12. p. 352. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1133.

Geum (chamaedrifolium) flore erecto octopetalo, fructu oblongo, aristis lanigeris.

CRANTZ. *fast.* 2. ed. 2. p. 70.

Caryophyllaeo alpino chamaedryas folio. MORIS. *ox.* p. 432.

Chamaedrys alpina cisti flore. BAUH. *pin.* 248.

Chamaedrys montana. CLUS. *hist.* II. p. 351.

Chamaedrys montana frutescens durior. LOR. p. 209.

Loc. In cacuminibus alpium saxosis, apricis, ubique frequens. *SUFFRUTEX*.

ADONIS. LINN. *gen. n.* 618., *syst. n.* 698.

Calyx pentaphyllus, deciduus. Petala plura, raro quinque, nulla squama nectarifera, ut in ranunculo, instructa. Semina plura, angulata, nuda, receptaculo oblongo affixa.

1917 **A**DONIS miniata.

Adonis floribus octopetalis, fructibus ovatis. LINN. *spec.* p. 771.

Adonis miniata. JACQ. *Fl. Austr.* tab. 254.

Adonis radice annua, flore octopetalo. HALL. *hist.* 1. 2. n. 1158.

Adonis annua prima. CRANTZ. p. 110.

Ranunculus orvensis folio chamoemeli, flore phaeniceo. TOURN. *inst.* 291. GARID.

Aix. tab. 80.

Adonis sylvestris flore phaeniceo. BAUH. *pin.* 278.

Flos Adonis vulgo, alius Eranthemum. BAUH. *hist.* III. p. 125.

Loc. Vulgaris inter segetes collium. *ANNUA*.

1918. **A**DONIS flammea.

Adonis floribus octopetalis, fructibus subcylindricis. LINN. *spec.* p. 771.

Adonis flammea. JACQ. *Fl. Austr.* tab. 355.

Adonis annua secunda. CRANTZ. p. 110.

Adonis flore minore ororubente. BAUH. *pin.* 278.

Loc. Obviam venit in collibus calidiotibus Montisferrovi, & Liguriae. *ANNUA*.

TROLLIUS. LINN. *gen. n.* 620. *syn. n.* 700.

Calyx nullus. Petala numerosa, a duodecim ad quindecim, decidua. Nectararia plura, plana, basi perforata. Capsulae plures, ovatae, monospermae.

1919 TROLLIUS Europaeus.

Icon. *Taur. Vol. IV. tab. 79.*

Trollius corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum. LINN. *spec. p.* 782. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1189.

Trollius flore pedunculo clauso globoso. CRANTZ. *fasc. 2. ed. 2. p.* 134.

Trollius Europaeus. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 323.

Helleborus niger Ranunculi folio, flore globoso. TOURN. *inst.* 272.

Ranunculus montanus aconiti folio, flore globoso. BAUH. *pin.* 182.

Ranunculus flore globoso, quibusdam Trollius. BAUH. *hist. III. p.* 419.

Loc. Vulgatissima est in pratis humidis alpinis, & subalpinis, atque etiam montanis. PERENNIS.

ANEMONE. LINN. *gen. n.* 614. *syn. n.* 694. TOURN. *tab.* 147.

Calyx ex tribus foliis, aut distinctis, aut in unum conglutinis, a flore remotus; sed in hepatica flori proximus, ut in ea pro vero calyce haberi possit, in aliis pro involucrio. Petala saepius sex, aut novem, nulla squama nectarifera instructa. Stamina plurima. Semina plurima, placentae communi affixa, eaque in variis speciebus, aut vellere laneo obducta, aut nuda, stylo persistenti instructa, aut brevissimo, aut longo plumoso.

1920 ANEMONE hepatica.

Icon. *Taur. Vol. IV. tab. 34. & 44.*

Anemone foliis trilobis integerrimis. LINN. *spec. p.* 758. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1156.

Anemone bracteis ternis approximatis integerrimis, foliis trilobis integerrimis. GOU. *hort. monsp. p.* 261. n. 1.

Hepatica. SCOP. *Fl. Carn. p.* 567.

Hepatica foliis trilobis integerrimis. CRANTZ. *fasc. 2. ed. 2. p.* 121.

Ranunculus tridentatus vernus. TOURN. *inst.* 287. GARID. *Aix. tab.* 94.

Trifolium hepaticum. LOB. *adv. p.* 382.

Trifolium hepaticum flore simplici. BAUH. *pin.* 330.

Trifolium hepaticum, s. Trinitatis herba flore simplici caeruleo. BAUH. *hist. II. p.* 389.

Trinitas. MATTH.

Off. Hepatica nobilis, Hepatica trifolia, Trinitas, s. herba Trinitatis.

Loc. Nihil primovere frequentius in sylvis *Taurinensibus*, & montanis ubique. PERENNIS.

Vir. Adstringentem virtutem habere dicitur, sed in usum non venit.

1921. ANEMONE sulphurea.

Icon. *Taur. Vol. X. tab. 15.*

Anemone tubis caudatis, involucriis multifidis, foliis pinnatis, pinnis latis lobatis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1147. *tab.* 21.

Anemone pedunculo involucrio, foliis triplicato-pinnatis pilosis planis acutis incis, seminibus caudatis. LINN. *syn. 12. p.* 375. *mont. p.* 78.

Pulsatilla lutea apii hortensis folio. BAUH. *pin.* 177.

Pulsatilla II. DALECH. *Lugd. p.* 851.

Loc. Ad nivem deliquescentem in summis alpium scopulis haec Pulsatilla occurrit. PERENNIS.

Obs. Pulsatilla lutea CAM. *epis. p.* 393., quam CL. LINNÆUS huc refert, ad ANEMONEM alpinam pertinet.

1922. ANEMONE Halleri N. *tab.* 80. *fig.* 2.

Icon. *Taur. Vol. XXII. tab. 62.*

Anemone tubis caudatis, involucriis multifidis, foliis hirsutis pinnatis, pinnis acutis lobatis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1148. *MISC. TAUR. tom. 5. p.* 92. n. 133.

Loc. In pascuis rupestribus vallis *Queiras*, & supra arcem *Fenestrellarum Ignotius MOLINERI*; minime autem nascitur in summis scopulis ad nivem deliquescentem. *PERENNIS*.

DESCR. Novam hanc *ANEMONES* speciem primus observavit, & descripsit *Celeberr. HALLER*, aique, ut recte *Clariss. Vir* adnotavit, proxima est *ANEMONE sulphureae*, diversa tamen omnino planta est. Tota planta sericea lanugine obducitur. Foliorum pinnae profundius, & acutius incisae sunt. Flos autem omnino purpureus cum aliquo sericeo villo. Petala autem tenera sunt, non dura, & firma, ut in *ANEMONE sulphurea*, cujus petala flavo, denso, sericeo villo teguntur. Semina sunt, ut in congeneribus, cauda plumosa instructa.

1913. *ANEMONE Pulsatilla*.

Anemone pedunculo involucreto, petalis rectis, foliis bipinnatis. LINN. spec. p. 759.

Anemone tubis caudatis, involucris unifoliis multifidis, foliis linearibus hirsutis duplicato-pinnatis, pinnis tripartitis, & quadripartitis. VALL. hist. tom. 2. n. 1146.

Anemone bracteis remotis multifidis, petalis rectis, foliis bipinnatis. GOV. hort. montp. p. 261. n. 2.

Anemone caule involucreto, flore nutante, limbo erecto. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 123.

Anemone seminibus caudatis, petalis lanceolatis rectis, foliis bipinnatis. SCOP. Fl. Carn. p. 568. n. 3.

Anemone pedunculo involucreto, foliis decompositis. GER. p. 380. n. 3.

Pulsatilla folio crassiori, & majori flore. BAUH. pin. 177.

Pulsatilla purpurea, caeruleave. BAUH. hist. III. p. 409.

Pulsatilla. MATTH.

OFF. Pulsatilla.

Loc. In aridis collis *Supergo* dicti, & in pascuis saxosis sterilibus frequens. *PERENNIS*.

VIZ. Proximum ranunculus *ANENOMES* genus, acre, & escaroticum est. Folia *Pulsatillae* cuti imposita vesicam excitant. Olim dictum est hanc plantam valere in morbis pulmonis, nostris temporibus datum est extractum in morbis oculorum, in quibus viscida lymphā sit resolvenda. Nolim tamen suspiciæ plantae usum auadere, donec iteratae observationes veram utilitatem comprobaverint, quam aliorum experimenta nondum videntur confirmare.

1914. *ANEMONE pratensis*.

Anemone pedunculo involucreto, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. LINN. spec. p. 760.

Anemone caule involucreto, flore pendulo, limbo reflexo. CRANTZ. fasc. 2. p. 105.

Pulsatilla flore minore nigricante. BAUH. pin. 177. HELW. puls. 66. tab. 12.

Loc. In pratis, quae interjacent urbi *Caramoniolae*, & Oppido *Carignani*, *Ignatius MOLINERI*. *PERENNIS*.

1915. *ANEMONE alpina*.

ICON. TAUR. Vol. X. tab. 90. f. 2. & Vol. XV. tab. 56.

Anemone foliis triplicato-pinnatis, ovate circumscissatis, caulibus serratis, tubis caudatis.

HALL. hist. tom. 2. n. 1149.

Anemone caule involucreto, seminibus pilosis caudatis. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 124. tab. 3. f. 2.

Anemone foliis caulibus ternis connatis supra decompositis multifidis, seminibus hirsutis caudatis. LINN. spec. p. 760.

Anemone burseriana. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 664.

JACQ. Fl. Austr. tab. 85.

Pulsatilla flore albo. BAUH. pin. 177.

Pulsatilla alba. LOB. ic. p. 282. BAUH. hist. III. p. 410.

Anemone sylvestris H. CLUS. hist. 1. p. 245.

B. *Anemone tubis caudatis, foliis omnibus duplicato-pinnatis, pinnulis confertis, luteo flore.* HALL. Helv. p. 332.

Pulsatilla lutea alpina hispidior. BAUH. pin. 94.

Pulsatilla lutea. CAM. epit. 393. BAUH. hist. III. p. 411.

Loc. Copiose nascitur in alpinis frigidioribus pettinentibus ad editissimos montes *Silvio*, & *Rosa*. *PERENNIS*.

1926. ANEMONE hortensis.

Anemone foliis digitatis. LINN. spec. p. 761.

Anemone seminibus lanatis, foliis radicalibus trilobis, & multifidis, caulinis ovato-lanceolatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1152.

Anemone foliis digitatis, lobis incis, petalis lanceolatis numerosis. GER. Fl. Galloprov. p. 380. n. 5.

Anemone Geranii rotundo folio, purpurascens. BAUH. pin. 173.

Anemone hortensis latifolia simplici flore. CLUS. hist. p. 249.

Loc. Nicææ occurrit ex collectione D. GIUDICE. PERENNIS.

1927. ANEMONE sylvestris.

Anemone pedunculo nudo, seminibus subrotundis hirsutis. LINN. spec. p. 761.

Anemone foliis digitatis hirsutis, floribus peniapetalis, seminibus lanatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1150.

Anemone pedunculo nudo, seminibus lana involutis. CRANTZ. fasc. 2. ed. 2. p. 123.

Anemone sylvestris alba major. BAUH. pin. 176.

Anemone sylvestris l. CLUS. hist. 1. p. 244.

Loc. Semel occurrit in montibus supra Coassæ. PERENNIS.

1928. ANEMONE baldensis. tab. 44. fig. 3. & tab. 67. f. 2.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 90. f. 1.

Anemone seminibus lanatis, foliis caulinis ternatis triplicato-trifidis, lobulis lanceolatis acutis trifidis, & bifidis. HALL. hist. tom. 2. n. 1151.

Anemone alpina. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 384. tab. 26.

Anemone alpina alba minor. BAUH. prodr. 94.

Anemone foliis biternatis incis. LINN. syst. 12. p. 375. mant. p. 78.

Loc. In rupibus summorum alpium præsertim illis, quæ a monte Cenisio usque ad alpes maritimas procedunt. PERENNIS.

DESCR. Radix obscura est, duriuscula, & repens, ex qua petiolata prodeunt tria, aut quatuor folia. Petioli longitudo eadem præterpropter est cum foliorum longitudine. In tria primum alia dividitur petiolum duas circiter lineas longa, & nuda; horum quodlibet subrotundum, supra sulcatum, in tria alia dividitur petiola profundius sulcata demum explanata, quorum duo lateralia brevissima sunt, medium linearis longitudinis. Haec tertia petiola porrigit folia trifariam ad pediculum secta. Foliola hæc aut tribus dentibus inciduntur profunde, aut triloba sunt, lobulo inferiori interdum iterum secto. Incisiones autem, seu dentes elliptico-acuti sunt. Inter hæc folia digitalis, aut quadruncialis erigitur cauliculus rotundus, paullo infra medium instructus foliolis tribus, quorum pediculi simul coeunt. Horum petiola membranacea linearia sunt, & compressa. Folia duplicato trifida, foliolis profunde nunc bilobis, nunc trilobis. Foliola tunc non sunt petiolata. Scapum terminat flos amplus, albus, septem, octo, aut novem lineatis petalis, albis, ovalibus, efformatus. Semina tomentosa, non caudata, in brevem, & densam spicam congesta. Folia glabra sunt, & pulchre virentia, sed caulibus, & petiolo subtilissime villosa sunt. ANEMONE HALLERI, & myrsifolia Cl. VILLARS prosp. p. 49. & 50. ad Baldensem LINNÆI pertinere videntur.

1929. ANEMONE nemorosa.

Anemone seminibus acutis, foliolis incis, caule uniflora. LINN. spec. p. 762.

Anemone seminibus nudis, caule uniflora, foliis radicalibus nullis, caulinis quinque-partitis, lobis tripartitis incis. HALL. hist. tom. 2. p. 1154.

Anemone seminibus ovatis, petalis ellipticis, foliis serratis. SCOP. Fl. Carn. p. 567. n. 1.

Anemone foliis tripartito-multifidis, floribus hexapetalis defloratis cernuis. NEKER tom. 1. p. 235.

Anemone nemorosa flore majore. BAUH. pin. 176.

Ranunculus phragmites albus, & purpureus vernus. BAUH. hist. III. p. 412.

Loc. Primovere copiosissime in sylvis, & umbris pratibus Taurinensibus, & montanis. PERENNIS.

1930. ANEMONE ranunculoides.

Anemone seminis acutis, foliis incisis, petalis subrotundis, caule subbiflora. LINN. spec. p. 762.

Anemone biflora, seminibus nudis, foliis radicalibus nullis, caulinis quinquepartitis, lobis tripartitis incisis. HALL. hist. tom. 2. n. 1153.

Anemone seminis acutis, petalis subrotundis, foliis crenatis. SCOP. Fl. Carn. p. 568. n. 2. ed. 2. n. 661.

Anemone lutea. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 318.

Ranunculus nemorosus luteus. BAUH. pin. 178.

Ranunculus phragmites luteus nemorosus. BAUH. hist. III. p. 413.

Loc. Frequens occurrit in sylvis Cherium versus, supra Sanctuarium B. M. Virginis del Pilone, & quandoque etiam ad oras sylvarum in montanis. PERENNIS.

1931. ANEMONE narcissiflora.

Icon. TAUR. Vol. IV. tab. 54.

Anemone floribus umbellatis, seminibus depresso-avalibus nudis. LINN. spec. p. 763.

CRANTZ fasc. 2. ed. 2. p. 122. tab. 3. f. 2.

JACQ. Fl. Austr. tab. 159.

Anemone seminibus nudis rotundis planis, foliis septemfidis imbricatis hirsutis, floribus umbellatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1155.

Anemone umbellata. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 322.

Ranunculus montanus hirsutus humilior Narcissi flore. BAUH. pin. 182.

Ranunculus alpinus Narcissi flore. BAUH. hist. III. p. 860.

Loc. Frequens est in editioribus subhumidis pascuis alpinis. PERENNIS.

CACTUS. LINN. gen. n. 539. syn. n. 613. TOURN. tab. 122.

Calyx tubularis, squamis imbricatis, superus, deciduus. Petala multa conniventia, unguibus coalita. Stamina plurima, calyci inserta. Stigma capitatum, multifidum.

Bacca unilocularis, polysperma.

1932. CACTUS Opuntia.

Icon. TAUR. Vol. VIII. tab. 27. f. 2.

Cactus articulato-prolifer laxus, articulis avatis, spinis setaceis. LINN. spec. p. 669.

Opuntia foliis avatis compressis, spinis setaceis. HALL. hist. tom. 2. p. 37. n. 1099.

Opuntia vulgo herbariorum. TOURN. inst. p. 239. BAUH. hist. I. p. 154.

Ficus indica folio spinoso, fructu majore. BAUH. pin. p. 458.

Fico indiano. MATTH.

Off. Opuntia, sive Ficus indica.

Loc. Ad rupes circa Sospello, & Ivrea. PERENNIS.

NYMPHÆA. LINN. gen. n. 579. syst. n. 653. TOURN. tab. 137. 138.

Calyx persistens, quadri-aut quinquefolius. Petala numerosa. Stamina plurima. Capsula multilocularis, polysperma.

1933. NYMPHÆA lutea.

Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 22.

Nymphaea foliis cordatis integerrimis, calyce majore pentaphyllo. LINN. syst. 12. p. 361.

Nymphaea calyce pentaphyllo petalis majori, fructu canica. HALL. hist. tom. 2. n. 1066.

Nymphaea lutea major. BAUH. pin. 193.

Nymphaea lutea. MATTH. CAM. epit. 634.

Off. Nymphaea lutea, s. Nenophar luteum.

Loc. Ad lacus etiam occurrit, sed frequentior in fossis majoribus aquatum stagnantium, uti circa Envie, secus il Po morio &c. PERENNIS.

1934. NYPHÆA alba.

Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 23.

Nymphaea foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. LINN. spec. p. 729.

Nymphaea calyce quadrifolio, petalis majori, seuctu sphaerico. HALL. hist. tam. 2. n. 1067.

Nymphaea foliis cordato-orbiculatis, petalis ovatis calycem aequantibus, fructu truncato.

NEKER. tam. 1. p. 227.

Nymphaea alba major. BAUH. pin. 193.

Nymphaea alba. BAUH. hist. III. p. 770. CAM. epil. 634.

Ninfæa birnca. MATTH.

Off. *Nymphaea alba*, sive *Nenuphar album*.

Loc. Frequens ad lacus. PERENNIS.

VIR. Flores præcipue commendantur ad febriles aestus coercendos, & somnum conciliandum; urinæ ardores temperant, impetum veneris compescunt. Porro exigui momenti remedium est coactiva florum NYPHÆÆ, utilius flores ex aqua decoquantur, sed & frequentem in usum venit aqua stillatitia ex floribus NYPHÆÆ.

SEMPERVIVUM LINN. gen. n. 338. syst. n. 612.

Calycis segmenta tot, quot petala. Petala a sex ad duodecim, & ultra. Stamina bis tot, quot petala; siliquæ tot, quot petala, eaque polyspermae. Folia succulenta.

1935. SEMPERVIVUM tectorum.

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 110. fig. 2.

Sempervivum foliis ciliatis propaginibus patentibus. LINN. spec. p. 664.

Sedum rasulis glabris ciliatis, petalis conglutinatis lanceolatis hirsutis quatuordecim.

HALL. hist. tam. 1. n. 949.

Sedum foliis planis ciliatis, propaginibus patentibus. SCOP. Fl. Carn. p. 490.

Sedum tectorum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 359.

Sedum majus vulgare. BAUH. pin. 283. BAUH. hist. III. 687. TOURN. inst. p. 262.

Sempervivo maggiore. MATTH.

Loc. Ubique muris, tectis, atque rupibus innascitur. PERENNE.

VIR. Viribus, & generis affinitate cum Sedo convenit. Solent frequenter officinae in SEMPERVIVO tectorum medicinarum quaerere, eo quod commodius succi quantitas ex eo ellici possit. Scopo attemperandi, atque humores demulcendi inus datur succus expressus ab uncis duabus ad uncias quatuor; extus autem eo ablunur oculi in ea ophthalmia, quæ nullum a repercutientibus detrimentum recipere potest.

1936. SEMPERVIVUM montanum.

Icon. TAUR. Vol. X. tab. 32. f. 1. Vol. XII. tab. 94. f. 3.

Sempervivum foliis integerrimis propaginibus paucis. LINN. syst. 12. p. 335.

Sedum rasulis semipaucis hirsutis, petalis novenis subhirsutis. HALL. hist. tam. 1. p. 410. n. 951.

Sedum majus montanum, foliis non denatis, floribus rubentibus. TOURN. inst. p. 262. BAUH. pin. 283.

Sedum montanum, lasifolium flore purpurea. BAUH. hist. III. 688.

Sedum minus flore rubente. BESL. syst. vern. 6. tab. 8. fig. 2.

Loc. In pascuis saxosis, & ad vias in alpinis, & subalpinis ubique uberrime. PERENNE.

1937. SEMPERVIVUM arachnoideum.

Sempervivum foliis pilis intertextis, propaginibus globosis. LINN. spec. p. 665.

Sedum petalis novenis connatis, rasulis araneosis calvescentibus. HALL. hist. tam. 1. n. 952.

Sedum montanum iamentosum. BAUH. pin. p. 284. TOURN. inst. p. 262.

Sempervivum rubrum montanum, gnaphaloides. COL. part. 1. 291.

Loc. Vulgatissimum locis montanis, & alpinis, tum ad rupes, tum locis saxosis sterilibus. PERENNE.

1938. *SEMPERVIVUM* hirtum. *tab. 65. fig. 1.**Icon. TAUR. Vol. XII. tab. 94. f. 8.**Sempervivum foliis coule, petalorumque apicibus hirtis. LINN. spec. p. 665.**JACQ. Fl. Austr. tab. 12.**Sempervivum petalis fimbriatis, sobole patula. SCHMIED. ic. p. 63. tab. 17.**Sedum majus mantanum, foliis dentatis. BAUH. pin. p. 183.**Loc. In valle Augunae Prætorioe, & Col di Caugnè uberrime in montibus ad Tendam pertinentibus. Cl. BELLARDI in alpihus di Ussey locis saxosis. PARENNE.**DESCR. Radix dura, teres, ex qua rosulae plures congestae adinstar SEMPERVIVI montani. Folia tenuiter hirsuta, præcipue ad oras. Caulis palmaris, rotundus, hirsutus, squammis longis, acutis, densius versus summum positus, instructus. Caulis summa pars in plures ramos finditur, bracteisque instruitur. Pedunculi, sive rami nunc triflori, nunc biflori, in ramorum divisione intermedio flore sessili. Calyx, & flos erectus. Petala calyce duplo longiora, carinata, pallide albescencia, integra, longissime elliptica. Petalorum margo fimbriatus, extrema petalorum parte profundius in fimbrias secta. Carina præsertim tenuiter hirsuta. Stamina duodecim, tubae sex, petalis paullo breviores. Antherae quadrisulcatae, staminibus subulatis, hirsutis, insidentes.*1939. *SEMPERVIVUM* globiferum.*Sempervivum foliis ciliatis propaginibus patentibus. LINN. syst. 12. p. 335.**JACQ. Fl. Austr. opp. tab. 40.**Sempervivum rosulis hirsutis ciliatis, petalis subuloso-lanceolatis duodenis. HALL. hist. 1. n. 950.**Sempervivum foliis radicalibus in globum cængentis ciliatis, propaginibus globosis. ROY. Lugd. 457.**Sedum majus vulgari simile globulis decidentibus. MORIS. hist. 3. p. 472. 2. 12. tab. 7. f. 18.**Sedum vulgari magna simile. BAUH. hist. III. p. 688.**Loc. In montibus di Groscaval. PARENNE.*1940. *SEMPERVIVUM* sediforme. *JACQ. hort. vind. 881. tab. 81.**Loc. Circa S. Jean de Maurienne copiose legi. ANNUM.*

CLASSIS X.

PLANTÆ APETALÆ, EXCEPTIS GRAMINIBUS.

I. FILAMENTIS COALITIS.

EPHEDRA. LINN. *gen. n.* 1007. *yst. n.* 1136.

Flores sexu, & tota planta distincti. Masculo amentum squamis unifloris. Calyx bifidus. Stamina connata antheris tribus superioribus, quatuor inferioribus. Foeminae calyx ex quinque squamis imbricatis. Germina duo, Styli duo. Semina duo, calyce succulento facto comprehensa.

1941 **E**PHEDRA distachya.

Icon. TAUR. Vol. VII. tab. 38.

Ephedra pedunculis appositis, amentis geminis. LINN. *spec. p.* 1472.

Ephedra petiolis maribus repetito ramosis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1664.

Ephedra maritima minor. TOURN. *inst.* 663.

Polygonum bacciferum moritimum minus. BAUH. *pin.* 15.

Uva marina Monspeliensium. LOB. *ic. p.* 796.

Teagum, uva marino circa Monspelium. BARR. *ic.* 731. *n.* 2.

Loc. In agro Nicaensi. *SUFFRUTEX.*

PINUS. LINN. *gen. n.* 956. *yst. n.* 1077. TOURN. *tab.* 355. 356.

Flores sexu in eadem planta distincti. Masculo amentum racemosum. Stamina plura ad basin connata. Foemineo conus imbricatus ex squamis duplicatis, bifloris.

Semina bina, sive nuces duae alatae sub qualibet squamula.

1942 **P**INUS sylvestris.

Pinus foliis geminis primordiolibus solitariis glabris. LINN. *spec. p.* 1418.

Pinus foliis binis convexo-concavis, conis masculis solitariis alaribus. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1660.

Pinus sylvestris. BAUH. *pin.* 492.

Pinus sylvestris Genevensis, & Taeda. BAUH. *hist. l. part. 2. p.* 252.

Pina selvaico. MATTH.

Loc. In sterilibus montanis, & collinis praesertim Liguriae, & Montisferroui. *ARBOR.*

1943. **P**INUS pinea.

Pinus foliis geminis, primordiolibus solitariis ciliatis. LINN. *spec. p.* 1419.

Pinus pinea. SCOP. *Fl. Corn. ed. 2. p.* 248. *n.* 1197.

Pinus sativa. BAUH. *pin.* 491.

Pinus ossiculis duris, foliis longis. BAUH. *hist. l. p.* 248.

Pinus sativa. TOURN. 385. LAM. *Fl. Franc. tom. 2. p.* 200.

Loc. In montibus Comitatus Nicaeensis. *ARBOR.*

VIR. Nuclei PINI edules sunt, ac in ciborum condimentum veniunt. Continent mitem substantiam oleosam, ac aptissimi existunt in debilibus, & effoetis ad vires nervorum instaurandas.

ALLIONI *Fl. Pedem. Tom. II.*

Y y.

1944. PINUS larix.

Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 106.

Pinus foliis fasciculatis obtusis. LINN. spec. p. 1420.

Pinus foliis fasciculatis deciduis. HALL. hist. tom. 2. n. 1658.

Larix. BAUH. pin. 493. LOB. adv. p. 449.

Larix folio deciduo conifera. BAUH. hist. 1. part. 2. p. 265.

Larix. MATTH.

Off. Larix.

VERN. Maleso.

Loc. Ubique in alpinis. ARNOR.

VIR. Omnes PINI species terebratae, & vulsetatae, sponte etiam sua ex hiant, cortice, & exesa ligni materia terebinthinam exstillant. Usitata apud nos terebinthina ex *Larice* profuit, eademque est *terebinthina veneta* dicta. Haec est balsamum liquidum, sive resinoso-oleosa sui generis substantia, quae, praeter oleosas, & crassiores particulas, oleum quoddam aethereum non exigua quantitate continet, atque speciem saponis constituit, cujus virtutes eximiae sunt antisepticae, abstergentes, aperientes, diureticae, & vulnerariae. Extus adhibetur terebinthina ad tumores solvandos, & in suppuratum ciendos, eos nimirum, qui digerentia, ac solventia desiderant. Ulceribus etiam mudandis egregie inservit, partium nutritionem promovet, corruptioni resistit, atque ulcera ad consolidationem optime conducit. Idcirco frequentis, & polychresti usus est apud Chirurgos, plurimumque exterorum remedium praecipuum materiam soppeditat. Internus ejus usus proficuum est in morbis glandularum, asthmate humido, pulmonum infarctibus, ipso incipiente hydropneumoniae pectoris, rheumatismo, podagra, ischiade, internisq; oclebribus. Menses pariter promovet. Verum tunc in hisce recensitis morbis ab ea utilitas est speranda, quando morbus ab haerente muco tenaci, & glutinoso pendet, ac calefacientia, & exstimulancia permittit. Animadverrendum autem est ab ejusdem usu humorum etiam internorum supputationem cieri, & ea propter hanc proprietatem coram oculis semper habendam esse id hujusmodi remedii apratione. Saepius enim curanda est tumorum resolutio, quin suppuratio eveniat. Si vero materies mucosa, reses, una teneat recrementa salina acria, quae commovenda non sint remedio exstimulante, & calefaciente, minime haec erit opportuna. Saepius autem juxta naturam morbi varia alia adjungenda sunt pro diversitate indicationum. Soler ea propter a Medicis in variis morbis utiliter terebinthina conjungi cum gummi ammoniaco, aselis, radice scillae, sulphure, croco orientali, aliisque. Haec remedii species bilem acuit, nocua tis, qui temperamentum biliosi sunt, maximeque iis, quibus bilis acris, falsaque inest. Calefacit, in sanguine aestum gignit, & caput replet; caute idcirco adhibenda, cum quis temperamento sanguineo donatur. Mucum solvit, urinam pellit, atque salina recrementa expedit, acruosaque reddit, proptereaque opportuna esse non solet iis, in quibus est mucus defectus, & morbis tentantur ex salsa destillatione, salive muriatici fusione. Substantia *terebinthinae* vi ventriculi non mutata ad sanguinem pervenit, prompte se se jungit seri particulis, celeriterque ad tubulos renales deferitur violarum odorem lotio impertiens, salina urinae recrementa acuit, mucumque harum viarum aliqua vi abstergit. Diutius ejus usus, urinae profluvium etiam perniciosum infert, atque materiam calcareo-salinam ad tenes deducit. Admodum caute id calculo renum, & vesicae *terebinthina* utendum est; nec eam sine dysuria aegri sustinere plerumque possunt. Perraro etiam aliquod emolumentum dedit in vesicae, & renum ulceribus. Si vero salsa destillatio, aut salinis recrementis nimis onusta urina mucum abarserit, morbumque produxerit, perniciose eadem est. Generatim febris praesentia, pulsumque cita, libera, ac expedita conditio hoc remedium contraindicat. Quod ad podagram attinet, haerentem materiam podagricam in circuitum pellit, fluidioremque reddit, sed radicatus hanc humorum constitutionem non emendat, neque, ut alias jam monuimus, tentanda est similis podagrae curatio. At magnum praesidium in ea positum est ad expedienda minima vasa praesertim pulmonum, si ad eos translata podagrae materies fuerit. In gonorrhoea etiam virulenta magni aestimatur: at ea adhibenda solummodo est, quando jam omnis inflammatio disparuit, tuncque

utilissima ad subsistentem gonorrhææ fluxum promovendum, aut revocandum. In internis crassorum intestinorum ulceribus sæpe Medici imperant clysteres terebinthinam recipientes, qui etiam utiles sunt ad parietes intestinorum blande abstergendos, & liberandos a mucosæ acris tenesmo, & cruciatus inferente. Modus usitator adhibendi est sub forma boli dosi scrupali unius, aut alterius, addito aliquo pulvere ad convenientem boli firmitatem. Licet terebinthina in aqua parum solvatur, si tamen in aqua calente ipsa diu detineatur, & pluries agitando conquassetur, aqua se se onerat activis ipsius particulis. Hujusmodi aqua utilis est ad ulcera abluenda, & exsiccanda, ac intus utiliter adhibetur in iis morbis, in quibus terebinthinam commendavimus, speciatim autem familiaris usus est in morbis glandularum, & mensium suppressione. Oleum æthereum terebinthinæ mirabile comperitur in tendinum, nervorumque vulneribus, & sanguine ex vulneratis partibus profluente sistendo. Perniones, echymoses, ac aedematosos tumores resolvit partibus affricum. Si spina dorsi eo perfricetur, frigus febrium intermittentium promptius dissipatur. Idem præstat, si ejusdem guntæ aliquæ vehiculo instillatæ, tempore febrili propinentur. Prudens olei ætherei terebinthiæ intus exhibitio, magnum calefaciens, antisepticum, resolvens, & diaphoreticum remedium suppeditat, utilissimum in morbis cum torpida perfrigeratione conjunctis, si ea internam inflammationem non subsequatur. Idem oleum multum prodest convenienter adhibitum in ossium carie, molliumque partium corruptione. Colophonia, quæ nihil aliud est, nisi terebinthina in resinam siccam redacta propter extractionem principii præsertim oleosi essentialis, in pulverem redacta utiliter insperguntur ulcera, atque etiam ossa ipsa carie detenta. Lignum PINI, propter diffusam terebinthinæ substantiam, aquæ immersum diu incoaruptum durat, ac virtutes etiam diureticas, diaphoreticas, nec non antisepticas habet. Amenta PINI, quæ strobilorum nomine veniunt, uberem, tenuemque terebinthinam continent, ac magnis laudibus celebrantur in atthritide, & ipso scorbuto. Vires dependent ex teui terebinthinacea substantia, eorumque usus utilis est in ea scorbuti specie, quæ saponacea resolutiva desiderat, & calefacientia permittit. Ex foliis demum *Laricis* transudat in albis minus frigidis substantia *Mannæ* similis, quæ instar mannae alvum movet, & serotos humores evacuat, si dupla dosi exhibeatur.

1945. PINUS cembra.

Pinus foliis quinis laevibus. LINN. spec. p. 1419.

Pinus foliis quinis triquetris. HALL. hist. tom. 2. n. 1659.

Pinus sylvestris montana tertia. BAUH. pin. 491.

Pinus montana. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 651.

Pinus, cui oscula fragili putamine, s. Cembro. BAUH. hist. l. part. 2. 251.

Pino cembro. MATTH.

Loc. In alpinis Canapiciensibus frequens est. In valle Maurianensi passim etiam nascitur secus torrentes locis declivibus. ARBOR.

VIR. Ex incisa arbore fluit resina grati odoris limpida, odore suo balsamum della Mecca referens, quæ virtute excellit præ reliquis terebinthinæ speciebus. Balsamum celebre carpaticum ex hac terebinthinæ specie paratur.

1946. PINUS picea.

Pinus foliis solitariis emarginatis. LINN. spec. p. 1420.

Pinus foliis solitariis planis pectinatis, emarginatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1657.

Abies conis sursum specianibus, s. mas. BAUH. pin. 505.

Abies foemina. BAUH. hist. l. part. 2. p. 231.

Pinus pectinatus. LAM. Fl. Franc. tom. 2. p. 202.

Abies. CAM. epit. 48. 49.

Abete. MATTH.

OFF. *Abies mas.*

Loc. In alpinis, & subalpinis. ARBOR.

1947. PINUS Abies.

Pinus foliis solitariis subulatis mucronatis laevibus biflorum versis. LINN. spec. p. 1421.

Pinus foliis solitariis tetragonis mucronatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1636.

Pinus excelsus. LAM. Fl. Franc. tom. 2. p. 202.

Abies tenuiori folio, fructu deorum inflexo. TOURN. inst. 385. GARID. tab. 2.

Picea major prima, s. abies rubra. BAUH. pin. 493.

Picea latiorum. BAUH. hist. I. part. 2. p. 238.

Abies. DOD. pempt. 866.

PEZZO. MATTH.

OFF. *Abies foemina.*

VERN. *Péra.*

Loc. In Sabaudiae praesertim sylvis subalpinis abunde. ARBOR.

JUNIPERUS. LINN. gen. n. 1005. syst. n. 1134. TOURN. tab. 361.

Flores sexu, & tota planta distincti. Masculo amentum conicum ex squamis pedicellatis, unifloris. Antherae tres ad quinque, filamentis coalitis, aur solutis, etiam squamis adnatis. Foemineo calyx tripartitus, trifidus, ex gemma natus. Germen tribus stylis instructum, calyce incrassato comprehensum evadit bacca trisperma. Petala tria quandoque accedunt.

1948. JUNIPERUS sabina.

Juniperus foliis oppositis erectis decurrentibus, oppositionibus pixidatis. LINN. spec. p. 1472.

Juniperus foliis cauli adpressis lanceolatis, alierne conjugatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1662.

Sabina folio Tamarisci Dioscoridis. BAUH. pin. 487. GARID. oix. tab. 81.

Sabina folio cupressi. BAUH. pin. 487.

Sabina. DOD. pempt. 855.

Sabina baccata. LÖB. adv. p. 447.

Sabina sterilis. CAM. epit. p. 56.

Sabina. MATTH.

OFF. *Sabina.*

Loc. In alpinis rupestribus soli expositis non infrequens. FRUTEX.

VIR. Tota planta fortissimi, & gravis odoris est, aromatici tamen, saporis vero calidi, & acris. Continet principium resinosem aliquid habens terebinthaceae, & insignem olei essentialis maxime acris, & calidi quantitatem. Exstimulat, & valde calefacit: resolvit, & trefaciendo sanguinem fluidiorem facit; aestum in eo gignit, & vasa sanguinea aperit. Tumoribus, ut ajunt, frigidis, aedematosis, atque contusionibus resolvendis inservit, sive in toto, sive in epithemate. Foliorum *Sabinae* pulvis luxuriantes, & spongiosas ulcerum carnes absumit, torpidamque fibrarum actionem erigit. Intus adhibetur *Sabina* ad menses pellendos, & mortuum foetum excludendum. Aptum remedium esse potest iis in casibus, in quibus rarefactio sanguinis timenda non sit, atque arteriarum aucta actio sufficere possit ad vasa uteri aperienda. Non raro vidi ex usu *Sabinae* febrim fuisse excitatam, ac haemorrhagiam uteri subortam fuisse. Scelestae foeminae abortum *Sabina* tentare solent. Si agatur de mensibus promovendis dati utique poterit (si opportuna judicetur) aliquoties *Sabina*, sed ejus generis medicamentum non est, in cujus usu persistere liceat. Dosis foliorum *Sabinae* in pulverem redactorum est a scrupulo uno ad drachmam unam, Drachmarum autem duarum, aut trium pondere ex aqua, aut jure decoquitur.

1949. JUNIPERUS communis.

Juniperus foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. LINN. spec. p. 1470.

Juniperus foliis convexo-concavis aristatis, baccis olaribus sessilibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1661.

Juniperus foliis verticillatis patentibus mucronatis, baccis minoribus nigro-violaceis.

GER. Fl. Galloprov. p. 545. n. 2.

Juniperus vulgaris fruticosa. BAUH. pin. 489.

Juniperus vulgaris, baccis parvis purpureis. BAUH. hist. I. part. 2. p. 293.

2. *Juniperus minor montana folio lottiore, fructusque longiore.* BAUH. pin. 489.

Ginepro. MATTH.

Off. Juniperus.

VERN. *Genévier*.

Loc. In apricis saxosis sylvis, & montanis apricis ubique provenit. FRUTEX.

VIR. JUNIPERUS communis, & *oxycedrus* similes, ac prorsus eximias virtutes habent, multiplicisq; generis collecta principia possident. Maltum salis alkalmi fixi ex iisdem obrinetur, ac gummosa substantia adstringens, & leviter aromatica adest, quae in cortice, ac immaturo fructu evidenter est. Major autem vis posita est in resinoso-oleosa aromatica substantia, quae oleum essenziale largitur. Baccae praesertim in usum Medicum eliguntur. Eae immaturae utique subaromaticae sunt, sed stipiticae, ac acidum ostendunt: at quum ad maturitatem pervenerunt, praebeant pulpam semina continentem, primum ad gustum subdulcem, deinde subamaram, acrem, aromaticam: atque terebinthinaeam substantiam cum oleo etiam essentiali tenent. Baccae hujusce plantae carminativae sunt, tonicae, stomachi fibras corroborant, tenui aromatico principio nervorum gastricorum actionem instantant, succi gastrici vim adaugent, haerentem etiam in stomacho mucum abstergunt. Propterea inter eximia stomachica habetur *rob* baccarum JUNIPERI iis omnibus in casibus, in quibus recensitae adsant indicationes. Maltum omnino prodest in stomachi imbecillitate, quae diuturnas moestias consequitur, plurimumque juvat ad flatus discutiendos, motumque intestinorum peristalticum excitandum, si ex antedictis causis morbus nascatur. Ad sanguinem delatae JUNIPERINAE particulae mucum blande solvunt, actionem vasorum incitant, sanguificationem promoveant, vasa aperiunt, atque urinam peculiariter pellunt. Idcirco ejusdem usus utilis est in leucophlegmatia, cachexia, morbis renum ex mucu lenescente: menses paritet, & haemorrhoides promovet. Quod si validiora tonica, aut efficaciora emmenagoga morbus desideret, eadem solent cum *rob* baccarum JUNIPERI conjungi. Torrefactae baccae JUNIPERI instat granorum *Cassiae* adhibitae non exiguum habent efficaciam ad menses ciendos, ac urinam pellendam. Praesertim autem commendantur ad mucoso-sabulosas congestiones & renibus protrahendas, & evacuandas. Licet autem *rob* baccarum JUNIPERI paulo confidentius uti Medicus possit, eo quod maltum acre aroma non contineat, & terebinthinaea substantia mitior sit, longeque parcius, quam in terebinthina: observatum tamen est nimiam hujusce remedii frequentiam non modo calefacere, sed & caput afficere, neque sine debita circumspectione esse ejusdem adhibitioni insitendum. Oleum essenziale e baccis hujusce plantae elicium proxime accedit ad oleum terebinthinae, plurimosque ex iis, quos recensuimus, usus praebere potest, sed excellere dicitur vi carminativa, nervina instaurante, ac etiam diuretica, atque potest dari aquae convenienti instillatum a guttis sex ad scrupulum unum. Odontalgiam ex carie dentium mitigat, cariemque continet, enecat etiam, atque abigit vermiculos in ulceribus interdum enatos, ita ut susulerit gravem auris dolorem natum ex vermiculis meatus auditorii interiores partes lacerantibus. Spiritus earundem baccarum praesentem habet vim diureticam, ac datur a scrupulo semisse, ad drachmam unam etiam in convenienti vehiculo. Lignum etiam juniperinum suas magnas vires possidet, quum in ligni substantia jam existat magna activorum principiorum pars, quae deinde in baccis colliguntur, diureticum, diaphoreticum, resolvens, antisepticum egregium est, ac ejusdem decoctum utile est in cachexia, rheumatismo, morbis renum, iisque cutis foeditatibus, quae similis naturae medicamenta exposulant. De ligno JUNIPERI traditum est ipsam luem veneream superari, atque *Guajaci* ligno aequiparari posse. Tantas utique vires non tribuo, sentio autem vere utile medicamentum esse ad nonnullos morbos, qui post luem veneream remanent, superandos. In ea cachexia, sive etiam hydrops specie, quae interdum scarlatinae, & morbilli supervenit, (si quidem horum exanthematum malignum miasma sanguini non inhaereat) juvat decoctum hujusce ligni. Hoc decoctum efficacius adhuc diureticum redditur, si cineres ipsius JUNIPERI adjiciantur. Combusta enim haec planta multum salis alkalmi lixivialis praebet, quod instar aliorum lixivialium serum solvit, atque urinas pellit. Ligni hujusmodi dosis est ab uncia semisse ad uncias duas. In calidioribus regionibus vera sandatacha etiam ex his JUNIPERI

speciebus in rimis corticis profluit. Haec gummi-resina vernicis materiam praebet, ulceribusque exsiccandis a Chirurgis inspergitur. Suffitus ex JUNIPERO, maximeque ex ipsis baccis, atque sandaracha combustis, usitatum, & vere utile odoramentum est ad aërem corrigendum occasione febrium putridarum, & pestilentia-
lium. Idem suffusus dissipat leves tumores oedematosos, atque symbolam etiam suam confert in rachitide ad artus imbecillos firmandos.

1950. JUNIPERUS Oxycedrus.

Juniperus foliis ternis patentibus mucronatis, bacca brevioribus. LINN. spec. p. 1470.
GOU. monsp. p. 509.

Juniperus foliis verticillatis patentibus, mucronatis, baccis majoribus rufescentibus. GER.
Fl. Gallopr. p. 544. n. 1.

Juniperus major bacca rufescente. BAUH. pin. 489.

Oxycedrus. CLUS. hist. p. 39.

Oxycedrus phoenicea. DOD. pempt. 853.

Juniperus major monspeliensis. LOB. ic. 223.

Juniperus phoenicea Bellonio, s. *Oxycedrus*, quibusdam *Juniperus major bacca rubra.*
BAUH. hist. I. part. 2. p. 297.

Loc. Ubique in collibus, & sylvis apricis Nicaeensis, potissimum versus Uneliæ.
FRUTEX.

1951. JUNIPERUS lycia.

Juniperus foliis ternis undique imbricatis ovatis obtusis. LINN. spec. p. 1471.

Cedrus phoenicea altera Plinii, & Theophrasti. LOB. ic. 221.

Cedrus folio cupressi media, majoribus baccis. BAUH. pin. p. 487.

Loc. Inter S. Dalmazzo, & Sospello ad rupes. FRUTEX.

1952. JUNIPERUS phoenicea.

Juniperus foliis ternis oblitteratis imbricatis obtusis. LINN. spec. p. 1471.

Cedrus folio cupressi, major, fructu flavescente. BAUH. pin. p. 487.

Loc. Frequens in Comitatu Nicaeensi, & collibus Uneliæ. FRUTEX.

TAXUS. LINN. gen. n. 1006, syst. n. 1135. TOURN. tab. 362.

Flores sexu, & tota planta distincti. Floris masculi calyx est gemma ex squamis saepius quatuor, quarum exteriores duriores sunt. Crassum filamentum carnosum antheras plures angulosas sustinet, breviter petiolatas. Foemineo flori similis squama. Germen receptaculo impositum, stylo vix ullo donatum, evadit semen superne nudum, inferne placenta comprehensum.

1953. TAXUS baccata.

Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 84.

Taxus foliis approximatis. LINN. spec. p. 1472.

Taxus baccifera. HALL. hist. 2. n. 1663.

Taxus. CAM. epit. 840. BAUH. hist. 1. p. 241.

TAXO. MATTH.

Loc. In montanis editioribus sylvis alpium frequens est. Copiosior adhuc in Saubaudia. ARBOR.

II. FILAMENTIS DISTINCTIS

A. JULIFERÆ

SALIX. LINN. *gen.* n. 976. *syn.* n. 1098. TOURN. *tab.* 364.

Flores sexu, & tota planta distincti amentis, singulis squamis florem unum ferentibus. Mari stamina duo ad quinque, & glandula nectarifera in centro flosculi. Foemineo flori germen cum stylis duobus evadit capsula unilocularis, bivalvis, cornuta, semina papposa continens.

FOLIIS SERRATIS

1954. SALIX triandra.

Salix foliis glabris elliptico-lanceolatis serratis, stipulis densatis, julis gracilibus triandris. HALL. *hist.* tom. 2. n. 637.

Salix foliis serratis glabris, floribus triandris. LINN. *spec.* p. 1442.

Salix foliis elliptico-lanceolatis, utrinque glabris serratis appendiculatis. GMEL. *sib.* n. 9. p. 135. *tab.* 34. f. 3.

Loc. In sylvis montanis. FRUTEX.

1955. SALIX caprea.

Icon. TAUR. Vol. VII. *tab.* 33. 34.

Salix foliis ovatis rugosis, subius tomentosis undatis, superne denticulatis. LINN. *spec.* p. 1448. *Flor. Lapp.* 365. *tab.* 8. f. 5.

Salix foliis ovatis rugosis, subius reticulatis tomentosis, julis ovatis, stipulis omplexicaulibus serratis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1653.

Salix foliis ovatis rugosis, subius tomentosis, sursum denticulosis. ROY. *Leyd.* p. 83. n. 6.

Salix foliis stipulosis ovatis, subius tomentosis, filamentis duobus distinctis. SCOP. *Fl.*

Carn. p. 407. ed. 2. n. 1205.

Salix latifolia rotundo. BAUH. *pin.* 474.

Loc. In paludosis locis frequens ubique. FRUTEX.

1956. SALIX pentandra.

Salix foliis serratis glabris, flosculis pentandris. LINN. *spec.* p. 1442. GMEL. *sib.* 1. p. 153. *tab.* 3. 4. f. 1.

Salix foliis glabris ovato-lanceolatis, petiolis glandulosis, floribus hexandris. HALL. *hist.* n. 1639.

Salix folio laureo, 2. lato glabro odorato. RAJ. *hist.* 1420.

Salix spontanea folio amygdalino, fragilis non auriculato. BAUH. *hist.* I. p. 214.

Loc. In montibus Exiliarum, & Fenestrellarum. FRUTEX.

1957. SALIX phylicifolia.

Salix foliis serratis glabris lanceolatis arenis undatis. LINN. *spec.* p. 1442. *Flor. Lapp.* 351. *tab.* 8. f. D.

Loc. In alpinis Fenestrellarum. FRUTEX.

1958. SALIX alba.

Salix foliis lanceolatis acuminatis serratis, utrinque pubescentibus, serraturis infimis glandulosis. LINN. *spec.* p. 1449.

Salix orboreo foliis ellipticis lanceolatis, subius sericeis, demibus crassescensibus. HALL. *hist.* n. 1635.

Salix maxima albo fragilis hirsuta. BAUH. *hist.* II. p. 212.

Loc. Vulgaris secus fluvios, & sylvas subhumidas. ARBOR.

VIR. SALICIS arbor continet principia amara, adstringentia, & attemperantia. Ex amentis florum aqua stillatitia educta frequentem in usum venit in febribus acutis, scopo attemperandi, somnumque conciliandi. Vis stiptica major inest cortici, atque in pulverem redactus dosi drachmae unius repetitis dosibus exhibitus tempore apyrexiae sustulit febres intermittentes. Idem etiam remedium adhibitum est ad fluidam alvum sistendam: hasce autem utilitates afferre videtur principio acido, amaro, quod blande abstergit, atque vitiosam bilem emendat. Contemnendum remedium non est, minime tamen cortici Peruviano aequiparandum. Illud autem commodum ex eo habetur, quod post se relinquere nequeat mala, quae interdum inopportuno corticis Peruviani usum consequuntur.

1599. SALIX viminalis.

Salix foliis integerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. LINN. spec. p. 1448.

Salix foliis praelongis, obscure dentatis, subtus tamentosis, & albicanibus. HALL. hist. 2. n. 1641.

Salix ramis villosis, foliis lineari-lanceolatis subtus tamentosis. ROY. Leyd. p. 84. n. 12.

Salix foliis exstipulatis lanceolato-linearibus dentatis rugosis, infra tamentosis, marginibus reflexis. SCOP. Fl. Carn. p. 410. n. 5. ed. 2. n. 1211.

Salix longifolia. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 232.

Salix folia longissimo. RAJ. syn. 3. p. 450.

Salix fragilis. BAUH. pin. 474. pradr. 159.

Salix foliis angustis, & longissimis crispis, subtus albicanibus. BAUH. hist. I. p. 212. FERN. Sales.

Loc. In arenosis fluminis Chison frequentissimos cespites constituit. FRUTEX.

1560. SALIX vitellina.

Salix foliis serratis ovatis acutis glabris: serraturis cartilagineis, petalis callosis-punctatis. LINN. spec. p. 1442.

Salix sativa lutea tenuiar sativa viminea. BAUH. hist. I. p. 2. pag. 214.

Loc. Ad fluvios, & torrentes locis montanis, & collinis. ARBOR.

1561. SALIX amygdalina.

Salix foliis serratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis tapeziformibus. LINN. spec. p. 1443.

Salix stipulis serratis, foliis lanceolatis serratis glabris. HALL. hist. tom. 2. n. 1636.

Salix spontanea fragilis amygdalina folia auriculata. BAUH. hist. II. p. 214.

Salix folio amygdalino utrinque virente auria. BAUH. pin. 473.

Salix foliis serratis glabris acuminatis appendiculatis. LINN. Flor. Lapp. p. 349. tab. 8.

Loc. In arenosis, & alveis fluminum, & torrentium. FRUTEX.

1562. SALIX hastata.

Salix foliis serratis glabris subovatis acutis sessilibus, stipulis subcordatis. LINN. spec. p. 1443.

Salix foliis serratis glabris subovatis sessilibus appendiculatis. LINN. Flor. Lapp. 354. tab. 8. f. G.

Salix stipulis dentatis, foliis ovato-lanceolatis, glumis avatis pilosis. HALL. hist. tom. 2. n. 1638.

Loc. Secus Padum in sylvestribus collibus, & alibi in submontanis frequens; in monte Cenia non rara. FRUTEX.

Obs. In nostra folia inferiora ramorum obtusiora, subrotunda, omnia petiolata, subtus caesio rore perfusa, glaberrima tamen. Stipulae semiamplexicaules, rotundatae, serratae.

1563. SALIX fragilis.

Salix foliis serratis glabris ovato-lanceolatis, petalis dentato-glandulosis. LINN. spec. p. 1443.

Salix fragilis. BAUH. pin. 474. pradr. 159.

Salix folia amygdalino utrinque virente auria. BAUH. pin. 473.

Loc. In sylvis montanis oritur. FRUTEX.

1964. SALIX helix.

Salix foliis serratis glabris lanceolato-linearibus, superioribus oppositis obliquis. LINN. spec. p. 1444.

Salix manandra foliis glabris lineari-lanceolatis serratis, superne conjugatis, julis tomentos. HALL. hist. tom. 2. n. 1640.

Salix humilior foliis angustis subcinereis, usplurimum sibi invicem oppositis. RAJ. Cantabr. p. 144.

Salix manandra Arduini mem. p. 67. ic.

Salix helice Theophrasti. DALECH. hist. 277.

Loc. Eisdem locis cum amygdalina provenit. FRUTEX.

1965. SALIX myrsinites.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 76. fig. 4.

Salix foliis serratis glabris avasis venosis. LINN. spec. p. 1445. Flor. Lapp. §. 333. tab. 8. f. 7. & tab. 7. fig. 6.

Salix foliis ovato-lanceolatis venosis serratis, julis tomentos. HALL. hist. tom. 2. n. 1645.

Salix pumila alpina myrsinites. PONT. Camp. tab. botanic. p. 149.

Loc. In monte Cenisio, & alpihus Vinadii. FRUTEX.

1966. SALIX arbuscula.

Salix foliis subserratis, glabris subdiaphanis, subius glaucis, caule suffruticosa. GMEL. sibir. vol. 1. p. 166. LINN. spec. p. 1445. Flor. Lapp. tab. 8. f. c. m.

Salix foliis ovato-lanceolatis teneris serratis, stipulis lanceolatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1647.

Loc. In alpihus minime rara. FRUTEX.

1967. SALIX herbacea.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 76. fig. 2.

Salix foliis serratis glabris orbiculatis. LINN. spec. p. 1445. Flor. Lapp. §. 335. tab. 8. f. h. & tab. 7. fig. 3. 4. JACQ. Vind. p. 296.

Salix foliis orbiculatis serratis glabris, julis paucifloris. HALL. hist. tom. 2. n. 1649.

Salix alpina lucida repens, alai rotundo folio. BOCC. mus. p. 19. tab. 1. f. ult.

Loc. BOCCONE reperit in monte Cenisio, sed minime rara in summis jugis alpium frigidiorum. SUFFRUTEX.

1968. SALIX retusa.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 76. fig. 3.

Salix foliis subserratis glabris obovatis obtusissimis. LINN. spec. p. 1445.

Salix foliis glabris ovatis nudentibus, julis paucifloris. HALL. hist. tom. 2. n. 1648.

Salix serpyllifolia. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 255. cum icon.

Salix alpina angustifolia repens non incana. BAUH. pin. 474. prodr. 159.

Salix alpina serpylli folio lucida. BOCC. mus. 2. p. 18. tab. 1.

Salix pumila folia utrinque glabra. BAUH. hist. I. p. 217.

Salix alpina minima repens retuso serpylli folio lucido. BOCC. mus. p. 18.

Salix humilis repens. LOB. adv. p. 423.

Loc. BOCCONE in sterilibus parvi montis Cenisii, & in montibus Sabaudicis nasci tradidit; LOBELIUS praeterea in aliis quamplurimis nostris alpihus reperiri scripsit, atque revera summarum alpium indigena planta est. SUFFRUTEX.

FOLIIS INTEGERRIMIS

1969. SALIX reticulata.

Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 76. fig. 1.

Salix foliis integerrimis glabris avasis obtusis. LINN. spec. p. 1446. Flor. Lapp. 359. tab. 8. f. i. & tab. 8. f. 1. 2. JACQ. Vindob. 296.

Salix foliis rotundis integerrimis subius tomentos, julis gracilibus longe petiolatis. HALL. emend. 3. n. 102. hist. n. 1650.

ALLIONI Fl. Pedem. Tom. II.

A 2 2

Salix pumila folio rotundo integerrimo, julo gracili. HALL. *Helv.* 154.

Salix pumila folio rotundo. BAUH. *hist. II.* p. 217.

Loc. Ubique frequens in summis alpinis. *SUFFRUTEX.*

1970. *SALIX aurita.*

Salix foliis integerrimis, utrinque villosis obovatis appendiculatis. LINN. *spec.* p. 1446.

Salix foliis rugosis reticulatis integerrimis, inferne tomentosis, julis ovatis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1452.

Salix caprea pumila folio subrotundo subius incano. RAL. *syn.* 3. p. 450.

Loc. In alveis fluminum passim adinvenitur. *FRUTEX.*

1971. *SALIX Lapponum.*

Salix foliis integerrimis hirsutis lanceolatis. LINN. *spec.* p. 1447. *Flor. Lapp.* §. 336. tab. 8. f. 1.

Salix pumila foliis utrinque candidantibus, & lanuginosis. BAUH. *pin.* 474. GMEL. *sib.* 1. p. 164. tab. 36. f. 1.

Salix foliis integerrimis ovato-lanceolatis, subius sericeis, julis tomentosis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1642. & *helv.* tab. 14.

Loc. In alpinis Crios Jambon. *FRUTEX.*

1972. *SALIX arenaria.*

Salix foliis integerrimis ovatis acutis, supra subvillosis, subius tomentosis. LINN. *spec.* p. 1447. *Flor. Lapp.* §. 362. tab. 8. f. o. q.

Salix pumila foliis utrinque candidantibus, & lanuginosis. GMEL. *sib.* tom. 1. p. 144. tab. 36. f. 1.

Loc. Non infrequens secus torrentes alpinum. *FRUTEX.*

BETULA. LINN. *gen.* n. 933. *syn.* n. 1052. *TOURN.* tab. 360.

Flores sexu in eadem planta distincti. Flores masculi in amento cylindraceo imbricato; stamina proterea sunt squamula, quae alias accessorias squamulas habet, quatuor in alno, duodecim in *BETULA*. Strobilus foemineus laxè imbricatus ex squamis, quae etiam aliis auctae sunt; sub singula squama germen unicum, aut duo; duplici stylo instructa, quae in nuda abeunt semina.

1973. *BETULA alba.*

Icon. TAUR. Vol. VI. tab. 148.

Betula foliis ovatis acuminatis serratis. LINN. *spec.* p. 1393.

Betula foliis cordato-lanceolatis serratis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1628.

Betula. BAUH. *hist. I. part.* 2. p. 149. *SCOP. Fl. Carn.* p. 413.

Betula. MATTH.

Off. Betula.

Vern. Biola.

Loc. In sylvis subalpinis, non aquosis, frequens admodum. *ARBOR.*

VIT. Non exigui sunt usus, qui ex *BETULA* habentur. Lignum, quod album est, & in nodis rubello pulchro colore variegatum, variis tornatorum operibus inservit. Focum egregie alit, bonumque carbonem praebet. Folia ovibus, & capris in pabulum cedunt. Eadem una cum cortice, & tenellis ramis ad coria firmanda adhibentur. Ex arbore vulnerata antequam folia prodeant, copiosa vena prosilit succi acido-dulcis, qui sapidiore est, si ex superioribus, & mediocribus ramis eliciatur. Hic succus acidae naturae, & fermentescibilis est, ita ut ex eo fermentato cum additione vini, aut fructuum acidorum etiam cerevisia obtineatur. Idem igne inspissatus, & loco frigido repositus deponit sal saccharinum, sive substantiam salinam *Mannae* analogam; si lagena ipse contineatur, & superpositum in officio oleum habeat, per aliquod tempus immutatus servari potest. Saponaceas, solventes, diureticas virtutes habet, ac sine stimulo, impetu, magnaue irritatione, quam plura diuretica habent, urinas pellit. Magni aestimatur in calculo renum pellendo, & hydropè incipiente, com-

mendaturque ad scabiem retropulsam expellendam. Datur duorum ciatorum mensura matutino tempore. In ipso præterea scorbutico suis etiam laudibus elatus est, necnon in cachexia scorbutica, ut ajunt, calida omnino opportunus esse videtur.

1974. BETULA Alnus.

Betula pedunculis ramosis. LINN. spec. p. 1394.

Alnus foliis glabris rotundis, rotunde crenatis, spongiosis ad nervorum angulos. HALL. hist. tom. 2. n. 1630.

Betula alnus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 233.

Alnus. MATTH. DUHAM. arbor 1. tab. 15.

VERN. Verna.

Loc. In sylvis subhumidis, atque ad fossas aquarum vulgarissima. ARBOR.

POPULUS. LINN. gen. n. 996. syn. n. 1123. TOURN. tab. 365.

Flores sexu, & tota planta distincti. Flori masculino squamæ unifloræ, fimbriatæ,

amentum oblongum constituentes; stamina octo brevissima; nectarium corniculatum.

Flori foemineo amentum, squamæ, & nectaria, ut in stamineo; stigma quadrifidum.

Fructus oblongus, trilocularis, bivalvis. Semina papposa.

1975. POPULUS alba.

Populus foliis subrotundis denato-angulatis, subtus tomentosis. LINN. spec. p. 1463.

HALL. hist. tom. 2. n. 1634.

Populus alba majoribus foliis. BAUH. pin. 429.

Populus leuce. BAUH. hist. I. part. 2. p. 160.

Popolo bianco. MATTH.

VERN. Arbron.

OFF. Populus alba.

Loc. In sylvis humectis, & secus flumina. ARBOR.

1976. POPULUS tremula.

Populus foliis subrotundis denato-angulatis utrinque glabris. LINN. spec. p. 1464.

Populus foliis glabris, orbiculatis acuminatis, laxè serratis. HALL. hist. tom. 2. n. 1633.

Populus tremula. BAUH. pin. 429.

Popolo libico. MATTH.

VERN. Terno.

Loc. Ubique in sylvis Taurinensibus, & montanis. ARBOR.

1977. POPULUS nigra.

Populus foliis deltoidibus acuminatis serratis. LINN. spec. p. 1464.

Populus foliis glabris, cordato-rhomboides, serratis. HALL. hist. tom. 2. n. 1632.

Populus nigra. BAUH. pin. 429. BAUH. hist. II. p. 155.

Popolo nero. MATTH.

VERN. Arbra.

OFF. Populus nigra.

Loc. Etiam secus fluentes aquas admodum frequens. ARBOR.

VIR. Gemmæ utriusque POPULI, nigrae nimirum, & albae, primòvere grate odoratae sunt, ac inter digitos pressae dant substantiam resinoso-balsamicam. Hujusmodi substantia spiritu vini extracta odore suo storacem æmulatur. Datur hujusmodi tinctura drachmæ unius pondere cum jusculo in internis ulceribus, atque excoriationibus; mite nimirum demulcens, & balsamicum medicamentum est, quod contumaces alvi fluxus ab excoriatione earum parium sustentatas dicitur sustulisse. Hæc gemmæ nomen dederunt unguento *Populeo*, quod frequenter imperatur ad hæmorrhoidum dolores leniendos. Propolis apum ex hisce etiam gemmis colligitur. Cum pappo seminum chariæ fecit CL. SCHUEFFER.

CARPINUS LINN. *gen.* n. 952. *syn.* n. 1073. *TOURN. tab.* 348.

Flores sexu in eadem planta distincti. Flori masculini amentum cylindraceum; squamæ nlongæ, unifloræ, margine villosæ; Stamina multa. Flori foemineo amentum foliosum, laxum. Squamæ bifloræ. Calyx sexfidus. Ovulum parvulum.

Sylvi duo. Fructus est nux ovata, angulosa, monosperma, intra basim squamæ calycinae concavæ hærens.

1978 **CARPINUS** betulus.

Carpinus squamis strobilorum planis. LINN. *spec. p.* 1416. *HALL. hist. tom. 2. n.* 1627.

SCOP. Fl. Carn. p. 413.

Carpino Matth. *DOD. pempt.* 841.

VERN. Cherso.

Loc. Ad sepes, & hortos magnatum colitur, & in sylvis montanis sponte nascitur.

ARBOR.

CORYLUS LINN. *gen.* n. 953. *syn.* n. 1074. *TOURN. tab.* 347.

Flores sexu in eadem planta distincti. Flori masculini amentum cylindraceum, constans ex squamis trifidis segmento medio latiori, unifloris. Stamina octo, vel plura.

Foeminei Flores in glomeres ad basim juli congesti decem, & ultra, quorum plerique abortiunt. Ovula duabus tubis instructa. Calyx bifidus, lacer cum fructu increscit, & nucem asseam continet laevem, monospermam, nucleo simili foetam.

1979 **CORYLUS** Avellana.

Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 74.

Corylus stipulis ovatis obtusis. LINN. *spec. p.* 1417.

Corylus sepium. *HALL. hist. tom. 2. n.* 1625.

Corylus sylvestris. *BAUH. pin.* 118.

Sylvestris Avellanae. *BAUH. hist. I. part. 1. p.* 269.

Avellana, ossia nucciule. *MATTH.*

OFF. Corylus, s. nux avellana.

VERN. Ninsole.

Loc. Vulgatissima in sylvis agri *Pedemontani*, & montanis humilioribus. *FRUTEX.*

Vir. Ligni carbonēs utiles pictoribus, atque ad pulverem pyrium conficiendum recepti. Nuclei farinosi, edules, sed stomacho graves. Dimidium sui ponderis partem constituit oleum unguinosum, omnis odoris experti, aptum ad odora menta recipienda, & in pictorum usum cedens.

QUERCUS LINN. *gen.* n. 949. *syn.* n. 1070. *TOURN. tab.* 349.

Flores sexu in eadem planta distincti. Masculi flores quasi in amentis laxioribus congesti, filis ex gemmis oriundis, quibus calyx est in quatuor, aut quinque partes divisus.

Stamina 6-10. Foeminae ovula nonnulla filis ex aliis gemmis oriundis adhaerent, stylo 3-fido, aut 5-fido instructa. Calyx in cavam cupulam mutatur, glandem, sive nucem oblongam sustinens nucleo simili foetam.

1980 **QUERCUS** ilex.

Quercus foliis ovato-oblongis indivisis, serratisque, subtus incanis, cortice integro. LINN. *syn.* 12. p. 629.

Quercus foliis ovatis indivisis, subtus tomentosis. *GER. Fl. Galloprov. p.* 530. n. 2.

Ilex oblongo serrato folio. *BAUH. pin.* 424.

Ilex arborea. *BAUH. hist. I. part. 2. p.* 95.

Loc. Sylvarum agri *Nicasensis* indigena. *FRUTEX.*

1981. QUERCUS suber.

Quercus foliis ovato-oblongis indivisis serratis subius tomentosis, cortice rimoso fungoso.
LINN. spec. p. 1413.

Suber lasifolium perpetuo virens. BAUH. pin. 434.

Suber lasifolium. BAUH. hist. I. part. 2. p. 103.

OFF. Suber.

Loc. Habitat in montanis Nicaeae. ARBOR.

VIR. Cortex spongiosus, crassus, mollis, & foraminulosus praestat substantiam sub nomine Natus notissimam, quae commoda obturacula praebet, pedibusque ad humidum atendum subijcitur.

1982. QUERCUS coccifera.

Quercus foliis ovatis indivisis spinoso-dentatis glabris. LINN. spec. p. 1413.

Quercus foliis ovatis sinuato-spinosis, utrinque glabris. GER. Fl. Galloprov. p. 531. n. 3.

Quercus foliis ovatis dentato-spinosis. ROY. Leyd. p. 81. n. 8.

Ilex aculeata Cocci glandifera. BAUH. pin. 425.

Ilex coccigera. BAUH. hist. I. part. 2. p. 106.

Coccus infectoria. LOR. ic. 153.

Loc. In sylvis Nicaeensis varior, quam praecedens. ARBOR.

VIR. Haec porrigit grana Chermes, quae nihil aliud sunt nisi corpora insecti cuiusdam ad peculiarem Coccum referendi, & ad coccineum colorem parandum diligenter collecta. Vis cardiaca, & adstringens iisdem tribuitur, & in confectione alkermes recipiuntur. Cardiaci, aut adstringentis huiusce medicamenti utilitas a Medicis disputatur, ita ut certioribus remediis utendum esse existimemus.

1983. QUERCUS Robur.

ICON. TAUR. Vol. XX. tab. 85.

Quercus foliis glabris semipinnatis, pinnis obtusis, superioribus majoribus. HALL. hist. tom. 2. n. 1626.

Quercus foliis deciduis oblongis superne laevioribus sinubus acutioribus, angulis obtusis.
LINN. spec. p. 1414.

Quercus cum longo pediculo. BAUH. pin. 420.

Quercus cum longis pediculis. BAUH. hist. I. part. 2. p. 70.

Quercia. MATTH.

VERN. Röl.

Loc. Ubique in sylvis. ARBOR.

VIR. Haec est vulgarissima apud nos. Omnes QUERCUM species adstrictotiam vim habent, in tota utique planta diffusam, sed in cortice fortiore, quae poudet ab acido vitriolico, in hoc vegetabili minus mutato. Ad coria firmanda, & nigrum colorem parandum apta est quercina substantia. Gallae, quae foliis innascuntur, tum etiam illa species, quae in periolis excitatur, insectorum opus sunt, ad Cynipis genus pertinentium. Gallae foliorum ad nigrum colorem, & atramentum insignis, & familiaris usus sunt: at opportuniore, quae ex regionibus calidioribus veniunt. Semina quercus, sive glandes substantiam habent farinosam, subadstringentem, sultis saginandis inserviunt, & panem etiam, multum urgente fame, dederunt. Quae priscis hominibus in Graecia panem suppeditabant, ad aliam QUERCUS speciem pertinent: sed certum etiam est spidiore, magisque nutriendas esse glandes QUERCUM calidis in regionibus provenientium. Decoctum glandium, & cupularum torrefactarum commendatum est in calculo renum, & podagra. Cum aliqua stiptica vi abstergant, atque dicuntur non modo tubulos renales expedire, sed vasorum tonum firmare, duplicique hac utilitate podagrae opulari. Nobis hoc remedium in podagra non placet, qui existimamus periculosam maxime rem esse, articulos firmando, podagrae recursus avertere. Propter vim adstringentem, ad febrem intermittentem tollendam, & alvi fluxum cohibendum haec arbor, praesertim fructibus, & cortice, medicamenta dedit, quae nullam habent frequentiam apud Medicos, quum alia minus stomacho gravia, & efficaciora suppetant.

1984. QUERCUS esculus.

Quercus foliis pinnatifidis, lacinii lanceolatis remotis acutis, pinnæ angulatis. LINN. *spec.* p. 1414.

Quercus parva, sive fagus Graecorum, & Esculus. BAUH. *pin.* p. 420.

Loc. In sylvis collium passim. *ARBOR.*

1985. QUERCUS aegilops.

Quercus foliis ovato-oblongis glabris serrato-repandis. LINN. *syn.* 12. p. 630.

Quercus echinatus. LAM. *Fl. Franc.* tom. 2. p. 207.

Quercus calyce echinato, glande majore. BAUH. *pin.* 420.

Cerri glans aegilops. BAUH. *hist.* I. part. 2. p. 77.

Aegilops minore glande. DOD. *pempt.* 831.

Loc. In sylvis calidioribus rarior. *ARBOR.*

1986. QUERCUS cerris.

Quercus foliis oblongis lyrato-pinnatifidis: lacinii transversis acutis: subtus submentosis. LINN. *spec.* p. 1415.

Quercus calice hispido glande minore. BAUH. *pin.* p. 420.

Loc. Frequens in sylvis collinis. *ARBOR.*

FAGUS. LINN. *gen.* n. 951. *syn.* n. 1072. *TOURN.* tab. 351.

Flores sexu in eadem planta distincti. Flores mares in breve amentum congesti.

Calyx 4-fidus. Stamina 5. ad 18. Foeminae, flores nonnulli etiam in breve amentum congesti. Calyx proprius quadrifidus, Seyli tres. Capsula maricata, aut echinata, 2-4-locularis, quadrivalvis. Semina 2-4.

1987. FAGUS Castanea.

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 14.

Fagus foliis lanceolaris acuminato-serratis subtus nudis. LINN. *spec.* p. 1416.

Castanea foliis ovato-lanceolatis serratis, dentibus aduncis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1623.

Castanea sativa. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 1187.

VERN. Castagnè.

Loc. Sponte nascitur in sylvis subalpinis, & in sylvis *Liguriae* ubique copiosissime, data etiam opera colitur. *ARBOR.*

VIR. CASTANEA bonum alimentum suppeditant, sed validum stomachum requirunt.

In imbecillis facile dolorem capitis afferunt: nocent etiam iis, quibus debiles pulmones sunt, aut convenienter non pervii.

1988. FAGUS sylvatica.

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 29.

Fagus foliis ovatis obsolete serratis. LINN. *spec.* p. 1416.

Fagus foliis ovato-lanceolatis, oris undulatis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1622.

Castanea Fagus. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 1188.

Fagus. BAUH. *pin.* 419.

Faggio. MATTH.

VERN. Fò.

Loc. In montanis sylvis frequentissima. *ARBOR.*

VIR. Lignum optimum focum alit, & ex eo praestantior carbonem nostrates alpigenae parant. Semina suspecti usus sunt, atque infensa habentur. Oleum ex iis expressum lampadibus alendis inservit. Foliis FAGI siccatis culcitrae apud eosdem alpicolas repleti solent.

HUMULUS. LINN. *gen.* n. 989. *yst.* n. 1116. TOURN. *tab.* 309.

Flores sexu, & planta distincti. Masculo calyx pentaphyllus. Stamina quinque, amentum nullum. Foeminae amentum ovato-oblongum, involucri tetraphyllo exceptum, squamis compositum, ovatis, imbricatis axi apposis. Styli duo.

Semen sabrotundum, tegmine membranaceo cinctum.

1989 **HUMULUS** lupulus.

ICON. TAUR. Vol. VII. *tab.* 35. f. 1. 2.

Humulus lupulus. LINN. *spec.* p. 1457.

Lupulus. HALL. *hist. tom.* 2. n. 1618. GER. *Fl. Galloprov.* p. 326. n. 1.

Cannabis lupulus. SCOP. *Fl. Carn. ed.* 2. n. 1219.

Lupulus scandens. LAM. *Fl. Franc. tom.* 2. p. 217.

Lupulus mas, & *foemina*. BAUH. *pin.* 298.

Lupulo. MATTH.

VERN. *Luvertin*.

Loc. In dumetis, & ad sepes ubique. *PERENNIS*.

VIR. Tenerae *Lupulorum* summitates primo vere edules; paulo adultior planta amaritatem explicat, quae non placet. Cerevisiam ingredi solet *Lupulus*, ne acescat, dataque opera nonnullis locis colitur ad hunc usum. Strobili hujusce plantae majorem amaritatem habent, ac principium balsamicum ostendunt. In usum autem medicum commendantur non sine ratione strobili, & radix. Principio agunt gummoso-resinoso, abstergente, & saponaceo, nec immerito dicuntur valere ad obstructions reserandas, limphae visciditatem emendandam, cutim aperientiam, menses ciendos, & renes muco, sabuloque expurgandos. Radices *Lupuli* salsaeparillae substituantur, atque adhibentur ab uncia una, ad uncias duas. Extractus datur dosi scrupuli unius.

PISTACIA. LINN. *gen.* n. 982. *yst.* n. 1108. TOURN. *tab.* 345.

Flores sexu, & tota planta distincti. Mari amentum laxum, squamis parvis unifloris.

Calyx quinquefidus parvus. Stamina quinque, minima. Foeminae amentum nullum.

Calyx trifidus. Germen calyce majus. Styli duo, vel tres reflexi.

Fructus est drupa ovata, sicca, monosperma.

1890 **PISTACIA** Terebinthus

Pinacia foliis impari-pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis. LINN. *spec.* p. 1455.

Terebinthus vulgaris. BAUH. *pin.* 400.

Terebinthus. DOD. *pempt.* 871.

Terebinto. MATTH.

OFF. *Terebinthus*.

Loc. In agro, & collibus *Nicaeensis* ubique. Inter *Cartos*, & *Monteu* Provinciae

Aquensis *Ignatii* MOLINERI. *FRUTEX*.

VIR. Ex hac arbore in Insulis *Arcipelagi* profluit *terebinthina* Chia.

1891. **PISTACIA** Lentiscus.

Pinacia foliis abrupte pinnatis, foliolis lanceolatis. LINN. *spec.* p. 1455.

Lentiscus vulgaris. BAUH. *pin.* 399. TOURN. *int.* 580.

Lentiscus. CLUS. *hist.* 1. p. 14. DOD. *pempt.* 871.

Lentiscus verus. LOB. *adv.* p. 412.

Lentisco. MATTH.

OFF. *Lentiscus*.

Loc. In aridioribus, & saxosis collium *Nicaeensium* prope Mare. *FRUTEX*.

VIR. Haec planta in calidioribus regionibus dat *Massichen*.

B. NON JULIFERÆ

1. GYMNOMONOSPERMÆ

HIPPURIS. LINN. gen. n. 11. syst. n. 11.

Calyx nullus. Stamen unicum. Semen unicum. Folia verticillata.

1893 **H**IPPURIS vulgaris.

Icon. TAUR. Vol. XVII. tab. 98.

Hippuris vulgaris. LINN. spec. p. 6.

Linnopence, HALL. hist. tom. 2. n. 1572. VAILL. mém. de l'acad. des Sciences an. 1719. tab. 1. f. 3.

Equisetum palustre linearis scopariae folio. BAUH. prodr. 24. Th. p. 241. brevioribus foliis polyspermum. BAUH. pin. 15.

Polygonum foemina. CAM. epit. 649.

Loc. Ad lense fluentes, aut stagnantes aquas vulgaris. PERENNIS.

SALICORNIA. LINN. gen. n. 10. syst. n. 10.

Calyx integer, ventricosus. Stamen unicum. Semen unicum.

1893 **S**ALICORNIA herbacea.

Salicornia herbacea patula articulis apice compressis emarginato-bifidis. LINN. syst. 12. p. 51.

Solicornia articulis subaequalibus obtusis, internodiis approximatis. GER. Fl. Galloprov. p. 328.

Salicornia geniculata annua, TOURN. cor. 51. SAUV. Fl. Monsp. p. 7.

Salicornia. DOD. pempt. 82.

Kali geniculatum brevius. BAUH. pin. 289.

Loc. Ad maris Nicaeensis litus. ANNUA.

POLYCNUM. LINN. gen. n. 51. syst. n. 53.

Calycis folia quinque, inaequalia, lanceolata, acuta. Stamina tria. Tuba unica. Semen splens, lenticulatum, involucri tenui, sericeo inclusum.

1894 **P**OLYCNUM arvense.

Icon. TAUR. Vol. VII. tab. 50.

Polycnemum. LINN. spec. p. 50. HALL. hist. tom. 2. n. 1570.

Camphorata vaginis spinosis. HALL. helv. 183. emend. 1. n. 22.

JACQ. Fl. Austr. tab. 365.

Polycnemum foliis, stipulisque subulatis. GOU. hort. monsp. p. 24.

Chenopodium annuum humifusum folio breviori, & capillacta. TOURN. inst. 506.

Anthyllis altera Italorum. LOB. 404.

Loc. Ad vias, & in arvis macilentis ubique frequens. ANNUUM.

THESIUM. LINN. gen. n. 258. syst. n. 289.

Semen unicum calyci adnascitur, ita ut segmenta calycis ex summo semine nasci videantur. Segmenta calycis triangularia, quinque, & quatuor, intus colorata.

Stamina tot, quot segmenta floris. Tuba simplex apice globoso.

1895 **T**HESIUM linophyllum.

Thesium calyce bracteis longiore, foliorum nervis decurrentibus. GOU. hort. monsp. p. 118. n. 1.

- Thesium panicula foliacea, foliis linearibus*, LINN. *yst.* 12. p. 188.
Thesium caule erecto paniculato, foliis lanceolatis, HALL. *hist. tam.* 2. n. 1573.
Liniphyllum alpinum latifolium majus, PONT. *anth.* p. 162.
Linaria montana, fasciculis albicanibus, BAUH. *pin.* 113.
Anonymus linifolius, CLUS. *hist.* 1. p. 324.

Loc. In pascuis saxosis umbrosis montanis; provenit etiam in collibus *Taurinensibus*,
 TERRANEUS in aridis collium *Montisferrati*. *PERENNE*.

1996. *THESIUM* alpinum.

- Thesium floribus subsessilibus, pedunculis foliosis, foliis linearibus*. GER. p. 442. n. 2.
 tab. 17. fig. 1.
Thesium racemo foliato, foliis linearibus. LINN. *spec.* p. 301. JACQ. *Vindob.* p. 213.
 Fl. Austr. tab. 416.
Alchimilla alpina linearis folio, calyce florum albo in foliorum alis. TILL. *pis.* 6.
 Loc. In pratis alpium, & saxosis apricis, tum alpinis, tum montanis. *PERENNE*.

STELLERA. LINN. *gen.* n. 439. *yst.* n. 483.

Calyx persistens, monophyllus, infundibuliformis, rubo longo, limbo quadripartito
 segmentis aequalibus. Stamina octo. Semen unicum, rostratum.

1997 *STELLERA* passerina.

- Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 22.
Stellera foliis linearibus, floribus quadrifidis. LINN. *spec.* p. 512.
Passerina. BAUH. *hist.* III. p. 456.
Lithospermum linariae folio, germanicum. BAUH. *pin.* p. 259.
Thymelaea linariae folio vulgaris. TOURN. *inst.* p. 594.
Linaria altero batryoides montano. COL. *ecphr.* 1. p. 82. tab. 80.
Thymelaea orvensis. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 218.
 Loc. Inter stipulas locis praesertim collinis abunde. *ANNUA*.

SLCERANTHUS. LINN. *gen.* n. 497. *yst.* n. 557.

Calyx persistens, semiquinquefidus, segmentis acutis margine coloratis. Stamina decem.
 Semina duo, hinc convexa, inde plana, cum calyce quasi coalita.

1998 *SLCERANTHUS* annuus.

- Icon. TAUR. Vol. X. tab. 66.
Scleranthus calycibus fructus patulis. LINN. *spec.* p. 580.
Scleranthus floribus patulis. HALL. *hist. tam.* 2. p. 255. n. 1551.
Knavei annuum. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 501.
Polygonum gramineo folio majus erectum. BAUH. *pin.* 131.
Alchimilla erecto gramineo folio, minore flore. TOURN. *inst.* p. 508.
 Loc. Locis sterilibus, & sabulosis ab aqua derelictis; tum etiam in arvis maci-
 lemis vulgaris planta est. *ANNUUS*.

1999. *SLCERANTHUS* perennis.

- Scleranthus calycibus fructus clausis*. LINN. *spec.* p. 580.
Scleranthus floris segmentis erectis. HALL. *hist. tam.* 2. p. 254. n. 1550.
Alchimilla supina gramineo folio, minore flore. TOURN. *inst.* p. 508.
Alchimilla graminea folio, majore flore. VAILL. *paris.* 4. tab. 1. fig. 5.
Knavei incanum flore majore, perenne. RAI. *synops.* 3. p. 160. tab. 5. f. 1.
Polygonum minus polycarpon. TABERN. *hist.* 1215.
Polygonum cocciferum. CAM. *epit.* p. 691.
 Loc. In valle *Fenestellarum* non infrequens est. *PERENNIS*.

ALCHEMILLA. LINN. *gen. n.* 153. *syn. n.* 165. TOURN. *tab.* 280.

Calyx octofidus. Stamina quatuor. Stylus unus. Semen unicum, calyce inclusum.

1000 **ALCHEMILLA vulgaris.**

Icon. TAUR. Vol. 1. tab. 134.

Alchemilla foliis lobatis. LINN. *spec. p.* 178.

Alchemilla foliis serratis palmatis seminovemfidis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1566.

Alchemilla floribus monogynis, foliis lobatis. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n.* 174.

Alchemilla foliis lobatis, stipulis foliaceis serratis. GOU. *hort. monsp. p.* 73. *n.* 2.

Alchemilla vulgaris. BAUH. *pin.* 319. GARID. *tab.* 4.

Pes leonis, seu stellaria. BAUH. *hist. II. p.* 398.

Stellaria. MATTH.

Off. Alchemilla, Stellaria, vel Pes leonis.

Loc. In pratis alpinis, & subalpinis ubique abunde. *PERENNIS.*

Oss. Singularem varietatem in alpinis di *Vià* legi, quae habet folia ultra medium in lobos secta, & pubescentia, atque cauliculos humiliores, qui nimirum supra radicalia folia vix effertuntur: fortasse haec erit *ALCHEMILLA pubescens minor.*
Hort. R. Paris.

1001. **ALCHEMILLA alpina.**

Icon. TAUR. Vol. 1. tab. 132.

Alchemilla foliis digitatis serratis. LINN. *spec. p.* 179.

Alchemilla foliis digitatis apice densius sericeis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1567.

Alchemilla foliis digitatis, stipulis membranaceis integerrimis. GOU. *hort. monsp. p.* 73. *n.* 2.

Alchemilla alpina quinquefolii folio subius argenteo. TOURN. *ins. 508.*

Tarmentilla alpina folia sericeo. BAUH. *pin.* 326.

Pentaphyllum, seu potius Heptaphyllum flore mustoso. BAUH. *hist. II. p.* 398.

Pentaphyllum alpinum petrosum minimum. LOB. *adv. p.* 307.

Loc. In siccis pascuis alpinis, & subalpinis vulgaris est. *PERENNIS.*

Vtr. Modice abstergit, & non sine aliquo robore adstringit. Inter vulnerarias locum habet: eminet autem vis adstringens, & virtute sua plurimum convenit cum *Sanicula*. Inrus datur utiliter (si adstringentia locum habeant) in mictu cruento, Leucorrhoea, & alvi fluxu cohibendo. Gargarisma etiam utiliter ingreditur in uvulae relaxatione, ac optime in foru conducit ad partium relaxatarum tonum firmandum. Species herbarum vulneratarum magna ex parte solet consituere. Succus e planta expressus datur ab uncia una ad uncias duas, aut etiam tres. Herba sicca in pulverem redacta praescribitur pondere drachmae unius, aut alterius.

1002. **ALCHEMILLA pentaphyllea.**

Icon TAUR. Vol. VII. tab. 67.

Alchemilla foliis quinatis multifidis glabris. LINN. *spec. p.* 179.

Alchemilla foliis glabris quinatis semimultilobis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1568.

Alchemilla alpina pentaphyllea minima, lobis fimbriatis. BOCC. *mus. 1 p.* 18. *tab.* 1.

Loc. In pascuis, & pratis editorum, & frigidiorum alpinum minime rara est. *PERENNIS.*

APHANES. LINN. *gen. n.* 154. *syn. n.* 166.

Calyx octofidus. Stamina quatuor. Styli duo. Semina duo, calyce inclusa.

1003 **APHANES arvensis.**

Icon TAUR. Vol. I. tab. 135.

Aphanes arvensis. LINN. *spec. p.* 179.

Alchemilla floribus diginis. SCOP. *Fl. Carn. p.* 376. *ed. 2. n.* 175.

Alchemilla minima montana. COL. *ecphr.* 145.

Chaerophyllo nonnihil similis. BAUH. *pin.* 152.

Perchepier Anglorum. LOB. *adv. p.* 324.

Off. Perchepier, sive Alchemilla minima.

Loc. In arvis præcipue montanis, & sabulosis agri *Pedemontani*. *ANNUA.*

VIR. Vires lithontripticæ perperam adscriptæ sunt. Inusitata planta est.

BETA. LINN. *gen. n.* 274. *syst. n.* 307. *TOURN. tab.* 286.

Calyx pentaphyllus. Stamina quinque. Styli duo. Semen intra substantiam baseos calycis.

1004. BETA maritima.

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 40.

Beta floribus geminis. LINN. *syst.* 12. *p.* 196.

Beta sylvestris maritima. BAUH. *pin.* 118. *RAI. angl.* 4. *p.* 127.

Loc. In agro *Nicasensi*. *BIENNIS.*

1005. BETA vulgaris.

Icon. TAUR. Vol. II. tab. 132.

Beta floribus congestis. LINN. *syst.* 12. *p.* 195.

Beta pallide virens major. BAUH. *pin.* 118.

Off. Beta.

VERN. Erbéta.

Loc. Agri *Nicasensis* indigena quoque planta est. *BIENNIS.*

VIR. Notissimum est BETÆ in usum familiarem receptum olus. Plures existunt varietates; frequentiores sunt *alba*, & *rubra*, quæ ex radicis colore suum nomen acceperunt. BETÆ folia nutrientem aliquam substantiam habent, emolliunt, sed insuper aliquid habent stimulantis, & leviter abstergentis. Jusculo hujusce plantæ folia incoquantur, aut etiam ejus succus in jusculo datur, tamquam leve eccoproticum, ad alvum ciendam, quam movet non modo lubricando, sed & leniter stimulando. Folia eadem imposita partibus cuticula denudatis juvant emolliendo, leniterque abstergendo: moderantur etiam ardorem partium inflammatarum in herpete, ac herisipelate; præsertim quando phlyctenæ disruptæ sunt, opportuna est foliorum BETÆ applicatio. Succus foliorum naribus attractus aliquam sternutationem promovet. Radix BETÆ, atque potissimum *rubrae*, minus emollit, principia activa stimulantia paullo uberius tenet, verumque saccharum largitur, quale ex *arundine*, radice *graminis*, aliisque stirpibus potest obtineri. Paullo efficacius abstergit, & aperit, atque inter diureticas radices locum meretur, laudaturque in morbis renum, si initia diuretica desiderentur. Radix *rubrae*, si bene succosa sit, in cibum venit, atque acetaria ingreditur. Ejusdem succo utuntur Medici ad ulcera cancerosa abluenda, ut blande ulcus abstergant, doloremque mitigent. Cancer uteri apertus, qui solet ab omnibus fere remediis injectis exasperari, (quod ad dolorem pertinet) per injectum succum BETÆ *rubrae* ad aliquod tempus mitescit.

CHENOPODIUM. LINN. *gen. n.* 273. *syst. n.* 306. *TOURN. tab.* 288.

Calyx pentaphyllus. Stamina quinque. Stylus unus. Semen lenticulare, calyce sicco involutum.

1006. CHENOPODIUM Bonus Henricus.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 66.

Chenopodium foliis triangulari-sagittatis integerrimis, apicis compositis aphyllis axillaribus.

LINN. *syst.* 12. *p.* 194.

Chenopodium foliis triangularibus undulatis integerrimis rubens farinosis. HALL. *hist. tom.* 2. *n.* 1578.

Chenopodium foliis triangulo-sagittatis alternis: summis subrhomboidis: fructificatione glomerato-racemosa terminali nuda. NEKER. *tom.* 2. *p.* 131.

Chenopodium folio triangulo. TOURN. *p.* 306.

Chenopodium sagittatum. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 244.

Lapathum unctuosum folio triangulo. BAUH. *pin.* 115.

Bonus Henricus. BAUH. *hist. II.* p. 965. TRAG. 317.

Off. Bonus Henricus, s. tota bona.

Loc. Ubique circa domos alpinae. *PERENNIS*.

VIR. Nutrit, & blande emollit, tactu etiam mollis, & unctuosa planta, quæ ab Alpicolis loco spinachiae editur. Usus malvae in ejusdem defectu supplere potest, sed & pleraque CHENOPODII species emolliendi vim habent, licet earum usus negligatur.

2007. CHENOPODIUM urticum.

Chenopodium foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis. LINN. *spec.* p. 318.

Chenopodium latifolium minus ramosum, petiolis longissimis ex foliorum alis confertim nascentibus. BUXB. *hall.* 69. *tab.* 1.

Chenopodium deltoideum. LAM. *Fl. Franc.*, *tab.* 3. p. 249.

Loc. In rudertis, & ad muros. *ANNUUM*.

2008. CHENOPODIUM rubrum.

Chenopodium foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfoliatis, caule brevioribus. LINN. *yst.* 12. p. 195.

Chenopodium foliis glabris nitentibus, acute circumdentatis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1588. *Hort. goet.* 20.

Chenopodium folio laciniato, cama purpurascens. VAILL. *bot. paris.* p. 35.

Atriplex sylvestris latifolia. BAUH. *pin.* 119.

Atriplex dicta pes anserinus. BAUH. *hist. II.* p. 975.

Pes anserinus. DOD. *pempt.* 416.

Loc. Similibus locis occurrit. *ANNUUM*.

2009. CHENOPODIUM serotinum.

Chenopodium foliis deltoideis sinuato-dentatis rugosis glabris uniformibus, racemis terminalibus. LINN. *spec.* p. 319.

Chenopodium foliis glabris trilobatis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1582.

Blitum ficus folio. PETIVER. *tab.* 8.

Loc. In rudertis, & cultis. *ANNUUM*.

2010. CHENOPODIUM album.

Chenopodium foliis rhomboideo-triangularibus erosis postice integris: summis oblongis, racemis erectis. LINN. *spec.* p. 319.

Chenopodium foliis subtus farinosis rhomboideis-dentatis, superioribus integerrimis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1579.

Chenopodium foliis rhombo-triangularibus tuberosis: superioribus lineari-lanceolatis: fructificatione recta, racemo conglomerata. NEKER. *tom.* 1. p. 128.

Chenopodium folio sinuato candicante. BAUH. *pin.* 119. *TOURN. inst.* 506.

Atriplex sylvestris. BAUH. *hist. II.* p. 972.

Loc. In hortis, & arvis frequens. *ANNUUM*.

2011. CHENOPODIUM viride.

Chenopodium foliis rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis. LINN. *spec.* p. 319.

Chenopodium foliis rhomboideis dentatis, subtus incanis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1580. *goet.* 20. *Helv.* p. 175.

Chenopodium candicans. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 248.

Chenopodium sylvestre opuli folio. VAILL. *bot.* 36. *tab.* 7. *f.* 1.

Loc. Vulgatissimum locis cultis, & rudertis. *ANNUUM*.

Obs. Difficile a CHENOPODIO albo sejungi potest.

2012. CHENOPODIUM hybridum.

Icon. TAUR. Vol. XXV. *tab.* 46.

- Chenopodium foliis cordatis angulato-ocuminatis, racemis remotis nudis.* LINN. spec. p. 319.
Chenopodium foliis glabris septangulis, floribus paniculatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1581.
 Hort. Goet. 20.
*Chenopodium foliis subcordatis petiolatis sinuato-angulosis: fructificationibus conglomerato-
 racemosis subnudis.* NEKER. tom. 1. p. 129.
Chenopodium angulosum. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 249.
Atriplex sylvestris major anguloso folio. BARR. ic. 540.
Chenopodium Siromoni folio. VALL. bot. paris. tab. 7. f. 2.
 Loc. Circa habitationes. ANNUUM.

2013. CHENOPODIUM glaucum.

- Icon. TAUR. Vol. XVI. tab. 96. f. 1.*
Chenopodium foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis. LINN.
 spec. p. 320.
Chenopodium foliis oblongis sinuatis, subtus inconis. HALL. hist. tom. 2. n. 1584.
Atriplex angustifolia laciniata. BAUH. hist. II. p. 472. 473.
 Loc. Etiam ad muros nascitur, & in arvis. ANNUUM.

2014. CHENOPODIUM Vulvaria.

- Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 92.*
Chenopodium foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. LINN.
 syst. 12. p. 195.
Chenopodium caule diffuso, foliis obtuse lanceolatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1577.
Chenopodium foetidum foliis farinosis glaucis obtuse rhomboideis. HALL. Helv. 175.
Chenopodium foetidum. TOURN. inst. 506.
Atriplex foetida. BAUH. hist. II. p. 974.
Vulvaria. TABERN. hist. p. 428.
 Off. Atriplex foetida, sive Vulvaria.
 Loc. Ad muros praesertim, locisque maxime meridiano sole percussis. ANNUUM.
 Vir. Foetidissime olens Vulvaria hystericos insultus sedare dicitur, sed propter in-
 tolerabilem, odorem in tanta anthystericonum remedium abundantia hujusmodi
 remedii genus non immerito negligitur.

2015. CHENOPODIUM polyspermum.

- Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 82.*
*Chenopodium foliis integerrimis ovatis, coule decumbente, cymis dichotomis ophyllis oxilla-
 ribus.* LINN. spec. p. 321.
Chenopodium coule erecto, foliis ovatis integris. HALL. hist. tom. 2. n. 1576.
Chenopodium Betoe folio. TOURN. inst. 506.
Blitum polyspermum a seminis copio. BAUH. pin. 118.
Blitum erectius, sive tertium Tragi. BAUH. hist. II. p. 977.
 Loc. Secus hortos, & in locis ruderalis. ANNUUM.

2016. CHENOPODIUM Botrys.

- Icon. TAUR. Vol. XV. tab. 81. f. 2.*
Chenopodium foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. LINN. spec. p. 320.
Chenopodium foliis oblongis semipinnatis viscidis, densibus rotundis. HALL. hist. tom. 2.
 n. 1585. Hort. Goet. 20.
Chenopodium ambrosioides folio sinuato. TOURN. inst. 506.
Botrys ambrosioides vulgaris. BAUH. pin. 138.
Botrys. DOD. pempt. 34.
Botr. MATTH.
 Off. Botrys vulgaris.
 Fern. Mingrana.
 Loc. In arvis macilentis, & calidioribus, apricisque sabulosis torrentium, atque fla-
 minum frequens est. ANNUUM.
 Vir. Nostrates Mingrana vocant, eo quod hemigranae opituletur, ac bibunt infu-

sum theiforme in hemicrasia, & ventriculi imbecillitate. Tota planta paululum acris, amara, & subaromatica est, resinosa ambrosiacam substantiam odore suo patefaciens. Humores solvit, vasa aperit, nervosque etiam instaurat, carminativa est, emmenagoga, plurimumque prodest in asthmate humido, & viscido mucu pulmones infarciens, si praesertim tepide cum adjuncto melle infusum theiforme propinetur.

1017. CHENOPODIUM scoparia.

ICON. TAUR. Vol. XXII. tab. 56.

Chenopodium foliis linearilanceolatis, planis integerrimis. LINN. spec. p. 321.

Linaria scoparia. BAUH. pin. 212.

Oxyris. DOD. pempt. 151.

Loc. In Comitatu Nicaeensi frequenter occurrit, atque a Nostratibus, data opera, colitur. *ANNUUM.*

* 1018. CHENOPODIUM maritimum.

ICON. TAUR. Vol. XXIV. tab. 40.

Chenopodium foliis subulatis semicylindricis. LINN. spec. p. 327.

Chenopodium maritimum annuum glabrum gramineo folio carnosum, & minus acuto, floribus in foliorum alis semine nigra splendente. MICH. hort. florent. p. 25. append. 128.

Chenopodium sedifolia minima facie Kali semine splendente annuum. BOERH. ind. ali. 2. 91. ZANNICH. hist. p. 64.

Kali minus album semine splendente. BAUH. pin. 289.

Kali minus. LOB. ic. 394.

Loc. In agro Nicaeensi. *ANNUUM.*

1019. CHENOPODIUM fruticosum.

ICON. TAUR. Vol. XV. tab. 80. f. 2.

Salsola erecta fruticosa foliis filiformibus obtusiusculis. LINN. spec. p. 324.

Chenopodium maritimum semper virens fruticosum foliis vermiculatis, floribus in foliorum alis semine nigro splendente. MICH. hort. flor. p. 25. append. p. 128.

Kali species vermicularis marina arborescens. BAUH. hist. III. p. 704.

Anthyllis chamaepithydes frutescens. BAUH. pin. 282.

Chamaepithys vermiculata. LOB. ic. 381.

Loc. In solo argillaceo ad maris litus, & secus flumen le Var. *SUFFRUTEX.*

1020. CHENOPODIUM augustanum tab. 38. fig. 4.

Salsola (prostrata) frutescens, foliis linearibus pilosis inermibus. LINN. syst. 12. p. 196.

JACQ. Fl. Austr. tab. 294.

Chenopodium foliis subulatis sericeis, florum glomerulis geminis. HALL. hist. sam. 2. n. 1575.

MUSC. TAUR. tab. 5. p. 93.

Kali hirsuto affinis anthylloidis forte aliqua species. BAUH. hist. III. part. 2. p. 205.

Salsola lignosa ramis filiformibus adscendentibus, floribus canglomeratis-spicatis. LOEFFL. it. 131.

Loc. Nihil vulgatus ad vias, & vinearum margines in valle Augustae Praetoriae, praesertim prope Ciambava, Nus, & Villanova. *SUFFRUTEX.*

ATRIPLEX. LINN. gen. n. 1021. syst. n. 1153. TOURN. tab. 286.

Flores sexu in eadem planta distincti. Mares, & foeminae, atque his etiam quandoque intermixti hermaphroditi. Mares habent calycem quinquefolium; stamina quinque.

Foeminae calycem bifolium, veluti bivalvem, valvis congruentibus, & semen compressum orbiculatum continentibus. Stylus profunde bifidus est.

1021. ATRIPLEX rosea.

ICON. TAUR. Vol. XXII. tab. 68.

Atriplex caule herbacea foliis incanis serosis, fructibus quadrangularibus densatis. LINN. spec. p. 1493.

Atriplex sylvestris fructu roseo compresso. BAUH. pin. 119. prodr. 58.

Atriplex monspesulana cum pulchris involueris. BAUH. hist. II. p. 973. Enum. Nic. p. 108.
Loc. In Comitatu Nicaensi, & Liguria frequens est. *SUFFRUTEX*.

1012. *ATRIPLEX* Halimus.

Atriplex caule fruticoso, foliis deltoideis integris. LINN. spec. p. 1492.

Atriplex fruticosa foliis ovato-triangularibus incanis. HALL. gou. 19.

Halimus fruticosus, s. latifolius. BAUH. pin. 120.

Halimus 1. CLUS. hist. p. 53.

Loc. Ad litus Nicaense. *FRUTEX*.

1013. *ATRIPLEX* laciniosa.

Atriplex caule herbaceo, foliis deltoideis dentatis, subtus argenteis. LINN. spec. p. 1494.

Atriplex maritima laciniosa. BAUH. pin. 120.

Atriplex marina. DOD. pempt. 615.

Loc. Etiam hæc agri Nicaensis indigena planta est. *ANNUA*.

1014. *ATRIPLEX* parula.

Icon. TAUR. Vol. XX. tab. 98.

Atriplex caule herbaceo paulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco dentatis. LINN. spec. p. 1494.

Atriplex foliis imis hamatis, reliquis lingulatis, vasculis seminalibus dentatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1616.

Atriplex annua foliis imis sagittatis, superioribus lingulatis, valvis foemininis dentatis. HALL. hort. gou. 19.

Atriplex caule herbaceo, valvis seminum dentatis. GMEL. sib. 3. p. 67.

Atriplex sylvestris angusto oblongo folio. BAUH. pin. 119.

Atriplex vulgaris angustifolia cum foliculis. BAUH. hist. II. p. 973.

Atriplex selvatico 1. MATTH.

Loc. Secus hortos, & in rudertis. *ANNUA*.

URTICA. LINN. gen. n. 933., syst. n. 1034. TOURN. tab. 308.

Flores sexu distincti, etiam tota planta in quibusdam speciebus. Masculis calyx quadrifidus.
Stamina quatuor elastica cum fructus rudimento. Foeminis calyx bifolius,
semen unicum nudum includens.

1015. *URTICA* pilulifera.

Icon. TAUR. Vol. VI. tab. 149. & Vol. XVI. tab. 7.

Urtica foliis oppositis ovatis serratis, amenis fructiferis globosis. LINN. spec. p. 1393.

Urtica urens pilulas ferens. BAUH. pin. 232.

Ortica 1. MATTH.

Loc. Comitatum Nicaensem incolit. *ANNUA*.

1016. *URTICA* urens.

Urtica foliis oppositis ovalibus. LINN. spec. p. 1396.

Urtica sexubus, sede disjunctis, foliis ovato-lanceolatis serratis, julis oblongis. HALL. hist. tom. 2. n. 1615.

Urtica urens minor. BAUH. pin. 232.

Urtica minor annua. BAUH. hist. III. p. 446.

Urtica minor. LAM. Fl. Franc. tom. 2. p. 194.

Ortica terça. MATTH.

Loc. Secus muros, & in rudertis saepe occurrat. *ANNUA*.

1017. *URTICA* dioica.

Icon. TAUR. Vol. XXIV. tab. 107.

Urtica foliis oppositis cordatis, racemis geminis. LINN. spec. p. 1396.

Urtica stipitibus sexu distinctis, foliis serratis ovato-lanceolatis productis. HALL. hist. tom. 2. n. 1614.

Urtica urens maxima. BAUH. pin. 232.

Urtica vulgaris major. BAUH. hist. III. p. 445.

Urtica alba. MATTH.

VERN. Urtica.

Loc. Vulgaris ad sepes, hortos, & in ruderalis. *PERENNIS.*

VIR. URTICARUM similia principia sunt, similesque vites. Tenerae edules sunt, si decoctae fuerint. Virides tactu, ut notum est, dolentem pruritus cum ustionis sensu excitant tenuissimis, & acutis spiculis, quae dum cutim vulnerant, venenatum quendam succum transfundunt; haec vis perit in exsiccata planta. Vis medicinalis *URTICÆ* dependet a substantia quadam leniter glutinosa, & principio quodam acido cum alkalinis tamen aliquibus, & oleosis particulis conjuncto. Succus expressus, & non deparatus ab uncis duabus ad quatuor datur militer ad sanguinis haemorrhagiam compescendam (quocumque ex loco sanguis profluit) eum in finem, ut glutinoso-acida vi hiantia vasa constringat, glutineque firmet. Licet efficax, validum tamen adstringens non est, ita ut in haemophroe passim adhibeatur. Verum non omni periculo expers medicamentum est in illa haemophroe specie, quae ab acris erodentis humoris actione proficiscitur, cum ea nullius generis adstringentia remedia permittat. Radix evidenter diueticæ est. Semen plus etiam, quam radix, urinam pellere dicitur. Cortex *URTICÆ*, insar cannabis, fili materiam praebet: charta etiam ex eo cortice parata est. Membra denique rorpidæ, atrophica, & paralytica non sine emolumento urticis verberata sunt.

PARIETARIA. LINN. *gen. n.* 1020. *yst. n.* 1152. *TOURN.* tab. 289.

Flores mares, & foeminei in eodem unius plantae racemo. Maribus calyx brevis, profunde quadrifidus. Stamina quatuor elastica cum rudimento fructus. Foeminis calyx quadrifidus, segmentis conglutinis in tubum, semen unicum includentem.

1018 *PARIETARIA officinalis.*

Icon. TAUR. Vol. XXIV. tab. 87.

Parietaria foliis lanceolatis-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus aphyllis. LINN. *yst.* 12. p. 672.

Parietaria foliis elliptico-lanceolatis hirsutis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1612.

Parietaria officinarum, & Dioscoridis. BAUH. pin. 121.

Parietaria. BAUH. *hist. II.* p. 976.

Elxine. MATTH.

Off. *Parietaria*, *Helxine*, *Vitraria*.

VERN. Panataria.

Loc. Ad parietes revera frequens. *PERENNIS.*

VIR. PARIETARIA emollientibus stirpibus accensetur, atque clysmatum, fotum, & balneorum emollientium, una cum *Malva*, & affinis, materiam solet suppeditare. Tenera est substantia *PARIETARIÆ*, neque viscidam illam, mollemque mucilaginem habet. Continet evidenter salem nitrosæ naturæ, ac salem aliquem ammoniacalem. Emollit, attemperat, serumque blande solvit. Excellit ejus usus in morbis renum ad urinam movendam, ac datur succus ab uncis duabus ad uncias tres, aut herba in jussulo leniter decoquitur. Emplastrum *PARIETARIAM* recipiens, ubi impositum, lortii excretionem promovet. In iis morbis, in quibus horraginem commendavimus, opportuna etiam est *PARIETARIA*: sed illa magis glutinosa est, in hac vis solvens efficacior existit.

RUMEX. LINN. *gen. n.* 407. *syn. n.* 446. TOURN. *tab.* 287.

Calyx hexaphyllus, foliolis duorum ordinum, quorum tria exteriora, tria autem interiora, fructum denique includentia. Stamina sex; styli tres; semen unicum trigonum.

Datur species, in quibus sexus est tota planta distinctus.

FLORIBUS HERMAPHRODITIS

1029 **RUMEX** *patientia*.

Icon. *Taur. Vol. VIII. tab. 11. & Vol. XIX. tab. 94.*

Rumex flaribus hermaphroditis, valvulis integerrimis, unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. LINN. *syn. 12. p.* 254.

Lapathum hortense, folio oblongo. BAUH. *pin.* 114.

Hippolapato. MATTH.

Ort. *Rumex hortensis, Lapathum sativum, s. patientia.*

Loc. Ad rivulos aquarum in alpihus di *Viâ* legit FRANCISCUS PETROLERI. *PERENNIS.*

VIR. Quamvis omnes RUMICIS species, quae ad *acetosa lapatha* non pertinent, similes praeterpropter proprietates habeant, haec tamen ea est, quae prae reliquis ad medicinales usus commendatur. Ea igitur, quae dicuntur de vi hujusce speciei, ad alias etiam transferri poterunt. Solent autem huic deficienti substitui *obtusifolius, acutus, crispus, maritimus, & pulcher, aquaticus* etiam, & *alpinus* in similem usum deducti possunt, sed aliquam in sua vi differentiam habent, quae tradetur. Reliquae a nobis commemoratae RUMICIS species ad *acetosam* pertinent, suisque qualitatibus a RUMICE differunt. RUMICIS planta continet principium acidum, salem aliquem alkalinum, tartarum ammoniacalem non sine substantia aliqua oleosa. Acidum principium foliis uberius inest, & in RUMICE *patientia* distinctius adhuc est, quam in foliis aliarum RUMICIS specierum ad *acetosam* non pertinentium. Ex conjunctione horum principiorum emergunt vires activae hujusce plantae, quae sunt antiputridinosae, saponaceae, abstergentes, & aliquantum tonicae, non calefacientes. Vis saponacea abstersens in radice major est, quae solet flavum colorem exhibere. Intestina blande quidem ita exstimulat, ut alvus ex ejusdem usu cieatur. Succus activae plantae ad sanguinem translatus, propter quandam principiorum affinitatem cum bilis elementis facile coalescit, particulas oleosas corruptioni proximas corrigit, lentam bilem abstergit, & stimulo suo, quo actionem vasorum augeat, ad evacuationem propellit. Per circuitum autem sanguinis ad aliarum partium minima vasa delatus, sensim eadem expedit cum lentescentibus humoribus facilius adhaerens, videturque eadem proprietate, quam in bilem hepate contentam exierit, similiter persequi recrementa biliosa resorpta, & minimis vasis cutis haerentia, quae plures contumaces cutis calamitates solent producere. Nulla, ut diximus, inest RUMICI qualitas calefaciens: sine omni aestu humores abstergit, neque vere stipticus est. RUMEX generis characterem proximus est *Rheo*, sed in hoc valida vis tonica, exstimulans, purgans, & calefaciens: caeterum & quandam principiorum similitudinem habent. Folia *Lapathi* ulceribus imposita, eadem blande abstergendo, ad consolidationem perducunt. In jure decocta, aut per expressum succum data alvum modice cient, sed allatas etiam utilitates afferunt. Verum cum ad memoratas indicationes potentiores radices sint, ex iis medela desumitur. Radices ex aqua solent diu decoqui, ut activa dimittant principia, quae viscidiusculo succo inhaerent; ad puritatem usque coctae laudantur impositae partibus scabie, impetigine, herpete detentis, atque unguentum ad scabiem paratur, quod inter reliqua *Lapathi* radices recipit. Idem decoctum utile est iuris datum in recensitis cutis morbis: In ictero etiam, atque hepatis obstructione opportunum est. Tunc autem validiora stimulantia saponacea, aut cathartica solent adjungi. Forti decocto RUMICIS cum emolumento colluuntur ulcera oris scorbuticorum, atque aphtae a bile corrupta, & acri productae, quae in hasce partes impetum fecit. Ad scorbutum plurimum valuisse dicitur RUMEX, & magnis laudibus elatus *aquaticus* est, qui vera herba

Britannica antiquorum esse iudicatur. Alvum movet, corruptosque humores emendat, ac convenit in eo praesentiam scorbuti, in quo corrupta bilis una adest, quam corrigit, & blande ad evacuationem urget. Magni certo adjumenti est externo usu in ulceribus scorbuticorum. RUMEX alpinus proximior est Rhei generi suis qualitatibus; ejus radices loco veri Rhapontici solent officinas ingredi. Potentius, quam aliae RUMICIS species alvum mover. Verum Rhaponticum magis adstringit, quam RUMEX alpinus. RUMICUM radices in decoctione adhibentur ab uncia una ad uncias duas, aut etiam tres. Planum est dosim variam esse debere pro RUMICIS activitate, atque scopo medicamenti aut alterantis, aut purgantis.

2030. RUMEX obtusifolius

Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. LINN. spec. p. 478.

Lapathum foliis ovatis, circa petiolum emarginatis, floribus dense paniculatis dentatis verrucosis. HALL. hist. tom. 2. n. 1592.

Lapathum folio minus acuto. BAUH. pin. 115.

Lapathum vulgare folio obtuso. BAUH. hist. II. p. 984.

Loc. Ad vias, & in pratis agri Pedemontani, locisque rudertatis. PERENNIS.

2031. RUMEX acutus.

ICON. TAUR. Vol. XIII. tab. 57.

Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. LINN. spec. p. 478.

Lapathum petiolo latescens, foliis longe lanceolatis, calyce serrato. HALL. hist. tom. 2. n. 1591.

Lapathum acutum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 443.

Lapathum sylvestre. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 4.

Lapathum folio acuto plano. BAUH. pin. 115. TOURN. inst. 304.

Lapathum acutum, s. Oxylapathum. BAUH. hist. II. p. 983.

Lapathum sylvestre, s. Oxylapathum. DOD. pempt. 648.

Loc. Vulgaris ad fossas. PERENNIS.

2032. RUMEX maritimus.

Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. LINN. spec. p. 478.

Lapathum aquaticum, luteolae folio. TOURN. inst. 304.

Lapathum aquaticum angustissimo acuminato folio. BOCC. mus. 2. p. 143. tab. 104.

Lapathum minus. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 4.

Loc. In agro Nicaeensi. PERENNIS.

2033. RUMEX crispus.

Rumex floribus hermaphroditis, valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. LINN. spec. p. 476.

Lapathum foliis crispis, imis ovatis, supremis lanceolatis, calycibus verrucosis. HALL. hist. tom. 2. n. 1589.

Lapathum folio acuto crispo. BAUH. pin. 115.

Lapathum acutum crispum. BAUH. hist. II. p. 988.

Lapathum crispum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 441. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 3.

Loc. Nascentur ad fossas. PERENNIS.

2034. RUMEX pulcher.

Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, subumica granifera, foliis radicalibus panduriformibus. LINN. spec. p. 477.

Lapathum foliis radicalibus, uerique emarginatis, calycibus reticulatis, ciliatis, verrucosis. HALL. hist. tom. 2. n. 1593.

Lapathum involucro seminis dentato, foliis supra pediculum emarginatis. HALL. helv. 72.

Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum. BAUH. hist. II. p. 988.

Lapathum floribus hermaphroditis, foliis radicalibus lyratis, obtusis, caule ramosissimo.

GER. p. 446. n. 5.

Loc. In agro Pedemontano ad vias vulgaris est. PERENNIS.

1035. RUMEX aquaticus.

Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 83.

Rumex floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis globris acutis.

LINN. spec. p. 479.

Lapathum foliis longe lanceolatis, paniculis densissimis. HALL. hist. tom. 2. n. 1588.

Lapathum aquaticum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 444. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 5.

Lapathum aquaticum folio cubitali. BAUH. pin. 116.

Rumex palustris. TRAG. p. 318.

Hippolapathum. CAM. epist. 232.

Hippolapaso. MATTH.

Loc. Secus lacum di Viviane abunde: secus fluvios, & fossas canalium ex iis deductorum quandoque occurrit. PERENNIS.

1036. RUMEX scutatus.

Rumex floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis, caule tereti. LINN. syst. 12. p. 255.

Lapathum foliis sagittatis, cis mucronem latissimis, hamis rectis divergentibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1594.

Lapathum scutatum. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 6.

Acetosa scutata repens. TRIUMPH. obs. p. 26. cum icon. p. 68.

Acetosa alpina serpegians. ZAN. hist. ven. tab. 87.

Oxalis folia rotundiore repens. RAI. syl. ex. p. 300.

Oxalis rotundifolia. DOD. pempt. 649.

Loc. In montanis, & subalpinis inter congestos mobiles lapides maxime frequens. PERENNIS.

1037. RUMEX digynus.

Icon. TAUR. Vol. VIII. tab. 5. 6.

Rumex floribus hermaphroditis digynis. LINN. spec. p. 480.

Lapathum foliis antice emarginatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1595.

Lapathum acetosum androgynum folia orbiculari emarginato. HALL. helv. 770.

Lapathum digynum. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 6.

Acetosa repens rotundifolia eborracensis folia in media deliquium patiens. MORIS. ox. 2. p. 583. tab. 36.

Loc. In spongiosis umbratis humidis alpium, praesertim ad scrobes humentes. PERENNIS.

1038. RUMEX bucephalophorus.

Icon. TAUR. Vol. XI. tab. 110. & vol. XIII. tab. 68.

Rumex floribus hermaphroditis: valvulis dentatis nudis, pedicellis planis reflexis. LINN. spec. p. 479.

Acetosa ocymi folia Neapolitana. BAUH. pin. 114.

Loc. In arvis, & tabulis in agro Nicoensi, nascitur etiam circa Augustam Praetoriorum. ANNUUS.

FLORIBUS SEXU DISTINCTIS

1039. RUMEX alpinus.

Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 89.

Rumex floribus hermaphroditis sterilibus, foemineisque valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtusis rugosis. LINN. spec. p. 480.

Lapathum foliis obtusis, circa petiolum emarginatis, paniculis dense spicatis, vaginis maximis. HALL. hist. tom. 2. n. 1587.

Lapathum floribus superioribus masculis, inferioribus foemininis, foliis cordatis. ZINN. goet. p. 38.

Lapathum hortense rotundifolium, sive montanum. BAUH. pin. 115.

Lapathum folio rotunda alpinum. BAUH. hist. II. p. 987.

Off. Rhabarbarum monachorum.

Loc. Ubique circa domos alpinas, & in pratis alpium stercoratis. PERENNIS.

2040. RUMEX arifolius N.

Lopanthum sexubus separatis, foliis sagittatis, hamis brevissimis, recta divergentibus.

HALL. *hist. tom. 2. n. 1598.* MISC. TAUR. *tom. 5. p. 94.*

Acetos montana, lato Ari rotundo folio. BOCC. *mus. di. piant. p. 165. tab. 125.*

Loc. In pratis alpium non infrequens est. PERENNIS.

DESCR. Ab *acetosa* differt caule humiliori, foliis non sinuatis, hamis brevioribus subrotundis, folia sunt virentia, lucemia, mollia, triangularia *Boni Henrici* foliis similia. Dioica est; panicula coarctata, ramis simplicibus, plumae strigatum, quae etiam rubent, longiores. Flores mares similes *RUMICIS acetosae* LINNEI, sed majores, antheris magis obaesis.

2041. RUMEX acetosa.

ICON. TAUR. Vol. VII. tab. 4.

Rumex floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. LINN. *spec. p. 482.*

Lopothum sexubus distinctis, foliis sagittatis, homis retrorsum porrectis. HALL. *hist. tom. 2. n. 1597.*

Lopanthum acetosa. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 438.*

Lopothum pratense. LAM. *Fl. Franc., tom. 3 p. 8.*

Acetosa pratensis. BAUH. *pin. 114.*

Oxalis vulgaris. BAUH. *hist. II. p. 989.*

Oxolide, ossio Acetos. MATTH.

n. Oxalis sylvestris maxima. BAUH. *hist. II. p. 890.*

Acetosa monona maxima. BAUH. *pin. 114.*

OFF. Acetosa.

VERN. Arivola.

Loc. Nasctur in pratis ubique: n. in montanis. *PERENNIS.*

VIR. Omnes *acetosae* species viribus conveniunt, grao acido principio scatentes.

Haec in Pharmacopeorum, & culinae usum solet venire. Minus aquosum, & fortius acidum habent *rotundifolius*, & *Acetosella*. Proprietates, quae tributae sunt *oxydi*, sive *trifolio acetoso* officinarum, eae etiam pertinent ad *acetosam* ex huius succo similiter sal essenziale parari potest. In *Acetosae* principium acidum mitius est, quam in *oxyde*. Longe autem frequentius prima adhibetur, eo quod omni fere tempore haberi possit in hortis, & pratis familiaris planta, & quantus quidem potest ad rem esse, succus prompte parari queat. In febribus biliosis, ardentibus, putridis, atque ubicumque adest bilis alkaliescentia corrigenda, aut nimius calor attemperandus, succum *Acetosae* imperant Medici duarum, aut trium unciarum pondere, pluribusque iteratis vicibus, si e re sit, intra nichemerum exhibent. Utilis etiam est in febribus ipsis peticularibus, iisque maxime, quae ex degeneri acri bili nascuntur. Solus interdum succus *Acetosae* sufficit ad febres intermittentes tollendas, quae primo vere, & incipiente aestate nascuntur, & cum aestuante bile conjunctae sunt. Alias hisce in febribus, pro circumstantiarum opportunitate, amara, antiputredinosa adjunguntur. Utile conubium acidorum cum acribus specificis antiscorbuticis jam alias commemoratum est. Frequens autem additamentum acidi medicamenti ex *Acetosae* depromitur. In sanguinis rarefcentia, atque ex hac causa nata haemorrhagia sanguinis multum prodest succus *Acetosae*, quantum quidem licet, copiose exhibitus. Si urinae propter eandem causam, aut nimium sanguinis attritum, aut actionem septicæ substantiae, cohaesionem sanguinis destruens, parce in renibus secretæ futuri hydrops metum faciant, *acetosa* etiam valde utilis est, sed ubi expedit lotii secretionem promovere, radices *acetosae* praefertuntur, quae praeter acidum tenent etiam aliquam majorem salis alkalini fixi quantitatem. Data etiam opera, mitia, non acria, neque calefacientia diuretica ipsi *acetosae* adjunguntur, si Medicus praecise jam debeat serum ad renes deducere. Ex his omnibus, quae nunc dicta sunt, jam apparebit, & in ipso alvi fluxu dysenterico, mensibusque nimium fluentibus succum *Acetosae* accommodatum, & opportunum medicamentum esse posse.

1042. RUMEX tuberosus.

Rumex flaribus diaicis, foliis lanceolato-oblongis sagittatis, hamis patentibus. LINN. *syn.* 12. p. 255.

Acetosa tuberosa radice. BAUH. *pin.* 114.

Oxalis tuberosa. DOD. *pempt.* 649.

Loc. In pratis agri *Nicaeensis.* *PERENNIS.*

1043. RUMEX acetosella.

Rumex flaribus diaicis, foliis lanceolato-hastatis. LINN. *spec.* p. 481.

Lapathum sexubus separatis, foliis sagittatis, hamis ovatis recurvis. HALL. *hist. tam.* 2. n. 1556.

Lapathum acetosella. SCOP. *Fl. Carn. ed.* 2. n. 439.

Lapathum arvense. LAM. *Fl. Franc. tam.* 3. p. 8.

Acetosa arvensis lanceolata. BAUH. *pin.* 114.

Oxalis parva auriculata repens. BAUH. *hist. II.* 992.

2. *Acetosa arvensis minima non lanceolata.* BAUH. *pin.* 114.

Oxalide minare. MATTH.

Loc. In agris, & pascuis sabulosis. *PERENNIS.*

1044. RUMEX multifidus.

Icon. TAUR. Val. XXVIII. tab. 74.

Rumex flaribus diaicis, foliis hastatis, auriculis hastatis. LINN. *syn.* 12. p. 255.

Acetosa minor foliis multifidis. Ejusdem BOCC. *mus. par.* 2. tab. 126.

Loc. Circa *Nicaeam*, & *Villafranca* ad rupes. *PERENNIS.*

DESCR. Habitus *Acetosae pratensis* etiam dioicus est: foliis evidenter differt, quae firmiora sunt, angustiora, longius petiolata, margine crispo, & revoluta, etiam sinuato; Rami vero duplicati sunt, atque inflexi. Rami floriferi magis divaricati, neque subrecti, breviores. Sapor acidus.

POLYGONUM. LINN. *gen. n.* 445. *syn. n.* 490. *TOURN. tab.* 290. 291.

Calyx coloratus profunde quinquefidus, segmentis ovatis. Stamina a quinque ad octo.

Stylus 1. 3. Semen trigonum, nudum.

1045. POLYGONUM bistorta.

Icon. TAUR. Val. X. tab. 40.

Polygonum caule simplicissima manastachya, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. LINN. *spec.* p. 516.

Polygonum radice lignosa cantaria, spica ovata, foliorum petiolis alatis. HALL. *hist. tam.* 2. p. 1559.

Polygonum flaribus digynis actandris, foliis caulibus cordato-lanceolatis, semine triquetra. SCOP. *Fl. Carn. p.* 421. n. 2.

Bistorta major radice magis intarta. BAUH. *pin.* 192.

Bistorta media folia minus rugosa. BAUH. *hist. III.* p. 539.

Polygonum simpliciter spica terminatum, foliis imis appendiculatis, seminibus triquetris. GMEL. *sub.* 3. p. 40.

2. *Bistorta radice minus intarta.* BAUH. *pin.* 192.

Bistorta. MATTH.

Off. Bistorta major.

Loc. Ubique in pratis subalpinis, & alpinis, praecipue irriguis. *PERENNIS.*

VIR. Multum acidum tenet *bistorta*, quod longe uberius est in radice coacervatum, ac gummosae substantiae inhaeret decoctione extrahendum. Radices hujusce plantae, natura, & viribus suis omnino cum radice *Tarmentillae* conveniunt; valide adstringunt, fibrarum nexum firmant, atque opportuna sunt iis in morbis, in quibus commendata est radix *Tarmentillae*. Animadvertimus etiam in hujusce validi adstringentis usu similes cautelas clinicas esse servandas. Radix *Bistortae* amaris,

antisepticiis, abstergentibus, aut stimulantibus aromaticis etiam adjicitur non sine evidenti utilitate iis in febris corruptivæ indolis, in quibus eodem tempore & vis vitæ est excitanda, aut instauranda, humores sunt in circuitum pellendi, & collabascens massa humorum in sua cohesione sustinenda. Haec autem indicatio saepius occurrit in febris quibusdam mali moris, quæ non superantur, nisi veniat criticus sapor quo motu perpetuo naturam avocet alvi fluxus symptomaticus. Radix eadem in pulverem redacta praescribitur a drachma semisse ad drachmam unam, vel duas, in decocto a drachmis duabus ad drachmas sex, aut etiam ad unciam unam.

1046. **POLYGONUM viviparum.**

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 11. 12. 13. 14. f. 2. 3. 4.

Polygonum caule simplicissimo monostachyo, foliis lanceolatis. LINN. spec. p. 516.

Polygonum radice lignosa comorta, foliis nervosis radicalibus ovato-lanceolatis, caulinis linearibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1558.

Polygonum floribus iriginis octandris apicatis, foliis caulinis lanceolatis, semine subrotundo. SCOP. Fl. Carn. p. 422. n. 3. ed. 2. n. 470.

Binoria alpina media. BAUH. pin. 192.

Binoria minimo. BAUH. hist. III. p. 539.

Loc. In pratis, & pascuis alium etiam editissimis obique frequens. **PERENN.**

1047. **POLYGONUM amphibium.**

Icon TAUR. Vol. XVI. tab. 99.

Polygonum floribus pentandris semidigynis, spica aversa. LINN. syn. 12. p. 275.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis ciliatis, spicis ovatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1565.

Potamogeton salicis folio. BAUH. pin. 193.

Loc. Vulgare ad lacus est. **PERENN.**

VIR. **POLYGONUM** amphibii radices, incidentes, abstergentes, saponaceas virtutes salsaeparillae aemulas possidere scripserunt *Cl. Viri* COSTE, & VILLEMET. Ex propria experientia nihil dicere possum.

1048. **POLYGONUM persicaria.**

Icon TAUR. Vol. XXIII. tab. 95.

Polygonum floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. LINN. spec. p. 518. SCOP. Fl. Carn. p. 420. n. 1.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis subhirsutis, spicis ovatis, vaginis ciliatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1557.

Persicaria mitis maculosa, & non maculosa. BAUH. pin. 101.

Persicaria mitis. BAUH. hist. III. p. 779.

Persicaria. MATTH.

OFF. *Persicaria mitis.*

Loc. Locis umbrosis, & ruderalis. **ANNUUM.**

VIR. Licet manifeste acida sit, non omnis tamen acrimoniae experta est, atque aliquam etiam amaritatem explicat. In usum venit, & suis etiam laudibus celebratur propter qualitates cum aliqua adstrictoria vi abstergentes, incidentes, & aperientes. Extas *Persicariae* folia ulceribus cum utilitate apponuntur. Eiusdem succus, aut decoctum laudatur in viscerum obstructionibus, sed non admodum activum deobstruens est, neque cum Saponaria, aliisque stirpibus comparandum. Utiliter interim apozemata, quæ hunc in finem praescribuntur, ingredi potest. Antiscorbuticis etiam praesidiis non sine utilitate pariter adjicitur, ut lenti humores abstergantur, ac solvantur. Ad sanguinem, ut ajunt, depurandum in vitiis chronicis cutis symbolam etiam suam confert cum aliis apertis vegetabilibus. Speciatim succus *Persicariae* datur ab uncis duabus ad uncias tres, aut quatuor ad renes mucososalubulosa congestione liberandos, calculumque sine aestu, ac magna irritatione expellendum.

1049. **POLYGONUM alpinum** tab. 68. fig. 1.

Icon. TAUR. Vol. III. tab. 10.

Polygonum caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis spicis paniculatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1564. MISC. TAUR. tom. 5. p. 94.

Persicaria alpina persicæ folio, non maculoso flore albo Campi. SPICILEG. p. 19.

Persicaria alpina folio nigricante, floribus albis. BOCC. mus. di plant. tab. 27. SPEC. PEDEM. p. 41. tab. 8.

Persicaria alpina altera saxatilis, foliis durioribus acutis. BOCC. mus. di plant. p. 108. tab. 83.

Polygonum spicis paniculatis, dense conspatis, floribus octandris trigynis, foliorum lanceolatorum vaginis hirsutis. GMEL. sibir. 3. p. 56. tab. 10.

Loc. In pratis alpium, & ad earum convalles minime rara est. PERENNE.

VIR. Cum minori acrimonia superiori acidior est. CL. Bartholomæus CACCIA meus olim Praeceptor in dysenteria cum emolumento adhibuit.

1050. POLYGONUM Hydropiper.

Icon. TAUR. Vol. XXIII. tab. 96.

Polygonum spicis strigosis laxis foliis lanceolatis, seminibus obtuse triangulis, vaginis debilibus. GMEL. sibir. 3. p. 50.

Polygonum floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submucicis. LINN. spec. p. 517.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis, spicis florigeris, vaginis solvis urancois. HALL. hist. tom. 2. n. 1554.

Polygonum floribus digynis hexandris, foliis lanceolatis. SCOP. Fl. Carn. p. 410. n. 1. ed. 2. n. 467.

Polygonum acre. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 234.

Persicaria urens, sive Hydropiper. BAUH. pin. 101.

Persicaria acris, sive Hydropiper. BAUH. hist. III. p. 780.

Idropepe. MATTH.

OFF. *Persicaria urens*, s. *Hydropiper*.

VERN. Erba brusa.

Loc. Ad fossas abunde. ANNUUM.

VIR. Tanta lingue acrimoniam imprimit, ut eam urere videatur. Succum expressum ab uncia una ad uncias duas in juscule dedi sine incommodo in hydropo, ac vidi copiosiores, & limpidiores urinas effluxisse. Potenter humores incidit, atque acidia, praesertim vegetabilibus, adjunctum etiam in ipso scorbuto non contemnendum mihi remedium videtur.

1051. POLYGONUM strictum N. tab. 67. fig. 1.

Icon. TAUR. Vol. XVI. tab. 107. & Vol. XVIII. tab. 58.

Polygonum spicis interruptis rarissimis, foliis ex lineari-lanceolatis, seminibus obtuse triangulis. GMEL. sibir. 3. p. 49.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis glabris, spicis strigosis vaginis ciliatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1555. MISC. TAUR. tom. 5. p. 94.

Persicaria pusilla repens. LOB. ic. 316.

Persicaria pumila. TABERN. hist. p. 858.

Polygonum (minus) floribus hexandris digynis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis, eoules divaricato patulo. HUDS. fl. angl. p. 148.

Persicaria angustifolia. BAUH. prodr. 43.

Loc. In fossis semper humentibus, tum ad stagnorum margines minime rara: ad lacus vero *Eporedianse* abunde. ANNUUM.

DESCR. Caules rotundi, ex viridi rubentes, parum ramosi, procumbentes. Folia alterna ex vagina ciliata, geniculi nodosi, folia subtus pallidiuscula, supra intense viridia, petiolata, petiolo dilatato amplexicauli, nervo foliorum albicante. Glabra tota planta est, foliorum ora subtilissime serrulata. Sapor nullus. Flores spicati ex duobus, aut tribus floribus subsessilibus, vagina exceptis, eaque ciliata. Color floris intus albus, extus purpureus, petalis ovatis quinque. Scamina quinque, petalis breviora. Styli duo.

1052. POLYGONUM Bellardi † tab. 90. f. 2.

Polygonum erectum floribus axillaribus octandris trigynis, foliis elliptico-lanceolatis, vaginis ciliatis.

Loc. In arvis inter *Bussolino*, & *Bardassan* primo vere florens. *ANNUA.*

DESCR. Ex radice, alba, tortuosa parum fibrosa erigitur haec *POLYGONI* species ad duorum, & ultra pedum altitudinem, caule erecto firmulo, glaberrimo, striato, rotundo. Caulis pluries per alternam dichotomiam dividitur. Rami omnes florigeri floribus subsessilibus alternis. Folia elliptico-lanceolata, sed in ramis linearia acuto sine etiam aristato, glaberrima sunt, nervo subtus eminente, breviter petiolata, internodia sunt foliis duplo longiora. Folia floribus subjecta continuo breviora sunt, & subsessilia, caeterum similia, solet autem ramus interdum ab uno ad alium florem angulose flecti. Flos primum albus, sed per aetatem roseus ex petalis quinque. Stylus trifidus. Stamina octo. Flos brevissime pedunculatus, saepius solitarius, sed interdum bini, aut tres adsunt. Semen trigonum, marurum corolla majus, rufescit. Vagina argenteo colore nitens ad basim fusca in ore lacera, & resecta, caulem, atque petiola foliorum amplectuntur.

1053. *POLYGONUM* aviculare.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 58. & Vol. XXII. tab. 57.

Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, coule procumbente herbaceo. LINN. spec. p. 519. GER. Fl. Galloprov. p. 447. n. 1.

Polygonum procumbens foliis linearibus, acutis floribus solitariis. HALL. hist. tom. 2. n. 1560.

Polygonum caule herbaceo annuo. BOHEM. Fl. Lips. p. 245. n. 589.

Polygonum floribus subsolitariis, in alis foliorum sessilibus, stominibus octo. GMEL. sib. 3. p. 40.

Polygonum ceminodium. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 237.

Polygonum latifolium. BAUH. pin. 281.

Polygonum, seu ceminodia. BAUH. hist. III. p. 377.

B. *Polygonum brevi, angustoque folio.* BAUH. pin. 281.

Polygonum mauchio. MATTH.

Off. *Polygonum*, s. *Ceurinodia*.

VERN. Erba rabloira.

Loc. Ad vias, & rudera frequentissime occurrit. *ANNUUM.*

VIR. Saporis est herbacei, sed ramen stripti. Inter stirpes adstringentes & suum locum meretur, licet valide non adstringat, viribus adstringentes etiam attemperantibus adjungit, atque in alvi fluxu etiam bilioso coëscendo adhibetur, quia bilis acrimonia eodem tempore emendat. Opportunum etiam est in mensium immodico fluxu, alboque fluore mulierum, si adstringentibus locus sit. Facilius autem huic plantae locus esse potest, eo quod ad valida adstringentia, quae saepe non sine periculo imperari possunt, *ceminodio* non sit referenda. Praescribitur ex aqua decocta, aut ejusdem succus ab uncis duabus ad uncias tres, aut quatuor.

1054. *POLYGONUM* maritimum.

Icon. TAUR. Vol. XXVII. tab. 68.

Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ovuli-lanceolatis sempervirentibus, coule frutescente. LINN. spec. p. 519.

Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, coule procumbente, suffruticosa. GER. Fl. Galloprov. p. 448. n. 2.

Polygonum maritimum latifolium. BAUH. pin. 280.

Polygonum maritimum. BAUH. hist. III. p. 376.

Loc. In arvis, & sabulosis agri *Nicotensis.* *SUFFRUTEX.*

VIR. Fortius adstringit, quam aviculare, cum minus aquosa, dilutaque activa principia habeat.

1055. *POLYGONUM* convolvulus.

Polygonum foliis cordatis, caule volubili angulato floribus obtusis. LINN. syst. 12. p. 276.

Polygonum caule volubili, foliis sagittatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1561.

Polygonum floribus trigynis, octandris, lateralibus planiusculis, caule volubili, semine triquetro. SCOP. *Fl. Carn.* p. 423. n. 5. ed. 2. n. 469.

Fagopyrum vulgare scandens. TOURN. *inst.* 511.

Polygonum convolvulaceum. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 239.

Convolvulus minor semine triangulo. BAUH. *pin.* 294.

Helxine semine triangulo. BAUH. *hist.* II. p. 157.

Loc. In arvis, & ad sepes abunde. *ANNUUM.*

2. ANGIOSPERMÆ

FLORIBUS HERMAPHRODITIS

HERNIARIA. LINN. *gen.* n. 272. *syn.* n. 305. TOURN. *tab.* 288.

Calyx quinquepartitus. Scamina decem, quinque fertilibus. Tubi bifida. Capsula monosperma.

2056. *HERNIARIA glabra.*

Icon. TAUR. Vol. VII. tab. 86.

Herniaria glabra, glomerulis multifloris. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1552.

Herniaria glabra. LINN. *syn.* 12. p. 194. *Hort. Cliff.* 41. HALL. *helv.* 182.

Herniaria glabra herbacea. LINN. *spec.* p. 317. BAUH. *hist.* III. f. 378.

Polygonum minus, s. Mellegrana major. BAUH. *pin.* 281.

Herba turca. LOR. p. 180.

Amhyllis valentina Clusii. LOR. *ic.* 421. obs. 230.

Poligono minore. MATTH.

Off. Herniaria, s. Herba turca.

Loc. Ubique in glareosis aridis, & saxosis, praesertim collinis. *ANNUA.*

VIR. *HERNIARIÆ* nomen profectum est ex ea virtute, quam hoc vegetabile dicitur habere ad herniæ sanationem, sive intus detur, sive extrinsecus applicetur. Licet vis major adstringens, & tonica ab aliis medicamentis obtineri possit, scripticum tamen principium inest *HERNIARIÆ*, illudque cum aliqua vi stimulante, & abstergente conjunctum. Eas igitur utilitates, quas extrinsecus applicitæ dare possunt plures adstrictoriae stirpes, praebere potest *HERNIARIA*. Peculiariter laudatur, ac adhibetur ad urinas pellendas, laxitatem vasorum renalium tollendam, renesque sabulo expurgandos; eodem nimirum tempore principio scriptico rouum fibris addit, serum solvit, mucumque blande abstergit. Solet adhiberi decoctum totius herbae dosi manipuli semissis, aut unius. Indiscriminatim ad usum recipiuntur *glabra*, & *hirsuta*.

2057. *HERNIARIA hirsuta.*

Herniaria hirsuta. LINN. *syn.* 12. p. 194.

Herniaria hirsuta glomerulis paucifloris. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1553.

Poligono minore. MATTH.

Loc. In aridis montanis soli expositis: frequentior adhuc in Comitatu *Nicaeensi*, & *Liguriæ*. *PERENNIS.*

Obs. Distinguenda a priori non modo foliis totis hirsutis, confertioribus, sed praesertim radice bienni.

2058. *HERNIARIA lenticulata.*

Herniaria suffruticosa foliis ovato-oblongis pilosis. REICH. *syn.* pl. 1. p. 617.

Polygonum minus lentifolium. BAUH. *prodr.* p. 131.

Polygonum maritimum longius radicatum nostras serpilli folio crasso nitente. PLUK. *alm.* 302 tab. 53. f. 3.

Loc. In apricis collibus, ac etiam ad vias secus sabulosa fluminum occurrit, superioribus longe rarior. *PERENNIS.*

ILLECEBRUM. LINN. *gen. n.* 256. *syn. n.* 287. TOURN. *tab.* 288.

Calyx pentaphyllus, cartilagineus. Stamina quinque. Stylus unus. Capsula monosperma.

1059 ILLECEBRUM Paronychia.

Illecebrum floribus bracteis nitidis obvallatis, caulibus procumbentibus, foliis laevibus.

LINN. *syn. n.* 12. p. 187.

Polygonum minus candicans. BAUH. *pin.* 281.

Paronychia argentea. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 230.

Loc. In sterilibus Comitatus Nicaeensis. PERENNE.

1060. ILLECEBRUM capitatum.

Illecebrum floribus bracteis nitidis occulantis capitula terminalia, caulibus erectiusculis, subtus villosis. LINN. *syn. n.* 12. p. 187.

Paronychia garbonensis erecto. TOURN. *inst.* 508.

Paronychia capitata. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 229.

Polygonum montanum, niveum, minimum. LOR. *ic.* 420.

Loc. Non modo in agro Nicaensi, sed etiam in locis arenosis montanis, & sub-alpinis calidioribus, uti in valle Augustae Praetoriae, Segusii, in valle Utiensi, Fenestellarum &c. provenit. PERENNE.

ORTEGIA. LINN. *gen. n.* 49. *syn. n.* 51.

Calyx pentaphyllus. Stamina tria. Stylus unus. Capsula unilocularis, trivalvis, polysperma.

1061 ORTEGIA dichotoma.

Icon. TAUR. Vol. 19. *tab.* 54.

Ortega dichotoma, axillis ramorum unifloris. MISC. TAUR. tom. 3. p. 176.

Ortega floribus solitariis, caule dichotomo. LINN. *man. ult.* p. 174.

Loc. Nascentur circa Gioveno. PERENNIS.

CAMPHOROSMA. LINN. *gen. n.* 152. *syn. n.* 164.

Calyx quadrifidus segmentis alternis majoribus reflexis. Stamina quatuor.

Stylus bifidus. Capsula monosperma.

1062 CAMPHOROSMA monepeliaca.

Icon. TAUR. Vol. XVIII. *tab.* 21.

Camphorosma foliis hirsutis linearibus. LINN. *spec. p.* 178.

Camphorata foliis lanceolatis hirsutis ciliatis, glomerulis florum laxè spicatis. ZINN.

Gott. p. 36.

Camphorata caulibus adscendentibus romosis, foliis alternis linearibus. GMEL. *Sib.* 3. p.

116. n. 92. *tab.* 22.

Camphorata hirsuta. BAUH. *pin.* 486.

Loc. In arenosis, & aridis agri Nicaeensis, praesertim inter Villafranca, & la Lanterne.

SUFFRUTEX.

VIR. CAMPHORAM olet tota planta, atque inde nomen habuit. Acris, calefaciens, extimulans est, sale volatili oleoso repleta. Ejusdem infusum prodest in asthmate humido, leucophlegmatia, aliisque morbis, in quibus opportunum pituitam solvere, lotii vias aperire, & sanguinis actionem instaurare. Dosis est ab uncia semisse ad unciam unam, & semis.

GLAUX. LINN. *gen. n.* 257. *yst. n.* 288

Calyx quinquefidus, coloratus. Stamina quinque. Stylus unus. Capsula unilocularis, quinque-valvis, pentasperma.

1063 GLAUX maritima.

Glaux maritima, LINN. *spec. p.* 301.

Glaux maritima, BAUH. *pin.* 215.

Glaux exigua maritima, BAUH. *hist. III. p.* 373.

Loc. In agro Nicaeensi lectam habeo. PERENNIS.

SALSOLA. LINN. *gen. n.* 275. *yst. n.* 308. TOURN. *tab.* 128.

Calyx profunde quinquefidus, quodammodo coloratus, persistens. Stylus simplex semibifidus. Stamina quinque. Capsula globosa. Semen unicum, coeleforme.

1064 SALSOLA Kali.

Icon. TAUR. Vol. II. *tab.* 133.

Salsola herbacea decumbens foliis subulatis spinosis scabris, calycibus marginatis axillaribus, LINN. *yst. n.* 12. *p.* 196.

Kali spinosa affinis, BAUH. *pin.* 289.

Salsola decumbens, LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 240.

Tragum, CAM. *epit.* 779.

Kali soda, SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n.* 285.

Traga, MATTH.

Loc. GUJDICE circa Nicaeam, TERRANEUS in maritimis prope Unelliam legerunt. ANNUA.

1065 SALSOLA soda.

Salsola herbacea patula foliis inermibus, LINN. *spec. p.* 323.

JACQ. *Hort. Vindob. tab.* 68.

Salsola longifolia, LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 241.

Kali majus cochleale semine, BAUH. *pin.* 289.

Soda, Kali magnum, sedi medii folio, semine cochleato, LOB. *ic.* 394.

Kali vulgare, BAUH. *hist. III. p.* 702.

Kali, MATTH.

Loc. In agro Nicaeensi. ANNUA.

VIR. Pleraque SALSOLÆ species combustae dant salem alkalinum sub nomine Soda notum, cujus usus magnus est ad saponem, & opera vitriariorum. Hic sal instar affinium urinam movet, sed & ipsa planta aut decocta, aut acetariis recepta urinas ciet. Utilis est SALSOLA aliis antiscorbuticis conjuncta, si metus hydropsis addit, in cachexia scorbutica ad lotii secretionem promovendam.

ISNARDIA. LINN. *gen. n.* 145. *yst. n.* 156.

Calyx quadrifidus, ovarium arcte cingens. Stamina quatuor. Stylus unus.

Capsula quadrilocularis, polysperma.

1066 ISNARDIA palustris LINN. *spec. p.* 175.

Icon. TAUR. Vol. XVI. *tab.* 49.

Damia foliis subovatis pediculis, floribus in foliorum alis sessilibus, GOET. *obs. 2. p.* 115.

Glaux major palustris flore herbacea, BOCC. *mus. 105. tab.* 84.

Alvine palustris rotundifolia repens, foliis portulacae pinguibus, LIND. *alsat. 114. tab.* 2.

Loc. Vulgaris admodum est ad lacus, & secus fossas aquarum lente fluentium. PERENNIS.

CHRYSOSPENTIUM. LINN. *gen. n.* 493. *syn. n.* 553. TOURN. *tab.* 60.

Calyx coloratus, persistens, 4-vel 5-fidus. Stamina octo ad decem. Styli duo.
Capsula birostris, unilocularis, polysperma.

1067 **C**HRYSOSPENTIUM alternifolium.

Chrysosplenium foliis alternis. LINN. *spec. p.* 669. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1548.

Chrysosplenium foliis pediculis oblongis insidentibus. TOURN. *inst. p.* 146.

Sedum palustre luteum majus foliis pediculis longis insidentibus. MORIS. *hist. 3. p.* 477.

s. 12. tab. 8. f. 8.

Loc. Ad fontium scaturigines locis montanis, & umbrosis; copiosissime supra Giaveno.
PERENNE.

VIR. Aliquantum amara, & gustu subacris planta pro antiscorbutica habetur, atque
syzymbrio aquatico substitui posse dicitur.

ULMUS. LINN. *gen. n.* 281. *syn. n.* 313. TOURN. *tab.* 372.

Calyx quinquefidus. Stamina quinque. Styli duo. Capsula compressa, foliacea,
ovalis, semen unicum includens. ARBOR.

1068 **U**LMUS campestris.

Ulmus foliis duplicato-serratis, basi inaequalibus. LINN. *spec. p.* 327.

Ulmus foliis ovato-lanceolatis dentatis, dentibus serratis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1586.

Ulmus campestris, & Theophrasti. BAUH. *pin.* 426.

Ulmus. DOD. *pempt.* 837.

Olmo. MATTH.

VERN. *Oûlm.* 2. *Oûrm.*

Loc. Ubique & sata, & spontanea frequens est. ARBOR.

VIR. Nostri temporibus virum medicinalium ULMi magna fama precrebuit; sed & antiquissimis jam haec planta propter usum medicamentosum laudata est. Arbor ULMi succo quodam glutinoso donatur, principia fixa continens, quorum quaedam manifeste acida sunt, alia vero ad substantiam mediæ cujusdam salis sunt redigenda. Hic activus succus sponte etiam quibusdam in regionibus primo vere ex hiant cortice stillat: colligitur etiam in vesicis rubentibus, quæ in superficie foliorum hujusce plantæ excitantur ab aphidis quadam specie, inra eorumdem parenchyma progeniem suam deponente. Succus sponte stillans ex cortice, maximeque succus hisce vesiculis amplificatis contentus tanquam vulnerarium celebratur, & speciarum utile dicitur in morbis oculorum. Vulnerum certe consolidationem promovere potest glutine suo, atque vi tonica leviter abstergente. Folia ipsa ULMi similiter vulneraria sunt. Secundus cortex, sive liber majorem continet hujusce succi quantitatem, ac in hoc cortice magna fiducia posita est ad curandas plurimas difficiles aegritudines, cujusmodi sunt scabies, herpes, impetigo, omnisque fere foeditas cutis: Rheumatismus, ischiadicum malum, scorbutus, scirrhus, atque cancer. In hisce morbis solet imperari decoctum corticis ULMi, quod ita paratur, ut libra una aquæ unciam unam corticis habeat, atque decoquendo ad medietatem redigatur. Cortex ipse applicitus in ambustis magnæ utilitatis esse dicitur. Decoctum autem longa ebullitione paratum, etiam ad ulcera abstergenda, & consolidanda multis laudibus effertur. Profuisse vidi in aphris, ulceribusque oris, quando opportunum extitit eadem vulnerario, & abstergente remedio eluere, sæpe autem in acutis præsertim febribus aphtæ in ore apparent, quarum si curetur cita sanatio per repercutientia remedia, acri vitiosa materia ad tracheam, aut tubum intestinalem translata, gravia, & difficilia mala gignuntur. Decoctum idem tonicis, corroborantes, abstergentes vires habet. Speciatim utget lentos humores in cute hærentes; vidi propalisse scabiem retro-pulsam, ac impetiginem curasse. Sine emolumento adhibitus est in scirrhis; ulceri canceroso externe adhibuit decoctum corticis ULMi evidenter nocuit sanie repressa, auctisque doloribus. Constans, & diutinus hujusce decocti usus denique

viscidum, & foetidum sudorem propellit, qui certo magni adjumenti esse potest ad nonnullas difficiles aegritudines superandas, quae requirunt crassi perspirabilis restitutam excretionem.

ASARUM. LINN. *gen.* n. 522. *sys.* n. 589. *TOURN.* tab. 289.

Calyx coriaceus, coloratus, ovarium cingens, trifidus, segmentis acutis, inflexis. Stamina duodecim. Stigma sexfidum. Capsula sexlocularis, polysperma.

1069 **ASARUM** europæum.

Asarum foliis reniformibus obtusis finis. LINN. *spec.* p. 633.

Asarum foliis reniformibus subhirsutis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1547.

Asarum. BAUH. *pin.* 197. BAUH. *hist.* III. p. 548.

Asaro. MATTH.

OFF. *Asarum.*

Loc. Circa thermas *Valderianas*, *Vinadienses*, reperi. TERRANEUS inter *Martiniano*, & *Paesana*. Vulgare in umbris *Montisregalis*, similibusque locis circa *Pramol*, *Villar*, & *Porte* etiam nascitur, & supra *Gye* in *Sabaudia* &c. *PERENNE*.

VIR. Tota *ASARI* planta similiter agit, sed in radice activa principia fortiora, & copiosiora sunt. Suis qualitatibus *ASARUM* affine est *Helleboro nigro*, minorem tamen habens virulentiam, majoremque principiorum simulantium tenuitatem. Amarum est, & linguam distincta acrimonia vellicat. Radices odorem aromaticum habent, fortiusque linguam feriunt. Multiplicis autem generis sunt principia, a quibus virtutes *ASARI* proficiuntur; acidum habent evidenter, cum ab eo charta caerulea rubescat: non exiguum dant combustae radices salis alkalinii fixi quantitatem. Vis autem primaria sedet in principio tenui, resinoso, tenente particululas volatiles, multum stimulant, a quibus emesis, & catharsis excitantur. In exsiccata, & vetusta radice perit vis emetica, & cathartica: sola protracta supra cineres calidas infusione, disparet emetica virtus, ac, si operatio majori calore procedat, diutinaeque ebullitioni hujus plantae radices subjiciantur, non modo emetica, sed etiam cathartica proprietate oriantur. Quae vero dicimus de radicibus, ea etiam de foliis intelligenda sunt, cum similis naturae principia in iisdem existant. Decoctio *ASARI* per ebullitionem memoratis principii destituta agit tantummodo fixis ad acidum, & alkali proprium potissimum pertinentibus. *ASARUM* erthinum est ejusdem pulvere, aut etiam succo caribus attractio; at cum validum erthinum sit, solet praeferrî radix diligenter siccata, in pulverem redacta, & paucorum granorum pondere naribus indita, ad cujus majorem gratiam, minuendumque stimulum cum pulvere aromaticarum stirpium jungitur. Efficaciter elicit mucum ex membrana piruitaria. Infusum *ASARI*, leni calore paratum, aut *asarina substantia*, quae nullam volatilium particularum jacturam passa sit, intus data vomitum fortiter movet, alvumque vehementer ducit: sine vomitu autem cathartica persistit, si decoctioni subjecta fuerit: ubi ad tertiae, aut dimidiae partis, ut dicitur, consumptionem menstruum aquae redactum fuerit, jam non amplius cathartica est, sed aperiens, & diuretica. Generatim commendatur in iis morbis, in quibus *Helleborus niger* laudatus est, sed speciatim adhibetur in contumacibus febribus intermittensibus, summaeque efficaciae medicamentum habetur in febre quartana. Multiplici autem ratione juvat: tanquam emetico-catharticum concutit viscera imi ventris, atque fomitem, qui in primis viis, ut dicitur, existat, excutit, educitque: protractus radicem *ASARI* usus, tanquam remedium diuretico-aperiens, minima vasa aperit, cuactum serum potenter incidit, saepius per renes, interdum etiam & per auctam perspirationem evacuat. Sicuti vero notissimum est, non solet quartana febris debellari, nisi humorum tenacitas resolvatur. Radices *ASARI*, pro scopo diuretico datae, non modo aptae sunt ad obstructions reserandas, verum etiam, propulso lotio, hydropis curationem fecerunt. Magni omnino faciendae sunt hujusmodi radices prudenter, & convenienter adhibita, atque pro ratione circumstantiarum cum tonicis, aromaticis, & corroborantibus conjunctae, in iis contumacibus febribus, quae jam ad

cachexiam aegros deduxerunt, & hydropis metum faciunt. Vis tonica, aperiens ASARI etiam opportuna est ad restituendos menses suppressos ex mucro lenso, minima vasa obstruente. Quod ad maniam pertinet, etsi minime negaverim *Hellebori nigri* efficaciam aemulari, in hoc majorem fiduciam ponendam esse puto. Utero gerentibus foeminis, propter abortus metum, ASARUM prudentes Medici non exhibent. Folia ASARI in infusione danant numero sex, aut octo. Radix in substantia, ut dicitur, praescribitur a scrupulo uno ad duos, in infuso vero a drachma una ad drachmas duas. Pro scopo diuretico uncia decoqui potest.

CITINUS. LINN. *yst. n.* 1115. TOURN. *tab.* 477.

Calyx tubulato-campanulatus, limbo quadrifido coloratus. Antherae sessiles sexdecim, adnatae stylo sub stigmate. Germen inferum. Stylus unicus. Stigma octofidum. Fructus, & bacca octolocularis, loculis polyspermis.

1070 CITINUS Hypocistis.

Asarum foliis sessilibus imbricatis, floribus quadrifidis. LINN. *spec. p.* 633.

Asarum aphyllum squamaum. SAUV. *monsp.* 4.

Hypocistis. BAUH. *pin. p.* 465. CAM. *epit.* 96. 97. CLUS. *hist. 1. p.* 68. 79.

Loc. Circa Berra in Comitatu Nicaeensi, & circa Nicaram, Ericae arboreae, atque Citarum radicibus imascens. ANNUUS.

Oss. Flori subjacent squamae duae oppositae, per aetatem purpurascens. Floris color sordide-lucens. Antherarum numerus, & stigmatis divisiones variant: antherarum numerus duplex est.

VIR. Veteribus usitatus succus hypocistidis, validum adstringens constituens, ab hacce planta suppeditatur.

JUNCUS. LINN. *gen. n.* 396. *yst. n.* 433. TOURN. *tab.* 127.

Calyx hexaphyllus, persistens ex foliolis coloratis, siccis, glumosis. Stamina sex. Stylus profunde trifidus. Capsula unilocularis, trivalvis, polysperma.

CULMIS NUDIS.

1071 JUNCUS acutus.

Juncus culmo subnudo tereti mucronata terminali involucra diphylla spinoso. LINN. *spec. p.* 463.

Juncus acutus capitulis Sorghi. BAUH. *hist. II. p.* 520. MORIS. *hist. 3. p.* 332. 2. 8. *tab.* 10. f. 15.

Juncus culmo subnudo tereti mucronata, panicula terminali: bractea duplici spinosa. GOV. h. 182. n. 1.

Loc. in locis maritimis Uncliae, & Nicaeae, PERENNIS.

Oss. JUNCUS maritimus anglicus mera varietas est.

1072. JUNCUS conglomeratus.

Juncus culmo nudo stricto capitula laterali. LINN. *spec. p.* 464.

Juncus caule nudo, foliis teretibus mollibus, panicula conglomerata. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1312.

Juncus culmo nudo tereti, panicula laterali densa globosa sessili. SCOP. *Fl. Carn. p.* 224. n. 2. ed. 2. n. 427.

Juncus laevis panicula non sparsa. BAUH. *pin.* 12. *theatr.* 183.

Juncus laevis panicula conglomerata. SCHEUCHZ. *gram.* 343.

Juncus. CAM. *epit.* 780. MATTH. *p.* 1036. BAUH. *hist. II.* 520.

Loc. Locis uliginosis, & spongiosis in agro Pedemontano, PERENNIS.

1073. JUNCUS effusus.

Juncus culmo nudo stricto, panicula laterali. LINN. *spec. p.* 464.

- Juncus culmo nudo tereti*, panicula laterali sparsa. SCOP. Fl. Carn. 223. n. 1. ed. 2. n. 428.
- Juncus laevis panicula sparsa major*. BAUH. pin. 12. theatr. 182. SCHEUCHZ. agron. 341.
- Loc. In pascuis humidis frequens. PERENNIS.
1074. **JUNCUS inflexus.**
Juncus culma nudo, apice membranaceo incurva, panicula laterali. LINN. spec. p. 464.
Juncus caule nudo, foliis teretibus stricis, panicula laterali sparsa. HALL. hist. tom. 2. n. 1311.
Juncus acumine reflexo, major. BAUH. pin. 12. prodr. 184. BARR. ic. 204.
 Loc. In pascuis humidis, locisque inundatis ubique. PERENNIS.
1075. **JUNCUS filiformis.**
Juncus culma nudo filiformi nutante, panicula laterali. LINN. spec. p. 465.
Juncus caule nudo, foliis mollibus teretibus, panicula laterali pauciflora. HALL. hist. tom. 2. n. 1313.
Juncus culma nudo nutante, panicula laterali. ROY. leyd. p. 44. n. 13.
Juncus laevis panicula sparsa, minor. BAUH. pin. 12. theatr. 183. SCHEUCHZ. agron. 347. t. 7. f. 1.
 Loc. In alpibus & Ussey lectam habeo. PERENNIS.
1076. **JUNCUS trifidus.**
 ICON. TAUR. Vol. I. tab. 93.
Juncus culmo nudo, foliis, floribusque tribus terminalibus. LINN. spec. p. 465.
Juncus acumine reflexo trifidus. HALL. hist. tom. 2. n. 1315.
Juncus acumine reflexo minor, & trifidus. BAUH. pin. 12. prodr. 22. tab. 22. theatr. 186.
Juncoides alpinum trifidum. SCHEUCHZ. agron. 325.
 Loc. Frequens in pascuis alpium. PERENNIS.
1077. **JUNCUS squarrosus.**
Juncus culmo nudo, foliis setaceis, capitulis glomeratis aphyllis. LINN. spec. p. 465.
Juncus rigidus panicula spicata, floribus cartilagineis. HALL. hist. tom. 2. n. 1317.
Gramen juncum foliis, & spica junci. BAUH. pin. 3.
 Loc. Incolit loca spongiosa montana, editiora. PERENNIS.
- CULMIS FOLIOSIS**
1078. **JUNCUS bulbosus.**
Juncus foliis linearibus constrictis, capsulis obtusis. LINN. spec. p. 466.
Juncus foliis carinatis, panicula sparsa, fructu globosa. HALL. hist. tom. 2. 1318.
Juncus foliis linearibus canaliculato-cancavis, capsulis avatis, culma compresso. JACQ. Vind. 235.
Juncus parvus cum pericarpis rotundis. BAUH. hist. II. p. 322.
Juncus foliis angulatis, culmo subnudo, panicula terminali prolifera, capsulis ovalis. ROY. Lugd. 43.
Juncus repens opocarpos minor. BARR. ic. 114.
 Loc. In sterilibus montanis pascuis occurrit. PERENNIS.
1079. **JUNCUS bufonius.**
Juncus culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. LINN. spec. p. 466.
Juncus palustris humilior, panicula laxissima. RUPP. jen. 130. Fl. Lapp. 122.
Juncus caule brochato, foliis setaceis, floribus solitariis od ramos sessilibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1319.
 Loc. Locus humidis, umbrosis, spongiosisque frequens est. ANNUUS.
1080. **JUNCUS triglomis.**
Juncus foliis planis, gluma triflora terminali. LINN. spec. p. 467.
Juncus gluma triflora, culmum terminante. Fl. Lapp. 115. tab. 10. f. 5.

Juncus coule folioso nudo, foliis teretibus, floribus terminalibus ternis. HALL. hist. tom. 2. n. 1314.

Loc. In pratis humidis editioribus alpium, ibique ad fontium scaturigines. *PERENNIS.*

1081. *JUNCUS* Jacquini.

Juncus caule unifolio, petiolis bifloris, floribus umbellatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1316.

Juncus (biglumis) folio subulato, capitulo subquadriflora terminali. LINN. man. 63.

Juncus alpinus capitula glomerata, & nigro splendens. SCHEUCHZ. it. 1. p. 40. tab. 5. f. 2.

Juncoides alpinum flouculis junci glomeratis atrofuscia. SCHEUCHZ. agr. p. 323. tab. 17. f. 9.

Juncus biglumis. JACQ. vind. p. 237. tab. 4. fig. 2. fl. austr. tab. 221.

Loc. In uliginosis alpium Grassonei, & Ussey. *PERENNIS.*

1082. *JUNCUS* pilosus.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 10. f. 2. & tab. 12.

Juncus foliis planis hirsutis, floribus umbellatis solitariis petiolatis aristatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1325.

Juncus foliis planis pilosis, corymbo ramoso. LINN. spec. p. 468.

Juncus foliis planis pilosis, pedunculis simplicibus, & umbellatis. GER. p. 141. n. 13.

Loc. In sylvarum collibus vulgatis. *PERENNIS.*

1083. *JUNCUS* spadicus.

Juncus planifolius panicula laxa, petalis mollibus breviter aristatis. HALL. hist. n. 1326.

Gramen hirsutum nemorosum alpinum angustifolium, paniculis obscure rufescentibus. SCHEUCHZ. it. alp. 6. p. 458.

Loc. Locis subhumidis, & umbrosis editiorum alpium non infrequens est. *PERENNIS.*

Obs. In tanto consensu Auctorum, varias *Juncoides* conjugentium sub specie pilati, nolo ab iisdem dissentire, sed hanc recte ab aliis separasse videtur Ccl. HALLER.

1084. *JUNCUS* niveus.

Juncus foliis planis subpilosis, corymbis folio brevioribus, floribus fasciculatis. LINN. spec. p. 468.

Juncus planifolius paniculis umbellatis, petalis interioribus duplo longioribus. HALL. hist. tom. 2. n. 1328.

Juncus niveus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 259. n. 436.

Juncoides montanum, nemorosum, flore niveo. SCHEUCHZ. agr. p. 320. tab. 7. f. 7.

Juncus angustifolius, villatus floribus albis paniculatis. Tourn. inn. p. 247.

Gramen hirsutum minus, paniculis albis. BAUH. pin. p. 7. theatr. 106.

Gramini luzulae affine flore albo. BAUH. hist. II. p. 492.

Loc. Ubique in sylvis collinis, & montibus. *PERENNIS.*

1085. *JUNCUS* luteus N.

Juncus planifolius glaber panicula nacente, floribus obtusis. HALL. hist. tom. 2. p. 173. n. 1339.

Juncoides latifolium alpinum glabrum, panicula sublutea splendens. SCHEUCHZ. agr. p. 314.

Loc. Ad oras sylvarum in editioribus alpiibus. *PERENNIS.*

1086. *JUNCUS* campestris.

Juncus foliis planis subpilosis, spicis sessilibus, pedunculatisque. LINN. spec. p. 468.

Juncus planifolius spicis petiolatis nutantibus, petiolis aristatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1330.

Juncus foliis planis subpilosis, spicis paucis subrotundis. GER. p. 140. n. 10.

Juncus villosus capitulis pyllis. Tourn. inn. 246.

Juncoides villosus capitulis pyllis. SCHEUCHZ. gram. 310.

Gramen hirsutum capitulis pyllis. BAUH. pin. 7. theatr. 103.

Loc. Frequens in sylvis montanis, & collinis. *PERENNIS.*

1087. JUNCUS spicatus.

Juncus foliis planis, spica racemosa nutante. LINN. spec. p. 469.

Juncus alpinus, latifolius panicula racemosa nigricante pendula. TILL. pis. 91.

Loc. In editoribus alpinis nascitur. PERENNIS.

1088. JUNCUS sylvaticus.

Juncus foliis teretibus articulatis, panicula repetito ramosa. HALL. hist. tom. 2. n. 1323.

Gramen junceum, folio articulato, sylvaticum. BAUH. theat. p. 75. 76. SCHEUCHZ. p. 334.

Loc. Frequens locis humidis, præsertim montanis. PERENNIS.

1089. JUNCUS aquaticus.

Juncus foliis compressis articulatis, panicula semel ramosa. HALL. hist. tom. 2. n. 1322.

Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. BAUH. theat. p. 76. SCHEUCHZ. agr. p. 331.

Gramen junceum paniculatum humilius, utriculis frequenter donatum. MORIS. oxon. 3. p. 127. tab. 9. f. 2.

Loc. In fossis, & udis ad oras aquarum stagnantium. PERENNIS.

ACORUS. LINN. gen. n. 392. syl. n. 430.

Clava ex sinu folii oriunda, digitiformis, floribus sessilibus undique tecta. Calyx hexaphyllus.

foliolis obtusis, superne crassioribus, persistentibus. Stylus brevissimus.

Capsula triangularis, trilocularis, seminibus tribus foeta.

1090. ACORUS calamus. LINN. spec. p. 462.

Acorus verus, 1. calamus aromaticus officinarum. BAUH. pin. p. 34.

Thypha aromatica clava rugosa. MORIS. hist. 3. p. 246. t. 8. tab. 13. f. 4.

Loc. Locis spongiosis in valle Macrae lectus est a Francisco PETROLERI. PERENNIS.

Via. Hic non est calamus antiquorum, suas tamen & insignes virtutes habet, non infrequenter in usum veniens. Radix est, quæ in usum recipitur, ac eligi debet, quam caries non prehenderit, & aromatica gratia sese commendat. Vetus non modo in pulverem carie confecta fatiscit, verum etiam plurimum imbecilla redditur, diffusa tenui aromatica substantia. Radix ACORI optime servata fractu tenax est, amara, ac aromatica acrimonia linguam vellicat, salivamque plurimam elicit. Principia activa, præter stipticam aliquam vim, pertinent ad activas salino-volatiles particulas cum oleo etiam æthereo conjunctas, quarum nonnullas spiritus vini, plerasque aqua secum abripit. Proprietates ACORI eximiae sunt: mucum incidunt, viscidum abstergunt, actionem fibrarum excitant, atque instaurant, vasa aperiant, ac secretionem promovent. Multum valent in stomachi imbecillitate, atque anorexia, si memoratae superius indicationes adsint. Prodest ejusdem usus in cachexia, mensium diminutione, febribus anomalis intermittentibus, atque speciatim in febre quotidiana, non illa quidem, quam sustineant visciditas lymphæ phlogistica, & congestiones internæ ab humore acri, quæ aut in abscessum iverint, aut ipsius metum inferant, sed lymphæ quedam tenacitas, præsertim ex diuturna moestitia profecta. Hisce autem in casibus pro varia natura morborum, atque aegri circumstantiarum, amara, tonica, incidentia, febrifuga, emmenagoga, aut potentia saponacea solent adjungi. In hydropoe etiam incipiente cum opportunis tonicis aperientibus utilissime calamus aromaticus administratur. Dari solet in substantia a scrupulo uno ad drachmam unam, aut in infuso a drachma una ad drachmas duas, vel tres. Diurina ebullitio ejusdem virtutem debilitat. Radix masticata, efficax, & suave sialagogum facit.

CLASSIS X. PLANTÆ

B. FLORIBUS SEXU DISTINCTIS

THELIGONUM. LINN. *gen. n.* 947. *syst. n.* 1068.

Flores sexu in eadem planta distincti. Maribus calyx bifidus. Stamina duodecim, aut plura. Foemini calyx minor, etiam bifidus. Stylus unus. Fructu est capsula coriacea monosperma.

2091 THELIGONUM Cynocrambe.

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 32.

Theligonum Cynocrambe. LINN. spec. p. 1411.

Cynocrambe dioicoidis. BAUH. prodr. 59. TOURN. cor. 51.

Alains facie planta nova. COL. phyl. 28.

Theligonum alimoidum. LAM. Fl. Franc. tom. 2. p. 198.

Loc. Ad muros, & sepes Nicææ. In fossis circa Craveja etiam provenit. ANNUUM.

AMARANTHUS. LINN. *gen. n.* 941. *syst. n.* 1060. TOURN. *tab. 118.*

Flores sexu in eadem planta distincti. Calyx triphyllus, vel pentaphyllus. Stamina tria, vel quinque. Styli tres. Capsula monosperma, horizontaliter dehiscens.

2092 AMARANTHUS Blitum.

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 63.

Amaranthus glomerulis lateralibus trifidis, foliis ovatis reuatis, caule diffuso. LINN. spec. p. 1405.

Amaranthus procumbens foliis ovatis emarginatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1606.

Amaranthus floribus triandris glomeratis, foliis subovato triquetris, caule diffuso. SCOP. Fl. Carn. p. 425. n. 2.

Blitum majus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1178.

Amaranthus caule decumbente, foliis subrhomboidis petiolis reuatis, alternis spicis triandris. NEKER. tom. 2. p. 386.

Blitum album minus. CAM. epit. 236.

Blitum rubrum minus. BAUH. hist. II. p. 967.

Loc. Ad vias, & in ruderatis, maceratisve frequens est. ANNUUM.

2093. AMARANTHUS viridis.

Amaranthus glomerulis triandris: floribus masculis trifidis, foliis ovatis emarginatis, caule erecto. LINN. spec. p. 1405.

Blitum album minus. BAUH. pin. 118. BAUH. hist. II. p. 967.

Blitum sylvestre spicatum. TOURN. par. 2. p. 273.

Amaranthus spicatus. LAM. Fl. Franc. tom. 2. p. 192.

Loc. Secus Duriam utramque Cl. BELLARDE. ANNUUS.

MERCURIALIS. LINN. *gen. n.* 998. *syst. n.* 1115. TOURN. *tab. 308.*

Sexus est tota planta divisus. Maribus calyx trifidus, etiam quadrifidus. Stamina duodecim, & ultra, antheris didymis. Foemini calyx triphyllus, aut tetraphyllus, Styli duo. Capsulae gemellae, monospermae, sive, ut ajunt, capsulae dicocca.

2094 MERCURIALIS annua.

Icon TAUR. Vol. XIII. tab. 46.

Mercurialis caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis. LINN. spec. p. 1465.

Mercurialis caule annuo brachiato, foliis conjugatis ovato-lanceolatis glabris. HALL. hist. tom. 2. n. 1600.

Mercurialis caule brachiata erecta annuo. SCOP. Fl. Carn. p. 419. n. 2.

Mercurialis spicata, & testiculata. BAUH. pin. 121.

Mercurialis mas, & foemina. BAUH. hist. II. p. 977.

Mercorella maschio, e femmina. MATTH.

OFF. *Mercurialis mas, & foemina.*

VERN. *Mercorella.*

LOC. *Secus hortes, & ruderata frequens. ANNUA.*

VIR. *MERCURIALIS herba non modo emollit, & lubricat, sed salino-acri suae naturae principio intestina irritat, atque alvum sollicitat. Clysteres ingredi solet cum aliis emollientibus stirpibus MERCURIALIS. Paratur syrupus MERCURIALIS ad alvum ciendam. Extat in officinis nostris syrupus MERCURIALIS compositus, quo non modo alvus cietur, sed propter additamentum aliarum stirpium mucum ventriculi abstergit. Succus ex tota herba expressus dari potest ab uncia semisse ad unciam unam. Frequentius in jasculo calente infunditur dosi manipuli semittis, eaque ratione propinatur ad alvum leniendam. Solent Medici MERCURIALEM praescribere in iis aegris, qui purgantia aegre ferre possunt. Licet autem inter mitia purgantia recenseri debeat, caute tamen foeminis histericis, & texturae sensibilioris praescribenda haec planta est, cum viderim non modo dolores, sed & spasmodicas contractiones intulisse. Propter hanc rationem gravidis, & puerperis non sine magna circumspectione imperanda. Mel *mercuriole* usitatissimum est medicamentum clysteribus receptum ad emollientium eorumdem vim acuendam, ut non modo faeces emolliant, sed & alvum sollicitent.*

2095. *MERCURIALIS perennis.*

ICON. *TAUR. Vol. XIII. tab. 47.*

Mercurialis caule simplicissimo, foliis scabris. LINN. *spec. p. 1465.*

Mercurialis caule perenni simplici, foliis ovato-lanceolatis hirsutis. HALL. *hist. num. 2. n. 1601.*

Mercurialis caule simplici. SCOP. *Fl. Carn. p. 429. n. 1.*

Mercurialis cynocrambe. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. n. 1225.*

Mercurialis montana. BAUH. *pin. 522.*

Cynocrambe mas, & foemina. BAUH. *hist. II. p. 977. & 979.*

Cynocrambe. MATTH.

LOC. *In sylvis montanis caeduis frequens est. PERENNIS.*

VIR. *Similis habita suo superioris est, sed omnium auctororum consensu, ac certorum experientiorum testimonio virulenta, & narcotica est, intestinisque multum infensa. Haec autem cum in finem indicantur, ut caveant diligenter Pharmacopolae, & Rhizotomi, ne haec pro superiori colligant, adhibeantque.*

CERATONIA. LINN. *gen. n. 983. syst. n. 1167. Tourn. tab. 344.*

Flores sexu, & tota planta distincti, sed dantur etiam flores hermaphroditi.

Hermaphrodito calyx quinque partitus, stamina quinque, stylus filiformis.

Fructus est siliqua magna, compressa, pulpa repleta, isthmis interrupta, semina compressa, nitida, continens.

1096. *CERATONIA siliqua.*

Ceratonia siliqua. LINN. *spec. p. 1513.*

Siliqua edulis. BAUH. *pin. 402.*

Siliqua arbor, sive Cerotia. BAUH. *pin. 413.*

Carobae siliqua Ceratia. LOB. *adv. p. 419.*

Siliqua. MATTH.

OFF. *Carroba, sive Siliqua edulis.*

VERN. *Carrobe.*

LOC. *Unique circa Nicotiam. ARBOR.*

VIR. *Siliquae gratum equis, & mulis cibum constituunt. Eaedem semina sua in pulpa quadam comprehendunt, quae demulcens, & pectoralis habetur. Nicotenses ad pectorales decoctiones eas recipiunt. Syrupus etiam ex ipsis paratur, qui multum laudatur in tussi, faucium asperitate, morbisque pectoris scopo leniendi, demulcendi, leniterque abstergendi.*

BUXUS. LINN. *gen.* n. 934. *syn.* n. 1033. TOURN. *tab.* 15.

Flores sexu distincti in eadem planta. Flores mares, & foeminae saepius ex eadem gemma, sed mares longe plures; Masculo calyx pentaphyllus; Stamina quatuor, thalamo tetragono adnata; Foemineo calyx heptaphyllus; Germen cum stylis tribus evadit capsula prismatica valvis tribus rostratis, trilocularis, loculis dispermis.

1097 **BUXUS** sempervirens.

BUXUS. HALL. *hist.* 2. n. 1610.

BUXUS arborescens. TOURN. 578. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 2. p. 203.

BOISS. MATTH.

VERN. Martel.

Loc. In montibus *Liguriae* ad rupes. Sylvulas etiam facit inter *Garressio*, & *Ormea*, circa *Mommellian*. Cl. *BELLARDI* inter *Rabilant*, & *Rocavian*. *FRUTEX*, aut *ARBOR*.

VIR. Ponderosum *BUXI* lignum aquae fundum petit. Non modo tornatoribus optatissimum est ad pixides, manubria cultorum, aliaque utensilia conficienda, sed & Sculptoribus inservit ad icones incidendas. Vires *Gujaci* aemulae, quae huic ligno tributae sunt, nullo vero fundamento inveniuntur. Oleum *Buxinum* nostris temporibus exolevit. Nauseosa, amara, atque cum aliqua acrimonia abstergentia sunt folia *Buxi*, ac dosi manipuli semissis in aqua decocta alvum efficaciter ciunt. Nauseosa cum sint, in usum venire non solent.

LEMNA. LINN. *gen.* n. 923. *syn.* 1038.

Flores sexu in eadem planta distincti; Utrique flori calyx monophyllus, subrotundus, latere dehiscens; Masculo stamina duo cum germine ovato, stylo brevi, & stigmate obsoleto-obstructo, abortiente; Foemineo germen subovatum cum stylo brevi, & stigmate simplici, quod evadit capsula globosa, unilocularis, semina oblonga continens.

1098 **LEMNA** trisulca.

Lemma foliis peristylis lanceolatis. LINN. *spec.* p. 1376.

Hydrophace caule filiformi, foliis ellipticis lanceolatis viviparis. HALL. *hist.* tom. 3. n. 1901.

Lenticula trisulca. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 1143.

Lenticula ramosa. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 2. p. 189.

Lemma aquatica trisulca. BAUH. *pin.* 362.

Loc. In aquis lente fluentibus. *PERENNIS*.

1099. **LEMNA** minor.

Lemma foliis sessilibus utrinque ploniuseculis, radicibus solitariis. LINN. *spec.* p. 1376.

Hydrophace minorrhiza, foliis planis ovatis. HALL. *hist.* tom. 3. n. 1900.

Lenticula minor. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 1142.

Lenticula minor monorrhiza foliis subrotundis utrinque viridibus. MICH. *gen.* 16. *tab.* 2. f. 3.

Lens palustris. CAM. *epit.* 852.

Loc. Nihil frequentius ad stagnantes aquas in fossis, & oris lacuum. *ANNUA*.

1000. **LEMNA** gibba.

Lemma foliis sessilibus subtus hemisphaericis, radicibus solitariis. LINN. *spec.* p. 1377.

Hydrophace monorrhiza foliis pulvinosis inferne convexissimis. HALL. *hist.* tom. 3. n. 1898.

Lenticula palustris major: inferne magis convexa, fructu polyspermo. MICH. *gen.* 15. *tab.* 11. f. 1.

Lenticula vulgaris. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 2. p. 189.

Loc. Ad oras lacuum. *ANNUA*.

1001. **LEMNA** polyrrhiza.

Lemma foliis sessilibus, radicibus confertis. LINN. *spec.* p. 1377.

Hydrophace polyrrhiza foliis ovatis planis. HALL. *hist.* tom. 3. n. 1899.

Lenticula major polyrrhiza, inferne atro-purpurea. MICH. *gen.* 16. *tab.* 11. f. 1.

Lenticula polyrrhiza, LAM. *Fl. Franc.* tom. 2. p. 189.

Loc. In aquis stagnantibus. *ANNUA*.

CHARA. LINN. *gen.* n. 1066. *sys.* n. 1203.

Flores sexu in eadem planta distincti. Planta palustris, ramosa, foliis verticillatis.

Foemineo calyx tetraphyllus, germen cum stigmate quinquefido, fructus ovatus monospermus. Ad basim calycis externe assidet anthera globosa, nuda, vices masculi floris faciens.

1102 *CHARA* tomentosa.

Chara aculeis caulinis ovatis, LINN. *spec.* p. 1624.

Chara caule tomentoso fragili, HALL. *hist. tom.* 3. n. 1683.

Equisetum fragile majus subcinereum aquis immersum, MORIS. *hist.* 3. p. 621. t. 15. tab. 4. f. 9.

Equisetum, 2. *Hippuris lacustris*, foliis manu arenosis, PLUK. *alm.* 135. tab. 9. f. 4.

Loc. Secus il Po morto. Cl. BELLARDI in aquis lente fluentibus di Borgo Masino, & agri Percellensis. *PERENNIS*.

1103. *CHARA* hispida.

Chara aculeis caulinis capillaribus confertis, LINN. *spec.* p. 1624.

Chara caule fragili spinoso, HALL. *hist. tom.* 3. n. 1682.

Chara caulibus aculeatis, HORT. *Cliff.* 477. ROY. *Lugd.* 214.

Chara major caulibus spinosis, VAILL. *act.* 1719. p. 18. tab. 3. f. 3.

Equisetum, 2. *Hippuris mucosus sub aqua repens*, PLUK. *alm.* 135. tab. 193. f. 6.

Loc. In fossis circa Sesimo Torinese. *PERENNIS*.

1104. *CHARA* vulgaris.

Chara caulibus laevibus, frondibus interne dentatis, LINN. *spec.* p. 1624.

Chara caule laevi fragili, HALL. *hist. tom.* 3. p. 1683.

Chara caulibus laevibus, ROY. *Lugd.* 1533.

Chara vulgaris foetida, VAILL. *act.* 1719. p. 23. tab. 3. f. 1.

Equisetum foetidum sub aqua repens, BAUH. *pin.* 16. *prodr.* 25. *Theatr.* 251. BAUH. *hist.* III. p. 731.

Loc. Ubique in aquis, sive stagnantibus, sive lente fluentibus. *PERENNIS*.

NAJAS. LINN. *gen.* n. 974. *sys.* n. 1096.

Flores sexu in eadem plama distincti. Masculus flos pedunculatus prodit ex sinu duarum squamarum, profunde quadrifidus, habens stamen unicum. Foemineus flos nudus est, & constituitur a germine ovali, subsessili, in ala alterius folii, & stylo unico, aut tribus terminato, quod evadit capsula 1-4locularis, loculis monospermis.

1105 *NAJAS* major. N.

Fluvialis latifolia fructu minus obtuso monospermo, MICH. *gen.* 11. tab. 8. f. 1. 2.

MISC. TAUR. tom. 5. p. 55.

Najas fructu monospermo, HALL. *hist.* tab. 1. n. 356.

Fluvialis vulgaris latifolia, VAILL. *act.* 1719. p. 17. tab. 1. f. 2.

Potamogeton fluvialis Sargato simile lucens, foliis margine dentatis, PLUK. *alm.* 304. tab. 216. f. 4. RAJ. *suppl.* 121.

Loc. Ad oras lacuum Canapiciensium, & praesertim ad exitum aquarum. *PERENNIS*.

1106. *NAJAS* minor N.

Fluvialis minor foliis angustissimis denticulatis, deorsum reflexis, fructu acuto, semutiori, monospermo, MICH. *nov. pl. gen.* p. 11. tab. 8. f. 3. MISC. TAUR. tom. 5. p. 55.

Fluvialis angusta, longoque folio, VAILL. *nov. pl. gen. in Comm. Ac. R. Scient. an.* 1719. 17.

Loc. In aquis stagnantibus, aut lentissime fluentibus in agro Canapiciensi. Cl. BELLARDI in lacu di Moncrivello, ubi deest major. *ANNUA*.

ALLIANTI *Fl. Pedem.* Tom. II.

K k k

CERATOPHYLLUM. LINN. *gen.* n. 944. *syn.* n. 1065.

Flores sexu distincti in eadem planta. Masculo calyx multifidus. Antherae plures conglomeratae, sessiles. Foemineo calyx idem. Stylus nullus.

Germen evadit capsula monosperma.

1107 CERATOPHYLLUM demersum.

Ceratophyllum foliis dichotomo-bigeminis, fructibus triapinatis. LINN. *spec.* p. 1409.

Ceratophyllum foliis subspinatis, capsula tricorni. HALL. *hist. tom.* 2. n. 1599.

Ceratophyllum asperum. LAM. *Fl. Franc. tom.* 2. p. 196.

Equisetum rub. aqua repens foliis bifurcis. LOES. *pruss.* 67. tab. 12.

Hydroceratophyllum folia aspera, quatuor cornibus armato. VAILL. *mém. de l'Acad.* anno 1719. p. 21. tab. 2. f. 2.

Loc. In stagnis aquarum frequentissimum. PERENNE.

ZANNICHELLIA. LINN. *gen.* n. 920. *syn.* n. 1034.

Flores sexu in eadem planta distincti. Masculum florem constituit filamentum unicum, anthera ovata instructum, juxta quod adjacet foemineus bos. Huic calyx monophyllus, bidentatus, ventricosus, continens germina quatuor ad sex, quae singula stylo instruuntur cum stigmate foliaceo. Haec germina evadunt capsulae uniloculares, rostratae, monospermae.

1108 ZANNICHELLIA palustris. LINN. *spec.* p. 1375.

Zannichellia palustris major foliis gramineis acutis, flore cum opice quadricapsulari, embryanis clypeolis integris, & vasculo non barbato, capsulis seminibus od costam dentatis. MICH. tab. 11. f. 1.

Potamogeton capillaceum capsulis ad alas trifidis. BAUH. *pin.* p. 193. *prodr.* 101.

Potamogeton similis graminifolia ramoso, & ad genicula polyceraso. PLUK. *alm.* 305. tab. 102. f. 7.

Loc. In Comitatu Nicoensi ad rivulos. Cf. BELLARDI 10 fossis circa Demant. PERENNIS.

RUPPIA. LINN. *gen.* n. 161. *syn.* n. 175.

In summis ramulis prodeunt spicae fereotae antheras octo reniformes, sessiles.

Inter eas nascuntur pedunculi octo, tenues, singuli sustinentes germen parvo stigmate instructum, quod abit in capsulam acuminatam, asperam, monospermam.

1109 RUPPIA maritima. LINN. *spec.* p. 184.

Buccaferrea maritima foliis acutissimis. MICH. *gen.* 72. tab. 35.

Potamogeton maritimum gramineis longioribus foliis, fructu fere umbelloso. RAJ. *angl.* 3. p. 134. tab. 6. f. 1.

Loc. Ad litus maris Nicaensis. PERENNIS.

ZOSTERA. LINN. *gen.* n. 919. *syn.* n. 1032.

Flores sexu in eadem planta distincti. Ex vagina folii prodit spadix linearis, stamina ferens octo in uno latere, in altero vero germina, quae in capsulas monospermas mutantur.

1110 ZOSTERA oceanica.

Zostera pericarpis pedunculatis oliviformibus. LINN. *syn.* 12. p. 605. & *man.* 123.

GER. *prov.* 121.

Alga angustifolia viuariorum. BAUH. *pin.* 364.

Alga marina. LON. *ic.* 251.

Loc. Ad maris Nicaensis litus. PERENNIS.

3111. ZOSTERA marina.

Zostera pericarpis sessilibus. LINN. *synt.* 12. p. 605.

Alga angustifolia vitrariorum. BAUH. *pin.* 364.

Fucus, s. *Alga marina graminea angustifolia*; *seminifera ramosior*. RAJ. *ongl.* 3. p. 52.

Loc. Ad litus maris *Nicaensis*. *PERENNIS*.

3. FRUCTU PULPOSO

BLITUM. LINN. *gen.* n. 14. *synt.* n. 14. TOURN. *tab.* 188.

Calyx trifidus. Stamen unicum. Germen cum stylis duobus exrescit in fructum, calyce persistente, & baccato contentum. Fructus baccam refert: flores enim plures in glomerem colliguntur.

3112. BLITUM capitatum.

Blitum capitellis spicatis terminalibus. LINN. *spec.* p. 6.

Blitum foliis semirilibus rariet densatis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1571.

Atriplex sylvestris lappulas habens. BAUH. *pin.* 119.

Atriplex mori fructu minima. MORIS. *hist. ox.* tom. 2. p. 606. *tab.* 32. f. 11.

Monocarpus capitatus. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 3.

Loc. Non infrequens est in Comitatu *Nicoensi* secus arva. Circa *Taurinum* in marciis vidit Cl. BELLARDI. *ANNUUM*.

3113. BLITUM virgatum.

Blitum capitellis sparsis lateralibus. LINN. *spec.* p. 7.

Blitum foliis triangularibus densatis, calycibus baccatis, capitulis summis foliosis. ROY. *Lugd.* 206.

Atriplex sylvestris, mori fructu. BAUH. *pin.* 119.

Loc. Legit Cl. BELLARDI ad sepes prope *Lanebourg*. *ANNUUM*.

FICUS. LINN. *gen.* n. 1032. *synt.* n. 1168. TOURN. *tab.* 420.

Fructificationes in cavo pomi carnosae, sive calycis communis contentae, cujus umbilicus aliquot squamis clauditur. Flori masculino calyx tripartitus; Stamina tria. Foemineo calyx quinquefidus; Stylus bifidus; Semen subrotundum. Flores quandoque hermaphroditi in simplici planta, alias sexu distincti in eadem, aut distincta planta.

3114. FICUS carica.

Ficus foliis palmatis. LINN. *spec.* p. 1513.

Ficus communis. BAUH. *pin.* 457.

Ficus. DOD. *pempt.* 812.

Ficus communis. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 652.

Fico. MATTH.

VERN. Fil. Fruct. Fl.

Loc. Dara opera, & facile colitur ubique: sponte etiam nascitur circa *Plassasco*, & in collibus calidioribus. *ARBOR*.

VIR. Arbor Fict, quocumque loco vulneretur, fundit lac escaroticum, quod verrucas absumit. Involucrum ipsum fructus, nisi ad magnam maturitatem pervenerit, lac etiam dat in inferiori parte, quae propior pedunculo est. Ob hanc rationem, dum fructus comeduntur, huiusmodi cortex abjicitur. Pulpa *FICUM* edulis mucilaginosam, nutrientem substantiam largitur, ac nna melleum liquorem eidem intime mixtum. *FICUM* cibis multum confert ad animalia pinguefacienda, non parvi certe aestimandus in quibusdam macilentis hominibus. Si fructus hi fuerint diligenter exsiccati, propter aquearum particulatum iacturam, coactam tunc tenent melleam substantiam, atque plures ad rem medicam usus tunc praebent. Conferunt ad maturandos tumores vi solvete, & emolliente, variaque epithemata, & emplastra ingredientur. Lacte infusa, eodemque imbuta in ira os tenentur in odontalgia, ac illa anginae specie, in qua e re sit relaxare, atque suppurationem adjuvare. Decoctiones pectorales *Ficus* siccata recipiunt

propter easdem vires. Ficus exsiccati aliquam vim calefacientem acquirunt propter uberem, coactamque mellem subsantiam. Haec substantia mellea tractu temporis, calore potissimum adjuvante, fermentationem subit, ac Ficus acres, subamaros, extimalantesque reddit. Ii, qui temperamenti biliosi sunt, facileque a bile solutam alvum habent, ab usu FICUM maxime siccatorum laeduntur.

SMILAX. LINN. *gen.* n. 992. *syn.* n. 1120. TOURN. *tab.* 420.

Flores sexu, & tota planta distincti. Masculo calyx profundissime sexfidus, coloratus, patens, segmentis reflexis; Stamina sex. Foemineo calyx idem, germen cum stylis tribus. Bacca trilocularis, saepius disperma.

1115 **SMILAX** aspera.

ICON. TAUR. Vol. VII. *tab.* 37.

Smilax coule aculeata, foliis dentato-aculeatis cordatis novemnerviis. LINN. *spec.* p. 1458.

Smilax aspera fructu rubente. BAUM. *pin.* 296. TOURN. *inst.* 654.

Smilax aspera. BAUM. *hist.* II. p. 115.

Smilace aspro. MATTH.

VERN. *Smilace*, o Gramon de Montagno.

OFF. *Smilax aspera*.

Loc. Vulgaris est in Comitatu *Nicacensi*. *SUFFRUTEX*.

VIT. Non modo generis characterem cum *Salsaparilla* convenit, verum etiam principiorum suorum natura, licet pares non habeat vires. Radices *SMILACIS asperae* etiam farinosae sunt, teretes, & *Salsamporillam* reserentes, minus ramen succulentae. Blande viscidam lympham solvunt, & cutim aperiendo perspirationem promovent; cient etiam locum in iis maxime, quibus cutis densa est. Temue, & infirmum remedium est ad luis venerae effectus corrigendos. Vere utilis extitit in chronicis quibusdam morbis cutis, uti herpete, impetigine, atque humorum indole rheumatica corrigenda. Radix ipsa ex aqua decoquitur ab uncia una ad uncias duas, lentoque igne diu decoquenda est, ut sensim emollita sua activa principia dimittat.

TAMUS. LINN. *gen.* n. 991. *syn.* n. 1119. TOURN. *tab.* 28.

Flores sexu, & tota planta distincti. Masculo calyx patens profunde sexfidus, persistens; Stamina sex. Foemineo calyx idem, sed minus profunde divisus. Germen inferum cum stigmate trifido evadit bacca trilocularis, calyce coronata, loculis dispermis.

1116 **TAMUS** communis.

ICON. TAUR. Vol. VII. *tab.* 36.

Tamus foliis cordatis indivisis. LINN. *spec.* p. 1458. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1620.

Vitis nigra. CAM. *epit.* 998.

Vitis sylvestris, s. *Tamus*. DOD. *pempt.* 400.

Vitis nero. MATTH.

n. *Bryonio laevis*, s. *nigro baccifera*. BAUM. *hist.* II. p. 149.

Loc. Scandens vulgarissima haec planta in sylvis ubique frequens. *PERENNIS*.

RUSCUS. LINN. *gen.* n. 1008. *syn.* n. 1139. TOURN. *tab.* 25.

Calyx profunde sexfidus segmentis interioribus angustioribus. Nectarium adest centrale, ovatum, superne apertum, tres antheras basi coalitas in apice suo sustinens.

Germen tuba una instructum evadit bacca globosa, trilocularis, trisperma.

Dantur flores sexu distincti.

1117 **RUSCUS** aculeatus.

ICON. TAUR. Vol. VII. *tab.* 39.

Ruscus foliis supra floriferis nudis. LINN. *spec.* p. 1474.

Ruscus foliis ovato-lanceolatis pungentibus, petiolis brevissimis vaginosis. HALL. *hist. tom. 2. n. 1238.*

Ruscus myrtilifolius aculeatus. TOURN. *inst. 79.*

Ruscus. BAUH. *pin. 470.* BAUH. *hist. p. 579.*

Ruscus. DOD. *pempt. 474.*

Rusco. MATTH.

OFF. *Ruscus*, s. *Brascus*.

Loc. Ad radices montium, & oras sylvarum: abunde in agro *Conapiciensi*, & *Bugellensi* secus *Seniam*, atque in valle *Segusii*. In collibus *Liguriæ*, & *Montis-ferrati* etiam nascitur. *SUFFRUTEX.*

VIR. Turiones *RUSCI* instar *Asporogorum* edules sunt, ac urinam similiter pellunt. In cibo adhibiti utiles affirmantur ad renes saburra calculosa expurgandos. Radices hujusce plantae inter radices quinque aperientes majores adnumerantur, eaeque aliquantum acerbæ, amaræ, & subacres sunt, abstergentem, saponaceam, solventem, & aperientem qualitatem habentes. Non sine emolumento aliis opportunis remediis adjunguntur in viscerum imi ventris obstructionibus. Speciatim laudantur ad urinam pellendam, ac renes sabulo, calculoque liberandos. Certæ etiam observationes habentur hydropis, propulsa urina, superati sola radice *RUSCI* decoctione. Ex aqua radix decoquitur, sed diutina ebullitio ejusdem virtutes infirmas; dosis est ab uncia semisse ad uncias duas. Si in pulverem trita eadem exhibeatur, datur a drachma una ad drachmas duas. In hydropse curando præfertur infusum vino albo paratum. Folia *RUSCI* in pulverem contrita, aut vino infusa similes etiam habent utilitates, sed potentior radix est. Baccæ, sive fructus utique abstergunt, sed evidentius adstringunt; atque laudantur ad contumacem gonorrhæam sistendam: tostæ autem coffeæ modo adhibitæ urinam pellunt.

1118. *RUSCUS Hypoglossum.*

Ruscus foliis supra floriferis sub foliolo. LINN. *spec. p. 1474.*

Ruscus coule simplicis, floribus pedunculatis, foliolo secus. SCOP. *Fl. Carn. p. 321. n. 1.*

Laurus alexandrina fructu pediculo insidente. BAUH. *pin. 304.*

Hypoglossum. LOB. *adv. p. 284.*

Hypoglossum. MATTH.

OFF. *Hypoglossum*, *Bislingua*, *Laurus alexandrina*.

Loc. *LOBELLUS* in saxosis, asperis, incultis sterilibus *Nicaeæ*, & *Liguriæ.* *SUFFRUTEX.*

VIR. Folia *Lauri alexandrinæ* propter vulnerariam vim celebrantur. Abstergant cum evidenti vi adstrictoria, & ulceribus exsiccandis inserviunt. Radices eas præbent utilitates, quas a *RUSCI* radicibus obtineri diximus.

OSYRIS. LINN. *gen. n. 978. syn. n. 1101.*

Flotes sexu, & tota planta distincti. Masculo calyx trifidus; Stamina tria.

Fœmineo calyx idem; Germen stylo carens evadit drupa unilocularis,

monosperma. Mascula planta præbet quandoque flores hermaphroditos

fertiles, atque calyx non semper trifidus est, quadrifidus nempe,

& quinquefidus, 4. aut 5. stamina profert.

1119. *OSYRIS alba.* LINN. *spec. p. 1450.* GOU. *hort. monsp. p. 502.* SAUV. *meth. fol. p. 56.* Icon. *Taur. Vol. VII. tab. 31.*

Oryris frutescens baccifero. BAUH. *pin. 212.*

Caria poetica monspeliensis. CAM. *epit. 26.* LOB. *ic. 432.* MAGN. *bot. monsp. 54.* TOURN. *inst. 664.*

Caria locinorum. ALP. *exot. p. 41. 42.*

Loc. In Comitatu *Nicaensi*, præsertim ad *Villæfronçæ* muros, & sepes vulgaris. *FRUTEX.*

HIPPOPHAE. LINN. *gen.* n. 980. *syn.* n. 1106.

Flores sexu, & tota planta distincti. Masculo calyx bifidus; Stamina quatuor.
Foemineo calyx idem; Germen unico stylo instructum evadit
bacca globosa monosperma.

1110 HIPPOPHAE Rhamnoides.

Hippophae foliis lanceolatis. LINN. *spec.* p. 1452.

Hippophae foliis linearibus, subtus rubiginosis. HALL. *hist. tom.* 2. n. 1603.

Oxyris Rhamnoides. SCOP. *Fl. Carn. ed.* 2. n. 1216.

Rhamnoides fructifera, & florifera folia salicis, baccis leviter flavescens. TOURN. *Cor.* 33.

Rhamnus salicis folio angustiore, fructu flavescens. BAUH. *pin.* 755.

Loc. Abunde in arenosis torrentium, & fluviorum. FRUTEX.

ELÆAGNUS. LINN. *gen.* n. 148. *syn.* n. 159.

Calyx quadrifidus, campanulatus, interne coloratus, epicarpium. Stamina quatuor
brevissima, ex incisuris calycis nata. Germen unico stylo
instructum evadit drupa unilocularis, monosperma.

1111 ELÆAGNUS angustifolia.

Icon. TAUR. Vol. 1. tab. 133.

Elæagnus foliis lanceolatis. LINN. *spec.* p. 176.

Olea sylvestris folia mollis incana. BAUH. *pin.* 472.

Elæagnus. CAM. *epit.* 106.

Elæagnus incanus. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 476.

Loc. In valle Argunæ Prætoriae, & copiosissime circa oppidum d'Avise. ARBOR.

CELTIS. LINN. *gen.* n. 1012. *syn.* n. 1143. TOURN. tab. 383.

Calyx quinquepartitus. Stamina quinque. Germen duobus stylis præditum evadit drupa
globosa, monosperma. Præter flores hermaphroditos adsunt etiam flores masculi, quibus
calyx sexfidus, aut septemfidus cum staminibus sex.

1112 CELTIS australis.

Celtis foliis ovato-lanceolatis. LINN. *spec.* p. 1478.

Celtis foliis oblique ovatis serratis acuminatis. GOU. *hort. monsp.* p. 152. n. 1.

Celtis foliis scabris serratis longissime lanceolatis. HALL. *hist. tom.* 2. n. 1619.

Lotus fructu Cerasi. BAUH. *pin.* 447.

Lotus arbor fructu cerasi. BAUH. *hist.* I. 229.

LAIO. MATTH.

VERN. *Cojendre*, aut *Tnesche*.

Loc. In sylvis prope *Isala d'Aut*, & circa *Eporédiam*: in collibus *Canapiciensis*
frequens, etiam in provincia *Bugellensi* similibus locis. ARBOR.

VIZ. Baccæ non insuaves, dulces, avide a nostratibus pueris comeduntur.

VISCUM. LINN. *gen.* n. 979. *syn.* n. 1105.

Flores sexu in eadem planta distincti. Mari calyx quadrifidus segmentis ovatis,
quibus quatuor antheræ sine filamentis adhaerent. Foemineo calyx similis
ovario insistent; stylus brevis. Fructus sistit baccam globosam glutine
plenam, quæ semen compressum, cordatum continet.

1113 VISCUM album.

Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 10.

Viscum foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. LINN. *spec.* p. 1451.

GER. *Fl. Gallaprov.* p. 47. n. 1.

Viscum baccis albis. BAUH. *pin.* 423.

Viscum quercuum, & aliorum arborum. BAUM. hist. I. part. 2. p. 89.

Visco. MATTH.

Off. Viscum quercinum.

Loc. In collibus *Taurinensibus* occurrit *Quercus*, *Malis*, *Pyris*, *Salicibus* &c. innascens. In valle *Augustae Proetoriarum*, & circa *S. Fronti* observavit *Cl. Dana*. Abunde quoque nascitur in *Subaudia* a *Megeve* ad *Conflans* adnotante *Cl. Bellardi*. Frequens etiam provenit in collibus circa *Buigiera*; *Unellae* tamen, & locis maritimis frequentior, quam in *Pedemonio*. *Frutex*.

VIR. Viscum stirps est parasytica, variis arborum speciebus innascens, quarum non modo corticem, sed & lignum depascitur, exhaustoque succo, non modo eas infirmat, verum etiam enecat. Ejus fructus quorundam avium eibus est, praesertim turdorum, qui semen immatarum cacautes plantam disseminant, quae viscum capiendis avibus suppeditat, unde vetus adagium—*Turdus ipse sibi malum cacos*. Visci albi folia manifeste acida, acerbique sunt, quendam amarae acrimoniae sensum in gustu relinquentia. Cortex longe debiliora principia ostendit, sed similia. Lignum minoris adhuc saporis est. Baccae primo quidem subdulces, vel potius sine gustu esse persentiantur, sed brevi fortiolem rauseosam quandam amaritiam explicant sine acidi principii manifestatione; eadem ab humano ventriculo non digeruntur, infensae sunt indissolubili suo glutine, amaroque stimulo etiam nocere queunt. Minime tamen crediderim actimoniam habere aptam ad hypercatharsim producendam. Folia rejici solent, sed sine juxta causa. Lignum autem tanquam antiepilepticum etiam antiquissimis temporibus adhibuitur est aut in pulverem rasum a drachma semisse ad drachmam unam, aut decoctum a drachmis duabus ad unciam semissem. Multum est nostro seculo disputatum de viribus antiepilepticis ligni Visci; qualitates sensibiles nihil magni promittunt. Experientia mihi monstravit neque hystericæ succurrisse, nullamque evidentem in epilepsia attulisse utilitatem. In spasmodicis nervorum motibus ex nervorum mobilitate, ac in vertigine ex eadem causa aliquod emolumentum adnotavi. Puto igitur blande posse humores solvere, sed praesertim stiptica aliqua vi fibrarum laxitatem emendare. Si vero hujusmodi medicamentum par morbo saepissime non est, certe in morbis convulsivis non nocet. Nocent autem saepius nervina calefacientia, aestumque gignentia, cum frequentissimae convulsiones sanguinis aestum, densitatem, plethoram, aut particularum stimulantium irritationem subsequantur, & morbus talium remedium usu exasperetur. Officinae solent eligere Viscum, quod in *Quercu* adolevit. Fortasse arboris nutrientis natura stipticam vim in Viscum adauget.

LAURUS. LINN. gen. n. 452. syst. n. 498. TOURN. tab. 387.

Laurus nostra dioica est. Variat numero staminum, & corollae calycinae divisione. Corolla calycina 4-6 partita. Nectarium ex glandulis tribus bisetis, germen ciugentibus. Filamenta novem trium ordinum, interioribus glanduliferis. Germen stylum simplicem habet cum stigmate acuto. Fructus est drupa monosperma, corolla calycina comprehensa.

2124 *Laurus nobilis*.

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 62.

Laurus foliis venosis lanceolatis perennantibus, floribus quadrifidis dioicis. LINN. spec. p. 529.

Laurus foliis ovato-lanceolatis, ramis florigeris folio brevioribus. HALL. hist. tom. 2. n. 1602.

Laurus vulgaris. BAUM. pin. 460.

Lauro. MATTH.

VERN. Laur.

Off. Laurus.

Loc. Ubique locis collinis, sed tantummodo in vicinis domuum occurrit, atque data opera primum exculta fuisse videtur. *Arbor*.

VIR. Maxima medicamenta largitur LAURI genus, uti *Camphoram*, *Cinnamomum*, *Cassiam*, *Sassafras* &c. LAURUS autem nobilis tanquam Europaeum aroma habe-

ri potest, cujus folia non modo propter aromaticam gratiam, sed ad citos flatulentos corrigendos, frequens eorundem condimentum constituunt. Aromatica sunt, stimulantia, calefacientia, carminativa. Ad internum autem medicinale usum Medici adhibent ipsius baccas, in quibus coacervata est activa aromatica virtus. Multum eae continent olei unguinosi crassioris, & aetheri aromatici cum substantia gummosa adstringente non sine sale alkalino fixo. Haec autem omnia ita intime mixta sunt, ut aqua etiam sola se onerare iis activis principiis possit. Baccæ ipsæ multum cum baccis *Juniperi* conveniunt, sed in his minor est vis carminativa, aromatica; sed efficacior vis diuretica aperiens. *Lauri* baccæ summæ utilitatis sunt in intestinorum morbis ad tonum ipsorum excitandum, nervorum spasmus leniendum, ac flatus præsertim discutiendos. Menses etiam propellant, foetus, & secundinarum expulsionem adjuvant, atque dolores, qui partum subsequuntur, mitigant: mirifice alimentorum concoctionem adjuvant, quando ea potissimum a flatibus accumulatis perturbatur. In tympanite, illa quidem, quæ calefacientia, & stimulantia permittit, utilissimæ sunt: in colica flatulenta injecti clysters solent baccas *Lauri* recipere. Folia, & baccæ ad vitiosum aërem corrigendum comburuntur, ac in focu adhibentur ad serosos tumores resolvendos, & dissipandos. Oleum per distillationem e baccis *Lauri* elicium magnum carminativum, & resolvens est, valde proficuum ad paralyticorum membra cum frictione illinienda. Baccæ *Lauri* solent contundi, & conterì, ut facilius ab aqua seminis dura substantia penetraretur. Decoquuntur vero a numero octo ad viginti pro una dosi in sufficienti menstrui quantitate.

ARUM. LINN. *gen. n.* 915. *syn. n.* 1028. *TOURN.* tab. 69.

Calyx est spatha monophylla, magna, basi convoluta, interne colorata. Spadix spatha brevior, clavatus, simplicissimus, supra nudus, ad suam basim cingitur plurimorum germinum ordinibus, quæ sine stylo stigmate barbato donantur. Supra germina duplex sedet ordo antherarum tetragonarum, quæ sessiles in *Aro* sunt cum interjectis filamentis, in *Arisæ* filamentis insistant. Germina mutantur in baccas polyspermas.

2115. *ARUM* Dracunculus.

Arum foliis pedatis, foliolis lanceolatis integerrimis superantibus spatham spadice brevior. LINN. *spec. p.* 1368.

Arum foliis palmatis, foliolis lanceolatis integerrimis spatham spadice clavata brevior. superantibus. ROY. *Leyd. p.* 1. n. 2.

Dracunculus polyphyllus. BAUH. *pin.* 195.

Dracontium. DOD. *pempt.* 329.

Dragonæ minor. MATTH.

Off. *Dracunculus*, *Dracontium*, & *Serpentaria*.

Loc. Circa Montaldo di Mondovì Ignasius MOLINER; collum etiam *Taurinensium* indigena planta est. *PERENNE.*

2116. *ARUM* maculatum.

Icon. Taur. Vol. VI. tab. 145. & 146.

Arum acule foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. LINN. *spec. p.* 1370.

Arum foliis sagittatis, spatha recta clava cylindrica. HALL. *hist. rom. 2. n.* 1302.

Arum foliis sagittatis, cucullo recta. HALL. *helv.* 261.

Arum vulgare. LAM. *Fl. Franc. rom. 3. p.* 537.

Arum vulgare non maculatum. BAUH. *pin.* 195.

Arum. BAUH. *hist. II. p.* 783.

n. *Arum venis albis.* BAUH. *pin.* 195.

Ara. MATTH.

Off. *Arum.*

Loc. Ad sepes, & in umbrosis secus sylvas collum *Taurinensium*, & ad radices montium subalpinorum enascitur. *PERENNE.*

Vin. Tota *Ara* planta acris est, caustica, escarotica, agens sale quodam volatili-oleoso singularis naturæ. Folia *Ara* labiis, & linguae imposita cum mordacitate contumaci ustionis sensum imprimunt: cuti applicita eam rubefaciunt, atque

vesicas excitant. Radix crassa est, tuberosa, substantiæ farinaceæ, & succum lacreum copiosum fundens, si vulnerata sit, aut expressa; similem lacreum liquorem, sed minori copia dant etiam foliorum petioli. Hic lacteus succus continet præsertim acres, activas plantæ particulas. Eadem radix per exsiccationem non parum suæ acrimoniæ amittit, integram vero exiit, si maxime vetusta existerit, aut in clibano insignem calorem passa sit. Quamvis maxime acris planta sit, prudenter tamen adhibita intus dari potest, ac insignes præbet utilitates. Macum potenter abstergit, solida fortiter exstimulat, coactumque serum solvit. Convenit non parum viribus suis, & principiorum natura cum *Sinapis* seminibus, ac in iisdem morbis, iisdem servatis cautelis, adhiberi potest; opportuna nimirum est radix *Art* cachecticis, frigidis, pituitosis. Speciatim laudatur in asthmate humido melli adjuncta ejusdem decoctio. Alias autem ficus, passulas, aut liquiritiam Medici adjungunt, ut actis medicamenti sæpe stomacho infensi stimulum leniant. Radix hujus plantæ probe siccata, cum minore acrimoniâ habet, solet confidentius adhiberi. Haec ingreditur pulverem stomachicum, cujus utilitas non exigua est ad mucum abstergendum, ac stomachi actionem excitandam. Utiliter etiam aliis aptis remediis adjicitur in febribus lentis, & quotidianis, in quibus sæpissime oportet stomachi vim erigere, lenosque mucosos humores solvere. Substantia *Art*, acris, volatilibus particulis exuta dat materiem insulsam, farinaceam, nutriemem instar *Colokasiae*, *Maniott*, aliarumque radicum acerrimarum, ex quibus per calorem ab acris particulis liberatis panis conficitur. Ipsa *faecula Art*, quæ nihil aliud est, nisi sedimentum, quod succus expressus, & quiescens deponit, adeo insulsa res evadit, siccata cum fuerit, ut inter inertia medicamenta nostris temporibus referatur. Substantia farinosa *Art* propter albedinem suam se se commendat ad cutis nitorem, & alborem augendum. Eadem porro, cum non sine glutine sit, *amili* usum præstare potest. Infusum radicis hujusce recentis, aut ejus, quæ per exsiccationem acrimoniâ suam non amiserit, utile est ad eluendas, ac dissipandas maculas cutis, easque præsertim, quæ ab insolatu proveniunt. Pictones etiam mulieres loco saponis radice *Art* utuntur ad sordes lineorum abstergendas. Radix eadem convenienter siccata dari potest a granis quinque ad grana quindecim; in infuso a drachma semisse ad drachmas duas. Recens veto caute admodum est præscribenda, convenientique vehiculo diluenda.

2127. ARUM *Arisarum*.

Arum acule foliis cordato-oblongis, spathæ apertura ovata. LINN. *synt.* 12. p. 604.

Arisarum latifolium majus. BAUH. *pin.* 196.

Arum incurvatum. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 338.

Arisarum latifolium alterum. CLUS. *hist.* 2. p. 73.

Loc. In sylvis *Nicaensibus* copiose: TERRANEUS in collibus *Uneliæ*. PERENNE.



CLASSIS XI.

231

I. GRAMINA LEGITIMA.

A. FLORIBUS HERMAPHRODITIS

1. DIANTHERE

ANTHOXANTHUM. LINN. *gen. n.* 40. *sys. n.* 42.

Avenae proximum est Anthoxanthum, sed duobus tantum staminibus a reliquis graminum generibus distinguitur.

1118 **A**NTHOXANTHUM odoratum.

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 64.

Anthoxanthum spica oblonga ovata, fasciculis subpedunculatis, arista longioribus. LINN. *sys. 12. p.* 67. SCHREB. *gram. p.* 49. tab. 5.

Avena diantha folliculo villosa, calycis glumis inaequalibus, altera de imo dorso, altera de summo aristata. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1491.

Gramen pratense, spica flavescens. BAUH. *The. p.* 44. SCHEUCHZ. *gram. 28.*

Gramen avenaceum odoratum spica flavescens. MONTI *prodr. ic. 84.*

Loc. Nihil in pratis vulgatus. Varietatem, spicam multo longiorem, atque interruptam, ferentem legit Cl. BELLARDI in graminosis prope Tendam, aliisque locis subalpinis. PERENNA.

2. TRIANTHERE

a. Locusta uniflora, & calyce nullo.

NARDUS. LINN. *gen. n.* 65. *sys. n.* 69. SCOP. *introd. n.* 63.

Flores solitarii, spicati. Glumae folliculi binae, angustae, acuminatae, aut etiam aristatae.

1119 **N**ARDUS stricta.

Nardus spica setacea recta secunda. LINN. *sys. 12. p.* 84. SCHREB. *gram. pag.* 65. tab. 7.

Gramen sparteum juncifolium. BAUH. *pin. 5.* SCHEUCHZ. *gram. 90.*

Nardus spica secunda lineari recta compacta. GOU. *h. 32. n.* 1.

Nardus spica setacea recta. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1410.

Gramen sparteum juncifolium. BAUH. *theatr. p.* 69. SCHEUCHZ. *agron. p.* 90. tab. 2. f. 10.

Loc. In pascuis montanis, & subalpinis frequens. PERENNIS.

1120 **N**ARDUS aristatus.

Nardus calycibus aristatis. LINN. *spec. p.* 78.

Nardus spica incurva aequali, calycina gluma exteriore aristato-acuminata longissima, flaribus distantibus alternis. GOU. *h. p.* 33. n. 2.

Agrostis incurvata. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. p.* 62. n. 28.

Gramen exilis arundinaceum minimum, acumine reflexum. SCHEUCHZ. BOCC. muz. 2. p. 74. tab. 57.

Gramen junceum nodosum minimum capillare. BARR. ic. 117. n. 1.

Loc. In agro Nicaensi. Secus macilentia pascua, & ad vias locis declivibus non modo in Liguria, & Monteferrata, sed etiam in collibus Taurinensibus, & agro Taurinensi occurrat. ANNUUS.

HOMALOCENCHRUS. HALL. hist. 2. p. 201.

Flores paniculati; glumæ corollinae, sive folliculi ovatae.

2131. HOMALOCENCHRUS oryzoides.

Phalaris panicula effusa, glumarum carinis ciliatis. LINN. spec. p. 81. SCHREB. gram. pari. 2. pag. 6. tab. 22.

Homalocenchrus. HALL. hist. tom. 2. n. 1412.

Gramen miliaceum palustre serotinum, paniculis ex locustis compressis compositis. MONTI prodr. pag. 51. ic. 58.

Loc. Ad fossas, aquaeductus, & secus aquas in agro Canapicensi, & Vercellensi admodum frequens. Provenit etiam in agro Pedemontana secus fossas aquarum lente fluentium. Circa Morena observavit Cl. BALLARDI. PERENNIS.

Oss. HOMALOCENCHRI genus primum constituit Cl. MIEG. (act. helv. IV. p. 317.) plantamque accurate descripsit.

b. Locusta uniflora, & calyce biglumi.

PHLEUM. LINN. gen. num. 71. syst. num. 77.

Calycis glumæ cuspidatae, & intus truncatae.

2132. PHLEUM pratense.

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 68. & Vol. XXII. tab. 87.

Phleum spica cylindrica longissima ciliata, culmo erecto. LINN. syst. 12. p. 88. SCHREB. gram. p. 102. tab. 14.

Phleum caule erecta, spiculis cylindricis longissimis, glumis calycinis oblique truncatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1528.

Gramen thyphoides maximum spica longissima. BAUH. pin. 4. SCHEUCHZ. gram. 60. MORIS. hist. 3. p. 188. n. 8. tab. 4. f. 2.

Phleum spica cylindrica longissima, glumis ciliatis. HUDS. p. 22. n. 1.

Loc. Abunde in pratis. PERENNE.

2133. PHLEUM viride. †

Phleum spica cylindrica laevi, culmo erecta.

Oss. Differt a praecedenti spica viridi laevi constanter non ciliata, neque aspera, dimidio brevior, dentes calycis breviores sunt, quam in aliis speciebus. A PHLEO nodosa radice non bulbosa, foliis non obliquis. In PHLEO viridi glumæ calycinæ lentis vitreae ope asperiusculæ observantur, & duobus nervis eminentibus instructae sunt. Loc. Cl. BALLARDI ad sepes agrorum locis sterilibus prope Moncalieri. ANNUUM.

2134. PHLEUM alpinum.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 22. f. 4. 6.

Phleum spica ovata cylindracea. LINN. spec. p. 88.

Phleum spicis ovatis hirsutis, locustis longe bicornibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1529.

Gramen thyphoides alpinum spica brevi densa, & veluti villosa. SCHEUCHZ. agr. p. 64.

Loc. In pascuis, & pratis editioribus alpinum non infrequens. PERENNE.

2135. PHLEUM Gerardi N.

Phleum spica subraunda, glumis ciliatis, caule simplici, foliarum vaginis ventricosis.

GER. Fl. Galloprov. p. 78. n. 4.

Phleum capitatium. SCOF. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 79.

Loc. Nasciuntur in summis alpium pratis, montis Cenisii, Vinadii, della Vanoesa.

PERENNE.

1135. PHLEUM nodosum.

Phleum spica cylindrica, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosa. LINN. *syst.* 12. p. 88.

Phleum caule imo bulboso declinante, glumis calycinis oblique truncatis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1530.

Gramen nodosum spico parva. BAUH. *pin.* 2. *prodr.* 6. *theatr.* 20.

Phleum spica cylindrica breviori glabra, radice bulbosa. GER. p. 78. n. 2.

Loc. In pascuis, & ad vias in montanis. PERENNE.

1136. PHLEUM arenarium.

Phleum spica ovata ciliata, culmo ramosa. LINN. *syst.* 12. p. 77.

Gramen typhinum maritimum minus. PLUK. *alm.* 177. *tab.* 33. f. 8. SCHEUCHZ. *gram.* 63.

Phalaris spica ovata, calycis valvulis dorso ciliatis, culmo ramoso. HUDS. p. 21. n. 2.

Loc. Locis arenosis, & macilentis. ANNUUM.

1137. PHLEUM schoenoides.

Phleum spicis avatis ovalatis, foliis brevissimis mucronatis amplexicaulibus. LINN. *spec.* p. 88.

Gramen maritimum typhinum brevi, & crassiori spica ad singulo genicula prodeunte, sive secundum. SCHEUCHZ. *gram.* 86.

Loc. In agro Nicaeensi. ANNUUM.

1138. PHLEUM Michelii N.

Phleum spicis paniculatis hirsutis, calycibus lanceolatis. HALL. *hist.* n. 1532.

Gramen typhinum junceum perenne. BARR. *ic.* 21. n. 2.

Gramen spicatum saxatile glabrum perenne, spica cylindracea flavescens longa, locustis acutis ciliis instar pilosis. HORT. *Pisan.*

Loc. Cl. BELLARDI in pascuis montanis di Borgomasino, locis siccis di Borgo d' Ale. PERENNE.

PHALARIS. LINN. *gen.* n. 96., *syst.* n. 74.

Calycis valvae carinatae, acuminatae, non truncatae, glumas corollae, sive folliculi includunt.

1139. PHALARIS canariensis.

ICON. *Taur.* Vol. 1. *tab.* 67.

Phalaris panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. LINN. *spec.* p. 79. SCHREB. *gram.* pag. 83. *tab.* 10. *fig.* 1.

Phalaris major semine albo. BAUH. *pin.* 28.

Gramen spicatum semine miliacea albo. TOURN. *inst.* p. 518.

Loc. In Comitatu Nicaeensi. ANNUA.

1140. PHALARIS phleoides.

Phalaris paniculo cylindrica spiciformi glabra passim vivipara. LINN. *syst.* 12. p. 86.

Phleum culmo recto, spicis cylindricis glabris, calycibus brevissimis mucronatis. HALL.

hist. tom. 2. n. 1531.

Phalaris panicula cylindrica spiciformi longiore glabra. GER. p. 77. n. 5.

Gramen typhoides asperum primum. BAUH. *theatr.* 57. *pin.* 4. SCHEUCHZ. *ogram.* p. 61.

Gramen cum cauda muris, minus. BAUH. *hin.* II. p. 471.

Gramen spicatum spica cylindracea tenuiori longa. TOURN. *inst.* p. 520.

Loc. Ad limites agrorum, & vias. ANNUA.

ALLIONI *Fl. Pedem.* Tom. II.

N n n

2141. *PHALARIS utriculata*.
Icon. Taur. Vol. XXII. tab. 84.
Phalaris panicula spicata, petalis aristata, vagina supremi folii spathiformis.
 LINN. spec. p. 80.
Gramen pratense spica purpurea ex utriculo prodeunte, sive Gramen folio spicam ample-
xante. BAUH. pin. 3. theatr. 44.
Loc. In pratis collinis, atque ad vias non infrequens: etiam circa Taurinum nasci-
tur. In pratis di Borgomasino frequentem observavit Cl. BELLARDI. ANNUA.
2142. *PHALARIS paradoxa*.
Phalaris panicula oblonga, flosculis mucronatis neutris plurimis, infimis praemorsis. LINN.
 spec. app. 1665. dec. 35. 18. SCHREB. gram. p. 93. tab. 12.
Gramen phalaroides spica brevi reclinata ex utriculo prodeunte. FLUK. atm. 177. tab.
 33. f. 5.
Phalaris panicula ovato-oblonga, apice dilatata. GER. prov. 75.
Loc. In Comitatu Nicaensi. ANNUA.
2143. *PHALARIS arundinacea*.
Phalaris panicula oblonga ventricosa amplo. LINN. syst. 12. p. 86.
Arundo locustis unifloris fasciculatis imbricatis, glumis floralibus nitenibus subhirsutis.
 HALL. hist. tom. 2. n. 1524.
Gramen arundinaceum spicatum. BAUH. pin. 6. theatr. 94.
Gramen arundinaceum acerosa jerseyanum. RAJ. angl. 3. p. 400. MORIS. hist. 3. p. 203.
 2. 8. tab. 6. f. 41.
Loc. Frequens ad fossas aquarum, & secus aquaeductus. PERENNIS.
- ALOPECURUS.** LINN. gen. n. 72. syst. n. 78.
 Gluma corollae, sive folliculi univalvis.
2144. **ALOPECURUS bulbosus.**
Alopecurus culmo erecto, spica cylindrica, radice bulbosa. LINN. syst. 12. p. 89. Spec.
 app. p. 1665.
Alopecurus culmo spicato erecto, radice bulbosa. GOU. hort. 37.
Alopecurus spica cylindrica, culmo erecto, radice bulbosa. HUDS. p. 24.
Gramen typhinum phalaroides, pilosa spica, aquaticum, bulbosum. BARR. ic. 699. f. 1.
 & 680. f. 1. 2.
Loc. In pratis udis Liguriaë. PERENNIS.
2145. **ALOPECURUS pratensis.**
Alopecurus culmo spicato erecto, glumis villosis, corollis mucicis. LINN. syst. 12. p. 89.
 SCHREB. gram. p. 135. tab. 19. fig. 1.
Alopecurus spica ovata. HALL. hist. tom. 2. n. 1539.
Alopecurus panicula cylindrica spiciformi, culmo erecto. HUDS. p. 23. n. 1.
Alopecurus culmo spicato erecto, glumis ciliatis. GER. p. 74. n. 2.
Gramen phalaroides majus, seu italicum. BAUH. pin. 4. theatr. 55. MORIS. hist. 3. 2. 8.
 tab. 4. f. 8.
Gramen Alopecuro simile, glabrum cum pilis longiusculis in spica, buccordn. BAUH.
 hist. II. p. 475.
Gramen phalaroides spica molli, sive germanicum. BAUH. pin. 4. prodr. 10.
Gramen Alopecurum viridi, & molli spica. BARR. ic. 123.
Loc. In pratis montanis, & collinis subhumidis frequens. PERENNIS.
2146. **ALOPECURUS agrestis.**
Icon. Taur. Vol. I. tab. 65.
Alopecurus culmo spicato erecto, glumis loevibus. LINN. syst. 12. p. 89. SCHREB. gram.
 p. 140. tab. 19. fig. 2.
Alopecurus culmo recto spicato, calyce ciliato. HALL. hist. tom. 2. n. 1540.

- Alopecurus culmo erecto*. ROY. Leyd. p. 54. n. 1.
Alopecurus culmo spicato erecto, glumis glabris. GER. p. 74. 11.
Gramen typhoides spica angustiore. BAUH. pin. 4. theatr. 53.
Gramen typhinum plantaginis spica, aristis geniculatis. BARR. ic. 699. f. 2.
 Loc. Ad limites agrorum. *ANNUUS*.
2147. *ALOPECURUS geniculatus*.
Alopecurus culmo spicato infracto, corollis muticis. LINN. syst. 12. p. 89.
Alopecurus culmo infracto, aristis gluma longioribus. ROY. Lugd. 54.
Gramen aquaticum geniculatum spicatum. BAUH. pin. 3. SCHEUCHZ. gram. 72.
Gramen typhinum aquaticum molle spica glauco. MORIS. prodr. 49.
 Loc. Secus flumina, aqueductus, fossasque aquarum. *PERENNIS*.
2148. *ALOPECURUS monspeliensis*.
 ICON TAUR. Vol. XXII. tab. 77.
Alopecurus panicula subspicata, calycibus scabris, corollis aristatis. LINN. syst. 12. p. 89.
Phleum crinitum. SCHREB. gram. p. 151. tab. 20. fig. 3.
Gramen alopecurum majus, spico virescente divulsa, pilis longioribus. BARR. ic. 115. f. 2.
 SCHEUCHZ. gram. 155.
Alopecurus (aristatus) panicula erecta ovata, glumis calycinis ovatis aristatis, oris vaginæ foliorum stipulatis. GOV. h. p. 37. n. 2.
Agrostis panicula oblongo, calycibus aequalibus terminatis, aristis longis rectis. GER. p. 80. n. 3.
 Loc. Ad limites agrorum in Comitatu Nicaeensi, & Provincia Aquensi. *ANNUUS*.
2149. *ALOPECURUS paniceus*.
Alopecurus panicula subspicata, glumis villosis, corollis aristatis. LINN. spec. p. 90.
Gramen Alopecurus minus spico longiore. BAUH. pin. p. 4. theatr. 57. SCHEUCHZ. agr. p. 154.
 Loc. In pascuis declivibus agri Pedemoniani frequenter adinvenitur. *ANNUUS*.
2150. *ALOPECURUS ciliatus*. †
Alopecurus culmo spicato erecto, glumis ciliatis. GER. Fl. Galloprov. p. 74.
Gramen spicatum spica cylindrica, longioribus villis donata. TOURN. p. 520.
Gramen phalaroides majus, s. italicum. BAUH. pin. 4. theatr. 55.
 Loc. Cl. BELLARDI in pratis elatioribus di Breglio. *ANNUUS*.
2151. *ALOPECURUS litoreus*. †
An? Gramen typhinum maritimum longius, radiculatum. BARR. ic. 717.
Phalaris calyce divaricato plano ovato ciliato, gluma florali interiori bidentato. HALL. append. 2. suppl. agrar. p. 60.
 Loc. Cl. BELLARDI ad litora maris a Nicaea ad flumen le Var. *ANNUUS*.

MILIUM. LINN. gen. n. 73. syst. n. 79.

Corolla bivalvis, calyce brevior. Stigmata penicilliformia.

2152. *MILIUM lendigerum*.
Milium panicula subspicata floribus aristatis. LINN. spec. p. 91. SCHREB. gram. port. 2. pag. 14. tab. 23. f. 3.
Gramen alopecuro accedens ex culmi geniculis, spicas in petiolis longiusculis promens. PLUK. alm. 177. tab. 33. f. 6.
Agrostis (ventricosa) calycibus inferne ventricosis, valvulo exteriori acuminata longitudine aristæ. GOV. h. p. 39. n. 1. tab. 1.
 Loc. In Comitatu Nicaeensi. *ANNUUM*.
2153. *MILIUM effusum*.
Milium floribus paniculatis dispersis muticis. LINN. spec. p. 90.

Milium paniculis raris longissime petiolatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1525.

Gramen sylvaticum panicula miliacea sparsa. BAUH. pin. 8. Theatr. 141. gram. 133.

MORIS. hist. 3. 1. 8. tab. 5. f. 10.

Loc. In sylvis opacis. PERENNE.

1154. MILIUM paradoxum.

Milium floribus paniculatis aristatis. LINN. spec. p. 90. SCHREB. gram. part. 2. pag. 50. tab. 28. fig. 2.

Milium paradoxum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 58. tab. 1.

Agrostis panicula patente, petalorum arista terminali recurva. GER. p. 81. n. 4.

Agrastis racemis ternatis pendulis, spiculis aristatis, arista undulosa longa. SCOP. Fl. Carn. ed. 1. p. 186.

Poa uniflora calycis glumis ovato-lanceolatis sublividis, semine nistente. HALL. append. ad agron. p. 51.

Gramen miliaceum saxatile angustifolium glabrum perenne, panicula fusca, semine nigra splendens. MICH. hort. pis. p. 73.

Milium nigrum. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 568.

Loc. In agro Nicaeensi. Cl. BELLARDI ad rupes mari proximas. BIENNE.

AGROSTIS. LINN. gen. n. 74. syst. n. 80.

Glumae calycis, & folliculi acuminatae, aut etiam aristatae, sed glumae folliculi, calycipis glumis longiores.

ARISTATÆ

1155. AGROSTIS spica venti.

Agrostis petalo exteriore, arista recta stricta longissima, panicula patula. LINN. syst. 12. p. 90. HUDS. gram. 26.

Avena monantha, panicula adscendente multiflora, calyce laevi flarali, arista longissima. HALL. hist. tom. 2. n. 1480.

Gramen agrarum Lobelii. BAUH. hist. II. p. 461.

Gramen agrarum spica venti. PARK. 1151.

Gramen segetum altissimum paniculo sparsa. SCHROCH. agr. 144. tab. 3. fig. 10.

Gramen segetum panicula arundinacea. BAUH. theatr. p. 34. 35. TOURN. inst. p. 524.

Loc. Vulgatissima in agris. ANNUA.

1156. AGROSTIS miliacea.

Agrostis petalo exteriore, arista terminali recta stricta mediocri. LINN. spec. p. 91.

Loc. Circa Nicaeam legit Cl. BELLARDI. Habeo etiam in Liguria lectam circa Garressia, & Ormen. PERENNIS.

1157. AGROSTIS serotina.

Agrostis panicula flosculis oblongis mucronatis, culma obiecta, foliis brevissimis. LINN. mant. 30.

Gramen foliaceum serotinum, panicula dispersa. SEGU. Veron. 3. pag. 146. tab. 3. f. 2.

Loc. In pascuis, & ad vias locis collinis calidioribus frequens. PERENNIS.

1158. AGROSTIS rubra.

Agrostis paniculae parte florente patentissima, petalo exteriore glabra, arista terminali tertiis recurva. LINN. spec. p. 92.

Panicum serotinum arvense spica pyramidata. TOURN. inst. 515.

Agrostis panicula lanceolata spiciformi, calyce flosculo tripla longiare, petalorum arista dorsali recurva. HUDS. pag. 26. n. 3.

Loc. In pascuis, & pratis macilentis submontanis saepe occurrit. PERENNIS.

1159. AGROSTIS canina.

Agrostis calycibus elongatis, petalorum arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis. LINN. syst. 12. p. 90.

- Avena monantha* panicula diffusa multiflora adscendente, gluma calycina exasperata. HALL. hist. tom. 2. n. 1479.
Agrastis calycibus coloratis, petalorum arista dorsali recurva. HUDS. fl. angl. p. 26.
Gramen supinum caninum paniculatum folio varians. BAUM. pin. p. 2.
Gramen paniculatum supinum, ad infima culmarum genicula foliarum capillarum fasciculis donatum. SCHEUCHZ. agr. p. 141. tab. 3. f. 9.
 Loc. In pascuis humidis agri Pedemoniani frequens. PERENNIS.
1160. AGROSTIS alpina. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 60. n. 86.
Avena monantha paniculata, gluma calycina exasperata, arista florali, aequali. HALL. hist. tom. 2. n. 1477.
Gramen parvum paniculatum alpinum, panicula spadicea aristatum. SCHEUCHZ. agr. p. 140. prodr. p. 22. tab. 4. f. 1.
 Loc. In pascuis summorum, & editiorum alpium. ANNUA.
1161. AGROSTIS rupestris N.
Avena monantha paniculata foliis setaceis gluma calycina exasperata, arista flore duplo longiori. HALL. hist. tom. 2. n. 1478.
Gramen paniculatum, capillacea folia, locustis parvis spadiceo-fuscis aristatis. SCHEUCHZ. agr. p. 141.
 Loc. In rupibus montanis apricis. ANNUA.

MUTICÆ

1162. AGROSTIS stolonifera.
 Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 82.
Agrastis paniculae ramulis patentibus muticis, culmo repente, calycibus aequalibus. LINN. syst. 12. p. 90.
Poa stolonifera monantha, calycibus laeviter exasperatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1473.
Agrastis culma repente, vagina supremi folii ventricosa. ROY. Leyd. p. 59. n. 2.
Gramen caninum supinum minus. SCHEUCHZ. agr. p. 128.
Agrastis culmo repente, foliis radicalibus brevioribus, folii suprema vagina ventricosa, fasciculis muticis. GÖRTER. ingr. p. 10.
Agrastis paniculae ramulis divaricatis muticis culma repente, calycibus aequalibus. HUDS. fl. angl. p. 27.
 2. *Gramen radice repente, panicula densa spicata spadiceo-viridi, locustis exiguis muticis*. SCHEUCHZ. gram. 130.
 Loc. Ad vias locis sterilibus, & sabulosis. PERENNIS.
1163. AGROSTIS pungens.
Agrastis panicula caarctata mutica, foliis involutis rigidis pungentibus: superioribus oblique apposis. SCHREB. gram. pag. 46. tab. 27.
 Loc. Legit Cl. BELLARDI locis aridis mari Nicaensi proximis. PERENNIS.
1164. AGROSTIS aculeata. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 89.
Schaenus (aculeatus) culmo tereti ramoso capitulis terminalibus, involucria triphylla brevissimo rigido patente. LINN. spec. p. 63.
Gramen album capitulis aculeatis italicum. BAUM. pin. 7. Theatr. 108. SCHEUCHZ. agr. p. 85.
Gramen spicatum spicis in capitulum foliatum congestis. TOURN. inst. p. 519.
 Loc. In agro Nicaensi. PERENNIS.
1165. AGROSTIS capillaris.
Agrastis panicula capillari patente, calycibus subulatis aequalibus hispidiusculis coloratis, fasciculis muticis. LINN. spec. p. 93.
Poa monantha caule erecto, panicula diffusa, calycibus exasperatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1475.
Agrastis panicula compressa, calycibus subulatis aequalibus hispidiusculis coloratis. ROY. Leyd. p. 59. n. 1.
 ALLIOTTI Fl. Pedem. Tam. II.

- Agrostis panicula capillari patente, spiculis coloratis musicis*. SCOP. Fl. Carn. 188.
Gramen monanthum panicula spadicea delicatior. BAUH. pin. 3. prodr. 12. SCHEUCHZ.
 gram. 129.
 Loc. In pratis humidis montanis. *ANNUA*.
1166. *AGROSTIS alba*.
Agrostis panicula laxa, calycibus musicis aequalibus. LINN. spec. p. 93.
Gramen miliaceum majus panicula spadicea, & viridi. RAJ. angl. 3. p. 404.
 Loc. In sylvis montanis. *PERENNIS*.
1167. *AGROSTIS pumila*.
Agrostis panicula mutica secunda, culmis fasciculatis erectis. LINN. mant. 31.
Poa monantha foliis setaceis, calycibus dorso exasperatis. HALL. helv. n. 1474.
Gramen minimum palustre, panicula spadicea delicata, tenuifolium. SCHEUCHZ. agr. 131.
 Loc. Reperta est circa Lucengo. *ANNUA*.
1168. *AGROSTIS minima*.
Agrostis panicula mutica filiformi. LINN. spec. p. 93. HUDS. p. 18.
Gramen minimum, paniculis elegantissimis. BAUH. pin. 2. Theatr. 16. SCHEUCHZ. agr.
 p. 40. MORIS. hist. 3. p. 100. 1. 8. tab. 2. f. 10.
Gramen sparteum espillaceo folio minimum. DILL. append. 173.
 Loc. In agro Nicaeensi. *ANNUA*.

ROTTBOLLA. LINN. suppl. gener.

Locustae uniflorae, flexuosi caulis scrobibus appressae. Calyx biglumis,
 sed glumis juxta se positis, ita ut uniglumis calyx videatur:
 folliculis biglumis.

1169. **R**OTTBOLLA incurvata.
Rottbolla spica teretis subulata, gluma calycina subulata appressa bipartita. LINN. suppl.
 p. 114.
Agrostis incurvata. SCOP. Fl. Carn. p. 62. n. 88.
Aegilops (incurvata) spica subulata mutica laevi incurva, calycibus unifloris. LINN.
 spec. p. 1490.
Gramen loliaceum maritimum scorpioides. SCHEUCHZ. agr. p. 42.
Gramen myuros erectum minimum arundinaceum. BOCC. mus. 70. tab. 59.
Nardus spica subulata disticha. ROY. lugd. 58.
 Loc. Unelinae, & Nicaeae in agris mari proximis. *ANNUA*.

DIGITARIA. HALL. hist. rom. 2. p. 244.

Receptaculum flores susinens se habet ut in Tritico, & Rottbolla. Calyx biglumis
 ex glumis oppositis folliculum continet, qui etiam bivalvis est, valvis difficile
 superabilibus semen acie involventibus. Non potest inter Panicam manere
 propter defectum tertiae glumae calycinae.

1170. **D**IGITARIA dactylon.
 Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 10. fig. 2.
Panicum (dactylon) spicis digitatis patentibus, basi interiore villosis, floribus solitariis,
sarmentis repentibus. LINN. spec. p. 85.
Digitaria molonibus teretibus, foliis patulis glabris, spicis digitatis. HALL. hist. rom.
 2. 1527.
Gramen dactylon folio arundinaceo, majus aculeatum forte Plinii. BAUH. pin. 7.
Gramen dactylon radice repente, 1. officinarum. SCHEUCHZ. gram. 104.
Digitaria dactylon. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 73.
 Loc. In pascuis, & agris passim. *PERENNIS*.

1171. DIGITARIA sanguinalis.

Icon. TAUR. Vol. XXIV. tab. 79.

Panicum (sanguinale) spicis digitatis basi interiore nodosis flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. LINN. spec. p. 84. SCHREB. gram. p. 119. tab. 16.

Digitaria foliis subhirsutis, caule debili, spicis verticillatis, scapo ancipite. HALL. hist. tom. 2. n. 1326.

Gramen dactylon folio latiore. BAUH. pin. 8. theatr. 114. SCHEUCHZ. gram. 101.

Digitaria sanguinalis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 72.

Loc. In arvis ubique. Julio, & Augusto flor. ANNUA.

STIPA. LINN. gen. n. 84. syst. n. 98.

Folliculi gluma una, terminata arista, locustam multoties superante.

1172. STIPA pennata.

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 80.

Stipa aristas lanatis. LINN. spec. p. 115.

Festuca aristas paniculae circiter longitudine plumosae. ROY. lugdb. 68.

Bromus corniculatus. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 608.

Loc. E rupium fissuris locis apricis, & montanis solet prodire. PERENNIS.

1173. STIPA capillata.

Icon. TAUR. Vol. XXI. tab. 93.

Stipa aristas nudis curvatis, calycibus semine longioribus, foliis intus pubescentibus. LINN. syst. 12. p. 98.

Festuca longissimis aristas. BAUH. pin. 10. theatr. 153.

Loc. Circa Segusium in valle Augustae Praetoriae, & in monte Sancti Michaelis della Chiesa locis apricis. PERENNIS.

LAGURUS. LINN. gen. n. 86. syst. n. 92.

Calycis glumae aristatae arista villosa. Folliculus biglumis valvula majori terminata duplici arista cum tertia ad dorsum accedente, valvula altera minori acuminata.

Semen oblongum folliculo arcu inclusum, aristatum.

1174. LAGURUS ovatus.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 22. & Vol. XXII. tab. 7. fig. 2.

Lagurus spica ovata aristata. LINN. spec. p. 119. SCHREB. gram. p. 143. tab. 19. fig. 3.

Gramen alopecuroides, spica rotundiore. BAUH. pin. 4. theatr. 56.

Gramen alopecurum molle, spica incana acuta minore. BARR. ic. 116. n. 1.

Gramen spicatum tomentosum longissimis aristas donatum. TOURN. inst. 517. SCHEUCHZ. agrost. 58.

Loc. In agro Nicaeensi frequens. ANNUUS.

1175. LAGURUS cylindricus.

Lagurus spica cylindrica mutica. LINN. spec. p. 120.

Gramen alopecurus, spica longa tomentosa candicante. BAUH. hist. II. p. 474.

Gramen tomentosum spicatum. BAUH. pin. 4.

Lagurus spica cylindrica longissima mutica. GER. p. 103. n. 1.

Gramen pratense alopecurum sericea panicula. BARR. ic. 2.

Loc. Etiam agri Nicaeensis indigena planta est. PERENNIS.

C. LOCUSTA UNIFLORA, ET CALYCE TRIGLUMI

PANICUM. LINN. *gen. n.* 72. *syst. n.* 76.

Calyx ex glumis binis majoribus, quibus tertia minor post alteram posita accedit.
Folliculus biglumis.

2176. PANICUM verticillatum.

Panicum spica verticillata racemulis quaternis, involuclis unifloris bisetis, culmis diffusis. LINN. *spec. p.* 82.

Panicum spica unica paniculata setis paucioribus. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1543.

Gramen panicum, spica aspera. BAUH. *pin.* 8. *theatr.* 139. *tab.* 139. SCHEUCHZ. *gram.* 47.

Panicum asperum. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 377.

Loc. Ad vias, & limites agrorum in arvis passim. *ANNUUM.*

2177. PANICUM glaucum.

Panicum spica tereti involuclis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus undulato-rugosis. LINN. *syst. 12. p.* 87.

Panicum (glaucum) spica venti involuclis bifloris fasciculato-setosis, seminibus undulato-rugosis. SCHREB. *gram. tab.* 25.

Panici effigie gramen simplicis spica. LOB. *ic.* 13.

Loc. In arvis frequens. *ANNUUM.*

2178. PANICUM viride.

Panicum spica tereti, involuclis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. LINN. *spec. p.* 83.

Panicum spica unica, flosculis sessilibus solitariis, setis numerosis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1542.

Panicum cynosuroides. SCOP. *Fl. Carn. ed. 2. p.* 50. *n.* 68.

Gramen panicum, sive panicum sylvestre spica simplicis. BAUH. *pin.* 8. SCHEUCHZ. *gram.* 46.

Panicum laevigatum. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 378.

Loc. In pratis feracibus, atque ad limites agrorum. *ANNUUM.*

2179. PANICUM crus galli.

Panicum spicis alternis, conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachis quinquangulari. LINN. *spec. p.* 83.

Panicum spica ramosa setis nullis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1544.

Gramen panicum, spica divisa. BAUH. *pin.* 8. SCHEUCHZ. *gram.* 49. MORIS. *hist. 3. p.* 189. *t.* 8. *tab.* 4. *f.* 15.

Loc. In arvis ubique abunde. *ANNUUM.*

2180. PANICUM hirtellum.

Panicum spica composita, spiculis adpressis alternis, calycibus geminis, valvulis amnibus aristatis, arista extrema longissima. LINN. *spec. p.* 83.

Panicum (undulatifolium) foliis lanceolatis undulatis, caule repente geniculis radiatis. ARD. *spec. 2. p.* 14. *tab.* 4.

Gramen supinum, brevi hirsuto folio, paniculis echinatis singularibus. BOCC. *mus. 2. p.* 66. *tab.* 35.

Loc. Ad radices montium in sylvis umbris. *PERENNE.*

D. LOCUSTA MULTIFLORA, ET CALYCE COMMUNI MONOPHYLLO.

TRAGUS. HALL. *hist.* 2. p. 203.

Locusta saepe quadriflora. Calyx communis uniglumis, rigidus, ciliatus, mucronatus, in
 foris rostrum productus. Calyx proprius tener, biglumis, glaber, glumis inaequalibus,
 altera exteriori acuminata. Folliculus bivalvis, valvis perexiguus: unus, aut alter
 folliculus ex postremis imperfectus est, & imaginem tantum floris habet.

2181 TRAGUS racemosus.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 10. fig. 4.

Cephrus (racemosus) *panicula spicata, glumis muricatis, setis ciliaribus.* LINN. *spec.*
 p. 1487. SCHREB. *gram.* p. 45. tab. 4.

Tragus. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1413.

Agrostis panicula spicata, glumis echinatis. GER. p. 83. n. 8.

Gramen caninum maritimum asperum. BAUH. *prodr.* 2. tab. 2.

Gramen caninum maritimum spicatum, echinatis glumis. BARR. *ic.* 718.

Cenchrus linearis. LAM. *Fl. Franc.*, tom. 3. p. 631.

Loc. In pascuis sterilibus, & sabulosis ubique frequens. *ANNUS.*

CYNOSURUS. LINN. *gen.* n. 81., *syn.* n. 87.

Locusta multiflora, sub qua bractea pinnata. Calyx biglumis, aequalvalvis,
 glumis acuminatis. Folliculus bivalvis, valva exterior breviter aristata.

2182 CYNOSURUS cristatus.

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 63.

Cynosurus bracteae pinnatifidis. LINN. *spec.* p. 105. SCHREB. *gram.* pag. 69. tab. 8. f. 1.

Cynosurus involutus pinnatis retusis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1545.

Phleum cristatum. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 81.

Gramen pratense cristatum, seu spica cristata laevi. BAUH. *pin.* 3. *Theatr.* 42. SCHEUCHZ.
agr. p. 79. tab. 2. f. 8. A. C.

Gramen typhinum plantaginis spica glumosa haeteromalla, digitata major. BARR. *ic.* 27.
 n. 11.

Gramen loliaceum, spicae locustis cristatis. MONT. *ic.* 23.

Loc. In pratis macilentis vulgaris. *PERENNIS.*

2183. CYNOSURUS echinatus.

Cynosurus bracteae pinnato-paleaceis aristatis. LINN. *spec.* p. 105.

Cynosurus demibus bracteae lanceolato-linearibus. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1546.

Alopecurum spica aspera. BARR. *ic.* 123. fig. 2.

Gramen alopecuroides, spica aspera. BAUH. *pin.* 4. *Theatr.* 58. SCHEUCHZ. *agr.* p. 80.

Gramen cum cauda leporis aspera, sive spica marina. BAUH. *hist.* II. 473.

Gramen spicatum echinatum locustis unam partem spectantibus. TOURN. *inst.* p. 519.

VERN. *Coena*

Loc. In agris praesertim secalinis mootanis, & collinis frequens. *ANNUS.*

2184. CYNOSURUS aureus.

Icon. TAUR. Vol. XIV. tab. 39.

Cynosurus paniculae spicis sterilibus pendulis ternatis, floribus aristatis. LINN. *spec.* p. 107.

Gramen panicula pendula aurea. BAUH. *pin.* 3. *Theatr.* 33. SCHEUCHZ. *agr.* p. 149.

Gramen sciurum, seu alopecurum minus haeteromalla panicula. BARR. *ic.* 4.

Gramen Barcinonense panicula densa aurea. TOURN. *inst.* p. 523.

Loc. In agro Nicaeensi locis sterilibus mari proximis. *ANNUS.*

ALLIOTT *Fl. Pedem.* Tom. II.

P p p

LOLIUM. LINN. *gen. n.* 90., *yst. n.* 92. SCOP. *introd. n.* 66.

Flotes spicati, locustis multifloris ad flexuosum scapum sessilibus. Fovea nimirum in scapo est loco valvae calycinae, atque ex altera parte gluma una, longa, calycina, sive foliolum, in cujus ala sedet spicula. Folliculus quilibet biglumis ex valvis inaequalibus. Semen nudum.

1185. **LOLIUM** perenne.

ICON. TAUR. Vol. I. tab. 75. 77. f. 2.

Lolium spica mutica, spiculis compressis multifloris. LINN. *spec. p.* 122. SCHREB. *gram. part. 2. p.* 79. tab. 37.

Lolium radice perenni, locustis contiguis octifloris. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1416.

Gramen loliaeum angustiore folio, & spica. BAUH. *Theatr.* 127. SCHEUCHZ. *app.* 25. MONTL. *ic.* 19.

Phoenix lolio similis. BAUH. *hist. II. p.* 436.

Loc. In pratis, & secus vias vulgatissimum. PERENNE.

1186. **LOLIUM** tenue.

Lolium spica mutica tereti, spiculis trifloris. LINN. *spec. p.* 122.

Gramen loliaeum foliis, & spicis longissimis. VALL. *paria.* 81.

Loc. In Comitatus Nicaensis, Liguriae, & provinciae Canaspiciensis pascuis, & dumetis saxosis. ANNUUM.

1187. **LOLIUM** temulentum.

ICON. TAUR. Vol. I. tab. 74.

Lolium spica aristata, spiculis compressis multifloris. LINN. *yst. 12. p.* 100. SCHREB. *gram. part. 2. p.* 74. tab. 36.

Lolium annuum locustis distichis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1420.

Gramen loliaeum spica longiore, seu lolium Dioscoridis. BAUH. *theatr. p.* 121. SCHEUCHZ. *agr. p.* 31.

Gramen loliaeum spica longiore, aristis habens. BAUH. *pin. 9. Tourn. inst. p.* 516.

Loc. Inter segetes heu nimium frequens. ANNUUM.

VIT. Omnes norum LOLII perniciosos effectus. Nocet autem non modo hominibus, sed etiam animalibus: simili ratione cum Opio fere agit, neque vis ejus per fermentationem mutatur. Temulentiam, soporem, delirium, convulsiones, atque etiam mortem infert panis, qui LOLII grana cum tritico subacta in magna proportionem recipiat. Ea, quae Opii malos effectus infringunt, aut corrigant, etiam opportuna sunt ad LOLII malos effectus emendandos.

E. LOCUSTA MULTIFLORA, ET CALYCE COMMUNI BIGLUMI, AUT ETIAM MULTIGLUMI

AIRA. LINN. *gen. n.* 75., *yst. n.* 81.

Locusta biflora. Calycis glumae ovato-acutae: Glumae folliculi similes, interdum aristatae.

1188. **AIRA** cristata.

Aira panicula spicata, calycibus multifloris pedunculo longioribus, petalis subaristatis inaequalibus. LINN. *spec. p.* 94. HUDS. *Fl. Angl. p.* 28.

Festuca locustis bifloris mucronatis confertis imbricatis paniculatis, in spicam congestis. HALL. *hist. n.* 1444.

Gramen spica cristata, subhirsutum. BAUH. prodr. n. 19. Theatr. p. 43. SCHEUCHZ. agr. p. 166. tab. 3. fig. 15.

Aira panicula spicata, floribus muticis, pedunculis longioribus, glumis acuminatis inaequalibus. ROY. Leyd. p. 61. n. 6.

Loc. in pascuis siccis frequentissima. PERENNIS.

2189. AIRA aquatica.

Aira foliis planis, panicula patente, floribus muticis laevibus, calyce longioribus. LINN. spec. p. 95. HUDS. Fl. Angl. p. 29. SCOP. Fl. Carn. p. 66.

Poa locustis bifloris glabris, florali gluma majari plicata serrata. HALL. hist. tom. 2. n. 1471.

Gramen caninum supinum. BAUH. pin. p. 2. BAUH. hist. II. p. 459.

Gramen milaceum aquaticum. SCHEUCHZ. agr. p. 176. VAILL. Paris. p. 89. tab. 17. fig. 7.

Loc. Locis apicis, & inundatis. PERENNIS.

ARISTATÆ

2190. AIRA subspicata.

Aira foliis planis, panicula spicata, flosculis media aristatis: arista reflexa laxiore. LINN. spec. p. 95.

Avena diantha, panicula dense spicata. HALL. hist. tom. 2. n. 1490.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum humile, locustis in spicam collectis varicoloribus aristatis. SCHEUCHZ. agr. p. 221. agr. prodr. p. 24. tab. 6.

Loc. In pratis summis montis Cenisii, Grosceval, Ceresale frequens. In montibus magni S. Bernardi observata est a Cl. BELLARDI. PERENNIS.

2191. AIRA cespitosa.

Aira foliis planis, panicula patente, petalis basi pilosis, aristisque, arista recta brevi. LINN. spec. p. 96. HUDS. Fl. Angl. p. 29.

Avena diantha, panicula amplissima patula bicolor. HALL. hist. tom. 2. n. 1487.

Gramen segetum altissimum panicula sparsa. BAUH. pin. p. 3.

Gramen agrorum Lobelii. BAUH. hist. II. p. 461.

Gramen segetum panicula arundinacea. SCHEUCHZ. agr. p. 244. tab. 5. fig. 2. & 3. non vera C. B. quod est spica venti.

Gramen pratense paniculatum, locustis parvis splendentibus non aristatis. VAILL. Paris. 26.

Aira altissima. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 582.

Loc. In dumetis secus flumen Sura frequens. PERENNIS.

2192. AIRA flexuosa.

Aira foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuosis. LINN. spec. p. 96. SCHREB. gram. part. 2. p. 37. tab. 30. append. spec. p. 1676. hujus sola varietas a montana. HUDS. Angl. p. 30.

Gramen alpinum nemorosum paniculatum foliis angustissimis splendentibus aristatis. SCHEUCHZ. agr. p. 218. tab. 6. fig. 1.

Gramen nemorosum paniculis albis, capillacea folia. BAUH. pin. p. 7. prodr. 14.

Aira montana. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 582.

Loc. In montibus, & collibus ad oras sylvarum non infrequenter occurrit. PERENNIS.

2193. AIRA montana.

Aira foliis setaceis panicula angustata, flosculis basi pilosis aristatis, arista tortili longiore. LINN. spec. p. 96. HUDS. Fl. Angl. p. 300.

Avena diantha paniculis flexuosis, floribus basi villosis, locustis ovatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1486.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum, foliis capillaceis brevibus, locustis purpureo-argenteis splendentibus, & aristatis. SCHEUCHZ. agr. p. 216. tab. 4. fig. 16. A. B. C. & tab. 4. prodr. MONTI ic. 74.

Gromen avenaceum copillaceum minoribus glumis. RAJ. p. 1288. TOURN. inst. p. 524.

BAUH. pin. p. 10.

Gromen nemorale avenaceum oliterum ex fusco xerampelinum, & lucidum donicum. LOB. adv. part. 2. 463. BAUH. hist. II. p. 463.

Loc. Locis saxosis apricis alpium frequens. PERENNIS.

2194. AIRA alpina.

Aira foliis subulatis, panícula densa, flosculis basi pilosis aristatis, orista brevi. LINN. spec. p. 96.

Gromen avenaceum capillaceum minoribus glumis argenteis, vix aristatis, foliis longioribus. SCHEUCHZ. agr. p. 222.

Loc. In summis alpiis occurrit. PERENNIS.

2195. AIRA canescens.

Aira foliis setaceis, summo spathaceo, paniculam inferne obvolvente. LINN. spec. p. 97.

Avena diantha foliis setaceis, panícula stricta, aristas clavatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1483.

Aira foliis subulatis, folio floroli spathaceo, paniculam inferiorem obvolvente. ROY. Leyd. p. 60. n. 3.

Gromen foliis juncis, radice jubato. BAUH. pin. 5. SCHEUCHZ. agr. 243.

Loc. In sabulosis sterilibus Liguriæ. PERENNIS.

2196. AIRA præcox.

Aira foliis setaceis, vaginis ongulatis, floribus paniculato-spicatis, flosculis basi aristatis. LINN. spec. p. 97. HUDS. fl. angl. p. 31.

Gromen parvum præcox (potius spica) laxa canescens. RAJ. syn. 407. PLUK. ph. tab. 33. f. 9.

Gromen minimum spica brevi hobilore, nostrum. SCHEUCHZ. agr. 219.

Loc. In pascuis siccis montanis nascitur. In montibus di Andrà supra Eposediam frequentem vidit Cl. BELLARDI. ANNUA.

2197. AIRA caryophyllæa.

Aira foliis setaceis, panícula divaricato, floribus oristosis distantibus. LINN. spec. p. 97.

HUDS. fl. angl. p. 31.

Avena diantha, foliis setaceis, panícula divaricato. HALL. hist. tom. 2. n. 1482.

Gromen paniculatum locustis purpureo-argenteis, annuum. RAJ. JJ. SCHEUCHZ. il. 11. p. 134. tab. 28. fig. 2.

Gromen paniculatum minimum molle. SCHEUCHZ. agr. p. 215. tab. 4. f. 15.

Gromen phalaroides sparsa panícula, minimum angustifolium. BARR. ic. 444. n. 1.

Coryophyllus arvensis glaberrimus. BAUH. pin. p. 105.

Loc. Locis glareosis collium frequens. ANNUA.

POA. LINN. gen. n. 77., syst. n. 83.

Locusta mutica, multiflora, flores habens tres ad decem, & ultra, fere disticha.

Calycis glumæ ovatae, acuminatae. Folliculi glumæ similes, calyce paullo longiores, margine scarioso. Semen folliculo acute involutum.

2198. POA nemoralis.

Poa panícula attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culmo incurvo. LINN. spec. p. 102. HUDS. flor. angl. p. 34.

Poa culmo debili, panícula nutante, locustis bifloris, folliculis subvilliosis. HALL. hist. 2. n. 1469.

Poa nemoralis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 74. n. 108.

Gromen paniculatum angustifolium alpinum locustis rarioribus, & angustioribus non aristatis. SCHEUCHZ. agr. p. 164. BOCC. p. 70. tab. 59.

Loc. In sylvis umbrosis, collinis, & montanis frequens. PERENNIS.

1199. POA montana N.
Poa panicula arista, locustis bifloris, folliculis basi villosis. HALL. hist. tom. 2. p. 244. n. 1468.
Gramen paniculatum angustifolium montanum, panicula densa, locustis parvis muticis. SCHEUCHZ. agr. p. 180.
 Loc. Passim locis montanis ad oras sylvarum, & in pascuis sterilibus. PERENNIS.
1200. POA Sabauda N.
Poa panicula laxa, locustis bifloris, floribus calyce duplo longioribus glaberrimis. HALL. hist. tom. 2. n. 1470.
 Loc. Inter Chalanche, & Chamonix Nobilis de SAUSSURE ex HALLERO.
1201. POA Gerardi N.
Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 39.
Poa culmo recto, locustis trifloris glaberrimis, calycibus aristatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1463.
Poa panicula erecta spicis trifloris glabris, corollis acuminatis, calyce duplo longioribus. GER. p. 9. tab. 2.
 Loc. Frequens in pratis, & pascuis alpium. PERENNIS.
1202. POA annua.
Poa panicula diffusa, angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. LINN. spec. p. 99. HUDS. Fl. Angl. p. 34.
Poa culmo infracto, panicula triangulari, locustis trifloris. HALL. hist. tom. 2. n. 1466.
Poa spiculis quinquefloris ovatis, culmo compresso. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 102.
Gramen pratense paniculatum minus album. BAUH. pin. 3. TOURN. inst. p. 321.
Gramen paniculatum minus album. BAUH. hist. II. p. 465.
 Loc. Vulgatissima ubique. ANNUA.
1203. POA trivialis.
Icon. TAUR. Val. XIII. tab. 22. fig. 1.
Poa panicula diffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. LINN. syst. 12. p. 93.
Poa spiculis trifloris, basi pubescentibus, glumis aequalibus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 99.
Gramen pratense paniculatum medium. SCHEUCHZ. agr. p. 180. BAUH. pin. 2. theaur. 30. TOURN. inst. p. 321.
Gramen pratense minus. BAUH. hist. II. p. 342.
 Loc. Nihil vulgatius in pratis. PERENNIS.
1204. POA angustifolia.
Poa panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. LINN. spec. p. 99.
Poa foliis duris et convolvutibus, locustis quadrifloris villosis. HALL. hist. tom. 2. n. 1460.
Gramen pratense paniculatum majus angustiore folio. SCHEUCHZ. agr. p. 178. tab. 3. fig. 17. BAUH. theaur. 29. pin. 2. prodr. 5. TOURN. inst. p. 322.
 Loc. In pratis vulgatissima. PERENNIS.
1205. POA bulbosa.
Icon. TAUR. Vol. I. tab. 79.
Poa panicula secunda patensiuscula, spiculis quadrifloris. LINN. spec. p. 102.
Poa foliis bulbosis, panicula diffusa, locustis quadrifloris, folliculis subvillosis. HALL. hist. tom. 2. n. 1461.
 Loc. Ad vias, & limites agrorum ubique frequens. PERENNIS.
1206. POA pratensis.
Poa panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. LINN. spec. p. 99. HUDS. Fl. Angl. p. 33.
 ALLIIONI Fl. Pedem. Tom. II.

Poa panicula diffusa, locustis trifloris villosis. HALL. hist. tom. 2. n. 1462.

Poa spiculis trifloris glabris, glumis inaequalibus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 100.

Gramen pratense paniculatum majus, latiore folio, Poa Theophrasti. BAUH. pin. 2.

SCHEUCHZ. agr. p. 177. tab. 3. fig. 17. TOURN. inst. p. 521.

Loc. Ubique in prais. PERENNIS.

1207. POA Cilianensis † tab. 91. fig. 2.

Poa panicula longissima ramosa, ramis erectis flexuosis, spiculis distichis quadrifloris.

Loc. In agro patrio Ciliani legit Cl. BELLARDI. ANNUA.

DESCR. Altitudo pedalis & ultra. Culmi sulcati, glabri, nodo fusco. Folia lineata, obscure viridia, glabra, circa vaginam ciliata, duarum, vel trium linearum latitudine. Folium paniculae fere subjectum totam paniculam aequat, aut superat. Panicula terminalis est, & valde ramosa. Rami ex eodem puncto tres, vel quatuor nascuntur, rarius solitarii. Rami flexuosi, primi suum etiam ramosi. Omnes porrigunt locustas distichas, ovato-oblongas, veluti in raram spicam dispositas, ut plurimum alternae prodeuntes, pedunculatas. Pedunculi plerumque uniflori, quandoque biflori. Locustae interdum triflorae, saepius quadriflorae, aut etiam quinqueflorae. Calyx bivalvis a locusta secedens, acutus, nervo eminenti subviridi exaratus. Glumae folliculi ovatae, etiam nervo divisa.

1208. POA seslerioides † tab. 91. fig. 1.

Poa spica ovata, locustis subsessilibus sexfloris obtusis.

Loc. Cl. BELLARDI in pratis elatioribus Tendae, & Vinadii. PERENNIS.

DESCR. Radix fibrosa, ex qua plures culmi prodeunt. Altitudo palmaris. Culmus non glaber, ramosus, erectus, tribus saepe nodis instructus. Folia erecta, linearia glabra, primo nodo longiora, radicalibus tenuioribus, & fere capillaribus. Vagina foliorum striata internodii longitudine. Culmus dimidius, & floriger nudus. Spica saepius paullulum inflexa. Locustae distichae, congestae, atque primo aspectu Sesleriam referentes. Pedunculi glabri, admodum breves, glumae calycinae glabrae, ex argenteo, & caeruleo nitentes, ovatae, brevissime macronatae. Glumae folliculi similes. Antherae obscuri coloris.

1209. POA alpina.

ICON. TAUR. Vol. XIII. tab. 22. f. 2.

Poa panicula diffusa ramosissima, spiculis sexfloris cordatis. LINN. spec. p. 99.

Poa latifolia culmo debili, locustis quadrifloris, calycis glumis aequalibus, floralium darso sericeo. HALL. hist. tom. 2. n. 1456.

Gramen alpinum paniculatum majus, panicula speciosa variegata. SCHEUCHZ. agr. prodr. p. 20. tab. 3.

Loc. Ubique in pratis, & pascuis alpium. PERENNIS.

1210. POA compressa.

Poa panicula secunda coarctata, culmo obliquo compresso. LINN. spec. p. 101.

Poa culmo compresso declinato, locustis distichis sexfloris. HALL. hist. tom. 2. n. 1455.

Gramen murorum radice repente, culmo compresso. VAILL. p. 91. tab. 18. f. 5.

Gramen paniculatum radice repente, culma compresso, locustis distichis pulchellis. SCHEUCHZ. agr. p. 198.

Gramen liliaceum procumbens caulibus compressis, paniculis rigidiusculis. MONTI. ic. 10.

Loc. Abunde in arvis. PERENNIS.

1211. POA dura. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 101.

Cynosurus (durus) spiculis alternis secundis sessilibus rigidis obtusis appressis. LINN. spec. p. 105.

Lolium procumbens spica disticha, locustis teretibus trifloris. HALL. hist. tom. 2. p. 305. n. 1419.

Gramen liliaceum minus supinum spica multiplici. BAUH. prodr. p. 19.

Gramen arvense polypodii panicula crassiori. BARR. ic. 50. n. 1213.

Loc. Secus arva Claravici nasci observavi. Legit etiam in agro Taurinensi Cl. BELLARDI. ANNUA.

2212. POA rigida.

Poa panicula lanceolata subramosa secunda ramulis alternis secundis. LINN. syst. 12. p. 93.

Poa panicula coarctata secunda, spiculis subsexfloris linearibus alternis rigidis. GER. p. 90. n. 8.

Poa panicula lanceolata subramosa paniculis alternis secundis. HUDS. p. 35. n. 12.

Gramen arvense filicina duriare panicula. BARR. ic. 49.

Gramen panicula multiplici. BAUH. pin. 3. prodr. 6.

Loc. Abunde locis aridis ad limites agrorum, & secus vias in agro Nicosensi, Astensi Comitatu, Liguria: in agro etiam Taurinensi similibus locis, & praesertim aridis declivibus obviam venit. ANNUA.

2213. POA aquatica.

Poa panicula diffusa spiculis sexfloris linearibus. LINN. spec. p. 98.

Poa altissima foliis latissimis, panicula amplissima, locustis distichis multifloris. HALL. hist. tam. 2. n. 1454.

Gramen palustre paniculatum olissimum. BAUH. pin. 3. theotr. 38. SCHEUCHZ. p. 191. tab. 4. f. 1.

Gramen phalaroides palustre arundinaceum radice amplissima. MONTI ic. 38.

Loc. Secus fossas aquarum, & stagnorum in agro Vercellensi, & Conapiciensi. PERENNIS.

2214. POA eragrostis.

Poa panicula patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis decemfloris, glumis trinerviis. LINN. syst. 12. p. 93. SCHREB. gram. part. 2. p. 81. tab. 38.

Poa locustis distichis decemfloris, calycibus acutis. HALL. hist. tam. 2. n. 1450.

Gramen paniculis elegantissimis minimum. TOURN. inst. p. 522. SCHEUCHZ. agr. p. 192. tab. 4. f. 2.

Gramen omoris alterum, paniculis minaribus, & angustioribus, magisque sparsis. RAJ. Syllog. 136. hist. pl. 1275.

Gramen Phalaroides, sparsa Brizae panicula, minus. BARR. ic. 44. 2. tab. 4. f. 2.

Loc. Locis arenosis, & secus flumina, & torrentes vulgaris: etiam inter segetes, sed rarius. ANNUA.

BRIZA. LINN. gen. n. 78. syst. n. 84.

Locusta multiflora, mutica. Calycis glumae cordato-concavae, aequales, obtusae.

Flores in spicam cordatam, disticham collecti. Folliculi valva inferior ventricosa, major, glumis calycinis similis. Superior minor, plana.

Semen ex folliculo secedens.

2215. BRIZA minor.

Briza spiculis triangularibus, calyce fasciculis (7) longiore. LINN. spec. p. 102. HUDS. fl. angl. p. 32.

Poa petiolis unerrimis, locustis triangularibus. HALL. hist. tam. 2. p. 218. n. 1440.

Gramen paniculatum minus locustis parvis tremulis. TOURN. inst. p. 524.

Gramen tremulum minus panicula parvo. BAUH. pin. 2. prodr. 4. Theotr. p. 24. SCHEUCHZ. agr. p. 205. tab. 4. f. 9.

Gramen tremulum minus. BAUH. hist. II. p. 470.

Loc. Frequens in pratis. ANNUA.

2216. BRIZA virens.

Briza spiculis ovatis, calyce fasciculis (7) aequali. LINN. spec. p. 103.

Gramen paniculatum minus locustis magnis tremulis. TOURN. inst. p. 523.

Gramen tremulum minus panicula magna. BAUH. pin. 2. BAUH. hist. II. 470.

Loc. In agro Nicasensi. ANNUA.

1217. BRIZA media.

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 84.

Briza spiculis ovatis, calyce flasculis (7) brevior. LINN. spec. p. 103. HUDS. fl. angl. p. 32.

Poa petiolis tenuissimis, locustis ovatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1448.

Briza spiculis septemfloris ovatis. SCOP. Fl. Carn. 198. ed. 2. n. 109.

Gramen tremulum, seu phalaroides minus lata sparsa panicula. BARR. ic. 16. MONT. ic. 39.

Gramen tremulum majus. BAUH. theatr. p. 22. SCHEUCHZ. agr. p. 204. tab. 4. f. 8.

Gramen paniculatum majus, locustis magnis candicantibus tremulis. TOURN. inst. p. 523.

Gramen tremulum majus. BAUH. pin. 2. Theatr. 22.

Gramen tremulum. BAUH. hist. II. p. 469.

Briza tremula. LAM. Fl. Franc., tom. 3. p. 587.

Loc. Vulgatissima in pratis. ANNUA.

1218. BRIZA maxima.

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 83. & vol. VIII. tab. 27. f. 1.

Briza spiculis cordatis, flasculis septemdecim. LINN. spec. p. 103.

Briza spiculis racemosis. JACQ. obs. bot. 3. p. 10. tab. 60.

Briza spica nutante simplici, spiculis alternis subsolitariis, pedunculis simplicibus, bifidiis, calycibus quindecimfloris. GOU. h. 46. n. 5.

Gramen tremulum maximum. BAUH. pin. 2. prodr. 5. theatr. 24. SCHEUCHZ. agr. p. 202. tab. 4. f. 7. BAUH. hist. II. 470.

Gramen paniculatum locustis maximis candicantibus tremulis. TOURN. inst. p. 523.

Loc. Frequens in agris Comitatus Nicaensis. ANNUA.

1219. BRIZA eragrostis.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 10. f. 2.

Briza spiculis lanceolatis, flasculis viginti. LINN. spec. p. 103. SCHREB. gram. part. 2. pag. 83. tab. 39.

Gramen paniculis elegantissimis, sive eragrostis majus. BAUH. pin. p. 2. TOURN. inst. p. 522. SCHEUCHZ. agr. p. 194. tab. 4. f. 4.

Gramen paniculis elegantissimis. BAUH. theatr. 25.

Gramen amoris dictum. BAUH. hist. II. p. 470.

Gramen eranthemum, seu eragrostis, phalaroides paniculatum, multiplici tenui Brizae spica. BARR. ic. 43. tab. 4. f. 4.

Loc. Secus agros, atque in avis praesertim, quibus satum est Mays, frequentissime nascitur. ANNUA.

1220. BRIZA montepessulana.

Briza spica nutante simplici, spiculis alternis pedunculatis, subsolitariis ovatis, calyce quinquefloris. GOU. hort. p. 45. n. 1.

Gramen tremulum minus panicula magna. BOT. mont. 113.

Loc. In agro Nicaensi. ANNUA.

SESLERIA. SCOP. Fl. Carn. 1. p. 63. n. 30. HALL. hist. 11. p. 217.

Locusta multiflora. Calyx ex duabus glumis aequalibus, mucronatis. Folliculus biglumis, gluma exterior tridentata, ampla, compressa, interiore minore, bicornii.

1221. SESLERIA caerulea. SCOP. Fl. Carn. n. 90.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 22. f. 5.

Sesleria locustis trifloris imbricatis, calyce tricorni. HALL. hist. n. 1446. Errat. 217.

Sesleria caerulea culmo simplici, spica subcylindrica. ARDUIN. spec. 2. p. 18.

Gramen glumis variis. BAUH. theatr. p. 158. cum icone prodr. n. 73. SCHEUCHZ. p. 83. tab. 2. f. 9. o. b.

Loc. In pratis montanis, & alpinis. PERENNIS.

BROMUS. LINN. gen. n. 83. syst. n. 89.

Glumae calycis acuminatae, muticae, inferiore minore. Folliculi gluma inferior major est, concava, apice bifido, aristam rectam infra apicem emittens: Superior minor est, & mutica. Semen folliculo arcte inclusum.

1222. **BROMUS ligusticus** N.

Gramen bromoides, fessuceae, tenuique panicula, minus. BARR. ic. 76. fig. 2. SCHEUCHZ. agron. p. 296. n. 3. tab. 6. fig. 13.

Loc. SCHEUCHZERUS nasci tradidit in Liguria ad litora maris. *ANNUUS.*

1223. **BROMUS giganteus.**

Bromus panicula nutante, racemis secundis binatis, spiculis quadrifloris, stantiae arista brevioribus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 116. ed. 1. p. 205.

Bromus panicula nutante, spiculis quadrifloris, aris brevioribus. LINN. spec. p. 114. SCHREB. gram. p. 88. tab. 11.

Bromus glaber locustis quadrifloris nutantibus aris longissimis. HALL. hist. tom. 2. n. 1510.

Gramen bromoides aquaticum, laetifolium, panicula sparsa, tenuissime aristata. SCHEUCHZ. agr. p. 264. tab. 5. f. 17.

Loc. In pratis agri Pedemontani non infrequens. *PERENNIS.*

1224. **BROMUS agrestis** N.

Bromus hirsutus angustifolius locustis quinquefloris, aris folliculo brevioribus. HALL. hist. tom. 2. n. 1507.

Gramen bromoides pratense foliis praeter culmum angustissimis, rara lanugine villosis. SCHEUCHZ. agr. p. 255. tab. 5. f. 13.

Festuca pratensis, lanuginosa. BAUH. pin. 10. theatr. 158. VAILL. p. 93. tab. 18. f. 2.

Loc. Secus agros, & in pascuis sterilibus. Circa urbem Vercellarum copiose nasci observavit Cl. BELLARDI. *PERENNIS.*

1225. **BROMUS Dertonensis** N.

Gramen bromoides panicula heteromalla, longioribus aris donata. SCHEUCHZ. agr. p. 290. n. 9. tab. 6. f. 10.

Loc. Joan. SCHEUCHZERUS mense Majo in Italia ad agrorum margines, speciatim inter Dertonam, & Navi copiose. *ANNUUS.*

1226. **BROMUS tectorum.**

Bromus panicula nutante, spiculis linearibus. LINN. spec. p. 114.

Bromus hirsutus panicula nutante pauciflora, locustis quinquefloris hirsutis, glumis acute lanceolatis. HALL. hist. n. 1508.

Gramen murorum spicis pendulis angustioribus. TOURN. paris. 91.

Festuca avenacea sterilis spicis erectis. RAJ. angl. 3. p. 413. PLUK. alm. 174. tab. 299. f. 2.

Festuca avenacea sterilis pedicellis brevioribus, & spicis erectis. MORIS. hist. 3. p. 212. s. 8. t. 7. f. 13.

Loc. Ubique locis aridis frequens. *BIENNIS.*

1227. **BROMUS sterilis.**

ICON. TAUR. Val. I. tab. 73.

Bromus panicula paucula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. LINN. spec. p. 113.

Bromus panicula nutante, locustis sepiifloris, glumis argute lanceolatis lineatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1505.

Bromus panicula nutante, pedunculis simplicibus, arista petalis longiore. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 113.

Loc. In muris, & ad vias passim. *BIENNIS.*

ALLIORTH Fl. Pedem. Tom. II.

R r r

1218. BROMUS rubens.

Bromus panicula fasciculata, spiculis subsessilibus villosis, arisis erectis. LINN. spec. p. 114.

Gramen panicula molli rubenne. BAUH. hist. II. p. 464.?

Loc. In agro Nicaeensi. *ANNUUS.*

1219. BROMUS mollis.

ICON. TAUR. Vol. I. tab. 70.

Bromus panicula erectiuscula, spicis ovatis pubescentibus, arisis rectis, foliis mollissime villosis. LINN. syst. 12. p. 97. SCHREB. gram. pag. 60. tab. 6. fig. 2.

Bromus hirsutus locustis sepiifloris ovato-conicis. HALL. hist. tom. 2. p. 236. n. 2504.

Gramen avenaceum villosum locustis angustis candicansibus, & arinatis. SCHEUCHZ. agr. p. 254. tab. 5. f. 10. TOURN. inst. p. 526.

Loc. Ad vias, & oras pratorum in agro Pedemontano. *BIENNIS.*

1220. BROMUS squarrosus.

ICON. TAUR. Vol. I. tab. 71.

Bromus panicula nutante, spicis ovatis, arisis divaricatis. LINN. spec. p. 112.

Avena locustis teretibus novemfloris, arisis reflexis. HALL. hist. tom. 2. n. 1502.

Festuca graminea, glumis vacuis. BAUH. pin. p. 9. theatr. 144. SCHEUCHZ. agr. p. 251. tab. 5. fig. 2.

Gramen avenaceum locustis amplioribus candicansibus, glabris, & arinatis. TOURN. inst. p. 525.

Gramen phalaroides majus acerosum nutante spica. BARR. ic. 24. tab. 5. fig. 2. & ic. 24. fig. 1. observ. 1225.

Loc. In pratis, & herbidis collium. *ANNUUS.*

1221. BROMUS inermis.

Bromus panicula erecta, spiculis subteretibus subulatis nudis submuticis. REICH. p. 210.

Bromus (inermis) panicula diffusa, spiculis subteretibus subulatis nudis muticis, aristatisque. SCHREB. gram. p. 97. tab. 13.

Festuca locustis teretibus multifloris, glumis semine membranaceis breviter arinatis. HALL. hist. n. 1433.

Gramen sparsum spica Briqae paniculata. BARR. ic. 25.

Poa panicula uricata, spicis oblongis erectis multifloris submuticis. GMEL. sib. tab. 1. p. 109.

Loc. Cl. BELLARDI circa Sospello. Ego ex Liguria habui circa Ormea lectum. *PERENNIS.*

1222. BROMUS arvensis.

ICON. TAUR. Vol. I. tab. 76.

Bromus glaber locustis octifloris nutantibus glabris, glumis marginatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1509.

Bromus panicula nutante, spiculis ovato-oblongis. LINN. spec. p. 113.

Gramen avenaceum dumetorum panicula sparsa. RAJ. Angl. 3. p. 415.

Festuca graminea effusa juba. SCHEUCHZ. agr. p. 262. tab. 5. fig. 15. BAUH. theatr. p. 144.

Gramen sylvaticum glabrum panicula recurva. VAILL. tab. 18. fig. 3.

Loc. Ad limites agrorum, & in pratis non irriguis. *ANNUUS.*

1223. BROMUS Plukenetii N.

Bromus foliis convolutis pungentibus, locustis binis terminalibus.

Gramen spica Briqae minus Pluk. phytogr. tab. 33. f. 1. quoad iconem, non vero. BAUH. prodr. p. 19.

Loc. Cl. BELLARDI legit locis aridis Nicaeae circa Villafranca. Ignatius MOLINERI locis saxosis calidioribus prope AQUI. *PERENNIS.*

DESCR. Radix repens culmos plures emittit rigidos, ad basim ramosos. Folia convoluta rigida, linearia, glauca, pungentia. Culmus spithama longior subnudus excepta inferiori parte. In erecto culmo ad basim suam nodus fuscus, ex quo vagina folii caulini erumpit. Locustae duae, distichae, teretes, sed

tamen utrinque compressae, glabrae floribus non multum appressis. Locusta inferior subsessilis decem flores habet sine impari, superior sexdecim, quae longe pedunculata est. Gluma folliculi evidenter ex dorso aristata, arista brevi; glumae ceterum ovato-oblongae, obtusae.

1234. *BROMUS pinnatus.*

Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 38.

Bromus spiculis alternis subsessilibus teretibus subaristatis, culmo indiviso. LINN. syst.

12. p. 98.

Triticum spicis distichis, locustis teretibus hirsutis oristatis duodecemfloris. HALL. hist. tom. 2. n. 1431.

Bromus spico stricta disticha, spiculis alternis solitariis sessilibus decemfloris oblongis, corollis subaristatis. GOU. h. 51. n. 6.

Bromus spiculis subsessilibus, alternis, teretibus potulis. SCOP. Fl. Corn. 201. ed. 2. n. 118.

Bromus culmo indiviso, spicis alternis subsessilibus teretibus, floralis arista longioribus.

HUDS. p. 41. n. 8.

Gramen loliaceum corniculatum. TOURN. hist. plom. paris. p. 92. SCHEUCHZ. agr. p. 35. tab. 1. f. 7.

Gramen loliaceum olusissimum spico perlongo, aristas brevibus donata. TOURN. inst. p. 517. MONT. p. 42. ic. 16.

Gramen spica Briqos majus. BAUH. pin. p. 9. prodr. 18.

Loc. In pascuis montanis, & collinis frequentissime occurrit. *PERENNIS.*

1235. *BROMUS ramosus.*

Bromus panicula ramoso nutante scabro spiculis linearibus decemfloris, arista longioribus, foliis scabris. HUDS. fl. angl. p. 40. n. 7.

Festuca gramineo nemoralis laetifolia mollis. BAUH. pin. 9. theatr. 144.

Loc. In sylvis collium Tourinensium. *PERENNIS.*

1236. *BROMUS madritensis.*

Bromus panicula rariore potulo-erecta, spiculis linearibus: internodiis geminis, pedicellis superne incrassatis. LINN. syst. 12. p. 98.

Bromus sterilis erecta panicula, major. BARR. ic. 76. f. 1.

Gramen bromoides pumilum, locustis erectis majoribus oristatis. SCHEUCHZ. agr. 260.

Loc. Cl. BELLARDI legit locis siccis circa Casion in Comitatu Nicaeensi. *ANNUUS.*

1237. *BROMUS distachyon.*

Icon. TAUR. Vol. XXIV. tab. 35.

Bromus spicis duobus erectis alternis. LINN. spec. p. 115.

Bromus spiculis subbinatis compressis sessilibus. GER. prov. 98. tab. 3. f. 1.

Festuca (ciliata) folio, & valvula corollarum interiore ciliatis, spiculis alternis solitariis sessilibus, panicula stricta simplici secunda. GOU. h. p. 48. n. 2.

Gramen spico Briqae minus. BAUH. prodr. 19.

Bromus ciliatus. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 609.

Loc. In Provincia Aquensi, & Comitatu Nicaeensi ad vias, & agrorum limites. *ANNUUS.*

1238. *BROMUS secalinus.*

Bromus paniculo pastine, spiculis ovatis, aristas rectis, seminibus distinctis. LINN. syst. 12. p. 97.

Bromus foliis glabris, locustis duodecemfloris. HALL. hist. tom. 2. p. 236. n. 1502.

Festuca gramineo glumis hirsutis. BAUH. pin. p. 9. theatr. 143. SCHEUCHZ. agr. p. 250. tab. 5. f. 9.

Gramen avenaceum locustis villosis crassioribus. TOURN. inst. p. 526.

Loc. In pratris frequens praesertim collium, & montium. *ANNUUS.*

FESTUCA. LINN. *gen. n.* 82. *syn. n.* 88.

Locusta tenuis, multiflora. Calyx inaequalis biglumis, glumis acuminatis muticis. Folliculus bivalvis, valvula inferiore majore acuminata, aut etiam ex dorso aristata.

2239. **FESTUCA** glomerata.

Icon. TAUR. Vol. 1. tab. 78.

Dactylis (glomerata) panicula secunda glomerata. LINN. spec. p. 105. SCHREB. gram. p. 73. tab. 8. f. 2.

Bramus locustis setranthis fasciculatis imbricatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1512.

Dactylis vagina foliorum ancipiti. GOD. h. 47. n. 1.

Poa spiculis quadrifloris glomeratis asperis, racemis solitariis. SCOP. Fl. Carn. p. 194. n. 5.

Bramus glomeratus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 111.

Gramen spicatum folia aspera. BAUH. pin. 3. prodr. 9. SCHEUCHZ. gram. 299. MORIS. hist. 3. 2. 8. tab. 6. f. 38.

Loc. Abunde in pratis. PERENNIS.

2240. **FESTUCA** ovina.

Icon. TAUR. Vol. XII. tab. 77. f. 2. 3.

Festuca panicula secunda caecata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. LINN. spec. p. 108. HUDS. fl. angl. p. 36.

Festuca foliis perangustis, panicula stricta, locustis quinquefloris subhirsutis. HALL. hist. tom. 2. n. 1442.

Bramus ovinus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 112.

Gramen foliolis juncis brevibus, majus, radice nigra. BAUH. pin. prodr. 34. theatr. 73. SCHEUCHZ. agr. p. 279. tab. 6. f. 8.

Gramen capillaceum locustellis pennatis non aristatis. PLUK. phytoz. tab. 34. fig. 2.

Poa foliis setaceis panicula secunda glumis angustis aristatis. GMEL. sib. 1. p. 107.

Loc. In pascuis, & pratis non irriguis, montanis praesertim ubique. PERENNIS.

2241. **FESTUCA** amethystina.

Festuca panicula flexuosa, spiculis secundis inclinis submuticis, foliis setaceis. LINN. spec. p. 109.

Gramen montanum foliis capillaceis longiaribus, panicula heteromalla spadicea, & veluti amethystina. SCHEUCHZ. agron. 276.

Loc. In pratis, & pascuis montanis non infrequens est. PERENNIS.

2242. **FESTUCA** myuros.

Festuca panicula spicata nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus glabris, arista longis. LINN. syst. 12. p. 96.

Festuca foliis setaceis, panicula erecta, locustis glabris longius aristatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1443.

Gramen festuceum, myurum minori spica heteromalla. BARR. ic. tab. 99. f. 1. SCHEUCHZ. agr. p. 294. tab. 6. f. 12.

Gramen spica nutante longissima. PARK. 1162.

Loc. Ubique locis sterilibus, & secus agros macilentos. ANNUA.

2243. **FESTUCA** duriuscula.

Festuca panicula secunda oblonga, spiculis oblongis laevibus, foliis setaceis. LINN. spec. p. 108.

Festuca foliis perangustis, panicula stricta, locustis distichis, aristatis glabris septifloris. HALL. hist. tom. 2. n. 1427.

Festuca panicula nutans inferne ramosa, spicis adscendentibus hispidis, foliis setaceis. LINN. got. p. 66.

Festuca foliis setaceis, radicalibus minaribus, panicula inferne ramosa nutante, spicis adscendentibus hispidis. ROY. Leyd. p. 68. n. 7.

Gramen pratense panicula duriore laxa, unam partem spectante. SCHEUCHZ. agr. p. 285.
Loc. In pascuis siccis frequens. PERENNIS.

1244. FESTUCA rubra.

Festuca panicula secunda scabra, spiculis sexfloris aristatis, flosculo ultimo mucoso, culmo semiseroti. LINN. spec. p. 109.

Festuca foliis perangustis, locustis teretibus quinquefloris aristatis, oris membranaceis. HALL. hist. n. 1440.

Gramen alpinum pratense, panicula duriore laxa spadicea, locustis majoribus. SCHEUCHZ. gram. 287.

Loc. In pratis alpium frequens. PERENNIS.

1245. FESTUCA Halleri. N.

Festuca foliis perangustis, panicula stricta, locustis teretibus hirsutis longius aristatis. HALL. hist. n. 1441.

Loc. Habet inter suas stirpes Cl. BELLARDI, legitque in montanis sterilibus. PERENNIS.

1246. FESTUCA decumbens.

Festuca panicula erecta, spiculis subovatis mucicis, calyce flosculis majore, culmo decumbente. LINN. spec. p. 110.

Poa decumbens. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 98.

Gramen montanum avenaceum locustis mucicis tumentibus, pilosum. SCHEUCHZ. agr. 170.

Gramen triticeum palastre humilius, spica mucica brevior. MORIS. hist. 3. p. 177. t. 8. tab. 1. f. 6.

Loc. In pascuis, & pratis non irriguis. PERENNIS.

1247. FESTUCA elatior.

Festuca panicula secunda erecta, spiculis subaristatis, exterioribus teretibus. LINN. spec. p. 111. SCHREB. gram. p. 34. tab. 2.

Poa foliis lotis asperis, locustis teretibus mucicis, glumarum oris membranaceis. HALL. hist. tom. 2. n. 1451.

Gramen liliaceum panicula multiplici, & spicata. TOURN. inst. p. 515. SCHEUCHZ. agr. p. 200. tab. 4. f. 6.

Phaenix multiplici spicata. PARK. theatr. 1145. fig. 1164.

Gramen paniculosum elatius spicis longis mucicis squamosis. VALL. Paris. 92.

Loc. In pratis prope fossas aquarum. PERENNIS.

1248. FESTUCA phaeuicoides.

Festuca racemo indiviso, spiculis alternis subsessilibus teretibus, foliis involutis mucronato-pungentibus. LINN. syst. 12. p. 96. MONTI 33. GER. prov. n. 95. tab. 2. f. 2.

Gramen phaeuicoides foliis convolutis junceis pungentibus. BAUM. hist. II. p. 477.

Loc. In pratis, & ad sepes in Comitatu Nicaensi. Cl. BELLARDI in valle Sturac prope Demoni. PERENNIS.

1249. FESTUCA fluitans.

Festuca panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus mucicis. LINN. spec. p. 111. SCHREB. gram. p. 37. tab. 3.

Poa locustis teretibus multifloris, glumis floralibus, exterioribus truncatis, interioribus bifidis. HALL. hist. tom. 2. n. 1453.

Poa spiculis decemfloris teretibus, rachis adpressis, racemis binatis, secundis patulis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 106.

Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica. BAUM. theatr. p. 41. SCHEUCHZ. agr. p. 199. tab. 4. fig. 5.

Gramen paniculatum aquaticum fluitans. TOURN. inst. p. 521.

Gramen aquaticum cum longissima panicula. BAUM. hist. II. 490.

Gramen liliaceum aquaticum Briqae locustis, semine rufo. BARR. ic. 7.

Loc. Secus fossas ad fluentes aquas. PERENNIS.

ALLIOTTI Flor. Pedem. Tom. II.

S s s

MELICA. LINN. gen. n. 76. syst. n. 82.

Flores vagi. Locusta biflora. Calyx biglumis: glumis ovatis mucicis aequalibus.
 Folliculi glumae muticae inaequales. Inter flores pedunculus sustinens
 saepe unum, aut alterum florem imperfectum, sive potius
 floris rudimentum. Semen nudum.

2250 MELICA ciliata.

Melica flosculi inferioris petalo exteriore ciliato. LINN. spec. p. 97.

Arundo locustis bifloris, spicatis, gluma florali exteriori ciliata. HALL. hist. tom. 2. n. 1517.

Melico panicula spicata, spiculis patentibus, flosculo majore lanato. SCOP. Fl. Carn. p. 198. ed. 2. n. 96.

Gramen avenaceum spica simplici, locustis densissimis candelantibus, & lanuginosis. TOURN. inst. p. 324. SCHEUCHZ. ogr. p. 174. tab. 3. fig. 16. G. H. J. K.

Gramen avenaceum montanum lanuginosum. BAUH. theatr. 156. pin. 10.

Gramen cum locustis parvis candidis pilosis semine avenaceo. BAUH. hist. II. p. 434.

Gramen sparteum alopecurum spica sericea glumosa typhina. BARR. ic. 3. n. 2.

Loc. Locis montanis alpestribus apicis saepissime occurrit. PERENNIS.

2251. MELICA nutans.

Melica petalis imberbibus, panicula nutante simplici. LINN. spec. p. 98. SCHREB. gram. p. 62. tab. 6. f. 2.

Poa panicula laxa, locustis nutantibus dianthis, alterno flosculo imperfecto. HALL. hist. tom. 2. n. 1472.

Melica pedunculis simplicibus, spiculis nutantibus secundis glabris. SCOP. Fl. Carn. p. 197. n. 1. ed. 2. n. 95.

Gramen avenaceum locustis rubris, montanum. BAUH. pin. 10. prodr. 20. RAS. hist. 1289. SCHEUCHZ. ogr. p. 171. fig. 16. D. E. F. tab. 3.

Gramen montanum avenaceum locustis rubris. BAUH. theatr. 154. 55. TOURN. inst. p. 324.

Gramen locustis rubris. BAUH. hist. II. p. 434.

Melica flosculis glabris, summo inaequaliter curvato. GMEL. Sib. 1. p. 97.

Loc. Ubique in sylvis. PERENNIS.

2252. MELICA minuta.

Melica culmo ramoso, foliis setaceis. LINN. syst. 12. p. 92. MANT. p. 32. petalis imberbibus. LINN. syst. veget. ed. 13. p. 97.

Loc. Ex collibus Aquisibus arulit Petrus MOLINERI. PERENNIS.

2253. MELICA caerulea.

Melica panicula coarctata, floribus cylindricis. LINN. mont. p. 325.

Aira (caerulea) foliis planis panicula coarctata, floribus pedunculosis mucicis convolutis-subciliosis. LINN. spec. p. 95. JACQ. austr. p. 14. HUDS. fl. angl. p. 29.

Agrostis racemis solitariis subrectis, spiculis mucicis, pedicello brevioribus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 91.

Gromen paniculatum autumnale panicula ampliore ex viridi nigricante. TOURN. inst. p. 321. SCHEUCHZ. ogr. p. 207.

Gramen arundinaceum, Enode majus montanum. BAUH. pin. 7.

Gramen erundinaceum Enode. BAUH. hist. II. p. 481.

Loc. Nascitur secus torrentes in sabulosis, & locis montanis sterilibus. PERENNIS.

AVENA. LINN. *gen.* n. 85. *syn.* n. 91. TOURN. *tab.* 197.

Locusta saepius multiflora, sed interdum etiam biflora. Calyx biglumis, glumis ventricosis, non aristatis. Folliculus bivalvis, valvula majore ventricosa, arista ex dorso prodeunte geniculata, & cumorta praedita. Germina pappi sericeus saepe circumdat.

1254. AVENA aurata N.

Avena diantha panicula sparsa erecta, floribus auratis basi villosis. HALL. *hist.* n. 1488.
Emend. 5. n. 17.

Loc. In summis alpinis di Bardouache, & Braman.

1255. AVENA sativa.

Avena paniculata, calycibus trifloris, flosculis omnibus basi pilosis, arisis totis brevibus. LINN. *spec.* p. 178. SCHREB. p. 109. *tab.* 15.

Avena triantha locustis patulis, folliculis villosis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1495.

Gramen avenaceum utriculis lanugine flavescens. TOURN. *ins.* p. 525. SCHEUCHZ. *agr.* p. 239. *tab.* 5. f. 1.

Festuca utriculis lanugine flavescens. BAUH. *pin.* p. 10. *Theatr.* 149.

Egilops quibusdam arisis recurvis, sive avena pilosa. BAUH. *hist.* II. p. 433.

Festuca dumetorum utriculis lanugine flavescens. BARR. *ic.* 75. 2. *tab.* 5. *fig.* 1.

Loc. In agris montanis hordeaceis praesertim frequens est. Etiam in agro Nicaenensi spontaneam legit Cl. BELLARDI. ANNUA.

1256. AVENA pubescens.

Avena subspicata, calycibus subtrifloris basi pilosis, foliis planis, pubescentibus. LINN. *spec.* pl. 1165. MANT. 327.

Avena triantha locustis teretibus erectis, petiolis sericeis, gluma exteriori lacera. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1498.

Avena (pubescens) calycibus subtrifloris basi pilosis, foliis planis pubescentibus. HUDS. *Angl.* p. 42. n. 4.

Gramen avenaceum panicula purpureo-argentea splendens. SCHEUCHZ. *agr.* p. 226. *tab.* 4. f. 20. MONTI. *ic.* 65.

Loc. Abunde in pratis alpinis. PERENNIS.

1257. AVENA flavescens.

Avena panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. LINN. *spec.* p. 118. HUDS. *Fl. Angl.* p. 42. SCHREB. *gram.* p. 76. *tab.* 9.

Avena triantha locustis teretibus, calycina gluma altera minima, petiolo villosa. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1497.

Gramen avenaceum pratense, elatius, panicula flavescens, locustis parvis. SCHEUCHZ. *agr.* p. 223. TOURN. *ins.* p. 525.

Loc. Ubique frequens in pratis, & pascuis montanis, & subalpinis. PERENNIS.

1258. AVENA pratensis.

Avena subspicata calycibus quinquefloris. LINN. *syn.* 12. p. 99.

Avena petiolis unifloris, brevibus, locustis teretibus quinquefloris, basi pubescentibus. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1499.

Avena calycibus quinquefloris, panicula spicata, foliis involutis. HUDS. p. 42. n. 3.

Gramen avenaceum angustifolium alpinum spicata panicula ex purpureo-viridi, & argenteo variegata. SCHEUCHZ. *agr.* p. 230.

Gramen avenaceum locusta simpliciter, arisis recurvis. RAI. *syn.* 3. p. 405. *tab.* 21. f. 1.

Loc. In pratis praesertim collinis, & montanis. PERENNIS.

1259. AVENA Scheuchzeri N.

Avena petiolis ramosis, locustis teretibus quinquefloris, basi pubescentibus. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1500.

Festuca avenacea humilior alpina, locustis varicoloribus majoribus aristatis. SCHEUCHZ. it. 6. p. 455. tab. 19.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum locustis majoribus varicoloribus aristatis. SCHEUCHZ. agr. helv. prodr. p. 23. tab. 3.

Loc. In pascuis editioribus non infrequens, copiosa inter *Braman*, & *le Barricade*. *PERENNIS.*

1260. *AVENA sesquiteria.*

Avena paniculata calycibus subristatis: flosculis omnibus aristatis, receptaculis barbatis. LINN. syst. 12. p. 99. mant. p. 34.

Gramen pratense villosum panicula densa ex argenteo dilute spadiceo, s. fusca. SCHEUCHZ. agr. p. 220. tab. 4. f. 17. *A. B.*

Loc. In pratis montanis alpinum *Valdensium.*

ARUNDO. LINN. gen. n. 87. syst. n. 93.

Flores vagi, congesti. Calyx bivalvis uni, vel multiflorus, valvis acuminatis muticis.

Folliculus bivalvis, valvis acuminatis ad basim plus minus lanugineosis.

Semeo lanuginoso folliculo arcte iocclusum.

1261. *ARUNDO phragmitis.*

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 79.

Aruno calycibus quinquefloris, panicula laxa. LINN. spec. p. 120. NEKER. p. 70. HUDS. Fl. Angl. p. 43.

Aruno foliis secantibus, locustis trifloris pappiis muticis. HALL. hist. tom. 2. n. 1515.

Aruno vulgaris, sive phragmites dioscoridis. BAUH. pin. 17. SCHEUCHZ. agr. p. 161. tab. 3. fig. 14. *D. Tourn. inst.* p. 526.

Aruno vulgaris. BAUH. theatr. 269.

Aruno vulgaris palustris. BAUH. hist. II. p. 485.

VERN. Cani.

Loc. Secus fluvios, & lacus, ubi aquae stasim patiuntur. *PERENNIS.*

1262. *ARUNDO donax.*

Aruno calycibus quinquefloris, paniculo diffus. LINN. syst. 12. p. 100.

Aruno caule lignoso geniculato, foliis latissimis, locustis trifloris. HALL. hist. tom. 2. n. 1516.

Aruno sativa, quae donax dioscoridis. BAUH. pin. 17. theatr. 271. SCHEUCHZ. gram. 159.

VERN. Cani.

Loc. In Monteferrata, & collibus calidioribus adeo frequens, ut (licet data opera etiam excolatur) indigenatus jus mereri videatur. *PERENNIS.*

VIR. Radix ARUNDINIS similia cum *Tritica* repente principia habet, uberius tenet principium sacchararum, & paullo efficacius humores solvit, dicitur menses pellere, cachecticis prodesse, & in podagra suam habere utilitatem. Licet aliquam vim aperientem, & solventem habeat, non tamen multa vis expectanda est. Opportuna est radix ARUNDINIS in tenaci lymphâ solvenda, quae in minimis vasis pulmonum haereat. Tanta est apud nonnullos existimatio, ut in phrysi, morbisque pulmonum ad syrupum de ARUNDINE conficiant, sed ea vera utilitas, quam habet interdum syrupus de ARUNDINE adhibitus multum tribuenda est aliis etiam rebus, quae in syrupo de ARUNDINE compositio recipiuntur. Radix decoquitur ab uncia una ad uncias duas.

1263. *ARUNDO epigejos.*

Aruno calycibus unifloris, panicula erecta, foliis subius glabris. LINN. spec. p. 120.

SCOP. Fl. Carn. p. 87. HUDS. Fl. Angl. p. 43.

Aruno locustis unifloris sericeis muticis, panicula stricta. HALL. hist. tom. 2. n. 1520.

Gramen arundinaceum paniculatum monanum, panicula spadiceo-viridi, semine papposo. SCHEUCHZ. agr. p. 124.

Loc. Locis aridis sabulosis. *PERENNIS.*

1264. ARUNDO calamagrostis.

Icon. TAUR. Vol. XI. tab. 39.

Arundo calycibus unifloris laevibus, corollis lanuginosis, culmo ramoso. LINN. syst. 12. p. 100.*Arundo locustis unifloris muticis, panicula alterne contracto.* HALL. hist. tom. 2. n. 1319.*Arundo (calamagrostis) calycibus unifloris, culmo ramoso.* HUDS. Fl. Angl. p. 43.*Gramen arundinaceum panicula molli spadiceo, majus.* SCHEUCHZ. agr. p. 122. tab. 5. c. 3. F. B. C. D. BAUH. pin. p. 7.

Loc. Ad aquas stagnantes, lentissime fluentes, aut inundantes, secus fossas, & fluviis frequens est. PERENNIS.

1265. ARUNDO agrostis.

Arundo locustis unifloris, glumis ex imo dorso aristatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1322.*Gramen avenaceum montanum panicula angusta e dilatissimo fusco albicante, & pappo.*

SCHEUCHZ. agr. append. p. 307.

Agrostis (arundinacea) panicula oblonga, pesalo exteriore basi villoso, aristaeque torta, calyce longiore. LINN. syst. 12. p. 90.*Arundo agrostis.* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 126.

Loc. In montibus S. Michaelis della Chiesa. Cl. BELLARDI legit in montibus di Più, & Uszy. PERENNIS.

1266. ARUNDO arenaria.

Arundo calycibus unifloris, foliis involutis, mucronato-pungentibus. LINN. spec. p. 121.*Gramen spartium spicatum foliis mucronatis longioribus.* BAUH. pin. 5.*Gramen spicatum setulinum maritimum maximum spica longiore.* SCHEUCHZ. gram. 138.

Loc. Prope Unellum legit Petrus MOLINERI. PERENNIS.

TRITICUM. LINN. gen. n. 94. syst. n. 99. TOURN. tab. 192. 193.

Scapus alterne flexuosus, & scrobibus excisus. Locusta multiflora. Calyx biglumis, glumis obtusis. Folliculus bivalvis, valvula exteriore ventricosa ex summo dorso aristata, vel acuminata, interiore plana. Semen a folliculo secedens.

1267. TRITICUM junceum.

Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 37. & Vol. XX. tab. 88.

Triticum calycibus truncatis quinquefloris, foliis involutis. LINN. spec. p. 120.*Triticum radice repente, culmo duro, foliis hirsutis, locustis quinquefloris.* HALL. hist. tom. 2. n. 1428.*Bromus truncatus.* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 121.*Gramen tritici spica muticae simili.* BAUH. pin. p. 9. prodr. 18.*Gramen tritici spica simili, angustifolium.* BAUH. theatr. 122. SCHEUCHZ. agr. p. 7.

Loc. Ad vias, & loca sicca in agro Nicaeni. PERENNE.

1268. TRITICUM repens.

Triticum calycibus subulatis quadrifloris acuminatis, foliis planis. LINN. syst. 12. p. 102.

SCHREB. gram. part. 2. pag. 24. tab. 26.

Triticum radicibus repentibus vaginosis, foliis hirsutis, locustis quinquefloris. HALL. hist. n. 1426.*Bromus glaber.* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 120.*Bromus spiculis sessilibus alternis trifloris, calyce brevioribus.* SCOP. Fl. Carn. p. 199. n. 1.*Gromen caninum arvense, sive primum dioscoridis, & officinarum.* BAUH. theatr. p. 7.*Gramen caninum, orvense, seu gramen dioscoridis.* BAUH. pin. 1. SCHEUCHZ. agr. p. 5.*Gramen lolioecum radice repente, seu gramen officinarum.* TOURN. inn. p. 516.

VERN. Gromon.

Loc. In pascuis, & locis arenosis, praesertim secus flumina, frequens. PERENNE.

ALLIIONI Fl. Pedem. Tom. II.

T t t

VIR. TRITICI repentis radix subdulcis, & farinosa est, alimentum etiam suppedians. Continet vero saccharum, atque vires habet laeviter abstergentes, atque aperientes. Non calefacit, urinam etiam movet, ac blande humores coactos resolvit. Solet ejus decoctione parasi decoctum febricitantium. Observatum est manifeste profuisse in hepatis obstructionibus, iisque praesertim, in quibus caute irritantibus procedendum est, sed in ejusdem usu perseverandum. Succus ex emollita, & madefacta radice expressus datur ab uncis duabus ad uncias quatuor. Arida, & exsucca radix vix succum praebet, atque succo, quem Pharmacopolae interdum, distribuunt, forsem, coactamque decoctionem praefereendam esse censeo. *Digüaria dactylon* etiam sub eodem nomine vernaculo ad eundem usum adhibetur, sed *TRITICUM repens* succosior planta praeferrí debet.

1269. *TRITICUM* tenellum.

Triticum calycibus subquadrifloris, flosculis muticis acutis, foliis setaceis. LINN. *spec.* p. 127.

Triticum radice fibrata, foliis angustissimis, locustis muticis acutis, foliis setaceis. LINN. *spec.* p. 127.

Triticum radice fibrata, foliis angustissimis, locustis muticis, folliculis ovatis. HALL. *hist. tom. 2. n. 1430.*

Gramen loliaceum minus, spica simplici. BAUH. *pin. p. 9. prodr. p. 11.*

Loc. In Comitatu Nicaensi; etiam provenit in agro Pedemoniana, atque incolitis pascua declivia soli exposita. *ANNUUM.*

1270. *TRITICUM* unilaterale.

Triticum calycibus unilateralibus alternis muticis. LINN. *man. 33.*

Gramen exile duriusculum maritimum. SCHLUCHZ. *agr. 372.*

Gramen pusillum uncialc, panicula foliacea. BOCC. *mus. 2. tab. 57.*

Loc. Nascitur ad litus maris Nicaensis. *ANNUUM.*

1271. *TRITICUM* caninum.

Triticum radice fibrata, foliis hirsutis, locustis quinquefloris aristatis. HALL. *hist. tom. 2. p. 212. n. 1419.*

Elymus (caninus) spica nutante arcta, spiculis rectis involucrio dentatis, infimis geminis. LINN. *spec. p. 124.*

Triticum caninum. HUDS. *Fl. Angl. p. 45.*

Gramen caninum non repens elatius, spica aristata. MORIS. *hist. 8. p. 177. 1. 8. tab. 1. f. 2.*

Gramen loliaceum fibrata radice, aristis donatum. VAILL. *Paris. p. 82. TOURN. inst. p. 516.*

Loc. Passim in dumetis, & sylvis agri Pedemoniani. *PERENNIS.*

ELYMUS. LINN. *gen. n. 91. syn. n. 96.*

Flores dentibus flexuosi scapi insidentes. Locustae geminae, multiflorae; quaelibet spicula duabus non glumis, sed rigidis setis excipitur.

Folliculus quilibet bivalvis, valvula exteriori aristata, interiori plana.

1272. *ELYMUS* arenarius.

Elymus spica erecta arcta, calycibus tomentosis flosculo longioribus. LINN. *spec. p. 112.*

SCHREB. *gram. part. 2. p. 85. tab. 40.*

Gramen caninum maritimum spicatum. BAUH. *pin. p. 1.*

Gramen caninum geniculatum maritimum spicatum. PARK. 1277.

Gramen caninum maritimum spica triticea, nostras. RAJ. *hist. 1256. SCHEUCHZ. agr. p. 6.*

Gramen loliaceum radice repente, maritimum. TOURN. *inst. p. 516.*

Loc. In atena ad maris litus. *PERENNIS.*

HORDEUM. LINN. *gen.* n. 93. *syn.* n. 98. SCOP. *Introd.* n. 68. TOURN. *tab.* 295.

Scapus alterne flexuosus, & scrobibus excisus. Locusta triflora, sive ex tribus distinctis floribus composita. Calyx communis sex angustis foliolis constat, duobus nempe glumarum instar, singulo folliculo subjectis, & aristatis. Folliculus bivalvis, valvula exterior ventricosa, in aristam longam desinente, interiori plana. Semen folliculo arcte involutum.

1273 HORDEUM murinum.

Icon. TAUR. Vol. 1. tab. 95.

Hordeum flocculis lateralibus maculis aristatis, involucri internodiis ciliatis, LINN. *spec.* p. 126.

Hordeum spicis crassis longe aristatis, calycinis glumis aristatis. HALL. *hist.* tom. 1. n. 1536.

Hordeum murinum. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. p. 277. n. 1241. BAUH. *hist.* II. 431.

Gramen hordeaceum minus, & vulgare. BAUH. *pin.* p. 9. *theatr.* 134. SCHEUCHZ. *agr.* p. 14.

Gramen spicatum vulgare secalinum. TOURN. *inst.* p. 517.

Loc. Ad vias, & limites agrorum ubique. ANNUUM.

1274. HORDEUM genicularum. † Tab. 91. fig. 3.

Hordeum culmo decumbente foliis obiecto, summo spothaeo spicae subjecto, supremo nodo incurvato.

Gramen hordeaceum a maritimis pumilum, PLUK. *physogr.* tab. 33. f. 2.

Gramen secalinum palustre, & maritimum, RAJ. *hin. plant.* 1256. SCHEUCHZ. *agrost.* p. 18.

Loc. CL. BELLARDI legit ad litora maris Nicaeensis prope Portum di Limpia. CL. VAHL *Botanices Professor Hafniensis* invenit quoque in maritimis Tuncantia. ANNUUM.

DESCR. Radix fibrosa, ex qua plures culmi nascuntur palmares, decumbentes, nodosi. Primi duo nodi fere recta procedunt, tertius ita incurvatur, ut angulum saepe erectum constituat. Folia molliter pubescentia, radicalia linearia, caulina culmum involvunt usque ad nodum, inde latescunt gradatim, ut ovato-lanceolata sint; supremi nodi folium tamquam spatha ampliatur ad medium usque spicam, iterumque angustatur, & acutum habet finem spicae subaequalem. Spica circiter uncialis, subovata, obscure disticha. Pedunculi triflori oppositè nascuntur. Basi singuli pedunculi sex aristas rigidae, asperiusculae, unciales, alterne longiores adsunt, quae calycem communem constituunt. Flores duo laterales mares, brevissime pedunculati, intermedius sessilis, hermaphroditus, singuli duas habent glumas, quarum exterior aristata, interior mucica. Semen oblongum, fuscum, totus sulcatum.

Obs. Non est HORDEUM jubatum, a quo evidenter differt. Planta culta majorem acquirit altitudinem, & spica duplo, vel triplo longior evadit. Character autem culmi incurvati non mutatur a cultura. Icon PLUCKENETII licet omnino non respondeat, neque exhibeat folium spicae immediate subjectum, attamen ad hoc HORDEUM spectare videtur.

1275. HORDEUM secalinum.

Hordeum flocculis lateralibus maculis aristatis, involucri setaceis scobris, SCHREB. *spic.* p. 148. REICH. *fl.* n. 939.

Hordeum spicis distinctis, folliculo brevi, glumis calycinis aristatis. HALL. *hist.* n. 1538.

Hordeum flocculis lateralibus, maculis aristatis, calycum valvis setaceis, GMELL. *sib.* 1. p. 124.

Gramen secalinum. RAJ. *synop.* 3. p. 392.

Gramen spicatum secalinum minus. SCHEUCHZ. *agr.* p. 17. n. 3.

Loc. Habitat in agro Nicaeensi. ANNUUM.

1176. HORDEUM Europaeum.

Hordeum spicis rigidis cylindricis, calycinis glumis aristatis. HALL. *hist. tom. 2. n. 5337.*

Elymus (europaeus) spica erecta: spiculis bifloris involucri aequalibus. LINN. *syn. 12. p. 101.*

Gramen hordeaceum spica strigiosiore brevius aristata. SCHEUCHZ. *agr. prodr. p. 14. tab. 1.*

Gramen secalinum majus sylvaticum D. Bobartii. RAI. *syn. 248.*

Loc. Frequens ad oras sylvarum supra la Perosa; incolit etiam dumeta montana alpium *Valdensium.* Cl. BELLARDI secus *Duriam* non infrequenter invenit. *PERENNE.*

B. FLORIBUS SEXU DISTINCTIS

ANDROPOGON. LINN. *gen. n. 1014. syn. n. 1145.*

Duo distincti flores, masculus unus, hermaphroditus alter. Quilibet calyx biglumis, glumis mucicis, interiore angustiore. Folliculus bivalvis, minor, arista e basi valvulae majoris prodeunte. Flori masculo stamina tantum tria, hermaphrodito praeter stamina tria styli tres. Semen folliculo involutum arista terminatum.

1177. ANDROPOGON contortum tab. 91. fig. 4.

Andropogon spica solitaria, foliis inferioribus mucicis. LINN. *spec. p. 1480.*

Gramen secalinum indicum, spica gracili tomentosa, longioribus aristas ad se invicem inortis. PLUK. *alm. 173. tab. 191. fig. 5. MORIS. hist. 3. p. 180. s. 8. tab. 4. fig. ult.*

Ægilops madraspariana glumis pilosis aristatis. SCHEUCHZ. *agr. p. 91.*

Loc. Supra *Eporédiam*, & in valle *Segusina* locis rupestribus passim nascitur. Primum omnium detexit Cl. BELLARDI in rupibus circa lacus *Eporédiae.* *PERENNE.*

DESCR. Radices numerosae, & fibrosae magnum caespitem faciunt culmorum biculbitalium, & ultra. Culmi glabri, teretes, nodosi; ex nodis rami simplices erecti. Folia ex nodis orta per duos triemes internodiorum vaginantia ad sui originem coalita in tubum, dum a caule secedunt ciliata promuni folium erectum, planum, lineari-lanceolatum, viride, tota sua superficie retrorsum asperum. Rami ex primis foliis non solent prodire, caulem, & ramos terminat glumis alternis spica imbricata, instar *Alopecuri* glaberrima, nihil habens tomentosi, sexuncialis, & biuncialis, aut etiam triuncialis. Squamae duae virides, elliptico-lanceolatae, margine albicantes, juxta se positae continent duas minores inaequales glumae florales. In harum medio flos masculus, & ad originem staminum binæ vesciculae albae. Ad latus floris masculi, ex situ nempe, qui originem dat glumae calycinae, nascitur foemina, quae nuda videtur, sed talis non est; glumae nempe duae fusco-purpureae in unum cylindricum corpus coalescunt, inus glumae duae florales albae semen involvunt, eique adhaerent. Foemina habet stylos magnos plumosos purpureos. Inter stylos ex summitate seminis prodit arista sericeo brevissimo villo nitens fusca longissima etiam spicae longitudine. Omnes aristae in unum corpus coalescunt, & contorquentur. Sub cortice purpureo adest semen album, acutum, cui arista vere infigitur facile separabilis; dum aristae distorquentur, & separantur, semina dimovent, & suo situ excutunt.

1178. ANDROPOGON gryllus.

Andropogon paniculae pedunculis simplicissimis trifloris, flosculo hermaphrodito aristato ciliato, basi barbato. LINN. *spec. p. 1480. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 273.*

Phoenix spica laxa, locustis longe petiolatis grandifloris, duobus floribus sessilibus, duobus petiolatis. HALL. *hist. tom. 2. n. 1411.*

Ægilops bromoides spica purpurascens. BAUR. *hist. II. p. 436. SCHEUCHZ. agr. p. 167. tab. 6. f. 1.*

Gramen avenaceum locustis gracilibus purpurascensibus, longissimis, petiolis insidensibus. MONT. *p. 57. ic. 67.*

Festuca dumerorum utriculis lanugine flovescentibus, oegilops dioscoridis. BAUH. theat. p. 49.

Loc. In pratis non irriguis praesertim ad radices montium positis. PERENNE.

1179. ANDROPOGON distachyon.

Andropogon spicis binis terminalibus, culmo indiviso. LINN. spec. p. 1481.

Andropogon spicis geminis bifloris, olerne muticis. HALL. hist. tom. 2. n. 1415.

Loc. Ubique ad rupes, & in saxosis Comitatus Nicoensis. PERENNE.

1180. ANDROPOGON hirtum.

Icon. TAUR. Vol. XXII. tab. 103.

Andropogon paniculae spicis conjugatis, colycibus hirsutis. LINN. spec. p. 1482.

Andropogon spicis conjugatis, colycibus hirsutis. ROY. Leyd. p. 53. n. 1.

Gramen dactylum spico gemina. SCHEUCHZ. agr. p. 95. TOURN. inst. p. 521.

Gramen bicorne, sive distachyphorum. BOCC. 20.

Festuca junceo folio, spica gemina. BAUH. pin. p. 9. prodr. 19. BAUH. hist. II. 504. theatr. 145.

Loc. Frequens Unelliae, & in Comitatu Nicoensi locis aridis, & saxosis. PERENNE.

1181. ANDROPOGON ischaemum.

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 85.

Andropogon spicis digitatis plurimis, flosculis sessilibus aristato, muticoque, pedicellis lanatis. LINN. spec. p. 1483. SCOP. Fl. Corn. p. 274. n. 1237. SCHREB. gram. port. 2. p. 66. tab. 33.

Andropogon spicis villosis septenis, locustis bifloris, floribus olernis sessilibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1414.

Airo spicis digitatis villosis: flosculo superiore sterili pedunculato mutico. SCOP. Flor. Corn. p. 190. n. 2.

Gramen dactylon spicis villosis. BAUH. pin. p. 8. theatr. 116. SCHEUCHZ. agr. p. 94.

Gramen dactylon spicatum, arinis geniculatis. BARR. ic. 753. fig. 2.

Gramen dactylon onguisfolium spicis villosis. TOURN. inst. p. 520.

Gramen digitatum hirsutum. BAUH. hist. II. 445.

Andropogon villosus. LAM. fl. franc., tom. 3. p. 634.

Loc. Vulgate est locis sterilibus agri Pedemoni. PERENNE.

1182. ANDROPOGON arundinaceum. SCOP. Flor. Corn. tom. 2. n. 1236.

Holcus (halepensis) glumis glabris, floribus hermaphroditis muticis, foemineo aristato?

LINN. syst. 12. p. 669. SCHREB. gram. p. 129. tab. 18. ic. opt.

Gramen arundinaceum paniculatum, locustis parim muticis, partim aristatis. SCHEUCHZ.

gram. p. 509. tab. 11. f. 12. 15.

Loc. In arvis argillaceis collium Taurinensium, & circa Lucengo. In vineis di Borgomasino, & in pratis siccis Cilioni, atque Montisferrosi frequenter occurrere adnotavit Cl. BELLARDI. PERENNE.

HOLCUS. LINN. gen. n. 1015., syn. n. 1146.

Calyx biflorus, aut etiam triflorus, flore uno perfecto, hermaphrodito altero, aut aliis duobus masculis. Calyx biglumis; glumae rigidae muticae. Folliculus

bivalvis, villosus, valvula exteriori aristata, inferiore mutica. Styli

capillares. Semen folliculo adhaerens. Flores distincti masculus,

& hermaphroditus in utroque calyce sedens.

1183. HOLCUS lanatus.

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 82.

Holcus glumis bifloris villosis: flosculo hermaphrodito mutico, masculo arista recurva.

LINN. syst. 12. p. 670. SCHREB. gram. 145. tab. 20. fig. 1.

Avena diantha floribus ovatis, perfecto mutico, imperfecto aristato. HALL. hist. tom. 2. n. 1484.

ALLIONI Fl. Pedem. Tom. II.

V v v

- Aira spiculis polygamis: masculo aristato, arista recurva.* SCOP. Fl. Carn. p. 190. n. 1. ed. 2. n. 1238.
- Grænen pratense paniculatum molle.* BAUH. pin. 2. prodr. 5. theatr. 27. SCHEUCHZ. agr. p. 234. tab. 4. fig. 24. A. B. TOURN. inst. p. 522.
- Grænen lanatum dalechampii.* LUGD. 425. BAUH. hist. II. 466.
- Loc. Ubique in pratis. PERENNIS.
1284. **HOLCUS mollis.**
Holcus glumis bifloris nudiusculis; flosculo hermaphrodito musico, masculo arista geniculata. LINN. spec. p. 1485. SCHREB. gram. p. 149. tab. 20. fig. 2.
Avena... HALL. hist. tom. 2. n. 1485.
Grænen caninum paniculatum molle. SCHEUCHZ. agr. p. 235. tab. 4. fig. 25.
Grænen paniculatum molle, radice graminis canini repente. MORT. hist. 3. p. 202.
Grænen caninum longius radicans. BAUH. pin. p. 1.
 Loc. Circa Augustam Taurinorum in pratis legi. In pascuis elatioribus di Tenda Cl. BELLARDI. PERENNIS.
1285. **HOLCUS avenaceus.** SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1239.
 Icon. TAUR. Vol. I. tab. 81. & Vol. XIII. tab. 9.
Avena (elatior) paniculata calycibus bifloris flosculo hermaphrodito submusico, masculo aristato. LINN. spec. p. 117. SCHREB. gram. pag. 25. tab. 1.
Avena diantha, folliculis basi villosis, majoris arista geniculata. HALL. hist. tom. 2. n. 1492.
Grænen nodosum avenacea panicula. BAUH. pin. 2. prodr. 3. theatr. p. 18. MONT. ic. 76. TOURN. inst. p. 525.
Grænen nodosum. BAUH. hist. III. p. 456.
Grænen bulbosum nodosum. LOB. ic. 23.
 Loc. Inhabitat pascua montana, & aprica. PERENNIS.
- ÆGILOPS.** LINN. gen. n. 1018. syn. n. 1150.
- Locusta 3-vel 4-flora, flores perfectos laterales, & masculos intermedios continens.
 Calyx biglumis, glumis ovatis, aristatis. Folliculus bivalvis, valvula exteriore ovata, triplici arista terminata, interiore mutica. Semen oblongum, valvulae folliculi interiori accretum.
1286. **ÆGILOPS ovata.**
Ægilops spica ovata, calycibus omnibus triaristatis. LINN. syst. 12. p. 671. Spec. plant. ed. 1. pag. 1050.
Grænen spicatum durioribus, & crassioribus locutis, spica brevi. TOURN. inst. p. 519. SCHEUCHZ. agr. p. 11. tab. 1. f. 2.
Festuca altera capitulis duris. BAUH. theatr. 151. pin. 10.
Phleum ægilops. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 78.
 Loc. Locis siccis ubique in Comitatu Nicaensi, Liguria, Monteferrato, atque etiam Auenti provincia Monteferrato contermina. Circa Augustam Taurinorum etiam vidit Cl. BELLARDI. ANNUA.
1287. **ÆGILOPS triuncialis.**
Ægilops spica aristata, calycibus inferioribus biaristatis. LINN. spec. p. 1489. GOU. monsp. 515. SCHREB. gram. pag. 80. tab. 10. f. 1.
Grænen spicatum durioribus, & crassioribus locutis, spica longissima. SCHEUCHZ. agr. p. 12. TOURN. inst. p. 519.
Festuca altera, capitulis duris, spica triunciali. BAUH. pin. p. 10. theatr. 151.
Ægilops elongata. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 632.
 Loc. In agro Nicaensi. ANNUA.

CENCHRUS. LINN. *gen. n.* 1017. *yst. n.* 1149.

Calyx exterior communis laciniatus, plures locustas continens. Locusta biflora.

Flore uno hermaphrodito, altero masculo. Calyx proprius biglumis, glumis concavis acuminatis. Folliculus bivalvis, valvulis acuminatis muticis, interiore minore. Stigma divisum.

1288 CENCHRUS capitatus.

Cenchrus spica ovata simplici. LINN. *spec. p.* 1488.*Gramen spica subrotunda echinata.* BAUH. *pin. 7. prodr.* 16. SCHEUCHZ. *gram.* 74.*Gramen monanum echinatum tribuloides capitatum.* COL. *ephr.* 1. p. 340. *tab.* 338. *f.* 1.*Gramen minimum spica globosa echinata.* BARR. *ic.* 28. *fig.* 1. & *ic.* 863. *fig.* 2.*Loc.* In monte Brau, & circa Sospello Cl. BELLARDI. *ANNUA.*

II. GRAMINA SPURIA.

A. CULMO SPONGIOSO, FLORIBUS MASCULIS,
ET FOEMINEIS IN EADEM PLANTA.COIX. LINN. *gen. n.* 927. *yst. n.* 1043. TOURN. *tab.* 305.

Flori masculo locusta biflora. Calyx biglumis, glumis muticis, exteriore crassiore.

Folliculus bivalvis, valvulis muticis. Flori foemineo locusta etiam biflora.

Calyx, & folliculus idem; stylus simplex; stigmata duo.

Semen magnum, nitidum, subrotundum, gluma calycis exteriore tectum.

1289 COIX lacryma Jobi.

Coix seminibus ovis. LINN. *spec. p.* 1378.*Lithospermum arundinaceum.* BAUH. *pin.* 258.*Lacryma Jobi.* CLUS. *hist.* 2. p. 216.*Loc.* In agro Nicaeani legit D. GIUDICE. *ANNUA.*CAREX. LINN. *gen. n.* 928. *yst. n.* 1046. TOURN. *tab.* 300.

Flores in spicis instar amenti imbricatis. Mares, & foeminae distinctis locis, aut in eadem spica, aut in diversis spicis, etiam in distincta planta. Flori masculino calyx est squama lanceolata, concava, uniflora, habens stamina tria calyce longiora. Foeminino quaelibet squamula fovet nectarium oblongum, bi-vel tridentatum, persistens, in quo sedet ovulum stylo bifido, aut trifido instructum, quod abit in semen saepius triquetrum, nectario contentum.

SPICA UNICA

1290 CAREX dioica.

Carex spica simplici dioica. LINN. *spec. p.* 1379.*Cyperoides parvum caulis, & foliis tenuissimis triangularibus, spica longiore capsulis oblongis.* MICH. *gen.* 36. *tab.* 32. *f.* 1.*Loc.* Habet inter suas stirpes Cl. BELLARDI lectam in pratis humidis di Frossasco. *PERENNIS.*

1291. CAREX pulicaris.

Carex spica simplici androgyna: superne mascula capsulis divaricatis retroflexis. LINN. *spec. p.* 1380.

- Carex spica unica terete seminibus rostratis.* HALL. hist. tam. 2. n. 1330.
Carex minima caulis, & foliis capillaceis, capitula singulari tenuiore, capsulis oblongis utrinque acuminatis, & dorsum flexis. MICH. gen. plant. p. 66. tab. 3. f. 1.
Gramen cyperoides spica simplici cassi. SCHEUCHZ. agron. 497. tab. 11. f. 9. 10.
 Loc. In montibus, & alpinis humidis, & uliginosis frequens. *PERENNIS.*
1292. *CAREX rupestris* † tab. 92. fig. 1.
Carex spica simplici androgyna oblonga, superne mascula, glumis foemineis aristatis.
 Loc. In summis alpinis jugis di *Ussey* prope l' *Auzaret* locis succis, & rupestribus *Cl. BELLARDI. PERENNIS.*
DESCR. Culmus vix palmaris nudus triquetris foliis duplo altior. Folia caryophyllacea. Spica uncialis oblonga. Glumae masculinae subovatae non aristatae. Foemineae latae ex ovatis acutae spadiceae, ora palidior, nervo latrescente arista terminato.
1293. *CAREX Bellardi* N. † tab. 92. fig. 2.
Carex spica unica androgyna strigosa, culmo tereti, foliis capillaribus.
 Loc. Nasctur in alpinis di *Ussey* prope l' *Auzaret* in saxorum rimis *Cl. BELLARDI. PERENNIS.*
DESCR. Radix fusca fibrosa, ex qua cespes multorum culmorum. Folia capillaria convoluta, striata, curvula, culmo subaequalia. Culmus teres striatus curvulus spithama minor. Spica uncialis, & ultra, floribus non appressis, sed fere solitariis alternis sessilibus ita, ut spica interrupta videatur. Singuli flores ex foliolo brevi spadiceo ora albicante tamquam e spatha prodeunt. Glumae ovatae acutae non aristatae spadiceae, ora subalbicante. Capsulae subrotundae.
1294. *CAREX capitata.*
Carex spica simplici androgyna ovata, superne mascula, capsulis imbricato-patulis. LINN. spec. p. 1379.
Carex spica unica subrotunda, seminibus inflatis. HALL. hist. n. 1331.
Cyperoides parvum caulis, & foliis tenuissimis triangularibus, spica subrotunda. MICH. gen. 56. tab. 32. f. 2.
Gramen cyperoides minimum ranunculi capitulo simplici, asperiore, rotundo. MORIS. oxon. 3. p. 245. t. 8. 12. f. 6.
 Loc. Ad radices montium locis paludosis minime rara. *PERENNIS.*
1295. *CAREX curvula* N. tab. 92. fig. 3.
Carex culmo, foliisque duris, curvulis, spica unica, glumis aristatis. HALL. hist. n. 1333.
 Emend. 3. n. 133.
 Loc. In summis jugis montis *Silvii*, & montis *Rosa.* *Cl. BELLARDI* in alpinis elatioribus di *Ussey. PERENNIS.*
Obs. Licet unica spica videatur, ad basim tamen spiculam unam, alteramve habet, quae per aetatem spicae demonstratur. Lit. A. exhibet spicam juniorem. Lit. B. spicam semine foetam.
1296. *CAREX juncifolia* N. tab. 92. fig. 4.
Carex spica unica subrotunda, glumis ovatis, brevissima aristatis. HALL. hist. n. 1334.
Carex alpina minima juncifolia, caule rotundo triquetris, spica in summitate caulis arofusca, squamis amplioribus, plerumque bifidis, & limba membranaceo cinctis. MICH. p. 68. n. 6.
Gramen cyperoides juncifolium spica simplici in summitate culmi arofusca. SCHEUCHZ. p. 492. tab. 11. f. 7.
 Loc. In valle *Ursina*, & *Chamany.* *Cl. BELLARDI* in paludosis montis *Cenisii*, & alpinis di *Ussey. PERENNIS.*
Obs. Haec etiam vere simplex spica non est, sed ex congestis spicis coalescit. Lit. C. exhibet spicam juniorem. Lit. D. spicam adultam.

1197. CAREX foetida N.

Carex foetida spica fusca conglomerata. HALL. hist. n. 1355.*Gramen alpinum, enode, spica parva subtruncato ferruginea.* SCHEUCHZ. agron. prodr. p. 18. tab. 4.

Loc. In spongiosis summorum alpinum frequens. PERENNIS.

OBS. Simul compactae spicae unam spicam mentiantur.

SPICIS PLURIBUS: ANDROGYNIS

1198. CAREX tripartita N. tab. 92. fig. 5.

Carex spica terminali tripartita. HALL. hist. n. 1356.

Loc. In alpibus di Grassand, & vallis Augustae Proetorior. Cl. BELLARDI in monte magni Sancti Bernardi. PERENNIS.

1199. CAREX arenaria.

Carex spica composita, spiculis androgynis, inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo triquetro. LINN. spec. p. 1381.*Carex spicis in summo caule congestis, imis foliatis insidentibus.* HALL. hist. tom. 2. n. 1362.*Carex maritima humilis, radice repente, caule triquetro, spica spadicea.* MICH. gen. 67. tab. 3. f. 4.*Gramen cyperoides e monte Ballon simile humilius, in arenosis nascens.* PLUK. alm. 178. tab. 34. f. 8.

Loc. Secus la Dora in arenosis occurrit. PERENNIS.

1200. CAREX uliginosa.

Carex spica composita, spiculis androgynis, inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo tereti. LINN. spec. p. 1381.*Carex spicis stipula brevioribus, imis distinctis superioribus congestis.* HALL. hist. tom. 2. n. 1363.*Gramen cyperoides palustre minus, spica diviso.* BAUH. pin. 16.

Loc. In sylvis subhumidis supra lo Novolesa. Cl. BELLARDI abunde nasci observavit in paludosis d' Ussey inter Margan, & Marciazia. PERENNIS.

1201. CAREX bipartita † tab. 84. fig. 5.

Carex culmo tereti nuda, spicae binis terminolibus, suprema composita.

Loc. In alpibus d' Ussey, & in monte Cenisia locis uliginosis reperit Cl. BELLARDI. PERENNIS.

DESCR. Radix fibrosa caespitem praebet, ex quo aliquot colmi prodeunt recti, nudi. Culmus foliis duplo altior, vix palmaris, striatus, teres. Folia graminea, glabra, parum convoluta, striata, acuta, fere pungentia. Spica terminalis etiam uncialis, composita ex spiculis sessilibus, alternis congestis, altera spica distincta subiacet simplex foliolo insiens. Spicula infima foliolo insidet spadiceo acuto, & ab aliis paullisper distat. raro tertia spicula inferius nascitur. Glumae ovatae, acutae, non aristatae, fuscae, ora per aetatem albescente.

1202. CAREX paniculata.

Carex racemo composito, spialis androgynis. LINN. syst. 12. p. 617.*Carex spica paniculata.* HALL. hist. n. 1368.*Carex angustifolia cauli triquetro, spica multiplici fusca.* MICH. gen. 68. tab. 373. fig. 7.*Cyperus alpinus longus, inoarus, panicula ferruginea minus sparsa.* SCHEUCHZ. prodr. 7. tab. 8.*Gramen cyperoides palustre, spico longiore lata.* RAI. hist. 1296. SCHEUCHZ. 499.

Loc. Locis montanis spongiosis, atque etiam ad oras lacuum minime rara. PERENNIS.

1203. CAREX leporina.

Carex spica composita, spiculis avatis sessilibus approximatis, alternis androgynis nudis. LINN. spec. p. 1381.

ALLIIONI Flor. Pedem. Tom II.

X x x

Carex spicis nudis, subrotundis, distinctis, in summa caule cængentis. HALL. hist. n. 1161.
Carex angustifolia, caule triquetra, spicis pluribus elegantibus parum inter se distantibus.
 SEGU. ver. 1. p. 124. tab. 1. f. 2.

Carex nuda. LAM. fl. franc. tom. 2. p. 172.

Loc. Ad radices alpium *Bugellensium* præta incolit spongiosa. Cl. BELLARDI in prætiis di *Bargomasino*, & in valle di *Bros* abunde nasci adnotavit. PERENNIS.

1304. CAREX vulpina.

Carex spicis subrotundis echinatis, supremis confluentibus, capsulis raris bifidis. HALL. hist. n. 1364.

Carex spica supradecomposita, inferne luxiare: spiculis avatis andragynis glomeratis superne masculis. LINN. syn. 12. p. 616.

Carex culma triquetra, spica supradecomposita, racemis imbricatis, spiculis androgynis, sessilibus, ovatis, foliis angulatis. SCOP. Fl. Carn. p. 219. ed. 2. n. 1169.

Scirpoides palustre majus spica compacta. MONT. prod. p. 17. tab. F.

Carex palustris major radice fibrata, caule exquisitè triangulari, spica brevi habitiore compacta. MICH. gen. 69. tab. 33. f. 13. 14.

Loc. Non infrequens ad oras sylvarum secus alveos fluminum, & lacus *Canapicienses*. PERENNIS.

1305. CAREX brizoides.

Carex spica composita disticha nuda, spiculis androgynis oblongis coniguis, culma nuda. LINN. spec. p. 1381.

Carex spicis distichis teretibus repandis. HALL. hist. n. 1338.

Carex culmo triquetra, spica composita, spiculis andragynis, alternis acutis, teretibus imbricatis. SCOP. Fl. Carn. p. 218. n. 18. ed. 2. n. 1170.

Carex radice fibrata, angustifolia, caule exquisitè triangulari: capitulis pulchellis, albicantibus, pauculum inter se distantibus. MICH. gen. pl. p. 76. tab. 33. fig. 17.

Loc. In sylvis montium subalpinorum *Epoediensium*. Cl. BELLARDI copiose nasci observavit ad sepes inter *Senimo Tarinese*, & *Brandizzo*, tum in prætiis di *Bargomasino*, & in sylvaticis uliginosis di *Frassano*. PERENNIS.

1306. CAREX muricata.

ICOM. TAUR. Vol. I. tab. 86.

Carex caule, folisque asperis, spicis echinatis subrotundis, supremis congestis. HALL. hist. tom. 2. n. 1365.

Carex spiculis subovatis sessilibus remotis andragynis, capsulis acutis divergentibus spinosis. LINN. spec. p. 1382.

Carex nemorosa caule triangulari, spica interrupta, capitulis salutaris. MICH. gen. pl. p. 69. O. 5. n. 5. tab. 33. f. 11.

Gramen nemorosum spicis parvis asperis. BAUH. pin. 7. Theaur. pag. 100.

Loc. In prætiis subhumidis, & circa lacus, præterea ad oras sylvarum, vulgaris. PERENNIS.

1307. CAREX remota.

Carex spicis ovatis subsessilibus remotis androgynis, bracteis culmum æquantibus. LINN. syn. 12. p. 617.

Carex (axillaris) &c. LINN. spec. pl. 1382.

Carex angustifolia, caule triquetra. MICH. gen. 70. tab. 33. f. 16.

Cyperoides angustifolium spicis sessilibus in salivum alis. RAI. hist. 1295. MORIS. hist. 3. p. 243. t. 8. tab. 12. f. 17.

Carex spicis androgynis imis in ala prælongi folii sessilibus, supremis nudis. HALL. hist. n. 1357.

Loc. In sylvis subhumidis secus flumina in agro *Pedemontano*, atque etiam in colibus *Taurinensibus*. PERENNIS.

1308. CAREX elongata.

Carex spicis ovatis, imis remotis, supremis congestis. HALL. hist. tom. 2. n. 1359.

Carex spiculis oblongis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis acutis. LINN. spec. p. 1383.

Cyperoides polystachyon, spicis laxis, paniculam veluti componentibus. SCHEUCHZ. agr. p. 482. tab. 2. f. 4.

Gramen cyperoides medium angustifolium, spicis teretibus erectis flavescentibus. MORIS. hist. 3. p. 242. t. 8. tab. 12. f. 8.

Loc. In alpinis Valdensem lecta est. Cl. BELLARDI circa lacus Canapicienses, & in pratis di Fenestrelle. PERENNIS.

1309. CAREX atrata.

Carex spicis ovatis petiolatis cængentis senescendo nutantibus. HALL. hist. n. 1369.

Carex spicis androgynis terminalibus pedunculatis, flamentis erectis, fructiferis pendulis. LINN. spec. p. 1386.

Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyllaceis, spicis aris, & tumentibus. SCHEUCHZ. gram. 481.

Loc. Vulgaris in pratis spongiosis, & pascuis alpinis. PERENNIS.

1310. CAREX nigra †

Carex culmo triquetro foliosa, spicis androgynis nigris erectis ternis terminalibus.

Loc. In summis alpinis Pedemontii, & Sabaudie non rara Cl. BELLARDI. PERENNIS.

DESCR. Folia caryophyllacea, culmo breviora. Culmus digiti longitudine, etiam pedalis, triquetus, foliosus, striatus, spicas tres, vel quatuor ovatas, obaesas, congestas, sessiles sustinet, etiam senescendo erectas, quarum ima subsessilis foliolum habet longius. Glumae ovatae, acutae, nigrae, ora subalbescente. Spica intermedia interdum evidenter superius mascula.

Obs. Differt a CAREX atrata spicis erectis sessilibus, ejusque habitum refert, cum qua confusa videtur ab Auctoribus.

1311. CAREX bicolor. †

Carex culmo tereti nudo, spicis androgynis sessilibus ternis terminalibus, capsulis glumas superantibus.

Loc. In summis alpinis locis uliginosis minus frequens Cl. BELLARDI. PERENNIS.

DESCR. Planta digno vix altior. Folia habet graminea, quae vix culmi dimidiam altitudinem attingunt, sulcata in parte superiore, nervo eminente, in inferiore glabra. Culmus subrotundus, striatus, tres spicas sustinet ovatas, androgynas, quarum prima subsessilis est, & foliolo brevi insidet, reliquae sessiles foliolo destituta. Glumae ovatae, obtusae, nigrae, nervo albicame notatae. Capsulae longitudinem glumarum dimidio superant, tumidiusculae, obtusae, ovatae, & subvirescentes.

Obs. Clar. HALLERUS suspicatur esse varietatem insignem CARICIS atratae n. 1369.

SPICIS PLURIBUS SEXU DISTINCTIS: MARE UNICA.

1312. CAREX prostrata N.

Carex spica mare unice, foemininis adpressis, calycinis glumis maximis, caule senescente prostrato. HALL. hist. n. 1370.

Cyperoides mansanum humile angustifolium, culmo veluti foliosa, spicis obaeso. SCHEUCHZ. agrar. p. 407. tab. 10. f. 1. capsulis oblongis, gibbis, trilobatis. MICH. p. 63. n. 65. tab. 32. f. 8.

Cyperoides longifolium culmo pumilo, veluti foliosa, spicis obaeso. SCHEUCHZ. p. 408. tab. 10. f. 2.

Loc. Locis udis saxosis alpinis Valdensem non infrequens. PERENNIS.

1313. CAREX approximata N.

Carex spicis sessilibus approximatis ovatis. HALL. hist. n. 1371.

Cyperoides alpinum foliis caryophyllaceis, spicis brevibus ex nigricante, & albidis variis. SCHEUCHZ. p. 421. tab. 10. f. 10.

Loc. In monte Cenisio. PERENNIS.

2314. CAREX conglobata N.

Carex foliis caryophyllaeis, spicis sessilibus approximatis paucifloris, capsulis avasis hirsutis. HALL. hist. n. 1372.

Cyperoides montanum foliis angustis parvis, spica spadicea divisa. SCHEUCHZ. p. 419. tab. 10. f. 8. 9.

Loc. Reperi in ascensu montis Asiense. PERENNIS.

2315. CAREX pilulifera.

Carex spicis terminalibus confertis subraundis, masculina oblonga. LINN. spec. p. 1385.

Gramen cyperoides tenuifolium, spicis ad summitatem caulis sessilibus, globulorum aemulis. FLUK. alm. 178. tab. 91. f. 8.

Loc. In spongiosis prope Envie lecta est. PERENNIS.

2316. CAREX montana.

Carex spicis foemineis sessilibus subsiliariis avasis masculae approximatis, culma nudo, capsulis pubescentibus. LINN. spec. p. 1385.

Carex angustifolius spicis sessilibus approximatis tereibus, capsulis hirsutis. HALL. hist. n. 1373.

Cyperoides angustifolium mantanum, folliculis seminum villosis. SCHEUCHZ. p. 423.

Cyperoides alpinum saxatile, capillacea folia, caule raunda, triquetra, spica seminali nigricante, plerumque unica. MICH. gen. 64. tab. 32. f. 3.

Loc. Vulgaris in valle Ulciensi, & descendit etiam ad montana Pedemontii prata. PERENNIS.

2317. CAREX tomentosa.

Carex spicis foemineis subpedunculatis erectis, capsulis subglobosis tomentosis. LINN. syn. 12. MANT. p. 123.

Cyperoides angustifolium montanum, folliculis seminum villosis. SCHEUCHZ. agr. p. 123.

Gramen spicatum angustifolium mantanum. BAUH. prodr. 20. pin. 4. theatr. 47.

Loc. Allata est ex valle Augustae Praetoriae. PERENNIS.

2318. CAREX mucronata N.

Carex spicis sessilibus approximatis brevissimis, glumis lanceolatis, mucronatis. HALL. hist. n. 1374.

Cyperoides alpinum saxatile capilleacea folia caule rotunda, triquetra, spica seminali nigricante plerumque unica, capsulis oblongis turbinatis, trilaseris, subhirsutis in apicem tenuissimum nonnihil bifidum terminatis. MICH. gen. p. 64. n. 69. tab. 32. f. 3.

Loc. In alpebus di Bardanache lecta est. PERENNIS.

2319. CAREX filiformis.

Carex spica mascula oblonga, foemineis sessilibus oblongis, inferiore fallata propria brevare. LINN. spec. p. 1385.

Carex spicis sessilibus approximatis tereibus folia insidenibus. HALL. hist. n. 1383.

Cyperoides sylvaticum angustifolium spicis parvis tenuibus spadiceo-viridibus. SCHEUCHZ. gram. 425. tab. 10. f. 11.

Loc. In sylvis humidis montanis Valdensem. PERENNIS.

2320. CAREX pedata.

Carex spicis foemineis sessilibus oblongis, inferiari axillari, foliis subfiliformibus. LINN. spec. p. 1384.

Carex spicis foemineis roris, marem adaequantibus, imo petiolata. HALL. hist. n. 1375.

Gramen caryophyllatum nemorosum spica multiplici. BAUH. pin. 4. Theatr. 47. prodr. 9. SCHEUCHZ. gram. 450. MICH. gen. tab. 32. fig. 14.

Loc. In sylvis subhumidis montanis. PERENNIS.

2321. CAREX digitata.

Carex spicis linearibus erectis: mascula brevior, inferiarique, bracteis aphyllis, capsulis distantibus. LINN. spec. p. 1384.

Carex spicis foemininis petiolatis raris, masculam superantibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1376.

Carex culmo subtereti nudo, spicis erectis imbricatis, foemineis supremis supra marem elatis, capsulis pilosis. SCOP. Fl. Carn. p. 212. n. 4. ed. 2. n. 1149.

Cyperoides monianum nemorosum, caule triquetro compresso, spicis ferrugineis tenuioribus, inter se distantibus. MICH. gen. 65. tab. 32. fig. 9.

Gramen cariophyllum monianum, spica varia. C. B. prodr. p. 23., theatr. p. 47. SCHEUCHZ. p. 448. tab. 10. fig. 14.

Loc. In sylvis Taurinensibus locis sylvaticis, & siccis. PERENNIS.

1312. CAREX alba.

Carex culmo tereti nudo, spicis pedunculatis erectis albidis, foeminea supra marem elata, capsulis levibus. SCOP. Fl. Carn. p. 212. n. 3.

Carex spicis foemineis raris petiolatis teretibus acutis, marem aequantibus. HALL. hist. n. 1377.

Cyperoides foliis tenuissimis, caule subtriquetro, spicis albicanibus, capsulis laterescentibus. MICH. gen. p. 65. n. 79.

Gramen sylvaticum angustifolium spica alba. C. BAUH. SCHEUCHZ. gram. p. 410. tab. 10. fig. 4. 5.

Loc. In sylvis, & collinis occurrit. Cl. BELLARDI in sylvis uliginosis di Pralognan. PERENNIS.

1313. CAREX pilosa.

Carex culmo triquetro, spicis erectis remotis, foemineis linearibus, folio proprio longioribus. SCOP. Fl. Carn. n. 1162.

Cyperoides nemorosum, caule triangulari, spicis distantibus, squamis in aristam attenuatis. MICH. gen. pl. p. 62. n. 46. tab. 32. fig. 5.

Carex spicis foemininis petiolatis erectis, floribus remotis. HALL. hist. n. 1379.

Loc. Inhabitat sylvas collium Taurinensium. PERENNIS.

1314. CAREX fusca N.

Carex spicis foemininis tribus erectis, capsulis ovatis breviter mucronatis petiolatis, folio insidentibus. HALL. hist. n. 1378.

Cyperoides angustifolium spica spadiceo-viridi, minus, alpinum spicis longioribus. SCHEUCHZ. ii. 6. p. 458.

Loc. Frequens in alpinis, quae monte Vesulo, & Cenisio interceptiuntur. PERENNIS.

1315. CAREX trigona † tab. 89. fig. 4.

Carex spico mascula pedunculata, foemineis sessilibus remotis trigonis.

Loc. Cl. BELLARDI legit locis paludosis di Viù. PERENNIS.

DESCR. Culmus foliosus pedalis, & ultra, triquetre, striatus, glaber. Folia linearia striata, obscure viridia, culmo breviora. Spica mascula, unica, oblonga, longe pedunculata, glumis spadiceis obtusis. Spicae foemineae tres, inter se longe remotae sedent in ala folii, infimae folium praelongum est, atque masculum subaequat. Spicae praedictae sunt ovatae, manifestae, & perfecte trigonae, quae nota facillime a proximis speciebus distinguitur. Spica foeminea suprema saepe androgyna est.

1316. CAREX distans.

ICON. TAUR. Vol. I. tab. 87.

Carex spicis remotissimis subsessilibus bractea vaginali, capsulis angulosis mucronatis. LINN. syn. 12. p. 618.

Carex spicis brevissime petiolatis divisis. HALL. hist. tom. 2. n. 1382.

Carex culmo subtriquetro, spicis erectis remotis, foemineis sessilibus, capsulis acutis. SCOP. Fl. Carn. p. 213. n. 6., ed. 2. n. 1150.

Cyperoides spicis seminibus breviter pedunculatis, & inter se, & a mare remotissimis. HALL. Helv. 237.

ALLIOTTI Fl. Pedem. Tom. II.

Y y y.

Gramen cyperoides gracile alterum, glomeratis torulis spatio dimittibus. MORIS. *hist.* 3. p. 243. t. 8. tab. 12. fig. 18.

Loc. Ad sepes bumentium pratorum vulgaris nascitur, & locis montanis, & collinis palustribus non infrequens. *PERENNIS.*

2327. *CAREX cespitosa.*

Carex spicis erectis cylindricis ternis subsessilibus: mascula terminali, culmo triquetro. LINN. *spec.* p. 1388. HUDS. *Fl. Angl.* n. 351.

Gramen cyperoides angustifolium spica spadiceo-viridi minus. BAUH. *pin.* 6. prodr. 13. *Cyperoides angustifolium spica spadiceo-viridi, minus.* TOURN. *inst.* p. 529.

Loc. Frequens locis spongiosis ad oras lacuum. *PERENNIS.*

2328. *CAREX foliosa N.*

Carex spicis foemininis sessilibus, ima petiolata, glumis perangustis. HALL. *hist.* n. 1384. *Cyperoides spicis viridibus brevibus, e squamis angustioribus compositis, laetifolium.*

SCHEUCHZ. *agron.* p. 435.

Loc. In udis ad radices *Assietæ.* *PERENNIS.*

2329. *CAREX alpestris N.*

Carex spica foeminina infima radicali, capsulis triquetris elongatis. HALL. *hist.* n. 1385. *Loc.* In alpihus la *Vanoise*, & monte *Rosa* lecta. *PERENNIS.*

2330. *CAREX obaesa N.*

Carex spicis foemininis sessilibus ternis, capsulis ovato-triquetris. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1387.

Cyperoides alpinum pumilum, spicis spadiceo-viridibus brevioribus, & crassioribus. SCHEUCHZ. p. 418.

Loc. Ex vallis *Bardonache* montibus. *PERENNIS.*

2331. *CAREX strigosa N.*

Carex foliis cespitosis brevibus, spicis foemininis paucifloris, suprema sessili. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1388.

Cyperoides alpinum angustifolium spicis laxis spadiceo-viridibus. SCHEUCHZ. p. 416.

Loc. In editioribus scopulosis locis montis *Silvio*, & *Rosa.* *PERENNIS.*

2332. *CAREX saxatilis.*

Carex spicis tribus ovatis sessilibus alternis, mascula oblonga. LINN. *spec.* p. 1385.

Carex spicis foemininis binis, longe petiolatis, dissitis, capsulis longe rostratis bifidis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1389.

Cyperoides alpinum spicis seminiferis tenuioribus averspadiceis. SCHEUCHZ. p. 415.

Loc. In vallis *Bardonasse* montibus editioribus. Cl. *BELLARDI* in alpihus di *Ussey.* *PERENNIS.*

2333. *CAREX ferruginea.* SCOP. *Fl. Corn.* n. 1159.

Cyperoides angustifolium alpinum spica spadicea tenuiore. SCHEUCHZ. p. 413. tab. 10. fig. 6. HALL. *hist.* n. 1390.

Loc. Frequens in editioribus alpihus la *Vanoise*, l' *Autarez* & vallis *Bardonache.* *PERENNIS.*

2334. *CAREX frigida N.*

Carex spicis foemininis ternis, quaternisque dinichis, capsulis longe mucronatis. HALL. *hist.* n. 1391. emend. 3. n. 149.

Loc. In editionibus alpium non infrequens *PERENNIS.*

2335. *CAREX limosa.*

Carex spicis ovatis pendulis, mascula longiore erectiore, radice repente. LINN. *spec.* p. 1386.

Carex spicis foemininis pendulis, capsulis ovatis compressis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1392.

Cyperoides spica pendula brevior: squamis e spadicea, s. fusco rutilante viridibus.
SCHEUCHZ. gram. 443. tab. 10. f. 13.

Loc. Secus lacum montis Cenisii. Cl. BELLARDI in pratis alpium di Viù, & Ussei.
PERENNIS.

2336. CAREX pallescens.

Carex spica pendulis: mascula erecta, femineis avanis imbricatis, capsulis confertis obtusis. LINN. spec. p. 1386.

Carex spicae femininis pendulis, capsulis ovato-conicis. HALL. hist. tam. 2. n. 1393.

Carex culmo triquetra, spica erecta, mascula flava, femineis imbricatis pedunculatis ovatis, capsulis obtusis. SCOP. Fl. Carn. p. 215. n. 12.

Cyperoides Palytachyon flavicans spica brevibus, prope summitatem caulis. SCHEUCHZ. agron. p. 431. MICH. p. 61. n. 45. tab. 32. f. 13.

Loc. Passim in pratis spongiosis montium, & collium. PERENNIS.

2337. CAREX praecox. JACQ. Fl. Austr. tab. 446.

Carex foliis cespitiis brevibus, spica confertis, petiolis erectis brevibus, capsulis ovato-triquetris. HALL. hist. n. 1381.

Cyperoides vernum caule rotundo-triquetra, spicae seminibus densioribus, binis, vel ternis, squamis ferrugineis obtuse mucronatis, & tanquam in aristulam prolongatis, capsulis turbinatis subhirsutis trilobatis. MICH. p. 64. n. 70. SEGU. veron. 2. p. 122. n. 9.

Cyperoides minus, spicae densioribus. TOURN. inst. R. H. 530.

Cyperoides alpinum, caryophyllaeis foliis, spica tenuibus e fusco rufescentibus. SCHEUCHZ. agron. p. 433. n. 4.

Loc. In pascuis, & clivis primovete frequentissima. PERENNIS.

2338. CAREX panicea.

Carex spica pedunculatis erectis remotis: foemineis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis. LINN. spec. p. 1387.

Carex spica mare una, pluribus foemininis petiolatis erectis, capsulis roris maximis ovato-triquetris bidentatis. HALL. hist. tam. 2. n. 1405.

Cyperoides foliis caryophyllaeis, spicae e rarioribus, & humidioribus vesicis compositis. MICH. gen. 61. tab. 32. f. 11.

Loc. Inhabitat alpes Valdensium. Cl. BELLARDI in alpiibus di Viù. PERENNIS.

2339. CAREX capillaris.

Carex spica pendulis, mascula erecta, foemineis oblongis distichis, capsulis nudis acuminatis. LINN. spec. p. 1386. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1192. tab. 59.

Carex spica foemininis raris pendulis, capsulis ovato-conicis mucronatis. HALL. hist. n. 1394.

Cyperoides alpinum, spica seminiferis pendulis, binis in summo caule. SEGU. veron. 3. p. 83. tab. 3. f. 1.

Loc. In summis alpiibus Valdensibus nascitur. Cl. BELLARDI reperit in alpiibus elatioribus d' Ussey prope l' Auzaret. PERENNIS.

2340. CAREX patula.

Carex culmo triquetra, spica mascula albicans triquetra femineis pedunculatis pendulis; capsulis ovatis glabris. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 226. n. 1160.

Carex spica femininis pendulis raris proclongis, capsulis rostratis bifidis. HALL. hist. n. 1395.

Carex (sylvatica) spica pendulis, mascula erecta, femineis filiformibus, pedunculo brevioribus, capsulis acutis disanibus. HUDS. p. 353. n. 24.

Gramen cyperoides sylvarum tenuius spicatum. PARK. 1171. Hist. Ox. 3. 243. t. 8. tab. 12. f. 9. SCHEUCHZ. gram. p. 418. n. 6.

Loc. Abunde in graminosis sylvarum locis montanis, & subalpinis. PERENNIS.

2341. CAREX maxima.

Carex culmo triquetro, spicis longissimis, femineis pendulis androgynis: capsulis confertis acutis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1166.

Carex spicis pendulis, masculis erectis, femineis cylindricis pedunculo longioribus, capsulis acuminatis. HUDS. Angl. p. 352. n. 23.

Carex spicis femininis pendulis longissimis, capsulis mucronatis ovatis. HALL. hist. n. 1396.

Gromen cyperoides latifolium, typha pendula longiori. BARR. ic. 45.

Cyperoides spica pendula, longiore, & angustiore. SCHEUCHZ. agrost. p. 445. n. 2.

Loc. Non infrequens est locis umbrosis, & humidis ad oras sylvarum. PERENNIS.

2342. CAREX Pseudo-Cyperus.

ICON. TAUR. Vol. XIII. tab. 17.

Carex spicis femininis pendulis asperis, capsulis longe rostratis retroversis. HALL. hist. tom. 2. n. 1397.

Carex spicis pendulis, pedunculis geminatis. LINN. spec. p. 1387.

Gromen cyperoides spica pendula brevior. BAUH. pin. 6. SCHEUCHZ. gram. 440. MORIS. hist. 3. p. 242. t. 8. tab. 12. f. 5.

Pseudo-Cyperus. DOD. pempt. 339.

Loc. Frequens locis spongiosis, & ad fossas aquarum stagnantium in agro Pedemontano, & ad litora lacus Candiæ, & Vivron. PERENNIS.

2343. CAREX flava.

Carex spicis confertis subsessilibus subrotundis: masculis lineari, capsulis acutis recurvis. LINN. spec. p. 1384.

Carex spicis femininis, petiolosis, erectis, ovatis, echinatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1380.

Gromen cyperoides palustre aculeatum capitulo brevior. SCHEUCHZ. gram. 426.

Gromen palustre echinatum. LOW. ic. 4. p. 15. &c.

Gromen palustre aculeatum, germanicum. BAUH. Theatr. p. 109.

Carex echinata. LAM. Fl. Franc., tom. 2. p. 177.

Loc. In humidis pratorum, & sylvarum frequens. PERENNIS.

SPICIS SEXU DISTINCTIS MARIBUS DUABUS, AUT PLURIBUS

2344. CAREX elata N.

Carex spicis masculis duobus, femininis sessilibus, capsulis ovatis, brevissime mucronatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1400.

Cyperoides foliis caryophyllaceis, spicis erectis sessilibus ex seminibus confertis compositis. RAI. Syn. 3. p. 418.

Loc. In spongiosis vallis Segusinae, & Ulcianis non infrequens. PERENNIS.

2345. CAREX vesicaria.

Carex spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis. LINN. spec. p. 1389.

Carex spicis maribus una, pluribusve, femininis erectis teretibus, capsulis ampullatis rostratis. HALL. hist. tom. 2. n. 1401.

Gromen cyperoides majus, praecox, spicis turgidis, teretibus flavescentibus. MORIS. ox. 3. p. 242. tab. 12. f. 6.

Cyperoides vesicarium spicis teretibus erectis, majus. SCHEUCHZ. agrost. p. 476.

Loc. In paludosis circa Frosasco, & la Marsaja, atque in agro Conspiciensi similibus locis. PERENNIS.

2346. CAREX hirta.

Carex coule, foliis, capsulisque hirsutis. HALL. hist. tom. 2. n. 1403.

Carex spicis remotis, masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis, capsulis hirsutis. LINN. spec. p. 1389.

Carex culmo triquetro, spicis erectis pilosis, masculis pluribus, femineis subsessilibus remotis. SCOP. Fl. Carn. p. 216. n. 14.

Gromen spicatum foliis, & spicis hirsutis mollibus. BAUH. Theatr. 48.

Cyperoides polystachion lanuginosum. MORIS. *hist.* 3. p. 243. t. 8. tab. 12. f. 10. MICH.

gen. p. 57. n. 15. SCHREUCHZ. *gram.* 478.

Loc. In agro Pedemontano, & Nicaensi locis sylvaticis vulgaris. *PERENNIS*.

1347. *CAREX acuta*.

Carex spica masculis pluribus, femineis subaequalibus, capsulis obtusiusculis. LINN. *spec.* p. 1388.

Carex spicis masculis ternis, femininis numerosis erectis, brevissime petiolatis, capsulis bicornibus. HALL. *hist.* n. 1404.

Cyperoides latifolium spica rufa, seu caule triangulo. BAUH. *theatr.* p. 83. SCHREUCHZ. *agrost.* p. 458.

VERN. *Leica*.

Loc. Aquosis locis, & secus lacus provenit. *PERENNIS*.

TYPHA. LINN. *gen.* n. 924. *syn.* n. 1040.

Habitus arundinis. Clava simplex, aut divisa in eodem scapo, superior clavae pars mares, inferior foemininos flores sustinet. Masculus calycem triglummem habet, & stamina tria, foemineus sistit ovulum pappi cinctum, stylo simplici persistente instructum, quod in semen ovatum mutatur stylo papposo terminatum.

1348. *TYPHA latifolia*.

ICON. *TAUR.* Vol. XIX. tab. 41.

Typha foliis subanisiformibus, spica mascula, foemineaque approximatis. LINN. *spec.* p. 1377.

Typha clava unica. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1305.

Typha palustris major. BAUH. *pin.* 20. MORIS. *hist.* 3. p. 246. t. 8. tab. 13. fig. 1.

Loc. Ubique in aquis stagnantibus. *PERENNIS*.

1349. *TYPHA angustifolia*.

ICON. *TAUR.* Vol. XIX. tab. 40.

Typha foliis semicylindricis, spica mascula, foemineaque remotis. LINN. *spec.* p. 1377.

Typha clava mascula a foemina remota. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1306.

B. *Typha palustris minor*. BAUH. *pin.* 20.

Loc. In alveis fluminum locis inundatis, praesertim secus flumen *Dora*. *PERENNIS*.

SPARGANIUM. LINN. *gen.* n. 925. *syn.* n. 1041. *TOURN.* tab. 302.

Flores masculi in amento subrotundo, dense imbricato, calycem habent triphyllum, & stamina tria. Foeminae habent amentum, & calycem maris, stylum brevem, bicornem. Fructus est drupa sicca, bilocularis, disperma.

1350. *SPARGANIUM erectum*.

ICON. *TAUR.* Vol. XVI. tab. 36.

Sparganium caule, folisque erectis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1303.

Sparganium foliis erectis triquetris. LINN. *spec.* p. 1378.

Sparganium ramosum. BAUH. *pin.* 15. *theatr.* 228.

Loc. Ad aquas stagnantes frequens. *PERENNE*.

1351. *SPARGANIUM natans*.

Sparganium foliis decumbentibus planis. LINN. *spec.* p. 1378.

Sparganium non ramosum minus. DELL. *gis.* 130. *spec.* 58.

Sparganium minimum. RAJ. *hist.* 1910.

Sparganium foliis planis mollibus decumbentibus. HALL. *hist.* tom. 2. p. 163. n. 1304.

Loc. In monte *Cenisio* loco dicto il *Barraton*, & frequens ad lacus in alpebus *Tarentasiae*. *PERENNE*.

B. FLORIBUS OMNIBUS PERFECTIS HERMAPHRODITIS

CYPERUS. LINN. *gen.* n. 61. *syn.* n. 66. *TOURN. tab.* 295.

Plures in capitulum congestae spicae multiflorae, complanatae, distichae, & appressae, imbricatae, conflatae squamis ovatis, carinatis, ex quarum sinu prodeunt filamenta tria; sedet autem ovulum stylo longissimo trifido instructum, quod abit in semen triquetrum, nudum.

2352. CYPERUS glomeratus.

Icon. TAUR. Vol. XVII. tab. 56.

Cyperus culmo triquetro nudo, umbella triphylla supradecomposita, spicis glomerato-rotundatis, spiculis subulatis. LINN. *spec.* p. 68.

Cyperus aquaticus italicus procerior, locustis tenuissimis in racemum dense congestis. MICH. *gen.* 45. *SEGU. Veron.* 3. p. 68. *tab.* 2. *fig.* 2.

Cyperus caputulis glomeratim congestis, seminibus aristatis. MONT. *gram.* 14. *tab.* 1. *fig.* 1.

Loc. Frequens locis inundatis secus flumina, & lacus, atque etiam in fossis aquarum stagnantium. *ANNUUS.*

2353. CYPERUS longus.

Cyperus culmo triquetro folioso, umbella foliosa supra decomposita, pedunculis nudis, spicis alternis. LINN. *spec.* p. 67.

Cyperus odoratus radice longa, seu cyperus officinarum. BAUH. *pin.* 14. *SCHREUCHZ. gram.* 378.

Loc. In paludosis circa lacus di Vivron, & di Candia. *PERENNIS.*

VIR. Radices CYPERI sunt aromaticae, stomachicae, carminativae, & excitantes; menses movent, urinae etiam secretionem promovent, utiles in stomachi imbecillitate chlorosi, & cachexia: genetatim iis in morbis locum habere possunt, in quibus *Helenii* radices commendavimus.

2354. CYPERUS flavescens.

Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 36. *fig.* 3.

Cyperus culmo triquetra nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus inaequalibus, spicis conferis lanceolatis. LINN. *spec.* p. 68.

Cyperus umbella trifolia, spicis sessilibus umbellatis, glumis obtusis. HALL. *hist. tom.* 2. p. 181. n. 1348.

Cyperus culmo triquetro nudo, umbella triphylla, spicis subsessilibus lanceolatis. SCOP. *Fl. Carn.* p. 220. n. 1.

Cyperus minimus panicula sparsa subflavescente. *TOURN. inst.* p. 527. *SCHREUCHZ. agr.* p. 385.

Gramen cyperoides minus, panicula sparsa subflava. BAUH. *theatr.* 88.

Gramen pulchrum parvum panicula lata compressa. BAUH. *hist. II.* p. 470.

Loc. Locis spongiosis, & humectis, atque in fluminum alveis. *ANNUUS.*

2355. CYPERUS fuscus.

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 89.

Cyperus culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis simplicibus inaequalibus, spicis conferis linearibus. LINN. *spec.* p. 69.

Cyperus umbella trifolia, spicis petiolatis congestis, glumis ovato-lanceolatis. HALL. *hist.* p. 181. *tom.* 2. n. 1349.

Cyperus minimus panicula sparsa nigricante. *TOURN. inst.* p. 527. *SCHREUCHZ. agr.* p. 384.

Gramen cyperoides minus panicula sparsa obsolete nigricante. BAUH. *theatr.* 88.

Gramen parvum pulchrum aliud panicula compressa nigricante. BAUH. *hist. II.* p. 471.

Cyperus minor pulcher panicula compressa nigricante. MORIS. *hist.* 3. p. 239. s. 8. *tab.* 9. f. 38.

Loc. lisdem locis, ubi *Cyperus flavescens* nascitur. *ANNUUS.*

2356. CYPERUS Monti.

Cyperus culmo tereti umbella supradecomposito, foliis corino laevibus. LINN. suppl. p. 102.

Cyperus serotinus odoratus radice longa, paniculis ex locustis luis ferrugineis compositis.

MICH. gen. plant. p. 45. n. 9. MONTI. Cat. plant. agr. Bon. prodr. 12. tab. 1.

n. 2. & SCHEUCHZ. hist. gram. p. 380.

Gromen cyperoides aquaticum panicula Cyperi longi ex crassioribus glumis compacto, & brevibus petiolis donata. RAI. hist. tom. 3. 626.

Loc. Frequens locis inundatis secus flumina, & lacus, atque etiam in fossis aquarum stagnantium. PERENNIS.

2357. CYPERUS compressus.

Cyperus culmo triquetro nudo, umbella universali triphylla, glumis mucronatis, lateribus membranaceis. LINN. syst. 12. p. 81.

JACQ. hort. vindob. Cent. 3. tab. 12.

Cyperus culmo triquetro, panicula foliosa, pedunculis simplicibus, apicis alternis subulatis distichis. ROY. Lugdh. 51.

Cyperus rotundus gramineus fere inodorus, panicula sparso compressa viridi. SLOAN. jam. 35. hist. 1. p. 117. tab. 76. f. 1. RAI. supp. 623.

Loc. Cl. BELLARDI locis udis, & spongiosis agri Vercellensis. Petrus MOLINERI detulit ex agro di Fossano repertum similibus locis. PERENNIS.

2358. CYPERUS glaber.

Cyperus culmo triquetro nudo laevi, umbella triphylla, floribus glomeratis, inferioribus brachiatis, foliis glabris. LINN. Mant. 179.

Cyperus parvus, panicula coaglobata, apicis compressis spodiceo-viridibus. SEGU. suppl. 66. tab. 2. f. 1.

Loc. Non infrequens in locis spongiosis, & ad oras lacuum in agro Pedemontano. ANNuus.

SCIRPUS. LINN. gen. n. 62., syst. n. 67. TOURN. tab. 300.

Differt a Cypero spicis non distiche imbricatis, & non complanatis, sed obacis, & semine setulis circumvallato.

SPICA UNICA

2359. SCIRPUS palustris.

Icon. TAUR. Vol. XIX. tab. 35. fig. 3.

Scirpus culmo tereti nudo, spico subovata terminali. LINN. spec. p. 70. HUDS. Fl. Angl. p. 16.

Scirpus caule terete, spica unica tereti multiflora. HALL. hist. tom. 2. n. 1336.

Scirpus culmo tereti nudo, spica oblonga terminali. SCOP. Fl. Carn. p. 222. n. 1.

Scirpus equiseti capitulo majori. TOURN. inet. p. 528. SCHEUCHZ. agr. 360.

Juncus capitulis equiseti major, scirpis latioribus. BAUH. pin. 12.

Juncus capitulis longis, seu clavatis. BAUH. hist. II. p. 523.

Loc. Secus aquas stagnantes, & lacus. PERENNIS.

2360. SCIRPUS fluviatilis.

Scirpus culmis teretibus nudis alternis, caule folioso flacido. REICH. p. 232. HUDS. p. 17.

Scirpus foliis linearibus planis alternatim fasciculatis, spica terminali. GUETT. obs. p. 141.

Scirpus caule folioso flacido, scopis alternis capitatis. LEID. prodr. p. 49.

Scirpus equiseti capitulo minori. T. SCHEUCHZ. gram. 365. tab. 7. fig. 20.

Juncus capitulis equiseti, minor, fluviatilis. BAUH. pin. prodr. 23. theotr. 187.

Loc. In rivulo agri Taurinensis loco dicto la Mulineto observavit Cl. BELLARDI. PERENNIS.

2361. SCIRPUS cespitosus.

Icon. TAUR. Vol. XIII. tab. 15. fig. 4.

- Scirpus culmo striato nudo, spica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis.* LINN. spec. p. 71. HUDS. Fl. Angl. p. 16.
Scirpus caule tereti aphylo, spica pauciflora, acuminata, calycinae glumae longitudine. HALL. hist. tom. 2. n. 1334.
Scirpus maritimus capitula breviora. TOURN. inst. p. 528. SCHEUCHZ. agr. p. 363.
Juncus montanus cum parvis capitulis luteis. BAUH. hist. II. p. 523.
Gramen junceum, foliis, & spica junci minus. BAUH. pin. 6.
 Loc. Loca spongiosa alpium inhabitat. PERENNIS.

2362. SCIRPUS acicularis.

- Scirpus culmo tereti nudo setiformi, spica avosa bivalvi, seminibus nudis.* LINN. syst. 12. p. 82.
Mariscus foliis setaceis mollibus, spica nuda, pauciflora. HALL. hist. tom. 2. n. 1346.
Juncus minimus, spica breviora squamosa spadicea. SCHEUCHZ. agr. 364. tab. 7. f. 4.
Juncellus minimus, capitulis equiseti. FLUK. alm. 201. tab. 40. f. 7.
 Loc. Locis inundatis ab aqua lente fluente agri Canapiciensis. PERENNIS.

2363. SCIRPUS setaceus.

- ICON. TAUR. Vol. XIX. tab. 35. f. 4. 5.
Scirpus culmo nudo setacea, spicis lateralibus subsolitaris sessilibus. LINN. spec. p. 73.
Mariscus setaceus, capitulis lateralibus paucissimis. HALL. hist. tom. 2. n. 1345.
Scirpus omnium minimus, capitulo breviori. TOURN. inst. 528. SCHEUCHZ. agr. 358.
Scirpus foliaceus humilis. DILL. syn. 3. p. 430.
Gramen junceum minimum, capite squamosa. BAUH. pin. 6. prodr. 13.
 Loc. Frequens in agro Canapiciensis locis ab aqua lente fluente inundatis. Cl. BELLARDI in agro Bugellensi circa Candei. PERENNIS.

CULMO TERETI POLYSTACHIO.

2364. SCIRPUS lacustris.

- ICON. TAUR. Vol. XXII. tab. 93.
Scirpus culma tereti nudo, spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. LINN. spec. p. 72. HUDS. Fl. Angl. p. 17.
Scirpus caule tereti, panicula laterali ramosa, locustis ovatis. HALL. hist. tom. 2. n. 1337.
Scirpus culmo tereti nudo, panicula laterali, spicis avatis. SCOP. Fl. Carn. p. 221. n. 2.
Scirpus palustris altissimus. TOURN. inst. p. 528. SCHEUCHZ. agr. p. 354.
Juncus maximus, s. Scirpus. BAUH. theatr. 178.
 Loc. Lacus, & stagnantes aquas inhabitat. PERENNIS.

2365. SCIRPUS hloschaenus.

- Scirpus culma tereti nudo, spicis subglobosis glomeratis pedunculatis, involucrio diphylo inaequali mucronato.* LINN. spec. p. 72.
Scirpoides maritimum capitulis sparsis glomeratis. SCHEUCHZ. agr. 271. tab. 8. f. 2. 3. 4. 5.
Scirpus maritimus capitulis rotundioribus glomeratis. TOURN. inst. p. 528.
Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. BAUH. pin. 2. theatr. 174.
 Loc. In pascuis subhumidis agri Pedemontani. PERENNIS.

CULMO TRIQUETRO PANICULA NUDA.

2366. SCIRPUS triquetri.

- Scirpus culmo triquetro nudo, spicis subsessilibus, pedunculatisque, mucronem aequantibus.* LINN. syst. 12. p. 83. mant. 29.
Scirpa cyperus palustris, caule molli, panicula sparsa minore capitulis subrotundis, plurimis simul juncetis subfuscis. MICH. gen. 47.
Juncus acutus maritimus, caule triquetro molli procerior. FLUK. alm. 200. tab. 40. fig. 2. RAI. suppl. 629.
 Loc. Lncis paludosis secus Padum frequentissime occurrat. Cl. BELLARDI reperit in paludosis Eporediae circa Duriam, & in agro Casalensi similibus locis. PERENNIS.

1367. SCIRPUS mucronatus.

Icon. *Taur.* Vol. XIX. tab. 35. f. 2.

Scirpus culmo triangulo nudo acuminato, spicis conglomeratis sessilibus lateralibus. LINN. *syn.* 12. p. 83.

Scirpus coule triquetro, panicula laterali ramosa, locustis ovoidis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1338.

Scirpo-cyperus maritimus. MICH. *gen.* 47.

Juncus acutus maritimus caule triangulo. BAUH. *pin.* 2. *prodr.* 22.

Juncus acutus maritimus caule triquetro rigido, & molli. PLUK. *alm.* 200. tab. 4. f. 13.

Loc. Nascitur in maritimis *Nicasae*, & *Onelias*, & vulgaris secus flumina. *PERENNIS.*

CULMO TRIQUETRO PANICULA FOLIACEA

1368. SCIRPUS maritimus.

Icon. *Taur.* Vol. XXII. tab. 92.

Scirpus culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, spicularum squamis trifidis, intermedia subulata. LINN. *spec.* p. 74.

Scirpus locustis ovoidis nutantibus, caule triquetro, panicula foliosa ramosa, glumis dentatis aristatis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1339.

Cyperus panicula sparsa, & spicis longioribus tenuioribus teretibus composito. SCHEUCHZ. *agr.* 398.

Cyperus panicula compacta, & spicis teretibus crassioribus composito. SCHEUCHZ. *agr.* p. 400. tab. 9. f. 9. 10.

Scirpus cyperoides. LAM. *Fl. Franc.* tom. 3. p. 553.

Loc. In arenosis inundatis agri *Pedemontani*, atque etiam in Comitatu *Nicasensi* frequens, & ad oras fluviorum ubique. *PERENNIS.*

1369. SCIRPUS sylvaticus.

Icon. *Taur.* Vol. XXII. tab. 83.

Scirpus culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. LINN. *spec.* p. 75.

Scirpus planifolius, panicula ramosissima, locustis ovoidis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1340.

Cyperus gramineus. BAUH. *hist.* II. p. 504. SCHEUCHZ. *agr.* 393.

Gramen cyperoides millaceum. BAUH. *pin.* p. 6.

Loc. Ubique frequens secus lacus, flumina, & loca inundata. *PERENNIS.*

1370. SCIRPUS michelianus.

Icon. *Taur.* Vol. XIX. tab. 35. fig. 1.

Scirpus culmo triquetro, capitulo globoso, involucri polyphylo longo. LINN. *spec.* p. 76.

Cyperus italicus omnium minimus. TILL. *pis.* 51. tab. 20. f. 3.

Loc. Frequens in pratis paludosis di *Bolengo*, & *Azeglio*, locis sabulosis humentibus ad lacus, & lente fluentes aquas. *ANNUUS.*

1371. SCIRPUS annuus N.

Scirpus culmo triquetro nudo, involucri diphylla, pedunculis nudis, spicis solitariis.

Scirpo-Cyperus aquaticus annuus minimus, capitulis ferrugineis, semine striato pulchro. MICH. *gen. plant.* p. 49.

Cyperus supinus minor, sparsa panicula ex rarioribus locustis conferta. MONT. *Cat. plant.* *agr.* Bon. *prodr.* 13.

Loc. Circa lacus, & locis humidis agri *Canapiciensis* frequens est. Copiose circa lacum di *Vivron*, & in pratis paludosis di *Bolengo*, & *Azeglio*. *ANNUUS.*

Descr. Radix fibrosa. Folia laevia, striata, linearia, mollia. Calmus simplex, triquetrus, striatus, foliis parum alnior se se erigit ab unciis tribus ad sex (plures autem ex una radice prodire solent): spicae umbellatae, terminales, involucrium diphyllum ex foliolis inaequalibus, quorum brevius vix pedunculam aequat, longius totam umbellam quandoque metitur. Spiculae ex ovato-acuminatae. Sedet una in centro umbellae, reliquae pedunculatae propriis pedunculis triquetris

inaequalibus insident. Pierumque pedunculi unam spicam ferunt, interdum proliferi sunt, atque alteram inferius positam sessilem spiculam porrigunt, aut etiam pedunculatam, cui ad basim foliolum subjicitur: caeterum spicae, & pedunculi nodi sunt. Numerus pedunculorum in umbella varius, a duobus ad septem, locustarum glumae appressae, acutae, spadiceae, nervo viridi percursae, sed inferiores, & quae spicam veluti ad basim complectuntur, sunt aristatae, nervo in aristam producto. Semen ellipticum, cinereum, striatum.

SCHOENUS. LINN. *gen. n.* 60. *syn. n.* 65.

Differt a Cypero glumis folliculi incerti numeri, laxè sine ordine congestis, aut laxè imbricatis. Locusta, sive spica multiflora.

2372. **SCHOENUS** Mariscus.

Icon. TAUN. Vol. XX. tab. 26.

Schoenus culmo tereti, foliis margine, dorsoque aculeatis. LINN. *spec. p.* 62.

Mariscus panicula ramosa, foliorum oris, dorsoque serratis. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1343.

Pseudo-cyperus palustris, foliis, & carina serratis. SCHEUCHZ. *gram. p.* 375.

Cyperus longus inodorus germanicus. BAUH. *pin. p.* 14.

Cyperus longus inodorus major, foliis, & carina serratis. MORIS. *hist. 3. p.* 237. t. 8. tab. 11. f. 24.

Loc. Abunde ad oras lacuum, & locis paludosis. *PERENNIS*.

2373. **SCHOENUS** mucronatus.

Schoenus culmo tereti nudo, spiculis ovatis fasciculatis, involucri subhexaphyllo, foliis conaliculatis. LINN. *spec. p.* 63.

Juncus maritimus panicula subrotunda glumosa. BARR. *ic. p.* 203. fig. 1.

Melanoschoenus maritimus humilis Cyperi effigie. MICH. *gen. p.* 46.

Scirpus maritimus capite glomerato. TOURN. *inst. p.* 528. SCHEUCHZ. *agr. p.* 367. tab. 8. fig. 1.

Gromen cyperoides maritimum. BAUH. *pin. 6. theatr. p.* 91.

Gromen maritimum cyperoides. BAUH. *hist. II. p.* 498.

Schoenus maritimus. LAM. *Fl. Franc. tom. 3. p.* 543.

Loc. TERRANEUS in maritimis Unelliae. Cl. BELLARDI ad litora maris a Monaco ad Menton. *PERENNIS*.

Obs. **SCHOENUS** mucronatus Cypero proximior, quam **SCHOENO** est; spiculae enim componuntur ex glumis laxè quidem, sed tamen, ut in Cypero, sibi alternatim succedentibus, & imbricatis.

2374. **SCHOENUS** nigricans.

Schoenus culmo tereti nudo, capitulo ovato, involucri diphylli volvula altera subulata. LINN. *spec. p.* 64.

Cyperus spicis conglomeratis, colyce multifolio. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1347.

Juncus affinis capitulo glomerato nigricante. SCHEUCHZ. *p.* 349. tab. 7. f. 13. 14. 15.

Loc. Ad scaturigines aquarum locis montanis, & collinis frequens. *PERENNIS*.

2375. **SCHOENUS** compressus.

Schoenus culmo subtriangulo nudo, spica disticha, involucri monophyllo. LINN. *spec. p.* 65. HUDS. *Fl. Angl. p.* 15.

Scirpus planifolius, spica terminante disticha. HALL. *hist. tom. 2. n.* 1342.

Gromen cyperoides, simpliciter compressum, disticha. FLUK. *tab. 34. f. 9. p.* 178. SCHEUCHZ. *agr. p.* 490. tab. 11. f. 6.

Cyperella montana spicata, radice repente, caule rotundo triquetro, spica fusca compressa disticha, semine cinereo. MICH. *gen. p.* 53. ord. 2. tab. 33. K.

Loc. In pratis spongiosis praesertim montanis, tum etiam secus flumina non infrequens. *PERENNIS*.

Obs. **SCHOENI** etiam compressi spiculae ita componuntur, ut ab aliis **SCHOENI** speciebus longe recedant, atque Cyperi spiculas repraesentent.

1376. *SCHOENUS albus.*

Schoenus culmo subtriquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis setaceis. LINN. spec. p. 65. HUDS. Fl. Angl. p. 15.

Scirpus foliis setaceis, panicula plana, locustis teretibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1341.

Gramen cyperoides palustre, Leucanthemum. SCHEUCHZ. p. 503. tab. 11. f. 11.

Gramen laxulae accedens glabrum, in palustribus proveniens, paniculatum. FLUK. alm. 178. tab. 34. f. 11.

Cyperella palustris capitulis umbellatis, primum albis, deinde fulvis. MICH. gen. 53.

Loc. Circa lacus Canapicienses frequens. PERENNIS.

ERIOPHORUM. LINN. gen. n. 63. tyst. n. 68.

Spica brevis, pauciflora, imbricata, squamis oblongis: pappus longus basi seminis circumpositus adeo longus, & densus est, ut super glumam longe emineat, & capitulum reddat tomentosum. Stamina enam tria habet, tubam trifidam, & semen triquetrum, acuminatum.

1377. *ERIOPHORUM polystachion.*

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 94.

Eriophorum culmis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis. LINN. spec. p. 76.

Eriophorum foliis planis, spicis pendulis. HALL. hist. tom. 2. n. 1331.

Eriophorum eulmis teretibus, floribus paniculatis nutantibus. GOU. hort. 32. n. 2.

Linagrostis polystachia. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 66.

Linagrostis paniculata. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 555.

Linagrostis panicula ampliore. TOURN. inst. app. 66.

Gnaphalium Tragi, s. Juncus bombycinus. BAUH. hist. II. 514.

Gramen pratense tomentosum, panicula sparsa. BAUH. pin. 4. GARID. aix. tab. 44.

Gramen eriophorum. DOD. pemp. 562.

Loc. Ubique locis spongiosis, praesertim montanis, & subalpinis. PERENNE.

1378. *ERIOPHORUM vaginatum.*

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 91.

Eriophorum culmis vaginatis teretibus, spica scariosa. LINN. spec. p. 66.

Eriophorum caule tereti, foliis caulinis vaginalibus, spica erecta ovata. HALL. hist. tom. 2. n. 1332.

Linagrostis vaginata. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 64. LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 555.

Gramen tomentosum alpinum, & minus. BAUH. pin. 5. prodr. 10.

Juncus alpinus capitulo lanuginoso, s. Schoeno-lagurus. BAUH. pin. 12. prodr. 23. theatr. 188. SCHEUCHZ. gram. 302. tab. 7. fig. 1. 2. 3.

Loc. Locis spongiosis, & frigidis alpinum frequens. PERENNE.

1379. *ERIOPHORUM alpinum.*

Icon. TAUR. Vol. I. tab. 92.

Eriophorum caule, foliisque triquetris, spica pauciflora. HALL. hist. tom. 2. n. 1333.

Eriophorum culmis nudis triquetris, spica poppo brevior. LINN. spec. p. 77.

Linagrostis alpina. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 65.

Linagrostis juncea alpina, capitulo parvo, tomento rariore. SCHEUCHZ. gram. 305. tab. 7. f. 4. prodr. tab. 8.

Juncus alpinus bombycinus. BAUH. pin. 12. prodr. 23.

Loc. In summis alpinis di Viis locis spongiosis a nive deliquescente intriguis. PERENNE.

CLASSIS XII.

PLANTÆ FLORE OBSCURO, AUT INCONSPICUO,
SIVE CRYPTOGRAMIA LINN.

FILICES

EQUISETUM. LINN. *gen.* n. 1033. *syn.* n. 1169. TOURN. *tab.* 307.

Spica fructificationibus peltatis, basi dehiscentibus multivalvi.

2380. **E**QUISETUM sylvaticum.
Equisetum caule spicato, frondibus compositis. LINN. *spec.* p. 1516. HUDS. *Fl. Angl.* p. 380.
Equisetum foliis repetito, ramosis, vaginis laxatissimis. HALL. *hist. tom.* 3. n. 1680.
Equisetum caule sulcato, frondibus ramosis. SCOP. *Fl. Carn.* p. 173. n. 2. ed. 2. p. 285. n. 1252.
Equisetum sylvaticum tenuissimis setis. BAUH. *pin.* 16. TOURN. *inst.* p. 533.
Equisetum, sive hippuris tenuissima non aspera. BAUH. *hist. III.* p. 730.
Loc. Passim in sylvis subhumidis, sive montanis, sive subalpinis. *PERENNE.*
2381. **EQUISETUM** arvense.
Equisetum caula fructificante nudo, sterili frondoso. LINN. *spec.* p. 1516. HUDS. *Fl. Angl.* p. 380.
Equisetum caule florifero nudo, sterili verticillato, radiorum duodecim. HALL. *hist. tom.* 3. n. 1676.
Equisetum arvense. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 1253.
Equisetum arvense longioribus setis. BAUH. *pin.* 16. TOURN. *inst.* p. 533.
Equisetum minus terrestre. BAUH. *hist. III.* p. 730.
OFF. Equisetum minus, s. Cauda equina minor.
Loc. Ubique in arvis, & ad vias locis subhumidis. *PERENNE.*
2382. **EQUISETUM** palustre.
Equisetum caule angulato, frondibus simplicibus. LINN. *spec.* p. 1516. HUDS. *Fl. Angl.* p. 380.
Equisetum caule sulcato, ramis multifloris foliis indivisis. HALL. *hist. tom.* 3. n. 1677.
Equisetum caule sulcato, frondibus simplicibus. SCOP. *Fl. Carn.* p. 173. n. 2. ed. 2. n. 1254.
Equisetum palustre, brevioribus setis. BAUH. *pin.* 15. TOURN. *inst.* p. 533.
Equisetum palustre. LÖB. *ic.* 795.
Loc. In pratis spongiosis. *PERENNE.*
2383. **EQUISETUM** fluviatile.
Equisetum caule striato, frondibus subsimplicibus. LINN. *spec.* p. 1517. HUDS. *Fl. Angl.* p. 381.
ALLIUM Fl. Pedem. Tom. II. B b b b

Equisetum caule florifero nudo, nerili verticillato, radiorum quadraginta. HALL. hist. tom. 3. n. 1675.

Equisetum caule laevi subnudo. SCOP. Fl. Carn. p. 172. n. 1. ed. 2. p. 286. n. 1255.

Equisetum palusae longioribus setis. BAUH. pin. p. 15. TOURN. inst. p. 533.

Equisetum majus aquaticum. BAUH. hist. III. p. 728.

Equisetum maximum. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 7.

OFF. *Equisetum majus*, s. *Cauda equina major*.

Loc. Secus fluvios, & torrentes. PERENNE.

2384. **EQUISETUM limosum.**

Equisetum caule subnudo laevi. LINN. spec. p. 1517. HUDS. Fl. Angl. p. 381.

Equisetum nudum laevius nostris. RAI. angl. 3. p. 131.

Loc. Abunde locis inundatis secus Ticinum. PERENNE.

2385. **EQUISETUM hyemale.**

Equisetum caule nudo scabro, basi subramoso. LINN. spec. p. 1517. HUDS. Fl. Angl. p. 381.

Equisetum caule subnudo asperimo, vaginis caulinis indivisis, ramis ciliatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1679.

Equisetum foliis nudum, non ramosum, sive junceum Hippuris aphyllae. BAUH. pin. 16. theat. p. 282. TOURN. inst. p. 533.

VERN. *Rasparella*.

Loc. Secus fluvios, atque locis, quae per inundationem flumina aluunt. PERENNE.

VIR. Omnes EQUISETI species cum evidenti acrimonia adstrictoriam vim habent, stomacho infensae sunt, diarrhaeam facile inferentes. Si stomachus ferat, urinam certo promovent, atque in hunc scopum profuisse observavi. EQUISETI protractus usus inaciem etiam infert, atque in nimia corpulentia, ac urinae parcitate suam praebere potest utilitatem. In pulverem tritae herbae dosis est a drachma semisse ad drachmam unam. Si ex aqua decoquatur, praescribi poterit dosi a manipulo semisse ad manipulum unum. EQUISETI species omnes sua asperitate insumi possunt ad polienda vasa. Nostrae famulae solent adhibere EQUISETUM hyemale.

OPHIOGLOSSUM. LINN. gen. n. 1035., syn. n. 1171. TOURN. tab. 325.

Spica articulata, disticha, articulis transversim dehiscenibus.

2386. **OPHIOGLOSSUM vulgatum.**

Ophioglossum fronde ovata. LINN. spec. p. 1518.

Ophioglossum folio unico ovato lanceolato obtuso. HALL. hist. n. 1685.

Ophioglossum vulgatum. BAUH. pin. 354. TOURN. inst. p. 548.

VERN. *Erba senza costa*.

Loc. In pratis, & pascuis subhumidis collium passim occurrit. In pratis nasci in pratis Vercellensibus tradidit Franciscus ALEXANDRI. PERENNE.

VIR. Apud rusticos OPHIOGLOSSUM vulgatum magna est in existimatione ad vulnera glutinanda, & folia vulneribus imponunt. Per infusionem quoque ex eadem herba oleum paratur ad vulnera, & ambusa. Succum certe glutinoso-adstringentem hujusmodi planta suppedizat aptum ad vulnere conglutinationem promovendam.

OSMUNDA. HALL. hist. 3. pag. 6. TOURN. tab. 324.

Spica tamosa, fructificationibus globosis.

2387. **OSMUNDA lunaria.**

Osmunda scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria. LINN. spec. p. 1519.

Osmunda foliis pinnatis flabelliformibus lunatis. HALL. hist. n. 1686.

Osmunda spica caulina solitaria, fronde pinnatifida solitaria. GOU. hort. 523. n. 1.

Lunaria racemosa minor, & vulgaris. BAUH. pin. p. 354.

Lunaria botryus. BAUM. hist. III. 709.

Osmunda foliis lunatis. TOURN. inst. p. 547. GARID. Aix. tab. 75.

Ophioglossum pinnatum. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 9.

Loc. Frequentissima in pascuis montanis, & subalpinis. PERENNIS.

VIR. Herba tota stipitica, & adstringens est, ac a nostris Alpicolis, data opera, colligitur, ut remedium habeant in immodico mensium fluxu. Datur pulvis herbae contritae drachmae unius pondere. Vidi interdum vere, & evidenter profuisse.

2388. OSMUNDA regalis.

Osmunda frondibus bipinnatis, apice racemiferis. LINN. spec. p. 1521.

Osmunda regalis, sive Filix florida. PLUM. fil. 35. tab. 13. f. 4.

Osmunda vulgaris, & palustris. TOURN. inst. p. 547.

OFF. *Osmunda regalis, sive Filix florida*.

Loc. Locis umbrosis humidis prope Giaveno, & Ivrea enndo ad Pagum Brass. Prope Eporediam circa lacum di S. Michele, & supra la Vigna rossa loco dicto la rovinia reperit Cl. BELLARDI. PERENNIS.

VIR. Stipitica, & tonica est radix OSMUNDÆ regalis, a Britannis in rachiide celebrata. In rachiide vere profuisse observavi, ejusdem usu diu protracto. Quum autem soleat haec planta in solo argillaceo martiali spongioso crescere, suspicor ferri particulis a radice resorptis non exiguum partem virtutis tribuendam esse. Multiplici ratione adhibetur: aut pulvis drachmae unius, alteriusve dosi pulmento ex granis Mays immiscetur, aut radix ipsa decoquitur unciae semissis pondere. Paratur etiam extractum, quod adhibetur a scrupulo uno ad scrupulos duos.

STRUTHIOPTERIS. HALL. hist. tom. 3. p. 6.

Foliorum alia sterilia, & perennia, alia fertilia, & annua. Superficies interna tota capsulis fructiferis obrita est.

2389. STRUTHIOPTERIS Filicestrum N.

Osmunda (Struthiopteris) frondibus pinnatis, pinnis pinnatifidis, scapo fructificante disticho. LINN. spec. p. 1522.

Filix palustris altera, fusco pulvere hirsuta. BAUM. pin. p. 358.

Filicestrum septentrionale, & palustre. AMM. ruth. 175. act. petrop. 10. tab. 18.

Loc. Secus flumen Corsalia in montibus Regalensibus, & secus flumen Sangon prope Giaveno. Cl. BELLARDI vidit in pascuis humidis prope Civaso. PERENNIS.

2390. STRUTHIOPTERIS spicant.

Osmunda frondibus lanceolatis pinnatifidis, laciniis confluentibus integerrimis paratellis. LINN. spec. p. 1522.

Struthiopteris. HALL. hist. n. 1687.

Polypodioides vulgaris foliis angustis. MICH. florent. 163.

Lonchitis minor. BAUM. pin. p. 359.

Acrosticum nemorale. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 11.

Loc. In sylvâ vallis Ursinae Tesonir dicta, inter Chamonix, & Chalanches, in alpibus de Noire Dame de la Gorge supra Giaveno, & in montibus supra Roburenc frequens est; incolit vero praesertim loca lapidosa in sylvis castanearum.

PTERIS. LINN. gen. n. 1038. syst. n. 1174.

Fructificationes in lineis marginalibus.

2391. PTERIS aquilina.

Pteris frondibus supradecompositis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis, superioribus minoribus. LINN. spec. p. 1533.

Filix foliis duplicato-pinnatis, pinnis nervosis integerrimis, ultimis lanceolatis. HALL. hist. n. 1688.

Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentata. BAUM. pin. p. 357.

VERN. Fêles, aliis Feles, vel Feils.

Loc. Ubique in pascuis sterilibus collium, & montium vulgarissima, uti etiam frequens in sylvis montanis apricis. *PERENNIS*.

VIR. ETIAM *PTERIDIS aquilinae* radix contra taeniam laudatur; eadem nauseam excitat, subamara est, & adstringens: principium adstringens universae plantae inest. Ex cineribus combustae plantae sal alkalinus lixivialis elicitor, qui vitriariorum operi inservit.

1392. *PTERIS* crispa.

Filix foliis duplicato-pinnatis, sterilibus obscure dentatis, floralibus ovatis integerrimis. HALL. hist. tom. 3. n. 1689.

Osmunda (crispa) frondibus supradecompositis, pinnis alternis subrotundis incisis. LINN. spec. p. 1522.

Adiantum foliis minutum in oblongum scissis, pediculo viridi. BAUH. pin. 755.

Adiantum album tenuifolium ruae murariae accedens. BAUH. hist. III. p. 743.

Adiantum album floridum, sive filicula petraea crispa. PLUK. alm. 9. tab. 3. fig. 2.

Pteris tenuifolia. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 13.

Loc. In scopulis alpium, in montibus *Bugellensibus*, *Vinadii*, & *Valderii* frequentissima est. *PERENNIS*.

ASPLENIUM. LINN. gen. n. 1042. syst. n. 1178. TOURN. tab. 318.

Fructificationes in lineolis disci frondis sparsae.

1393. *ASPLENIUM* scolopendrium.

Asplenium frondibus simplicibus cordato-lanceolatis integerrimis, stipitibus hirsutis. LINN. spec. p. 1537.

Asplenium petiolis hirsutis, folio longe lineari-lanceolata integerrimo circa petalum excisso. HALL. hist. n. 1695.

Lingua cervina officinarum. BAUH. pin. 353. TOURN. inn. p. 544.

Phyllitis, seu lingua cervina vulgi. BAUH. hist. III. p. 756.

Phyllis. MATTH.

OFF. Lingua cervina, *Phyllitis*, *Scolopendrium*, seu *Scolopendria*.

Loc. Locus umbrosis saxosis, praesertim secus fluentes aquas, ad montium, & alpium radices. Ad oras etiam puteorum, & fontium scaturigines in agro di *Scioltze*, & *Candeil* legit *CL. BELLARDI*. *PERENNIS*.

1394. *ASPLENIUM* Ceterach.

Asplenium frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtusis. LINN. syst. 12. p. 689.

Asplenium foliis pinnatis, pinnis in basi dilatatis obtusis, subius mucanis. HALL. hist. n. 1694.

Asplenium sive ceterach. BAUH. hist. III. p. 749. TOURN. inn. p. 547.

Ceterach officinarum. BAUH. pin. p. 354.

Asplena. MATTH.

OFF. *Asplenium*, s. *Ceterach*.

VERN. Erba dora.

Loc. Frequentissimum ad rupes, & muros locis montanis, & collinis. *PERENNIS*.

VIR. *ASPLENIUM Ceterach*, & *Scolopendrium* laudantur in viscerum imi ventris obstructionibus, & potissimum in lienis morbis; non inficiamur cum tonica vi etiam aliquam abstergentem virtutem possidere, ita ut utiliter aliis remediis memoratae stirpes adiciantur, sed hujusmodi morbi stimulantia, atque etiam fortiora saponacea eccoprotica medicamenta desiderant. Adhiberi solent ex aqua decocta hae stirpes a manipulo semisse ad manipulum unum.

1395. *ASPLENIUM* trichomanoides.

Asplenium frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. LINN. syst. 12. p. 690.

Trichomanes fronde pinnata, foliolis subrotundis crenatis. GLEDITZ. apud BOHEM. lips. 723. SCOP. Fl. Carn. p. 169.

Trichomanes, sive *polytrichum officinarum*. BAUH. pin. p. 356. TOURN. inst. p. 539.

Asplenium trichomanes. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 292. n. 1263.

Trichomanes. MATTH.

OFF. *Polytrichum*, *Adiantum rubrum*, s. *Trichomanes*.

Loc. Ubique locis saxosis, & ad vias in oris sylvarum, tum etiam e rupium fissuris, sive in montibus, sive in alpinis. PERENNE.

Oss. *Trichomanes* foliis eleganter incisus TOURN. tab. 315. F. F., quod in alpinis nascitur, aut est insignis varietas *ASPLENII Trichomanoidis*, aut distincta species.

1396. *ASPLENIUM* *Ruta muraria*.

Asplenium frondibus alternatim decompositis, foliolis cuneiformibus crenulatis. LINN. spec. p. 1541. HUDS. 386.

Asplenium foliis laxè ramosis, ramis secundis trifoliis, superioribus semisrilobis, lobis rhomboidetis circumscissis. HALL. hist. n. 1691.

Acrosticum fronde ramosa divisa, foliolis subrotundis ternato-connatis. GLEDITZ. opud BOHEM. Lips. 712. SCOP. Fl. Carn. p. 168.

Ruta muraria. BAUH. pin. p. 356. BAUH. hist. III. 753. TOURN. inst. p. 541.

Asplenium murorum. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 28.

Loc. Ubique ad muros vetustos, & sepes. PERENNE.

1397. *ASPLENIUM* *nigrum*.

Asplenium frondibus subtripinnatis, foliolis alternis, pinnis lanceolatis inciso-serratis. LINN. spec. p. 1541.

Asplenium foliis triangularibus, pinnis pinnatis, pinnulis semipinnatis, lobulis ovatis serratis. HALL. hist. n. 1692.

Asplenium adiantum nigrum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1264.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro. BAUH. pin. p. 355.

Adiantum nigrum officinarum. BAUH. hist. III. p. 742.

Filicula, quae *adiantum nigrum officinarum* pinnulis obtusioribus. TOURN. inst. p. 542.

Asplenium nigrum. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 28.

Loc. Locus lapidosus in montibus di Piossasco, & di San. Michele della Chiava, & ad sepes in agro Cilianensi provenire affirmat Cl. BELLARDI. PERENNE.

POLYPODIUM. LINN. gen. n. 1043., syst. n. 1179. TOURN. tab. 316.

Fructificationes in punctis subrotundis, sparsis per discum frondis.

1398. *POLYPODIUM* *vulgare*.

Polypodium frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamata. LINN. spec. p. 1544. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1266.

Polypodium foliis pinnatis lanceolatis, radice squamata. HALL. hist. n. 1696.

Polypodium fronde pinnata: pinnis lanceolatis indivisis serrulatis alternis, coronato-sessilibus. ROY. Lugd. 499.

Polypodium vulgare. BAUH. pin. 359. PLUM. fl. 27. tab. A. f. 2.

Polypodium majus. DOD. pempt. 464.

Loc. Ubique in sylvis montanis, & collinis, atque saepe ad radices arborum. PERENNE.

Viz. Radices *POLYPODII* in usum medicum recipiuntur, gusta subdulces sunt, nauseosae tamen, vires habent, quibus coacta resolvunt, abstergunt, atque etiam alvum cient. Speciatim laudatur radix *POLYPODII* in obstructionibus viscerum imi ventris, atque ingredi solet apozemata, quae in dictis morbis adhibentur. Dosis est ab uncia semisse ad unciam unam, & semis.

1399. *POLYPODIUM* *Lonchitis*.

Polypodium frondibus pinnatis, pinnis lunulatis ciliato-serratis declinatis, stipitibus strigosis. LINN. spec. p. 1548.

ALLIOTTI Fl. Pedem. Tom. II.

C c c c

- Polypodium foliis pinnatis, pinnis ciliatis dentatis appendiculatis.* HALL. hist. n. 1711.
Pteris fronde pinnato lanceolata, foliolis lunulatis ciliato-serratis, petiolo strigoso.
 GLEDITZ. apud BOHEM. Lips. 712.
Lanchitis aspera. BAUH. pin. 359. TOURN. inst. p. 538.
 Loc. Locis lapideis, & umbrosis montium, & alpium frequenter occurrat. PERENNE.
1400. POLYPODIUM aculeatum.
Polypodium frondibus bipinnatis, pinnulis lunulatis ciliato-dentatis, stipite strigoso. LINN. spec. p. 1522.
Polypodium pinnis pinnatis ciliatis serratis appendiculatis. HALL. hist. n. 1712.
Polypodium fronde bipinnata, pinnis lanceolato-dentato-ciliatis, stipite strigoso. HUDS. p. 389. n. 9.
Polypodium fronde duplicato-pinnata, foliolis lunulatis dentatis, petiolo strigoso. ROY. Lugdb. p. 500. n. 6.
Filix aculeata major. BAUH. pin. 358. prodr. 151.
 Loc. hisdem locis ut supra. PERENNE.
1401. POLYPODIUM phaeopteris.
Polypodium frondibus subbipinnatis: foliolis infimis reflexis, paribus pinnula quadrangulari coudunatis. LINN. spec. p. 1530.
Polypodium foliis pinnatis reflexis; pinnulis ovatis hirsutis, primis cum nervo confluentibus. HALL. hist. n. 1698.
 Loc. Passim locis umbrosis montanis, & subalpinis. PERENNE.
1402. POLYPODIUM dryopteris.
Polypodium frondibus supradecompositis: foliolis ternis bipinnatis. LINN. spec. p. 1535.
Polypodium pinnis pinnatis conjugatis, pinnulis ovatis obtusis crenatis. HALL. hist. n. 1699.
Filix ramosa minor pinnulis dentatis. BAUH. pin. 358.
Filix pumila saxatilis. CLUS. hist. 2. p. 212.
 Loc. Frequens in sylvis saxosis umbrosis subalpinis: frequentissima circa thermas Valderii, atque in alpihus Valdensium. Etiam in agro Taurinensi extra moenia urbis maris Septentrioni expositis innasci visa est a CL. BELLARDI. PERENNE.
1403. POLYPODIUM cristatum.
Polypodium frondibus subbipinnatis, foliolis ovato-oblongis, pinnis obtusiusculis, apice acuto-serratis. LINN. spec. p. 1531.
Filix mas ramosa pinnulis dentatis. GER. em. 1129. PLUK. phyt. 181. fig. 2.
 Loc. In sylvis umbrosis montanis, & subalpinis. PERENNE.
1404. POLYPODIUM Filix mas.
Polypodium frondibus bipinnatis, pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. LINN. spec. p. 1531.
Polypodium pinnis pinnatis obtusis dentatis. HALL. hist. n. 1701.
Pteris fronde duplicato-pinnata, foliolis obtusis crenulatis, petiolo strigoso. GLEDITZCH. apud BOHEM. Lips. 718. SCOP. Fl. Carn. p. 170.
Filix mas pinnulis cristatis. VALL. tab. 9. f. 2.
Filix mas non ramosa dentata. BAUH. pin. p. 358.
Felce maschio. MATTH.
 Off. Filix mas.
 Loc. In sylvis subhumidis umbrosis collium, & montium passim. PERENNE.
 Vir. Radix Filicis maris celebris est nostris temporibus propter Noufferianum specificum promulgatum, atque utilis vere reperta ad Taeniam expellendam: Vide Précis du traitement contre la Tenie à Paris 1775.
1405. POLYPODIUM Pontederæ N.
Polypodium pinnis paucis, semipinnatis, brevissimis acute serratis. HALL. hist. n. 1702.
Filicula alpino foliis rotundioribus, & crenatis. PONT. compend. p. 19. SEGU. suppl. p. 54. tab. 1. f. 2.
 Loc. In sylvis umbrosis ad thermas Vinadii legi. PERENNE.

2406. POLYPODIUM molle N.

Polypodium pinnis pinnatis, pinnulis ovatis obtusis dentatis, dentibus imis bifidis. HALL. hist. n. 1733.

Filix mollis, seu glabra, vulgari non ramosae accedens. BAUH. hist. III. p. 738. VAILL. p. 53. tab. 9. fig. 4.

Filix non ramosa alpina foliolis, quae ad alas, rotundioribus, omnibus autem dentatis. PONT. camp. p. 13. SEGU. suppl. p. 53. tab. 1. fig. 1.

Loc. Nascitur ad fontium scaturigines, & secus lente fluentes aquas. Secus Padum etiam reperit Cl. BELLARDI. PERENNE.

2407. POLYPODIUM Filix foemina.

Polypodium fronde bipinnata, pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. LINN. syst. 12. p. 693.

Polypodium pinnis pinnatis, pinnulis lanceolatis semipinnatis, lobis acute bisectis. HALL. hist. n. 1704.

Polypodium filix foemina. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 295.

Felce femina. MATTH.

OFF. Filix foemina.

Loc. In sylvis umbris collium, & montium frequens. PERENNE.

2408. POLYPODIUM rhaeticum.

*Polypodium frondibus bipinnatis: foliolis, pinnisque remotis lanceolatis, serraturis acumina-
tis.* LINN. spec. p. 1532.

Polypodium pinnis pinnatis, laxè divisis, pinnulis semipinnatis acutis. HALL. hist. n. 1708.

*Polypodium fronde bipinnata, foliolis, pinnisque remotis lanceolatis, serraturis acumina-
tis.* HUDS. Fl. Angl. f. 390.

Filix rhaetica tenuissime denticulata. BAUH. hist. III. p. 740. TOURN. inst. p. 537.

OFF. Adiantum album.

Loc. Frequens ad vias profundas inter saxa in collibus, & montibus, atque saepe prodiit e rupium fissuris locis subalpinis. PERENNE.

2409. POLYPODIUM alpinum. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 22.

Polypodium pinnis pinnarum pinnatis laxissime divisis, lobulis obtusis dentatis. HALL. hist. n. 1709.

Filicula alpina crispa. BAUH. pin. 338. SEGU. suppl. tab. 1. f. 3. p. 35.

Loc. In editioribus rupibus alpium Savinae, montis Cenisii, & vallis di Locana. In alpi-
bus di Viù, & Ussey reperit Cl. BELLARDI. PERENNE.

2410. POLYPODIUM montanum. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 23.

Polypodium triplicato-pinnatum: pinnulis teriis semipinnatis, lobulis bifidis. HALL. hist. tom. 3. n. 1710.

Filix montana ramosa minor argute denticulata. VAILL. 53.

Filix alpina myrrhidis facie Cambrobritannica. PLUK. tab. 89. f. 4.

Filix rhaetica tenuissime divisa. BAUH. hist. III. p. 740.

Loc. Locis umbris humidis montis Cenisii, & supra Gros Caval. Cl. BELLARDI -
circa Pralognan. PERENNE.

2411. POLYPODIUM fragile.

*Polypodium frondibus bipinnatis, foliolis remotis, pinnulis subrotundis incis. LINN. spec.
p. 1553.*

*Polypodium pinnis pinnatis, laxè divisis, pinnulis semipinnatis, lobulis subrotundis den-
tatis.* HALL. hist. n. 1707.

Filix saxatilis cauliculo tenet fragili. PLUK. alm. 150. tab. 180. f. 5.

Filix saxatilis non ramosa nigris maculis punctata. BAUH. pin. 358.

Polypodium album. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 21.

Loc. Locis montanis inter saxa secus vias nascitur. Locis umbris collium Cana-
pencium frequens esse animadvertit Cl. BELLARDI. PERENNE.

2413. POLYPODIUM regium.

Polypodium frondibus bipinnatis: foliolis suboppositis: pinnis alternis laciniosis. LAMN. spec. p. 1553.

Filix regia fumarie pinnulis. VALL. Paris. p. 52. tab. 9. f. 1.

Loc. Locus saxosis ad fontium scaturigines inter Giaveno, & Quassa. PERENNE.

2413. POLYPODIUM fontanum.

Polypodium frondibus pinnatis laciniosis, foliolis subrotunde argute incis, stipite levi. LINN. syst. 12. p. 693.

Polypodium duriusculum pinnis laxè pinnatis, pinnulis bidentatis, & videntatis argutis. HALL hist. n. 1706.

Polypodium frondibus bipinnatis, foliolis argute incis, inferioribus subpalmatis, stipite laevi. GOU. illustr. p. 80.

Filicula montana minor. BAUH. pin. 358.

Loc. Prodit e rupium fissuris prope Moutiers, & in monte S. Bernardi. Supra Ussey similibus locis legit Cl. BELLARDI PERENNE.

2414. POLYPODIUM thelipteris.

Acrosticum (thelipteris) frondibus pinnatis: pinnis pinnatifidis integerrimis. LINN. spec. p. 1528. HUDS. Fl. Angl. p. 384.

Filix mollis, seu glabra vulgari mari non ramosae accedens. BAUH. hist. 730. tab. 731. fig. 1.

Polypodium pteroides. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 18.

Loc. Abunde circa lacum di Candia, & Vivrone. In agro etiam Vercellensi locis palustribus frequenter occurrere adnotavit Cl. BELLARDI PERENNE.

ACROSTICUM. LINN. gen. n. 1037. syn. n. 1173.

Fructificationes discum totum frondis regentes.

2415. ACROSTICUM septentrionale.

Acrosticum frondibus nudis linearibus laciniosis. LINN. spec. p. 1524.

Acrosticum caule bis bifurcato. HALL. hist. tom. 3. n. 1714.

Filicula saxatilis, corniculata. TOURN. inst. p. 542.

Filix saxatilis corniculata. BAUH. pin. 358.

Filix saxatilis Tragi. BAUH. hist. III. 755.

Loc. Nihil vulgatus ad rupes locis montanis. PERENNE.

2416. ACROSTICUM marantae.

Acrosticum frondibus subpinnatis: pinnis opposito-coadunatis subius hirsutissimis basi subdentatis. LINN. spec. p. 1527.

Asplenium ramosum. TOURN. inst. p. 544.

Lonchitis folio ceterach. BAUH. pin. p. 359.

Lonchitis aspera marantae. BAUH. hist. III. 745.

Loc. Inter Lange, & Viù abunde: inter Varallo, & Allagna; circa Eporediam, Plasasium. Cl. BELLARDI secus Duriam in saxosis prope la Rocca di Villaregia. Ignatius MOLINERI inter Superga, & Baudissè; non infrequens ad rupes montium subalpinorum locis apicis. PERENNE.

ADIANTHUM. LINN. gen. n. 1044. syn. n. 1180. TOURN. tab. 317.

Fructificationes in maculis terminalibus, sub replicato margine frondis.

2417. ADIANTHUM capillus veneris.

Adiantum foliis decompositis, foliolis alternis, pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. LINN. spec. p. 1538. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 299.

Adiantum petiolis ramosis, frondibus strobiliformibus lobatis. HALL hist. tom. 3. n. 1713.

Adiantum coriandrifolium. LAM. Fl. Franc. tab. 1. p. 29.

Adiantum foliis coriandri. BAUH. pin. p. 355. TOURN. inst. 543.

Adiant. MATTH.

OFF. Capillus veneris.

VERN. Capel ventre.

Loc. Ad rupes, & fontium scaturigines locis a sole minime percussis; secus Padum non infrequens, multo vulgaris sive in pratis, sive in rupibus *Liguriae*, & collium maritimorum. *PERENNE*.

VIA. Haec inter praestantiores capillares herbas habetur. Extrat in officinis syrupus capillorum veneris laudatus in russi, morbisque pectoris. Nihil vere nilis haec planta promittit: vim aliquam, sed levem tonicam, & adstringentem possidet. Virtus emmenagoga tribuitur, at sine vero fundamento, in fibrarum laxitate aliquam fortasse dare poterit utilitatem. Idem iudicium ferendum est de *ADIANTHO nigro*, & albo, *ruta muraria*, & *Trichomane*, quae stripes solent a Pharmacopaeis *Capillo veneri* substitui, ac inter capillares herbas etiam enumerantur.

MARSILEA. LINN. ZALUZIANSKIA. NECKER. *act. palat.* vol. 3. p. 303.

Fl. masc. Per gemmas planta haec certissime se propagat: fructificationem videre nobis datum adhuc non fuit: corpuscula ad basim radices nasci in loculis semina continenta, relatum est.

3418 MARSILEA quadrifolia.

Marsilea foliis quaternis. LINN. *yst.* 12. p. 695.

Lemna. HALL. *hist. rom.* 2. n. 1608.

Lenticula palustris quadrifolia. BAUH. pin. 362.

Lens palustris quadrifolia. BAUH. *hist.* III. p. 785. MORIS. *hist.* 3. p. 619. t. 15. tab. 4. f. 5.

Lens palustris altera. CAM. *epit.* 853.

Loc. Circa lacus *Epoedienses* nascitur. *PERENNIS*.

SALVINIA. MICHEL. *gen.* 107. tab. 58.

Fl. masc. Tubercula foliorum non videntur ulla ratione ad masculinos flores pertinere. Ad radices initium, & primas divisiones adsunt sphaerulae incerti numeri molliter echinatae, granula, sive semina continentes.

3419 SALVINIA natans.

Salvinia vulgaris aquae innatans, foliis subrotundis, punctatis, lacte virentibus. MICH. *gen.* 107. tab. 58.

Marsilea foliis oppositis simplicibus. LINN. *yst.* 12. p. 696.

Lenticula palustris latifolia punctata. BAUH. pin. 362.

Lens palustris patavina. BAUH. *hist.* III. p. 785.

Loc. Circa lacus *Epoedienses* non modo nascitur, verum etiam in fossis aquarum stagnantium. Etiam secus *il Po morto*, & locis paludosis prope *Vinovo*, alibique provenit.

PILULARIA. LINN. *gen.* n. 1047. *yst.* n. 1183.

Masculi flores in linea pulverulenta sub folio, Foemina ad radicem posita est globus quadrilocularis, polyspermus.

3420 PILULARIA globulifera. LINN. *yst.* 12. p. 697.

Pilularia palustris juncifolia. VAILL. *Paris.* 159. tab. 15. f. 6. DILL. *musc.* 538. tab. 79. f. 1.

Graminifolia palustris repens, vasculis granorum piperis aemulis. RAI. *hist.* 1325. angl. 3. p. 156. MORIS. *hist.* 3. p. 608. t. 15. tab. 7. f. 49.

ALLIOTII Flor. Pedem. Tom. II.

D d d d

Muscus aureus capillaris palustris, inter folia folliculis rotundis quadripartitis. PLUK. alm. 246. tab. 48. f. 1.

Loc. THOMAS PRIM communicavit lectam in paludosis circa Frossasca, & la Marsaja. *Petrus MOLINERI* in fossis aquarum stagnantium locis calidioribus non infrequentem esse observavit.

MUSCI

LYCOPODIUM. LINN. gen. n. 1049. syst. n. 1183.

Anthera bivalvis, sessilis. Calyptra nulla.

1421. LYCOPODIUM clavatum.

Lycopodium foliis sparsis filamentosis, speciebus teretibus pedunculis, geminis. LINN. spec. p. 1564.

Lycopodium ramis prolixis, speciebus petiolatis gemellis, foliis linearibus, pilo aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1722.

Lycopodium (officinale) surculo vaga reptante ramoso terminali erecto, imbricato, dichotomo, capitulifero. NECKER. Meth. musc. p. 156. n. 8.

Lycopodium vulgare pilosum, amfragorum, & repens. DILL. hist. musc. p. 441. tab. 38. f. 1.

Muscus terrestris clavatus. BAUH. pin. 360.

VERN. Braje d' Ours.

Loc. Passim in sylvis collinis, & montanis. *PERENNE.*

1422. LYCOPODIUM selaginoides.

Lycopodium foliis sparsis ciliatis lanceolatis, speciebus solitariis terminalibus foliosis. LINN. spec. p. 1565. HUDS. Fl. Angl. p. 395.

Lycopodium speciebus sessilibus, foliis ovato-lanceolatis serratis confertis. HALL. hist. tom. 3. n. 1717. tab. 49. f. 1.

Lycopodium (selaginoides) surculo decumbente sparsis terminali erecto, alis capitulifero, foliis lanceolatis ciliatis recurviusculis. NECKER. Meth. musc. p. 148. n. 6.

Selaginoides foliis spinosis. DILL. hist. musc. p. 460. tab. 68.

Muscus terrestris repens, clavis singularibus, foliolis erectis. SCHEUCHZ. it. alp. tom. 1. p. 43. tab. 6. f. 1.

Lycopodium ciliatum. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 32.

Loc. Frequens locis spongiosis alpium. *PERENNE.*

1423. LYCOPODIUM selago.

Lycopodium foliis sparsis octifariis, caule dichotomo erecta fastigiato, floribus sparsis. LINN. spec. p. 1569.

Lycopodium spica sessili, foliis linearibus, lanceolatis confertis. HALL. hist. tom. 3. n. 1716.

Lycopodium (selago) surculo erecto, dichotoma capitulifera, primordialibus decidentibus sparsis. NECKER. Meth. musc. p. 148. n. 5.

Lycopodium selaga. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 180.

Selaga vulgaris abieis rubrae facie. DILL. hist. musc. p. 435. tab. 56. f. 1.

Muscus erectus ramis saturate viridis. BAUH. pin. 360.

Lycopodium densum. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 33.

Loc. Vulgaris locis montanis, & alpinis humidis, & sylvois. *PERENNE.*

1424. LYCOPODIUM annotinum.

Lycopodium foliis sparsis quinquifariis subterraneis, surculis annotino-articulatis, speciebus terminalibus glabris erectis. LINN. spec. p. 1566. HUDS. Fl. Angl. p. 394.

Lycopodium ramis prolixis, speciebus sessilibus, foliis linearibus, subterraneis. HALL. hist. tom. 3. n. 1720.

Lycopodium (annuinum) surculo repante adscendente repetitum terminoli tereti solitaria, capitulifero sessili, foliis serrulatis paulo-deflexis. NECKER. Meth. musc. p. 146. n. 2.

Lycopodium elatius juniperinum, clavis singuloribus sine pediculis. DILL. hist. musc. p. 455. tab. 63. f. 9.

Lycopodium annuinum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 303. n. 1282.

Lycopodium juniperifolium. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 33.

Loc. In sylvis subalpinis umbrosis non infrequens. PERENNE.

1415. LYCOPODIUM alpinum.

Lycopodium foliis quadriflorum imbricatis ovatis, caulibus erectis bifidis, apicis sessilibus teretibus. LINN. syn. 12. p. 698. HUDS. fl. angl. p. 394.

Lycopodium apicis sessilibus, foliis lanceolatis odpressis, utrinque ternatis. HALL. hist. tom. 3. p. 21. n. 1719.

Lycopodium (alpinum) surculo adulto reptante, caeteris imbricato-fascicularis terminalibus, capituliferis erectis dichotomis. NECKER. Meth. musc. p. 147. n. 4.

Lycopodium Sabinae facie. DILL. hist. musc. p. 445. tab. 58. f. 2.

Loc. In monte Cenisio non infrequens, usque in Sabaudia loco dicto entre les deux Eaux. In sterilibus elatioribus di Viù Cl. BELLARDI loco dicto Pianum. PERENNE.

1416. LYCOPODIUM complanatum.

Lycopodium foliis bifariis connatis, superficialibus solitariis, apicis geminis pedunculatis. LINN. spec. p. 1567.

Lycopodium apicis petiolatis, quaternis, caulibus complanatis, foliis odpressis. HALL. hist. tom. 3. n. 1723.

Lycopodium surculo erecto, continuo compresso, terminalibus capituliferis, dichotomo-spiceformibus. NECKER. Meth. musc. p. 145. n. 1.

Lycopodium digitatum, foliis arboris vitae, apicis bigemellis teretibus. DILL. hist. musc. p. 448. tab. 59. f. 3.

Lycopodium complanatum. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 303. n. 1281.

Loc. In sylvis apricis abiegnis non infrequens, abunde in valle Urina, jugis Argentera supra Rodoret, & in valle Progettas. PERENNE.

1417. LYCOPODIUM helveticum.

Lycopodium foliis bifariis pinnatis: superficialibus distichis, apicis geminis pedunculatis. LINN. spec. p. 1568. SCOP. Fl. Carn. p. 164. n. 4.

Lycopodium (helveticum) surculo reptante romoso: terminali erecto dichotomo capitulifero. NECKER. Meth. musc. p. 147. n. 3.

Lycopodioides denticulatum pulchrum repens apicis pediculis insidentibus. DILL. musc. p. 465. tab. 64. fig. 2.

Muscus pulcher, parvus, repens. BAUH. hist. III. p. 765.

Loc. Nihil frequentius in pascuis subhumidis alpinis, atque etiam ad montes, & colles descendit. PERENNE.

SPHAGNUM. LINN. gen. n. 1051. syn. n. 1187.

Anthera operculata: ore ciliata. Calyptra nulla.

1418. SPHAGNUM palustre.

Sphagnum romis deflexis. LINN. spec. p. 1569.

Sphagnum coulisferum romis teretibus pendulis. HALL. hist. tom. 3. n. 1724.

Sphagnum palustre. SCOP. Fl. Corn. ed. 2. p. 305.

Hypnum (cubile) ramis laterolibus deflexis, primordialis subrotundis, terminalibus congestis. NECKER. Meth. musc. p. 188. n. 45.

Muscus palustris in ericetis nascens. VAILL. paris. p. 139. tab. 23. f. 3.

Loc. Ubique locis spongiosis sive in alpinis, sive in montibus. PERENNE.

2429. SPHAGNUM arboreum.

Sphagnum ramasum repens, antheris lateralibus. LINN. spec. pl. p. 1570.

Hypnum (polychephalon) surculo ramosa sparsa, capitulis lateralibus secundis, margine ciliatis. NECKER. Meth. musc. p. 190.

Sphagnum heteromallum polycephalum. DILL. musc. 248. tab. 32. f. 6.

Loc. Non infrequens supra truncos arborum, PERENNE.

PHASCUM. LINN. gen. n. 1052. syst. n. 1189.

Anthera operculata: ore ciliata. Calyptra minuta.

2430 PHASCUM acaulon.

Phascum acaule anthera sessili, foliis ovatis acutis. LINN. syst. 12. p. 699.

Sphagnum acaulon, foliis ovato-lanceolatis, pilo aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1726.

Bryum (bulbiforme) capitulis globosis nigris, calyptra basi dilatata, primordialis bulbois. NECKER. Meth. musc. p. 230.

Phascum capsula globosa, foliis connatis, avatis, diaphanis. NECKER. Act. Palat. p. 450.

Phascum acaule, anthera sessili, foliis ovatis imbricatis. HUDS. p. 396. n. 1.

Sphagnum acaulon bulbiforme majus. DILL. hist. musc. p. 251. tab. 32. f. 11.

Muscus trichoides acaulos minor latifolius. VALL. paris. p. 128. tab. 27. f. 2.

Loc. In agris requietis exeunte hyeme frequens.

2431. PHASCUM subulatum.

Phascum acaule anthera sessili, foliis subulato-setaceis patulis. LINN. spec. p. 1570.

Phascum caulescens, foliis lanceolato-linearibus patulis. SCHREBER. de Phasco p. 8. n. 1.

Spicil. p. 71. n. 777.

Bryum (erycetorum) capitulis subsessilibus, avoideis, calyptra canica, primordialis plumosis. NECKER. Meth. p. 231. sp. 43.

Phascum acaule anthera sessili, foliis subulatis patentibus. HUDS. p. 397. n. 2.

Sphagnum acaulon trichoides. HALL. hist. tom. 3. n. 1727.

Sphagnum acaulon trichoides. DILL. hist. musc. p. 251. tab. 32. f. 10.

Muscus trichoides minor acaulos capillaceis foliis. VALL. paris. p. 128. tab. 29. f. 4.

Loc. Ubique ad aggeres, atque etiam in agris sub fine hyemis.

BUXBAUMIA. LINN. syst. 12. n. 1188.

Anthera operculata, hinc membranacea. Calyptra caduca (SCHMIDEL); intra operculum sacculus pollinis.

2432 BUXBAUMIA aphylla LINN. spec. p. 1570.

Buxbaumia caulescens aphylla. HALL. hist. tom. 3. n. 1728.

Buxbaumia (caulescens) bulbo villis seta. SCHMID. diss. p. 25. sp. 1.

Muscus capillaceus aphyllus capitulo crassa bivalvi. DILL. hist. musc. p. 477. tab. 68. f. 5.

Loc. In corticibus circa Tendam lecta est, mihiq; communicata.

POLYTRICHUM. LINN. gen. n. 1055. syst. n. 1192.

Anthera operculata, apophysi minime insidens. Calyptra villosa.

Stella feminea in distincto individuo.

2433 POLYTRICHUM commune.

Polytrichum caule simpliciter, anthera parallelepipedica. LINN. spec. p. 1573.

Polytrichum surculo capitulifera, simpliciusculo, setifera, antherino-articulato, capitulis adultis, tetraedris, obliquis. NECKER. Meth. musc. p. 124. n. 7.

Maian calyptris villosis, foliis serratis, capulis quadrangulis, disco insidentibus. HALL. hist. tom. 3. p. 50. n. 1835.

Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccae foliis serratis. DILL. hist. musc. p. 420. tab. 54. f. 1.

Muscus juniperifolius, capitulo quadrangulo. VAILL. paris. p. 131. tab. 33. f. 8.
Loc. Nihil frequentius in sylvis ubique.

2434. **POLYTRICHUM** alpinum.

Polytrichum caule ramosissimo, pedunculis terminalibus. LINN. spec. p. 1573.
Polytrichum foliis serratis, capsulis ovatis, basi turbinatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1800.
tab. 46. f. 6.
Polytrichum (alpinum) surculo ramosissimo, setis terminalibus, capitulo ovato obliquo.
NECKER. Meth. musc. p. 120. n. 3.
Polytrichum alpinum ramosum, capsulis e summitate ellipticis. DILL. hist. musc. p. 427.
tab. 55. f. 4.
Loc. In sylvis apricis montanis, & subalpinis frequentissime occurrit.

2435. **POLYTRICHUM** urnigerum.

Polytrichum caule ramosissimo, pedunculis axillaribus. LINN. spec. p. 1573.
Bryum caule ramoso ex alis florifero, foliis serratis, capsulis cylindricis. HALL. hist.
tom. 3. n. 1801.
Polytrichum (urnigerum) surculo ramosissimo, setis lateralibus, capitula erecto acumi-
nato. NECKER. Meth. p. 120. sp. 2.
Polytrichum ramosum, setis ex alis urnigeris. DILL. hist. musc. p. 427. tab. 28. f. 13.
Muscus ramosus erectus, calyptra villosa. VAILL. paris. p. 131. tab. 28. f. 13.
Polytrichum axillare. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 43.
Loc. In sylvis alpium di Viù, di Locana, & Teramasia frequens est.

MNIUM. LINN. gen. n. 1056. syst. n. 1193.

Anthera operculata. Calyptra laevis. Fem. capitulum nudum, pulverulentum, remotum.

2436. **MNIUM** pellucidum.

Mnium caule simplici, foliis ovatis. LINN. spec. p. 1574.
Mnium caule simplicissimo, foliis ovato-lanceolatis, seta fungifera foliosa. HALL. hist.
tom. 3. n. 1853.
Mnium capitulo sphaero-phyllisque distincto, surculis simplicibus, primordialibus plumosis.
NECKER. Meth. musc. p. 233. n. 1.
Mnium serpilli foliis tenuibus pellucidis. DILL. hist. musc. p. 232. tab. 31. f. 2.
Mnium perangustis, & brevibus foliis. BUXB. comm. acad. petrap. tom. 3. p. 273.
tab. 14. f. 2. SCHMIED. p. 12. tab. 3.
Muscus coranatus minimus, capillaceis foliis, capitulis oblongis. VAILL. paris. p. 130.
tab. 24. f. 7.
Loc. Ubique in umbrosis subhumidis, praesertim sylvis.

2437. **MNIUM** fontanum.

Mnium caule simplici, geniculis inflexa. LINN. spec. p. 1574.
Mnium caulibus teretibus, erectis, ex verice multifidis. HALL. hist. tom. 3. p. 55. n. 1851.
Mnium capsulis subrotundis, pedunculis radicalibus. SCOP. Fl. Carn. p. 130. n. 6. ed.
2. p. 313. n. 1294.
Bryum surculo simplici, tereti, capitulis obliquis subrotundis. NECKER. Meth. musc. p.
209. n. 21.
Bryum antheris obliquis, subrotundis, caule simplici, geniculis inflexa. HUDS. Fl. Angl.
p. 404. n. 3.
Bryum palustre, scapis teretibus, stellatis, capsulis magnis subrotundis. DILL. hist. musc.
p. 340. tab. 44. f. 1.
Muscus stellatus palustris, viticulis longioribus, & habitioribus, foliis acutis imis. MICH.
gen. plant. p. 108. tab. 59. f. 4.
Muscus capillaceus tenuissimus, pediculo longissimo purpurascens, capitula rotundiore.
VAILL. paris. p. 134. tab. 24. f. 10.
Loc. Locis spongiosis ad fontium scaturigines ubique.

ALLIOTTI Fl. Pedem. Tom. II.

E e e e

2438. MNIMUM palustre.

Mnium caule dichotoma, foliis subulatis. LINN. spec. p. 1574.

Mnium caulibus rubiginosis bipartitis, foliis lanceolatis mollioribus, capsulis cylindricis acuminatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1855.

Bryum surculo erecto dichotoma, stipitibus axillaribus capituliferis, capsulis obliquis. NECKER. Meth. musc. p. 210. n. 22.

Mnium majus, ramis longioribus bifurcatis. DILL. hist. musc. p. 233. tab. 31. f. 3.

Muscus palustris &c. VAILL. paris. p. 235. tab. 2. f. 2.

Loc. In pratis spongiosis, atque ad fontium scatutigenes in agro Pedemontana.

2439. MNIMUM androgynum.

Mnium caule ramoso, androgynum. LINN. spec. p. 1574.

Mnium caule simplici, cauliculis rosiferis subnudis. HALL. hist. n. 1854.

Mnium angustifolium capitulo pulverifero ovato, glabro, foliato, globoso, surculis simplicibus, ramosisque. NECKER. Meth. musc. p. 234. n. 2.

Mnium caulibus simplicibus aequalibus rectis. ROY. Lugd. p. 305. n. 2.

Mnium peranguntis, & brevibus foliis. DILL. hist. musc. p. 230. tab. 3. f. 1.

Muscus tricaides parvus, capitulo glomerato, sive botryoide. MICH. gen. p. 108. tab. 59. f. 8. H. K.

Muscoides: muscus capillaris minimus, capitulo minimo pulverulento. VAILL. paris. tab. 29. f. 6.

Loc. Reperi in sylvis inter arcem Exilles, & jugum Aisnetæ.

2440. MNIMUM purpureum.

Mnium caule dichotoma, axillis pedunculiferis, anthera erecta, foliis carinatis. LINN. syst. 12. p. 700.

Bryum foliis lanceolatis, subulatis, capsulis erectis, operculis canieis. HALL. hist. n. 1816.

Bryum tenue stellatum, setis purpureis. DILL. hist. musc. 386. tab. 49. f. 31.

Muscus trichades parvus, foliis musci vulgaris, capitulis longis acutis. MORIS. hist. 3. p. 628. s. 15. tab. 6. f. 4. 16.

Loc. In sylvis umbrosis occurrit.

2441. MNIMUM hygrometricum.

Mnium acaule anthera nutante, calyptra reflexa, tetragona. LINN. spec. p. 1575.

Mnium foliis ovato-lanceolatis caniventibus, capsulis ovatis reflexis. HALL. hist. tom. 3. n. 1852.

Bryum acaule, capitulis turbinatis obtusis, siccitate tetragonis, seta arcuata, primordiis aggregatis. NECKER. Meth. musc. p. 211. n. 32.

Bryum capsulis pendulis obovatis, surculis simplicibus, foliis piliferis ovatis. SCOP. FL. Carn. p. 146. n. 19. ed. 2. p. 320. n. 1303.

Bryum bulbiforme aureum, calyptra quadrangulata, capsulis pyriformibus nutantibus. DILL. hist. musc. p. 407. tab. 52. f. 75. bona.

Muscus capillaceus, folio rotundiore, capsula longa incurva. VAILL. paris. p. 135. tab. 26. f. 10.

Loc. In pascuis ad muros frequens est.

2442. MNIMUM cirratum.

Mnium foliis arefactione revolutis. LINN. spec. p. 1576. POLICH. hist. pl. n. 986.

Hypnum foliis capillaceis congestis, crispisemibus capsulis, ovato-cylindricis brevissime ciliatis. HALL. hist. n. 1786.

Bryum surculo ramosa, foliis linearibus siccitate contortis, capitulis erectis, cuspidatis. NECKER. Meth. musc. p. 213.

Bryum antheris erectis, foliis arefactione revolutis. HUDS. angl. p. 409. n. 19.

Bryum cirratum, & stellatum, tenuioribus foliis. DILL. hist. Musc. p. 379. tab. 48. f. 42.

Muscus muralis minimus roseus stellaris. VAILL. paris. p. 150. tab. 24. f. 8.

Loc. Nascitur locis umbrosis, & ad sepes in montanis.

2443. MNIMUM hornum.

Maïum antheris pendulis, pedunculo curvato, aurculo simplici, foliolis margine scabris. LINN. spec. p. 1576.

Maïum foliis lanceolatis imbricatis, capsulis pendulis cylindricis obtusis. HALL. hist. tom. 3. n. 1846.

Bryum aurculo capitulifero ramosiusculo, stellifero simplici, primordioliis plumulosis. NECKER. Meth. musc. p. 215.

Bryum antheris oblongis nutantibus, pedunculo curvato, foliolis ovatis margine scabris. HUDS. p. 415. n. 38.

Bryum stellare hornum sylvarum capsulis magnis nutantibus. DILL. hist. musc. p. 71. tab. 51. n. 71.

Muscus capillaceus major stellatus. VAILL. paris. tab. 24. f. 4. 5.

Maïum stellatum. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 39.

Loc. Passim locis sylvestribus, & rupestribus humidis.

2444. MNIMUM pyriforme.

Maïum antheris pendulis turbinatis, stipite filiformi, floribus femineis setiferis. LINN. spec. p. 1576.

Bryum (aureum) antheris pendulis turbinatis, stipite filiformi, foliis ensiformibus nitidis. HUDS. p. 412. n. 28.

Bryum (aureum) foliis capillaceis, capsulis pyriformibus, pendulis, operculo brevissimo rotundato. SCHREB. spic. p. 81. n. 1042.

Bryum (rupeum) subcaule, capsulis turbinatis cernuis, seta flexuosa, operculis obtusis. NECKER. Meth. p. 220. n. 31.

Bryum trichoides aureum, capsulis nutantibus. DILL. hist. musc. p. 391. tab. 50. f. 60.

Loc. In rupibus passim inter *Pinerolium*, & *l' Villar*.

2445. MNIMUM cradum.

Maïum antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis. LINN. spec. p. 1576.

Bryum aurculo simplici, capsulis nutantibus, foliis intermediis latioribus, summis linearibus. NECKER. Meth. musc. p. 223. n. 34.

Bryum antheris oblongis pendulis, calyptra recurva, foliis ovatis, ocnis, pellucidis. HUDS. angl. 415.

Bryum pendulum hornum molle, foliis & lanceolatis, & gromitis. DILL. musc. p. 401. tab. 51. f. 70.

Loc. Sylvas, & pascua inhabitat.

2446. MNIMUM polytrichoides.

Maïum calyptra villosa. LINN. spec. p. 1576.

Maïum acaulon calyptra villosa, foliis serratis, capsulis cylindricis erectis. HALL. hist. n. 1837.

Polytrichum (subrotundum) caule simplici, onthera subrotunda. HUDS. p. 400. n. 2.

Polytrichum (nanum) acaule, foliis integerrimis, capsulis subrotundis, erectis, mucronatis, stipite subflexuoso. NECKER. Meth. musc. p. 119. n. 2.

Polytrichum (alcofolium). SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 309. n. 1290.

Polytrichum nanum, capsulis subrotundis galerinis, alcos folio non serrato. DILL. hist. musc. p. 428. tab. 55. f. 6.

Loc. In humidis sylvis inter la *Veneria*, & *Rubianetta*, tum in sylvaticis di *Borgo*

Masino.

2447. MNIMUM serpillifolium.

Maïum pedunculis aggregatis, foliis patenibus pellucidis. LINN. spec. p. 1577.

Maïum foliis ovatis integerrimis, capsulis pendulis, ovatis aristatis. HALL. hist. 3. n. 1845.

Bryum serpillifolium aureulo simpliciusculo, capsulis subaggregatis cernuis, foliis obovatis, obtusis, nitidis, integerrimis. NECKER. Meth. musc. p. 216. n. 27.

Bryum antheris pendulis, pedunculis aggregatis, foliis patenibus pellucidis. HUDS. p. 416. n. 41.

Loc. In humidis sylvarum, & secus rivulos frequentissimum.

2448. MNIMUM triquetrum.

Mnium foliis trifariis patulis subulato-lanceolatis carinatis. LINN. spec. p. 1578.

Mnium caulibus praelongis, rubiginosis, foliis ovato-lanceolatis, capsulis ovatis pendulis. HALL. hist. n. 1849.

Bryum antheris oblongis, pendulis, foliis trifariis, subulato-lanceolatis, carinatis, surculis romosis. HUDS. Angl. 416.

Bryum annotinum palustre capsulis ventricosis pendulis. DILL. hist. musc. p. 404. tab. 51. f. 72.

Muscus denticulatus lucens fluvialibus maximus od. ramorum apices adianthi capitulis ornatus. VAILL. paris. p. 135. tab. 24. f. 2.

Loc. Locis spongiosis, & subalpinis nascitur.

BRYUM. LINN. gen. n. 1057. syst. n. 1194.

Anthera operculata. Calyptra laevis. Filamentum e tuberculo terminali ortum.

ANTHERIS SESSILIBUS

2449. BRYUM apocarpum.

Bryum antheris sessilibus terminalibus, calyptra minima. LINN. spec. p. 1579. Pollich. Palat. n. 995.

Hypnum caulibus romosis, foliis lanceolatis hirsutis, operculo orinato. HALL. hist. rom. 3. n. 1793.

Bryum surcula ramosa, foliis carinatis, acuminatis, capitulis sessilibus, ovatis, terminalibus. NECKER. Meth. musc. p. 109. n. 8.

Bryum antheris erectis, terminalibus sessilibus, surculis ramosis. SCOP. Fl. Corn. p. 140. n. 8.

Sphagnum subhirsutum obscure virens, capsulis rubellis. DILL. hist. musc. p. 245. tab. 32. f. 4.

Muscus apocarpus hirsutus, saxis adnascens, capitulis obscure rubris. VAILL. paris. tab. 27. fig. 15, 18.

Loc. In saxosis montanis frequens.

2450. BRYUM striatum.

Bryum antheris sessilibus sparsis, calyptris striatis, sursumve pilosis. LINN. syst. 12. p. 701.

Bryum setis brevissimis alaribus, calyptris cylindricis villosissimis. HALL. hist. n. 1799.

Polystichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus, majus. DILL. hist. musc. 430. tab. 55. f. 8.

Muscus apocarpus arboreus ramosus. VAILL. paris. 129. tab. 25. f. 5. 6.

Loc. Arborum corticibus innascitur.

ANTHERIS PEDUNCULATIS, ERECTIS.

2451. BRYUM pomiforme.

Bryum antheris erectis sphaericis. LINN. spec. p. 1580.

Bryum foliis subulatis, setis verticalibus, capsulis sphaericis. HALL. hist. rom. 3. n. 1803.

Bryum sureula erecta, capitulis lateralibus globosis. NECKER. Meth. musc. p. 108. n. 19.

Bryum capsulis erectis, sphaericis, pedunculis lateralibus, surculis ramosis, foliis linearibus. SCOP. Fl. Carn. p. 142. n. 12., ed. 2. p. 322. n. 1307.

Bryum copillaceum, capsulis sphaericis. DILL. hist. musc. p. 339. tab. 44. f. 1.

Muscus trichoides minimus sericeus capillaceus capitulis sphaericis. MORIS. hist. 3. p. 628. t. 15. tab. 6. f. 6. VAILL. paris. p. 129. tab. 24. f. 9. 12.

Loc. Ad rupes, & muros aqua lente fluente irriguos ubique.

2452. BRYUM pyriforme.

Bryum, antheris erectis obovatis, calyptra subulata, surculis acaulibus, foliis ovatis muticis. LINN. spec. p. 1580.

Bryum caule brevissimo, foliis ovato-lanceolatis, capsulis erectis, ovariis, operculo brevi.
HALL. hist. tom. 3. n. 1832.

Bryum capitulis erectis turbinatis, opercula sedente truncatis. NECKER. Meth. musc. p. 197. n. 6.

Bryum capsulis erectis, obovatis, surculis simplicibus, foliis pellucidis, ovariis, glabris.
SCOP. Fl. Carn. p. 139. n. 5. ed. 2. p. 318. n. 1300.

Bryum serpillifolium, pellucidum. capsulis pyriformibus. DILL. hist. musc. p. 345. tab. 44. f. 6.

Muscus capillaceus minimus, capitulis pyriformibus turgidis. VAILL. paris. p. 129. tab. 29. f. 3.

Loc. In agris, & fossis humidis, & terra argillacea frequens.

2453. BRYUM extinctorium.

Bryum anthera erectis oblonga minori, calyptris laxis oequalibus. LINN. spec. p. 1581.

Bryum caule brevissimo, calyptra cylindrica. HALL. hist. tom. 3. p. 48. n. 1829.

Bryum surculo simplici, foliis ovariis, supremis parvis, capitulis erectis, subcylindricis, calyptra basi dilatata. NECKER. Meth. musc. p. 207. n. 18.

Bryum calyptra exünctarii figura minus. DILL. hist. musc. p. 349. tab. 45. f. 8.

Muscus capillaceus minimus calyptra longa nitida conidea. VAILL. paris. 137. tab. 26. f. 1. TOURN. inst. p. 552.

Loc. In arenosis subhumidis ad rupes, & muros ex lapidibus sine glutine constructos.

2454. BRYUM subulatum.

Bryum antheris erectis subulatis, surculis acaulibus. LINN. spec. p. 1581.

Bryum caule brevissimo, foliis lanceolatis, capsulis longissimis, opercula proelongo. HALL. hist. tom. 3. n. 1827.

Bryum capitulis subulatis, foliis superioribus oculis patens, primordialis subradiculis. NECKER. Meth. musc. p. 194. n. 2.

Bryum antheris erectis subulatis, surculis simplicibus, foliis imberbibus. SCOP. Fl. Carn. p. 137. n. 1. ed. 2. n. 320. n. 1304.

Bryum capsulis longis subulatis. DILL. hist. musc. p. 350. tab. 45. f. 10.

Muscus capillaceus corniculis longissimis incurvis. VAILL. paris. p. 133. tab. 25. f. 8.

Loc. Minime rarum est ad aggeres, & in pascuis subhumidis sylvarum.

2455. BRYUM rurale.

Bryum antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis. LINN. spec. p. 1581.

Hypnum caulibus erectis, foliis lanceolatis, pilo fluante terminatis, capsulis erectis, longe rostratis. HALL. hist. tom. 3. n. 1789.

Bryum surcula opicibus stellato, foliis recurvato-patulis, operculo capsularum subulato. NECKER. Meth. musc. p. 225. n. 36.

Bryum rurale unguiculatum hirsutum elatius, & ramosius. DILL. musc. p. 352. tab. 45. f. 12.

Bryum rurale. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 323. n. 1308.

Muscus capillaris tectarum, densis caespitiibus nascenti, capsulis oblongis, foliis in pilum desinentibus. VAILL. paris. p. 133. tab. 25. f. 3.

Loc. Ubique frequens ad muros, & in tectis.

2456. BRYUM murale.

Bryum antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, surculis simplicibus caespitosis. LINN. spec. p. 1581.

Bryum cauliculis brevissimis, foliis ovato-lanceolatis parvis, pile terminatis, capsulis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1825.

Bryum capitulis oblongis, erectis cuspidatis, foliis oblongis concavis piliferis. NECKER. Meth. musc. p. 176. n. 5.

Bryum capsulis erectis oblongis, surculis simplicibus, foliis rectiusculis, piliferis, ovariis. SCOP. Fl. Carn. p. 138. n. 4. ed. 2. p. 317. n. 1299.

Bryum regulare humile pilosum, & incanum. DILL. hist. musc. p. 355. tab. 45. f. 14.

ALLIOTTI Fl. Pedem. Tam. II.

F f f f

Muscus muralis omnium vulgarissimus, villosus. VAILL. paris. p. 133. tab. 24. f. 15.

Muscus capillaris minor, capitulis erectis. MICH. gen. tab. 59. f. 7.

Loc. Passim in tectis, & muris.

2457. BRYUM scoparium.

Bryum antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato. LINN. spec. p. 1582.

Hypnum foliis falcatis, heteromallis, vaginis multifloris. HALL. hist. tom. 3. p. 36. n. 1777.

Bryum surculo declinato ramoso, foliis secundis recurvatis, primordialibus plumosis.

NECKER. Meth. musc. p. 223. n. 35.

Hypnum (scoparium) surculis erectiusculis, foliis secundis linearibus recurvis. SCOP.

Fl. Carn. p. 150. n. 24. ed. 2. p. 334. n. 1324.

Bryum reclinato, foliis falcatis, scoparum effigie. DILL. hist. musc. p. 357. tab. 46. f. 16.

Muscus capillaceus major pediculo, & capitulo tenuioribus. VAILL. paris. p. 132. tab. 28. f. 12.

Loc. Ubique in sylvis.

2458. BRYUM undulatum.

Bryum antheris erectiusculis, pedunculis subulnaribus, foliis lanceolatis, carinatis, undulatis, patentibus, serratis. LINN. spec. p. 1582.

Bryum foliis lanceolatis serratis, capsulis cylindricis inclinis, aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1823.

Bryum (phyllitidisfolium) surculo simplici, foliis undato-serrulatis, primordialibus plumosis. NECKER. Meth. musc. p. 203. n. 13.

Bryum capsulis subnullis, surculis simplicibus, foliis lanceolatis, undatis, serratis.

SCOP. Fl. Carn. p. 143. n. 13. ed. 2. p. 318. n. 1101.

Bryum phyllitidis folio rugoso acuto, capsulis incurvis. DILL. hist. musc. p. 360. tab. 46. f. 18.

Muscus erectus linearis folio major. VAILL. paris. p. 132. tab. 27. f. 7.

Loc. In sylvis vulgarissimum.

2459. BRYUM glaucum.

Bryum antheris erectiusculis: operculo arcuato, foliis erectis imbricatis, surculis ramosis. LINN. spec. p. 1582.

Hypnum caulis erectis teretibus, foliis imbricatis fragilibus, capsulis inclinis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1785.

Bryum (glaucum) surculo ramoso, fragili, imbricato, foliis lanceolatis, operculo capitolium rostrato. NECKER. Meth. musc. p. 226. n. 37.

Bryum capsulis subnullis, operculo arcuato, surculis ramosis, foliis fragilibus erectis, glaucis. SCOP. Fl. Carn. p. 144. n. 16. ed. 2. n. 1309.

Bryum albidum, & glaucum fragile majus, foliis erectis, setis brevibus. DILL. hist. musc. 362. tab. 46. f. 10.

Muscus trichodes montanus albidus fragilis. MORIS. hist. 3. p. 630. t. 15. tab. 6. f. 22.

Muscus erectus capillaceus densissimus, glauco folio. VAILL. paris. 131. tab. 26. f. 13.

Muscus saxatilis ericoides. BAUM. pin. 362. prodr. 151.

Loc. Locis humidis argillosis non infrequens est.

2460. BRYUM pellucidum.

Bryum antheris erectiusculis, foliis recurvis acutis, caule hirsuto. LINN. spec. p. 1583.

Bryum foliis ovato-lanceolatis aristatis reflexis, capsulis ovatis obliquis. HALL. hist. tom. 3. n. 1824.

Bryum surculo ferrugineo, tomentoso, foliis recurvatis, nidis, carinatis, capsulis obliquis, cuspidatis. NECKER. Meth. musc. p. 204. n. 14.

Bryum palustre pellucidum capsulis, & foliis brevibus recurvis. DILL. hist. musc. p. 364. t. 46. f. 23.

Loc. Gen. de SAUSSURE (referente Cl. HALLERO loco citato) circa Chaumouny. Ego in monte Cenisio reperi; allatum etiam est ex Gros Caval, & Ceresole.

2461. BRYUM tenue. WERN. Spicil. n. 175.

Bryum foliis lanceolatis, laxè imbricatis, capsulis cylindricis orinatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1817.

Bryum tenue barbatum foliis angustioribus, & rarioribus. DILL. hist. musc. p. 385. tab. 48. f. 49.

Bryum perangustum foliis, & cauliculis foliis rarioribus cinctis, capitulis erectis & surculis annotinis egredientibus. DILL. cot. p. 225. HALL. enum. helv. p. 3. n. 16.

Loc. Terrae innascitur in sylvis montanis.

2462. BRYUM flexuosum.

Bryum antheris erectis, foliis setaceis, pedunculis flexuosis. LINN. spec. p. 1583.

Bryum foliis capillaceis, capsulis cylindricis, operculis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1804.

Bryum surculo erecto, foliis setaceis, stipite flexuoso, subsolitario, capitulis erectis cuspidatis. NECKER. Meth. musc. p. 205. n. 16.

Bryum pilosum molle, setis interioris. DILL. hist. musc. p. 373. tab. 47. f. 33.

Loc. Supra Lemie in sylvis umbris obviam venit.

2463. BRYUM heteromallum.

Bryum antheris erectis, foliis setaceis secundis. LINN. spec. p. 1583.

Bryum foliis capillaribus heteromallis, capsulis ovatis, operculis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1807.

Bryum surculo adolescente apici: annotino dorso capitulifero, foliis secundis capillaceis. NECKER. Meth. musc. p. 229. n. 41.

Bryum capitulis subrotundis, surculis simplicibus, foliis setaceis secundis. SCOP. Fl. Carn. p. 144. n. 15. ed. 2. p. 319. n. 1302.

Bryum heteromallum. DILL. hist. musc. p. 375. tab. 47. f. 37.

Muscus capillaceus, foliis unam partem spectantibus. VAILL. paris. p. 132. tab. 27. f. 7.

Bryum elegans. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 48.

Loc. Habitat in truncis arborum locis montanis.

2464. BRYUM tortuosum.

Bryum antheris erectis, foliis setaceis imberbibus arefacione retortis. LINN. syn. 12. p. 702.

Hypnum foliis subulatis cincinnatis, capsulis cylindricis, longissime ciliatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1787.

Bryum surculo apici, laterique capitulifero, operculo cuspidato, foliis setaceis, siccitate crispatis. NECKER. Meth. musc. p. 227. n. 39.

Bryum cirratum setis, & capsulis longioribus. DILL. hist. musc. p. 377. tab. 48. f. 40.

Muscus alpinus cirratus, seu crinium retortuorum odinatæ crispatus. SCHEUCHZ. it. alp. 2. p. 138. tab. 19. f. 5.

Muscus alpinus ramosus &c. MICH. nov. gen. n. 68.

Loc. Passim in alpihus ad rupes.

2465. BRYUM truncatulum.

Bryum antheris erectis subrotundis, operculo mucronato. LINN. spec. p. 1584.

Bryum foliis ovato-lanceolatis, capsulis erectis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1833.

Bryum capitulis erectis subrotundis, operculo mucronato abecedente truncatis, exanulatis. NECKER. Meth. musc. p. 195. n. 4.

Bryum capsulis ovatis, surculis simplicibus, foliis piliferis oblongis. SCOP. Fl. Carn. p. 139. n. 6. ed. 2. p. 316. n. 1298.

Bryum exiguis creberrimis capsulis rufis. DILL. hist. musc. p. 347. tab. 45. f. 7.

Muscus capillaceus, omnium minimus. VAILL. paris. p. 130. tab. 26. f. 2.

Loc. Locis umbris ad vias praesertim in collibus, & montibus frequens est.

2466. BRYUM montanum LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 48.

Bryum alpinum capillaceis foliis, caule adpressis. HALL. helv. n. 7. tab. 4. f. 1. & hist. n. 1806.

Loc. Locis alpinis, & subalpinis frequentissime occurrit.

2467. BRYUM viridulum.

Bryum antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. LINN. spec. p. 1584.

Bryum foliis capillaribus, capitulis ovatis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1809.

Bryum surculo simpliciusculo, foliis linearibus exsiccatione crispis, capitulis erectis, operculo subrotundo tectis. NECKER. Meth. musc. p. 106. n. 17.

Bryum capitulis erectis ovatis, surculis simplicibus, foliis imbricatis lanceolatis. SCOP. Fl. Corn. p. 140. n. 7., ed. 2. p. 316. n. 1297.

Bryum capillaceum breve, pollide, & lacte virens, capitulis ovatis. DILL. hist. musc. 380. tab. 48. f. 43.

Musci capillaceus omnium minimus, foliolis longioribus, & angustioribus. VAILL. poris. p. 130. tab. 29. f. 5.

Loc. In terra ad aggeres frequenter occurrit.

2468. BRYUM paludosum.

Bryum acaulon, foliolis setaceis, antheris obtusissimis patulis. LINN. spec. p. 1584.

Bryum foliis capillaribus, cauliculo sessili, capitulis ovatis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1810.

Bryum paludosum foliis setaceis, primordialibus solitariis. NECKER. Meth. musc. p. 195. n. 3.

Bryum trichoides acaulon palustre minimum, setis, & capitulis brevissimis. DILL. hist. musc. p. 387. tab. 49. f. 53.

Loc. Loca montana incolit, tegitque lapides aqua madentes.

2469. BRYUM hypnoides.

Bryum antheris erectis, coule erectiusculo, ramis lateralibus brevibus sterilibus. LINN. spec. p. 1584.

Hypnum ramis alternatim brevioribus, foliis pilosis, petiolis brevibus flexuosis. HALL. hist. tom. 3. n. 1780. tab. 45. f. 4.

Bryum surculo declinato, ramoso, ramis fertilibus, capitulis ovatis, erectis, operculo cuspidato. NECKER. Meth. musc. p. 116.

Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum. DILL. hist. musc. p. 372. tab. 47. f. 32.

Musci alpinus ramosior, erectus, flagellis brevioribus, & lanuginosis. PLUK. alm. p. 255. tab. 47. f. 5.

Loc. Passim frequens in umbris ab arce Exilles ascendendo jugum Asiense, & in valle di Locana.

2470. BRYUM trichodes.

Bryum antheris erectiusculis: ore ciliato exanulato, pedunculo longissimo. LINN. spec. p. 1585.

Bryum foliis capillaceis erectis, setis longissimis, capsulis sursum lascentibus, operculo brevissimo. HALL. hist. tom. 3. n. 1812.

Bryum capitulis operculo decedente ciliatis, exanulatis, primordialibus reconditis. NECKER. Meth. musc. p. 198. n. 7.

Bryum trichoides aureum, capsulis incurvis, obtusis in setis longis. DILL. hist. musc. p. 389. tab. 49. f. 58.

Loc. Num infrequens in sylvis umbris, montanis, terraque humida arenosa.

2471. BRYUM cespiticium.

Bryum antheris pendulis, foliis lanceolatis, acuminato-setaceis, pedunculis longissimis. LINN. spec. p. 1586.

Hypnum foliis ovato-lanceolatis, aristatis patulis, capsulis ovatis obtusis pendulis. HALL. hist. n. 1790.

Bryum foliis lanceolatis acuminatis nitidis, stipite subradicali, capitulis ovatis, obtusis. NECKER. Meth. musc. p. 128.

Bryum pendulum avatum cespiticium, & pilosum, seta bicolore. DILL. hist. musc. p. 396. tab. 50. f. 66.

Muscus capillaceus minimus capitula nutante, pediculo purpurea. VAILL. PARIS. p. 134; tab. 29. f. 7.

Loc. Muris innascitur.

2472. BRYUM carneum.

Bryum antheris pendulis subglobosis, foliis acutis alternis. LINN. spec. p. 1587.

Bryum foliis lanceolatis rariaribus, capsulis ovatis pendulis. HALL. hist. tam. 3. n. 1834.

Bryum surculo annano stipitifero, apereulis capitulorum obtusis, capsulis subrotundis, cernuis. NECKER. Meth. musc. p. 202. n. 11.

Bryum lanceolatum pellucidum, capsulis subrotundis pendulis carnis. DILL. hist. musc. p. 400. tab. 50. f. 69.

Loc. In umbrosis subhumidis collium frequens, terraque innascitur.

2473 BRYUM capillare.

Bryum antheris pendulis, foliis avatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis. LINN. spec. p. 1586.

Hypnum foliis avato-lanceolatis arinatis, capsulis avatis pendulis, apereulis canicis. HALL. hist. n. 1791.

Bryum surculo stellifero acaule capitulifero caulescente, foliis oblongis nitidis mucranatis. NECKER. Meth. musc. p. 214.

Bryum capsulis pendulis oblongis, surculis ramosis, ramis annuinis pedunculiferis, foliis piliferis carinatis avatis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 326. n. 1319.

Bryum foliis latiusculis congestis, capsulis longis nutantibus. DILL. hist. musc. p. 398. tab. 50. f. 67.

Muscus capillaceus major, capsulis crassiaribus cylindraceis nutantibus. VAILL. PARIS. p. 134. tab. 24. f. 6.

Muscus capillaris folia longiare. MAGN. hort. 138. tab. 138.

Loc. Muros occupare solet.

2474. BRYUM simplex.

Bryum antheris oblongis nutantibus, foliis subulatis, surculo simplicissima, media pedunculifera. LINN. spec. p. 1587. POLLICH. Palat. n. 1020.

Bryum cauliculis cernuis, foliis capillaribus heteramallis, capsulis curvulis, cylindricis, apereulis canicis. HALL. hist. n. 1808.

Bryum surculis apice, dorsaque capituliferis, simplicissimis, capsulis avatis, foliis imbricato-patulis. NECKER. Meth. musc. p. 202. n. 12.

Bryum trichodes capsulis rubris, cernuis. DILL. hist. musc. p. 390. tab. 50. f. 59.

Loc. Nascitur in pascuis.

2475. BRYUM argenteum.

Bryum antheris pendulis, surculis cylindricis, imbricatis, laevibus. LINN. syst. 12. p. 702.

Bryum cauliculis teretibus, capsulis ovatis acuminatis pendulis. HALL. hist. n. 1821.

Bryum surculo nuda arce imbricata, foliis avato-concavis, capsulis avatis nutantibus, stipite subradicali. NECKER. Meth. musc. p. 201. sp. 10.

Bryum capsulis pendulis subradicalibus, surculis teretibus ramosis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1310.

Bryum pendulum julaceum argenteum, & sericeum. DILL. hist. musc. p. 392. tab. 50. f. 62.

Muscus squamosus argenteus, ericæ folio. VAILL. PARIS. p. 134. tab. 26. f. 3.

Muscus minimus e viridi argenteus, capsulis oblongis cernuis. MORIS. hist. 3. p. 627. 2. 15. tab. 6. f. 17.

Loc. Crescit super muros, & rupes locis montanis, & subalpinis.

2476. BRYUM pulvinatum.

Bryum antheris subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. LINN. syst. 12. p. 702.

Bryum foliis lanceolatis, pilo terminatis, capsulis pendulis, avatis arinatis. HALL. hist. n. 1822.

ALLIONI Flor. Pedem. Tam. II.

G g g g

- Bryum surculo cespitoso, aggregato, foliis piliferis, setaceis, capitulis ovatis inter folia sepulitis.* NECKER. Meth. musc. p. 200. n. 9.
Bryum caputulis pendulis, ovatis, pedunculis reflexis, surculis ramosis, foliis piliferis. SCOP. Fl. Carn. 2. n. 1312.
Bryum orbiculare pulvinatum, hirsute canescens, capsulis immersis. DILL. hist. musc. p. 395. tab. 50. f. 65.
Muscus capillaceus lanuginosus minimus. VAILL. Paris. p. 133. tab. 29. f. 2.
 Loc. Muros, atque rupes inhabitat.

HYPNUM. LINN gen. n. 1058. syst. n. 1195.

Anihtra operculata. Calyptra laevis. Filamentum laterale ortum e perichætio.

FRONDIBUS PINNATIS

2477. HYPNUM taxifolium.

- Hypnum fronde simplicissima pinnata, lanceolata, basi pedunculifera.* LINN. spec. p. 1587.
 SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 328. n. 1314.
Hypnum foliis planis pinnatis, parium duodecim, setis radicalibus. HALL. hist. tom. 3. n. 1775.
Hypnum surculo simplicissima, basi stipitifera, capitulis incurvis apice subulatis, foliis imbricatis acutis. NECKER. Meth. musc. p. 151.
Hypnum fronde pinnata simplici, pedunculis subradicalibus. SCOP. Fl. Carn. p. 149. n. 2., ed. 2. n. 1314.
Muscus pinnatus capitulis adianthi. VAILL. tab. 24. f. 11.
Hypnum taxiforme minus, basi capsuliferum. DILL. hist. musc. p. 263. tab. 34. f. 2.
 Loc. Frequentissimum ubique in umbris.

2478. HYPNUM denticulatum.

- Hypnum fronde pinnata simplici, pinnis duplicatis, basi pedunculifera.* LINN. spec. p. 1588.
Hypnum foliis laxis, pinnatis ovato-lanceolatis aristatis retroveris. HALL. hist. tom. 3. p. 35. n. 1772.
Hypnum surculo simpliciusculo decumbente, basi setifero, capitulis obliquis, foliis ordine duplici acutis, recurvatis. NECKER. Meth. musc. p. 154. n. 5.
Hypnum denticulatum pinnatum pinnis duplicatis recurvis. DILL. hist. musc. p. 266. tab. 34. f. 5. GER. p. 53. n. 22.
Muscus pinnatus denticulatus minor. VAILL. Paris. 137. tab. 29. f. 8.
Hypnum taxifolium. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 328.
 Loc. Ad vias in umbris montanis terrae innascitur.

2479. HYPNUM bryoides.

- Hypnum fronde simplicissima pinnata lanceolata, apice pedunculifera.* LINN. spec. p. 1588.
Hypnum foliis planis pinnatis, parium septem setis ex summis. HALL. hist. tom. 3. n. 1776.
Hypnum surculo simplicissimo decumbente, apice stipitifera, capitulis erectis, ovoideis, foliis imbricatis. NECKER. Meth. musc. p. 152. n. 2. act. palat. tom. 2. p. 452.
Hypnum fronde pinnata simplici, peduncula terminali. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 327. n. 1313.
Hypnum taxiforme exiguum, versus summam capsuliferum. DILL. hist. musc. p. 262. tab. 34. f. 1.
Muscus polytrichoides exiguis capitulis, in summis surculis, seu foliis subrotundis erectis. VAILL. Paris. p. 136. tab. 24. f. 13.
 Loc. Non infrequens in collum Taurinensium umbris secus semitas.

2480. HYPNUM adiantoides.

- Hypnum fronde pinnata ramosa, erecta, media pedunculifera.* LINN. spec. p. 1588.
 POLLICH. hist. pl. n. 1024.
Hypnum foliis planis pinnatis, parium quadraginta. HALL. hist. n. 1774.

Hypnum surculo ramoso erecto, medio stipitifero, capitulis obliquis subulatis, foliis imbricatis acutis. NECKER. Meth. musc. p. 153. n. 3.

Hypnum taxiforme palustre ramosum majus, & erectum. DILL. hist. musc. p. 264. tab. 24. f. 3.

Musci taxiformis ramosus. VAILL. parisi. p. 136. tab. 28. f. 5.

Loc. In humidis montanis reperitur.

2481. *HYPNUM complanatum.*

Hypnum fronde pinnata ramosa, foliolis imbricatis acutis complicatis compressis. LINN. spec. p. 1588.

Hypnum caule disticha, foliis ovatis planis, capsulis ovatis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1771.

Hypnum surculo reptante ramosa, ramis basi setiferis, capitulo avuli erecto, foliis complicatis obtusis. NECKER. Meth. musc. p. 155. n. 6. act. palat. tom. 2. p. 451.

Hypnum (complanatum) fronde ramosa, foliis distichis imbricatis acinaciformibus acuminatis. SCHREB. spic. p. 87. n. 778.

Hypnum pennatum compressum, & splendens, capsulis avatis. DILL. hist. musc. p. 268. tab. 34. f. 7.

Musci trichomanoides, filicifolius, splendens. VAILL. parisi. 139. tab. 25. f. 4.

Loc. In corticibus vetustorum arborum frequentissimum.

SURCULIS VAGIS

2482. *HYPNUM rugosum.*

Hypnum surculis vagis erectiusculis: foliis secundis recurvatis, basi rugosis. LINN. syst. 12. p. 703. mant. 131. POLLICH. hist. plant. 1238.

Hypnum lutescens crispum, Lycopodii facie. DILL. hist. musc. p. 289. tab. 37. f. 24.

Loc. In spongiosis circa lacum montis Cenisii occurrit.

2483. *HYPNUM undulatum.*

Hypnum surculis ramosis, frondibus pinnatis, foliis undulatis complicatis. LINN. syst. 12. p. 703.

Hypnum caule plana, foliis distichis obiter rugosis nitidis, operculo canica. HALL. hist. tom. 3. n. 1770.

Hypnum undulatum, surculo vaga basi, medioque setifera, capitulis oblongis, obliquis, foliis distichis complicatis, lanceolatis undatis. NECKER. Meth. musc. p. 156. n. 7.

Hypnum fronde subpinnata, foliis undatis crispis, pedunculis subradicalibus longissimis, capsulis oblongis. SCOP. Fl. Carn. p. 151. ed. 2. p. 331. n. 1318.

Hypnum pennatum, & undulatum Lycopodii instar sparsum. DILL. hist. musc. p. 271. tab. 36. f. 11.

Loc. Locis opacis collium, & montium, & in subalpinis sylvis alpinum maritimum frequens.

2484. *HYPNUM crispum.*

Hypnum surculis ramosis, frondibus subpinnatis, foliis undulatis planis. LINN. syst. 12. p. 703.

Hypnum caule plana, foliis distichis ovatis nitidis transversim undulatis, operculis aristatis. HALL. hist. n. 1769. tab. 45. f. 5. a

Hypnum surculo ramoso vaga, erectiusculo, stipitifero, capitulis obliquis acuminatis, foliis undatis, obtusis distichis. NECKER. Meth. musc. p. 153. n. 4. act. palat. t. 2. p. 451.

Hypnum fronde subpinnata ramosa, foliis undulatis crispis, capsulis ovatis. SCOP. Fl. Carn. p. 150. ed. 2. n. 1317.

Hypnum pennatum, & undulatum, crispum, setis capsulis brevibus. DILL. hist. musc. p. 273. tab. 36. f. 12.

Loc. Vulgare in subalpinis sylvis, & in corticibus arborum.

2485. *HYPNUM triquetrum.*

Hypnum ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. LINN. spec. p. 1589.

- Hypnum foliis hispidis, ovato-lanceolatis aristatis.* HALL. hist. tom. 3. p. 26. n. 1729.
Hypnum surculo adscendente, ramis supremis recurviusculis setiferis, infimis repantibus, foliis imbricato-paulis. NECKER. Meth. musc. p. 185. n. 43.
Hypnum surculis repentibus, ramis vagis suberectis, apice dilatatis, ramulis recurvis. SCOP. Fl. Carn. p. 157. n. 18., ed. 2. n. 1329.
Muscus squamatus major, seu vulgaris. VALL. tab. 28. f. 9.
Hypnum vulgare maximum triangulum, & pallidum. DILL. hist. musc. p. 293. tab. 38. f. 28.
 Loc. Ubique in sylvis, & pascuis montanis vulgarissimum.

2486. HYPNUM rutabulum.

- Hypnum ramis vagis subrepentibus, foliis ovatis mucronatis imbricatis.* LINN. syst. 12. p. 703.
Hypnum foliis ovato-lanceolatis, paulis, aristis breviter aristatis, operculis concis. HALL. hist. tom. 3. n. 1730.
Hypnum surcula repente ramis erectiusculis, teretibus setiferis, foliis concavis, capitulo incurvo, obtusiuscula. NECKER. Meth. musc. p. 178. n. 33.
Hypnum surculis repentibus, ramis vagis suberectis, foliis acutis ovatis, capsulis obtusis. SCOP. Fl. Carn. p. 159. n. 21. ed. 2. p. 336. n. 1328.
Hypnum densatum vulgarissimum, operculis obtusis. DILL. hist. musc. p. 295. f. 29.
Muscus myrsinoides, rutabili fructu. VALL. tab. 27. f. 8.
 Loc. Uberrimum in sylvis.

SURCULIS PENNATIS.

2487. HYPNUM filicinum.

- Hypnum surculis pennatis, ramulis dinantibus, foliis imbricatis incurvis acutis secundis.* LINN. syst. 12. p. 703.
Hypnum caulibus pinnatis, pinnis dinantibus alterne longioribus ex apice conferis, foliis cinnamatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1766.
Hypnum surcula juniore erecta, simpliciter pinnata, adulto subrepente, capitalifero, capsulis oblongis obliquis. NECKER. Meth. musc. p. 164. n. 17.
Hypnum surculis, & ramis pinnatis, setis brevioribus, ramulis remotis, apicibus, foliisque recurvis. SCOP. Fl. Carn. p. 153. n. 9.
Hypnum repens filicinum crispum. DILL. hist. musc. p. 282. tab. 36. f. 19.
Muscus filicinus palustris. VALL. par. 138. tab. 29. f. 9.
 Loc. In humidis locis montanis, & subalpinis sæpissime occurrit.

2488. HYPNUM proliferam.

- Hypnum surculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis.* LINN. spec. p. 1590.
Hypnum ramis teretibus pinnatis, pinnulis pinnatis, foliis adpressis. HALL. hist. tom. 3. n. 1764.
Hypnum (parietinum) surculo pinnato, ramis arcuato-subulatis, teretibus, capsulis aggregatis obliquis, operculo subulato. NECKER. Meth. p. 157. n. 8.
Hypnum surculis rugosis nudis, frandibus bipinnatis ramulis decurrentibus. SCOP. Fl. Carn. p. 155. n. 13.
Hypnum filicinum, tamarisci foliis, minoribus non splendentibus. DILL. hist. musc. p. 276. tab. 35. f. 14.
Muscus filicinus minor. VALL. p. 40. tab. 23.
 Loc. Ubique ad arborum radices.

2489. HYPNUM praelongum.

- Hypnum surculis subbipinnatis, decumbentibus ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis.* LINN. spec. p. 1591. POLLICH. hist. pl. n. 1033.
Hypnum foliis distichis, lanceolatis, pila terminatis, capsulis ovatis, inclimatis, aristatis. HALL. hist. n. 1758.
Hypnum (praelongum) surculo reptante, ramulis subaequalibus, setis axilloribus, capsulis subcernuis, foliis serrulatis patulis. NECKER. Meth. p. 174. n. 28.

Hypnum repens filicinum triangularibus parvis foliis, praelongum. DILL. hist. musc. p. 278. tab. 35. f. 15.

Muscus filicinus minor. VAILL. Paris. tab. 23. f. 9.

Muscus terrestris minor, foliis crispis. BUXB. cent. 4. p. 37. tab. 63. f. 3.

Loc. Arborum cortices incolit.

2490. *HYPNUM crista castrensis.*

Hypnum surculis pinnatis, ramulis approximatis, apicibus recurvis. LINN. spec. p. 1591.

Hypnum foliis pinnatis, pinnis simplicibus aequalibus, foliis cinnatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1768.

Hypnum surculo pinnato, ramis supremis canisulis, apice deflexis, capitulis subrotundis obliquis. NECKER. Meth. musc. p. 165. n. 18.

Hypnum surculis, & ramis pinnatis, ramulis approximatis, apicibus, foliisque recurvis. SCOP. Fl. Carn. p. 153. n. 8. ed. 2. n. 1320.

Hypnum filicinum cristam castrensem representans. DILL. hist. musc. p. 286. tab. 36. f. 20.

Muscus terrestris repens, subflavus, foliis crispis, ramulis caneritis. VAILL. Paris. p. 141. tab. 27. f. 14.

Muscus pennatus major, cauliculis ramosis, in summitate veluti spicatus. LOESEL. p. 164. ic. 42.

Loc. In sylvis praesertim montanis ad radices arborum.

2491. *HYPNUM abietinum.*

Hypnum surculis pinnatis teretibus rematis inaequalibus. LINN. spec. p. 1591.

Hypnum ramis duris, teretibus, foliis adpressis ovata-lanceolatis, pilo aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1762.

Hypnum primordialisibus obtusis ramis teretibus subulatis, foliis ovatis acutis, rachi siccata adpressis. NECKER. Meth. musc. p. 165. n. 15. Act. Palat. tab. 11. p. 452.

Hypnum surculis, & ramis pinnatis, ramulis dinatis, subulatis rectis. SCOP. Fl. Carn. p. 154. n. 11.

Hypnum lutescens, alis subulatis tenacibus. DILL. hist. musc. p. 280. tab. 35. f. 17.

Muscus pennatus minor, cauliculis ramosis, in summitate veluti spicatis. VAILL. Paris. tab. 29. f. 12.

Loc. In sylvis inter Braman, & Termignon, ubique in sylvis abietum.

FOLIIS REFLEXIS

2492. *HYPNUM cupressiforme.*

Hypnum surculis subpinnatis, foliis secundis recurvis, apice subulatis. LINN. spec. p. 1592.

Hypnum caule compressa, foliis imbricatis, falcatis, pilo aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1737.

Hypnum sarcula pinnata, ramis apice deflexis, remotis, capitulis ovatis erectis. NECKER. Meth. musc. p. 166. n. 19.

Hypnum surculis, & ramis pinnatis, foliis secundis apicibus aduncis. SCOP. Fl. Carn. p. 154. n. 10. ed. 2. p. 333. n. 1322.

Hypnum crispum cupressiforme foliis aduncis. DILL. hist. musc. p. 287. tab. 37. f. 21.

Muscus ramosus squamosus minor, & crispus. VAILL. Paris. 139. tab. 27. f. 13.

Loc. Frequentissimum in sylvis ad arborum radices.

2493. *HYPNUM aduncum.*

Hypnum surculis erectiusculo-subramosis, foliis secundis recurvis subulatis, ramis recurvis. LINN. spec. p. 1592.

Hypnum caule erecto, foliis falcatis, pilo aristatis, operculis conicis. HALL. hist. tom. 3. p. 27. n. 1736.

Hypnum surculo erecto simpliciuscula, ramis recurvis, capitulo oblongo, apice obtuso. NECKER. Meth. musc. p. 167. n. 20.

Hypnum palustre erectum, summis aduncis. DILL. hist. musc. p. 392. tab. 37. f. 26.

Loc. In pascuis humidis montanis nascitur,

ALLIONI Fl. Pedem. Tam. II.

H h h h

1494. HYPNUM scorpioides.

Hypnum ramis vagis procumbentibus recurvis, foliis secundis acuminatis. LINN. spec. p. 1592.

Hypnum scorpioides palustre magnum, Lycopodii inar sparsum. DILL. hist. musc. 290. tab. 37. f. 23.

Loc. In valle Ursina lectum est.

1495. HYPNUM viticulosum.

Hypnum surculis repentibus, ramis vagis teretibus, foliis potulis acuminatis. LINN. spec. p. 1592.

Hypnum foliis lanceolatis crispis, capsulis erectis, operculo conico. HALL. hist. tom. 3. p. 28. n. 1739.

Hypnum surculo germinante crassiore, adulto graciliore, reptante capitulifero, primordialis pilosis. NECKER. Meth. musc. p. 169. n. 23.

Hypnum subhirsutum, viticulis gracilibus erectis, capsulis teretibus. DILL. hist. musc. p. 307. tab. 39. f. 43.

Muscus montanus gracilis ramosus, viticulis longioribus glabris. VAILL. p. 137. tab. 23. f. 2.

Loc. Ad caudices arborum in sylvis.

1496. HYPNUM palustre.

Hypnum surculis repentibus, ramis confertis erectis, foliis ovatis secundis, antheris erectiusculis. LINN. spec. p. 1593.

Hypnum foliis ovato-lanceolatis falcatis, capsulis ovatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1738.

Hypnum (heterophyllum) surculo reptante simplici, ramis erectis, setis subaequantibus, operculo mucronato. NECKER. Meth. p. 168. n. 21.

Hypnum surculo repente, ramis confertis erectis, foliis ovatis, antheris erectiusculis. HUDS. fl. angl. p. 429. n. 37.

Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalum repens. DILL. hist. musc. p. 295. tab. 37. f. 27.

Loc. Locis spongiosis provenit in montibus, & collibus.

1497. HYPNUM loreum.

Hypnum surculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis secundis, antheris subrotundis. LINN. spec. p. 1593.

Hypnum loreum surculo repente ramis erectis, foliis subsecundis, capitulo obliquo subrotundo. NECKER. Meth. musc. p. 170. n. 24.

Hypnum loreum montanum capitulis subrotundis. DILL. musc. p. 305. tab. 39. f. 40.

Loc. In montibus inter Gioveno, & Quasse.

SURCULIS DENDROIDIBUS, S. FASCICULATIS

1498. HYPNUM dendroides.

Hypnum surculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus simpliciusculis, antheris erectis. LINN. spec. p. 1593.

Hypnum caule nullo inclinato, ramis teretibus confertis, capsulis erectis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1747.

Hypnum surculo pristino reptante, ramis erectis congregatis simpliciusculis, operculo capsularum cuspidato. NECKER. Meth. musc. p. 187. n. 44.

Hypnum surculis erectis, ramis terminalibus teretibus imbricatis, radice repente. SCOP. Fl. Carn. p. 159. n. 23. ed. 2. p. 347. n. 1336.

Hypnum dendroides sericeum, setis, & capsulis longioribus erectis. DILL. hist. musc. p. 313. tab. 40. f. 48.

Muscus squamosus ramosus erectus alopecuroides. TOURN. inst. 554. tab. 326. f. B.

VAILL. paris. p. 137. tab. 26. f. 6.

Loc. In sylvis abunde provenit.

SURCULIS TERETIUSCULIS

1499. HYPNUM curtispiculum.

Hypnum surculis vagis teretibus, foliis ovatis acutis parulis, amheris pendulis. LINN. spec. p. 1594.

Hypnum ramis teretibus, foliis ovato-lanceolatis pilo aristatis, capsulis ovatis pendulis, operculis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1740.

Hypnum surculo germinante crassiore, operculis capitulorum cuspidatis. NECKER. Meth. musc. p. 177. n. 32.

Hypnum surculis vagis, teretibus, foliis ovatis acutis, parulis, perichetis longissimis, capsulis pendulis. SCHREB. Spicil. p. 101. n. 1075.

Hypnum densatum curtispiculum viticulis rigidis. DILL. musc. 333. tab. 43. f. 69.
Loc. Incolit montanas sylvas.

1500. HYPNUM illecebrum.

Hypnum surculis, ramisque vagis teretibus, erectiusculis obtusis. LINN. syst. 12. p. 704.

Hypnum foliis ovato-lanceolatis concavis ramis, teretibus. HALL. hist. n. 1744.

Hypnum surcula vago, procumbente ramis teretibus arcu imbricatis; foliis concavis obtusis, mucrone terminali. NECKER. Meth. p. 178. n. 34.

Hypnum cupressiforme rotundius, vel illecebrae aemulum. DILL. musc. 311. tab. 40. f. 46.

Muscus terrestris, surculis kali geniculatis, aut illecebrae oemulis, foliis subrotundis squamatis incumbenibus. VAILL. paris. 137. tab. 25. f. 7.

Loc. Sylvas inhabitat.

1501. HYPNUM purum.

Hypnum surculis pinnato-apicatis subulatis, foliis ovatis obtusis conniventibus. LINN. spec. p. 1594.

Hypnum ramis teretibus, foliis ovato-lanceolatis setis praelongis, capsulis inclinatissimis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1743.

Hypnum surculo ascendente, ramoso setifero, ramis incurvo-subulatis, teretibus, foliis conniventibus obtusis mucronatis. NECKER. Meth. musc. p. 160. n. 11.

Hypnum cupressiforme vulgare, foliis obtusis. DILL. hist. musc. p. 309. tab. 40. f. 45.

Muscus squamosus cupressiforme. VAILL. paris. p. 138. n. 15. tab. 28. f. 3. TOURN. inst. p. 554.

Loc. In sylvis subhumidis.

1502. HYPNUM cuspidatum.

Hypnum surculis vagis: apice foliis convolutis acuminatis. LINN. syst. 12. p. 704.

POLLICH. hist. pl. n. 1046.

Hypnum foliis ovato-lanceolatis, ramis teretibus, supremis conicis, acuminatis. HALL. hist. n. 1741.

Hypnum surculo erectiusculo, ramis summis pungentibus-cuspidatis, setis axillaribus longissimis. NECKER. Meth. musc. p. 163. n. 16.

Hypnum palustre, extremitatibus cuspidatis, & pungentibus. DILL. hist. musc. p. 300. tab. 39. f. 34.

Muscus squamosus palustris, foliis, flagellisque rigidiusculis, incurvis. VAILL. paris. tab. 28. f. 11.

Loc. Secus fossas, & loca spongiosa adinvenitur.

1503. HYPNUM nitens. WEB. spic. n. 159.

Hypnum surculis erectis, ramis brevissimis, foliis lanceolatis adpressis, striatis, perichetis longissimis, capsulis obliquis. SCHREB. spic. p. 92. n. 1062.

Hypnum ramis compressis, foliis pilo aristatis, nitentibus, capsulis erectis, operculis conicis. HALL. hist. tom. 3. n. 1784.

Hypnum (trichoides) surculo erecta, ramis approximatis, seta terminali, foliis lanceolatis striatis, capsulis erectis. NECKER. Meth. p. 161. n. 13.

Hypnum palustre erectum trichoides, ramulis crebris, luteo, & rufo virentibus glabris.
 DILL. hist. p. 303. tab. 39. f. 37.
 Loc. In valle di Lanzo secus fluentes fontium aquas.

1504. HYPNUM trichodes.

Hypnum surculo erecto, ramoso, foliis subulatis, rectis, patentibus, sevis prælongis, capsula subcylindrica, incurviscula. POLICH. hist. pl. n. 1047.
Hypnum ramis compressis, foliis pilo aristatis, niventibus, capsulis erectis, operculis conicis. HALL. hist. n. 1784.
Hypnum palustre erectum trichodes, ramulis crebris, rufo, & luteo virentibus glabris.
 DILL. musc. tab. 39. f. 37.
 Loc. Crescit in locis montanis, & subalpinis.

SURCULIS CONFERTIS

1505. HYPNUM sericeum.

Hypnum surculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris erectis. LINN. spec. p. 1595.
Hypnum ramis teretibus, foliis pilo præpilatis, capsulis cylindricis erectis aristatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1750.
Hypnum repens ramis annotinis, erectis, capsulo erecto acuminato, primordialibus, acuminatis. NECKER. Meth. musc. p. 173. n. 27.
Hypnum vulgare sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis. DILL. hist. musc. p. 323. tab. 42. f. 59.
Muscus arboreus splendor sericeus. VAILL. paris. p. 132. tab. 27. f. 3.
 Loc. Passim in arborum corticibus inæt saxa, imo etiam ad muros provenit.

1506. HYPNUM velutinum.

Hypnum surculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris subnutantibus. LINN. spec. p. 1595.
Hypnum ramis teretibus, foliis filo terminatis, capsulis ovatis, inclinatis mucronatis. HALL. hist. p. 31. n. 1754.
Hypnum repens, ramis erectis teretibus seto duplo-brevioribus, capsulis ovatis subcernuis. NECKER. Meth. musc. p. 172. n. 26.
Hypnum velutinum capsulis ovatis cernuis. DILL. hist. musc. p. 326. tab. 42. f. 61.
Muscus squamosus ramosus tenuior, capsulis incurvis. VAILL. paris. p. 138. tab. 26. f. 9.
 Loc. Vulgare est ad arborum radices.

1507. HYPNUM myurum.

Hypnum surculo multifloro, superne præprimis romoso, ramis recurvis, rigidiusculis, foliis ovatis acuminatis, capsulis lanceolatis erectis. POLICH. hist. pl. n. 1054.
Hypnum foliis ovato-lanceolatis, ramis teretibus compressis. HALL. hist. n. 1745.
Hypnum myosuroides crassius, capsulis erectis. DILL. musc. p. 316. tab. 41. f. 50.
 Loc. Ad arborum cortices.

1508. HYPNUM myosuroides.

Hypnum surculis ramosissimis, ramis subulatis, utrinque attenuatis teretibus. LINN. spec. p. 1596.
Hypnum ramis teretibus, foliis pilo terminatis, capsulis ovatis inclinatis, mucronatis. HALL. hist. n. 1752.
Hypnum myosuroides tenuius, capsulis nutantibus. DILL. hist. musc. p. 317. tab. 41. f. 51.
Muscus trichodes humilis ramosus, capsulis oblongis tumidiusculis donatum. MORIS. hist. 3. p. 628. t. 15. tab. 6. f. 3.
Muscus squamosus minor myosuroides, capsulis incurvis. VAILL. paris. p. 137. tab. 27. f. 6.
 Loc. Ad arborum caudices.

2509. *HYPNUM* sciaroides.

Hypnum surculis erectis ramosis incurvatis. LINN. spec. p. 1596.

Hypnum caulibus teretibus ramosis, foliis adpressis, pilo arinatis, operculis conicis. HALL. hist. tom. 3. n. 1749.

Hypnum surculo germinante crassiore capitulifero tenuiore, ore capitulorum coarctato, primordialis pilosis. NECKER. Meth. musc. p. 175. n. 29.

Hypnum surculis erectis ramosis, ramis subradicalibus, foliis subovatis, capsulis erectis. SCOP. Fl. Carn. p. 159. n. 22. ed. 2. p. 340. n. 1334.

Hypnum arborcum, sciaroides. DILL. hist. musc. p. 319. tab. 41. f. 54.

Muscus arborcum splendens myosuroides. VAILL. parisi. tab. 27. f. 12.

Loc. Corticibus arborum innascitur locis umbris.

2510. *HYPNUM* clavellatum.

Hypnum repens ramulis erectis confertissimis, antheris incurvis, operculis inflexis. LINN. spec. p. 1596. POLLICH. hist. plant. n. 1055.

Hypnum foliis ovato-lanceolatis acutissimis, operculis aristatis. HALL. hist. n. 1731.

Hypnum surculo repente ramis conguis, teretibus, erectis duplo eca brevioribus, capitulo incurvo, acuminato. NECKER. Meth. musc. p. 176. n. 31.

Hypnum clavellatum parvum repens, scis brevioribus. DILL. hist. musc. p. 351. tab. 85. f. 17.

Loc. Lignis corruptis innascitur.

FONTINALIS. LINN. gen. n. 1053. syst. n. 1190.

Anthera operculata. Calyptra sessilis, perichaetio inclusa.

2511. *FONTINALIS* antipyretica.

Fontinalis foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. LINN. spec. p. 1571.

Hypnum foliis complicatis, ovato-lanceolatis capsulis ex alijs petiolatis ovatis. HALL. hist. tom. 3. p. 40. n. 1794.

Hypnum (antipyreticum) surculis trifariis, capitulis subsessilibus axillaribus, primordialis oblongis teretibus. NECKER. Meth. musc. p. 191. n. 48.

Fontinalis capsulis lateralibus, foliis lanceolatis trifariam versis. SCOP. Fl. Carn. p. 162. n. 1., ed. 2. n. 1286.

Muscus aquaticus folio expanso. BAUH. prodr. p. 152.

Muscus squamosus acutissimus in oqua nascens. VAILL. p. 140. tab. 32. f. 5. MICH. tab. 59. f. 9.

Loc. In aquis frigidis, & lente inter saxa fluentibus vulgaris.

2512. *FONTINALIS* minor.

Fontinalis foliis ovatis concavis trifariis acutis, passim geminis, antheris terminalibus. LINN. syst. 12. p. 699.

Hypnum foliis ovatis lanceolatis carinatis, opicibus capsuliferis. HALL. hist. tom. 3. n. 1795.

Hypnum (minus) surculis trifariis apice capsuliferis, operculo capitulorum cuspidato. NECKER. Meth. musc. p. 192. sp. 48. B.

Fontinalis triangularis minor carinato e cymis capsulifera. DILL. hist. musc. p. 257. tab. 33. f. 2.

Fontinalis minor, foliis triangularibus minus complicatis, capitulis in summis ramis sessilibus. RAJ. syn. 3. p. 79.

Muscus squamosus, foliis ovatis in aquis nascens. VAILL. Paris. p. 140. tab. 3. f. 5.

Loc. Secus Padum loco dicto il Pò morto.

2513. *FONTINALIS* pennata.

Fontinalis foliis bifariis patentibus, antheris lateralibus. LINN. syst. 12. p. 699.

ALLIONI Flor. Pedem. Tom. II.

l i i i

Hypnum coulibus distichis ramosis, foliis ovatis transversim undosis. HALL. hist. n. 1797. tab. 45. f. 2.

Hypnum (pennatum) surculo pennata, decumbente, foliis undato-rugosis acutis, recurviusculis, capitulis axillaribus, sessilibus, subcylindraceis. NECKER. Meth. musc. p. 193. sp. 30.

Sphagnum pennatum undulatum, vagino squamosa. DILL. hist. musc. 250. tab. 32. f. 9.

Muscus terrestris major, ramulis compressis, foliis superficie crispis. VAILL. paris. 129. tab. 27. f. 4.

Loc. Ad quercus locis montanis.

SPLACHNUM. LINN. syst. p. 699.

Anthera insidens Apophysii maxime coloratae. Calyptra caduca. Stella feminea in distincto individuo.

2514. SPLACHNUM ampullaceum.

Splachnum umbraculo ampullaceo obovato. LINN. syst. p. 699.

Bryum foliis ovato-lanceolatis, oristatis, capsula pyriformi, terminata cylindro. HALL. hist. tab. 3. p. 49. n. 1830.

Splachnum surculo capitulo, foliis lanceolatis, nitidis, appendice capitulorum turbinato. NECKER. Meth. musc. p. 125.

Bryum ampullaceum foliis thymi pellucidis, collo strictiore. DILL. hist. musc. 343. tab. 44. fig. 3.

Muscus capillaceus minor, capitulis geminatis. VAILL. paris. tab. 26. f. 4.

Loc. In agro Cilianis locis humidis reperit Cl. BELLARDI.

MARCHANTIA. LINN. gen. n. 1091. syst. n. 1198.

Masculo. Calyx peltatus, subtus tectus corollis 1-petalis. Antherae multifidae.

Fem. Calyx sessilis, campanulatus, polyspermus.

2515. MARCHANTIA polymorpha.

Marchantia calyce communi decemfidio. LINN. spec. p. 1603. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 438.

Marchantia linea frondem biperviente, cyathis scabiferis serratis, setis umbellatis, & stellatis decemfidis. HALL. hist. 3. p. 66. n. 1891.

Marchantia seminis analoga scabiformi, primordiolibus marginalibus. NECKER. Meth. musc. p. 114. n. 1.

Marchantia major capitulo stellata, radiis teretibus, capsularum seminalium crenis in longiusculum quasi pilum desinentibus. MICH. gen. 2. tab. 1. fig. 1.

Lichen fontanus major stellatus aequae, ac umbellatus, & cyathophorus. DILL. hist. musc. p. 523. tab. 76. f. 6.

Marchantia stellata. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 71.

Loc. Locis udis umbrosis, & secus rivulos lente fluentes.

VIR. Non sine aliqua acrimonia subadstringentes, & abstergentes vires habet. Propter utilitates, quas exerit in morbis hepatis, hepaticae nomen habet. Laudatur, & adhibetur in obstructionibus hepatis, & speciatim in ictero in aqua, aut sero lactis cocta dosi manipuli semissis. Licet majorem fiduciam in pluribus aliis stirpibus habeam, non negaverim tamen suam praebere posse utilitatem, atque in iis praesertim casibus convenit, in quibus validiora tonica, stimulantia, & calefacientia suspecta sunt.

2516. MARCHANTIA hemisphaerica.

Marchantia calyce communi hemisphaerico, perichaetia nulla. LINN. spec. p. 1604.

Marchantia fronde crenato, petiolis cunicis hirsutis. HALL. hist. tom. 3. n. 1890.

Marchantia hemisphaerica seminis analoga nullo, primordiolibus marginalibus. NECKER.

Meth. musc. p. 118. n. 7.

Lichen pileatus parvus, foliis crenatis. DILL. hist. musc. p. 519. tab. 75. f. 2.

Hepatica media capitulo hemisphaerico, MICH. nov. gen. p. 3. tab. 2. f. 2.
 Loc. Locis umbrosis humidis montanis frequens.

2517. **MARCHANTIA conica.**

Marchantia calyce communi quinqueloculari subovato, LINN. spec. p. 1604. HUDS. Fl. Angl. p. 439. n. 4.
Marchantia verrucis asperis, capitulis canicis, HALL. hist. tom. 3. n. 1889.
Marchantia seminis analogo subrotundo, primordialis subarticulatis, NECKER. Meth. musc. p. 115. n. 2.
Lichen Plinii primus, & pileatus, COL. eschr. 1. p. 330.
Marchantia conica, SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 355. n. 1358.
Lichen vulgaris major pileatus, & verrucosus, DILL. hist. musc. p. 516. tab. 75. f. 1.
Hepatica vulgaris major, sive officinarum Italiae, MICH. nov. gen. p. 3. tab. 2. f. 1.
 Loc. Incolit loca rupestra, & madida.

2518. **MARCHANTIA androgyna.**

Marchantia calyce communi integro hemisphaerico, LINN. spec. p. 1605.
Marchantia (angustifolia) pileo hemisphaerico, frondibus parvialibus lineari-dichotomis, NECKER. Meth. musc. p. 117. n. 5.
Lichen plicatus angustifolius dichotomus, DILL. hist. musc. p. 520. tab. 75. f. 3.
Hepatica minor angustifolia, capitula hemisphaerico, MICH. gen. 3. tab. 2. f. 2.
 Loc. Locis saxosis subhumidis in valle Augustae Praetoriae, & valle Maurianensi.

TARGIONIA, MICH. gen. pl. 3. LINN. syst. n. 1197.

Calyx bivalvis, includens globum.

2519. **TARGIONIA hypophylla**, LINN. spec. p. 1603.

Targionia minima, & vulgaris, MICH. gen. 3. tab. 3.
Lichen petræus minimus, fructu Orob. BAUH. pin. 362.
Lichen petræus minimus, fructu Orob. DILL. hist. musc. 532. tab. 28. f. 9.
 Loc. Locis aqua humectatis sabulosis praesertim secus flumina non infrequens est.

JUNGERMANNIA, MICH. gen. pl. 5. LINN. gen. n. 1059. syst. n. 1196.

Masc. pedunculatus nudus. Anthera 4-valvis. Fem. sessilis, nudus, seminibus subrotundis.

2520. **JUNGERMANNIA asplenoides.**

Jungermannia frondibus simpliciter pinnatis, foliis ovatis subciliatis, LINN. spec. p. 1597.
 POLLICH. tab. 3. n. 1056.
Jungermannia foliis pinnatis subrotundis serratis, ex apice florifera, HALL. hist. tom. 3. n. 1868.
Jungermannia surculo pennata, apice capitulifera, foliis obtusis, recurvisculis, margine subciliatis, NECKER. Meth. p. 133. n. 10.
Jungermannia major, foliis brevioribus, & obtusioribus non dentatis, MICH. gen. 8. tab. 5. f. 3. v. o.
Lichenastrum asplenii facie, pinnis laxioribus, DILL. hist. musc. 482. tab. 69. f. 5.
 Loc. Ad oras sylvarum locis umbrosis, & collibus.

2521. **JUNGERMANNIA viticulosa.**

Jungermannia frondibus simpliciter pinnatis, foliis planis nudis linearibus, LINN. syst. 12. p. 705. POLLICH. tab. 3. n. 1057.
Jungermannia foliis pinnatis subrotundis, ex caule florifera, HALL. hist. tom. 3. n. 1869.
Jungermannia surculo pennata, basi, medioque capitulifero, foliis ovatis integerrimis, NECKER. Meth. musc. p. 132. n. 11.
Jungermannia terrenis, viticulis longis, foliis perexiguis densissimis ex rotunditate acuminatis, MICH. gen. 8. tab. 5. f. 4.

Lichenastrum trichomanis facie e basi, & medio florens. DILL. hist. musc. 484. tab. 69. f. 7.
Loc. Super terram crescit in sylvis umbris humidis.

2512. *JUNGERMANNIA lanceolata.*

Jungermannia frondibus simpliciter pinnatis lanceolatis apice floriferis, foliis integerrimis. LINN. syst. 12. p. 705. POLLICH. tam. 3. n. 1059.

Jungermannia foliis pinnatis ovatis confertis, ex apice florifera. HALL. hist. tom. 3. n. 1871.

Jungermannia surculo pennato, apice globulifera, foliis ovatis obtusis integerrimis. NECKER. meth. musc. p. 131.

Jungermannia palustris minima repens, foliis subrotundis densissimis laete virentibus. MICHL. gen. 8. tab. 5. f. 6.

Lichenastrum trichomanis facie minus, ab extremitate florens. DILL. hist. musc. 486. tab. 70. f. 10.

Loc. Similibus locis provenit.

2513. *JUNGERMANNIA bidentata.*

Jungermannia frondibus simpliciter pinnatis apice floriferis, foliis bidentatis. LINN. syst. 12. p. 705. POLLICH. tam. 3. n. 1060.

Jungermannia foliis bifidis in ramo florifero majaribus. HALL. hist. tom. 3. n. 1877.

Jungermannia surculo pennato, apice globulifero, foliis bidentatis. NECKER. Meth. p. 130. n. 6.

Jungermannia surculis procumbentibus, ramosis, apicibus floriferis, foliis ovatis bicuspidatis, stipulis lanceolatis quadridentatis. SCHREB. Spic. p. 104. n. 1081.

Jungermannia major repens, foliis bifidis. MICHL. gen. 8. tab. 5. f. 12.

Lichenastrum, pinnulis acutiaribus & concavis bifidis, majus. DILL. hist. musc. 487. tab. 70. f. 11.

Hepaticoides, polytrichi facie, foliis bifidis, major. VAILL. poris. 99. tab. 19. f. 8.

NECKER. tom. 2. p. 490.

Muscus lichenoides, foliis pennatis bifidis, minor. MORIS. hist. 3. p. 627. t. 15. tab. 6. f. 47.

Loc. In ericetis umbris subhumidis.

2514. *JUNGERMANNIA bicuspidata.*

Jungermannia frondibus simpliciter pinnatis medio floriferis, foliis bidentatis. LINN. syst. 12. p. 705. POLLICH. tam. 3. n. 1062.

Jungermannia foliis distichis, bicuspidatis, summis ramis globuliferis. HALL. hist. tom. 3. n. 1865.

Jungermannia surculo pennata, lineari-ramoso, media capitulifero, foliis bidentatis acutissimis. NECKER. Meth. p. 129. n. 5.

Jungermannia surculis procumbentibus, foliis distichis, quadratis, bidentatis, stipulis nullis. SCHREB. Spic. p. 105. n. 1052.

Jungermannia minima repens, foliis bifidis, vagina florum cylindracea. MICHL. gen. 9. tab. 6. f. 17.

Lichenastrum pinnulis acutissime bifidis, minimum. DILL. hist. musc. 488. tab. 70. f. 13.

Loc. In sylvis frequens occurrit.

2515. *JUNGERMANNIA nemorosa.*

Jungermannia frondibus supra bipinnatis, apice floriferis foliis ciliatis. LINN. syst. 12. p. 706. POLLICH. tam. 3. n. 1066.

Jungermannia foliis bipartitis, auriculatis, imbricatis, supremis punctiferis. HALL. hist. tam. 3. n. 1859.

Jungermannia surcula pinnata, apice globulifero, foliis obovatis, margine ciliatis, basi supro appendiculatis. NECKER. Meth. p. 136. n. 13.

Jungermannia nemorosa, foliis acutioribus auritis, tenuissime denticulatis, flore insidente pediculo brevior. MICHL. gen. 7. tab. 5. f. 8.

Lichenastrum auriculatum, pinnis minoribus crenatis. DILL. hist. musc. 490. tab. 71. fig. 18.

Loc. Sylvas montanas umbras inhabitat.

1516. JUNGERMANNIA albicans.

Jungermannia frondibus supra bipinnatis opica floriferis, foliis linearibus recurvatis. LINN. syst. 12. p. 706. POLLICH. tom. 3. n. 1068.

Jungermannia surculo pinnato, ramosiusculo, apice copulifero, foliis linearibus, recurvis, supra auriculatis. NECKER. Meth. p. 135. n. 12.

Lichenastrum auriculatum, pinnulis angustis planis recurvis. DILL. hist. musc. 492. tab. 71. f. 10.

Hepaticoides albescent, foliis pinnatis. VAILL. paris. 100. tab. 19. f. 5.

Loc. In sylvis ad arborum truncos.

1517. JUNGERMANNIA complanata.

Jungermannia surculis repentibus, foliis inferne auriculatis, duplicato-imbricatis, romis aequalibus. LINN. syst. 12. p. 706. POLLICH. tom. 3. n. 1069.

Jungermannia foliis subrotundis, alternis imbricatis, coule plano, multiflora, setis brevioribus. HALL. hist. tom. 3. n. 1860.

Jungermannia surculo repante, foliis subrotundis, serie duplici ordinatis, subus appendiculatis, vaginis romorum plano-truncatis. NECKER. Meth. p. 141. n. 21.

Jungermannia foliis circinatis imbricatis dispositis ex viridi flovescentibus. MICH. gen. 7. tab. 5. f. 21.

Lichenastrum imbricatum majus, squamis compressis, & planis. DILL. hist. musc. 496. tab. 72. f. 26.

Loc. Ad arborum truncos.

1518. JUNGERMANNIA dilatata.

Jungermannia surculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, romis opice laevioribus. LINN. spec. p. 1600. POLLICH. tom. 3. n. 1070.

Jungermannia foliis imbricatis, alternis, orbiculatis, setis brevioribus. HALL. hist. tom. 3. n. 1874.

Jungermannia surculo repante, imbricato, foliis serie duplici, orbiculatis, romorum apice lobatus. NECKER. Meth. p. 140. n. 19.

Lichenastrum imbricatum minus, squamis convexo-concavis. DILL. hist. musc. 497. tab. 72. f. 27.

Hepaticoides surculis, & foliolis thuyae instar compressis, minor. VAILL. paris. 99. tab. 19. f. 10.

Muscoides minimum, foliis obovatis, superioribus circinatis, inferioribus cucullatis, flore pediculo ferme carente. MICH. gen. 10. tab. 6. f. 6.

Loc. Frequens in sylvis ad arborum truncos.

1519. JUNGERMANNIA tamarisci.

Jungermannia foliis imbricatis serie duplici, superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo majoribus. LINN. spec. p. 1600. POLLICH. tom. 3. n. 1071.

Jungermannia foliis imbricatis, rotundis, superne alternis convexis, inferne quadrifloris. HALL. hist. tom. 3. n. 1873.

Jungermannia surculo lineari repante; foliis convexusculis, duplici ordine suborbiculatis, inferioribus quadruplo majoribus, subfidis. NECKER. Meth. musc. p. 141. n. 20.

Jungermannia (tamariscifolia) surculis decompositis, opice floriferis, foliis subrotundis, subus auriculatis, stipulis ovaris, emarginatis. SCHREB. spic. p. 102. n. 1086.

Lichenastrum imbricatum, tamarisci narboneasis facie. DILL. hist. musc. 499. tab. 72. fig. 31.

Hepaticoides, quoe Muscus trichomonoides terrestris minor floridus. VAILL. paris. 100. tab. 23. f. 10.

Muscoides squamosum sexatile nigro-purpureum, surculis angustioribus, foliis circinatis minoribus. MICH. gen. 10. tab. 6. f. 5.

Loc. Truncos arborum, aequae rupes inhabitat.

2530. JUNGERMANNIA platyphylla.

Jungermannia surculis procumbentibus subius imbricatis, foliis cordatis acutis. LINN. *syn.* 12. p. 706. POLICH. *tom.* 3. n. 1073.

Jungermannia foliis imbricatis lanceolatis superne planis alternis, inferne concavis quinquefariis. HALL. *hist.* *tom.* 3. n. 1873.

Jungermannia surculo decumbente imbricata, appendicibus subius ordine duplici cordatis, acutis. NECKER. *Meth. musc.* p. 142.

Lichenantrum arboris vitæ facie, foliis minus rotundis. DILL. *hist. musc.* 501. *tab.* 72. *fig.* 32.

Hepaticoides sureulis, & foliolis thuyæ instar compressis major. VAILL. *paris.* *tab.* 19. *f.* 9.

Muscoides squamosum majus atrovirens, foliis subrotundis. MICH. *gen.* 9. *tab.* 6. *f.* 3. 4.

Muscus muralis floridus, foliis subrotundis eruberrime imbricatis dispositis. MORIS. *hist.* 3. p. 627. 2. 15. *tab.* 6. *f.* 44.

Loc. Ad arborum truncos in sylvis.

BLASIA. LINN. *gen.* n. 1062. *syn.* n. 1199.

Masculo. Calyx cylindricus granis repletus. Foeminae. Calyx nudus.

Fructu subrotundo, foliis immerso, polyspermis.

2531. BLASIA pusilla. LINN. *syn.* 12. p. 707.

Blasia fronde lobata, lobis subrotundis, nervis setiferis. HALL. *hist.* *tom.* 3. n. 1857.

Blasia pusilla lichenis pyxidati facie. MICH. *gen.* 14. *tab.* 7.

Malum lichenis facie. DILL. *hist. musc.* 237. *tab.* 31. *f.* 7.

Loc. In udis loci dicti la Malinetta in agro Taurinensi.

RICCIA. LINN. *gen.* n. 1063. *syn.* n. 1200.

Calyx nullus, nisi cavitatem vesicularem intra folii substantiam. Corolla nulla.

Anthera cylindrica, sessilis, germine imposita. Pistilli germen turbinatum.

Stylus filiformis. Pericarpium sphaericum, coronatum anthera emarcida.

Semina haemisphaerica pedicellata.

2532. RICCIA fluitans.

Riccia frondibus dichotomis linearifiliformibus. LINN. *syn.* 12. p. 708.

Lichenantrum aquaticum fluitans tenuifolium furcatum. DILL. *hist. musc.* 514. *tab.* 74. *fig.* 47.

Hepatica palustris dichotoma, segmentis angustioribus. VAILL. *paris.* 98. *tab.* 19. *f.* 3.

Loc. Cl. BELLARDI in fossis circa lacum di Vivrane.

ANTHOCEROS. LINN. *gen.* n. 1064. *syn.* n. 1201.

Masculo. Calyx sessilis, cylindricus ineger, Anthera subulata longissima bivalvis.

Foeminae. Calyx sexpartitus, semina tria.

2533. ANTHOCEROS laevis.

Anthoceros frondibus indivisis sinuatis laevibus. LINN. *syn.* 12. p. 708.

Anthoceros fronde sinuata, integra, obtusa. NECKER. *Meth. musc.* p. 44. n. 3.

Anthoceros fronde plana crenata. SCHREIB. *spic.* p. 110. n. 1089.

Anthoceros foliis majoribus minus lacinatis. DILL. *hist. musc.* 476. *tab.* 62. *f.* 2.

Anthoceros major. MICH. *gen.* 11. *tab.* 7. *f.* 1.

Anthoceros fronde plana crenata. SCHMID. *icon.* p. 71. *tab.* 19.

Lichen hepaticus, pediculis gramineis. BUXB. *cent.* 1. p. 40. *tab.* 61. *f.* 1.

Loc. In sylvis collium Taurinensium.

LICHEN. LINN. *gen. n.* 1065. *synt. n.* 1202.

Masc. Receptaculum subrotundum, planiusculum, nitidum. Fem. Farina foliis adpersa.

LEPROSI TUBERCULATI

1534. LICHEN cinereus.

Lichen leprosus tuberculis nigris albo-marginatis. LINN. *man. p.* 132.

Loc. In montibus, & collibus frequens.

1535. LICHEN scriprus.

Lichen leprosus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus. LINN. *spec. p.* 1606.

Lichen de rimis efflorescens, bivalvis, atque characteristicus. HALL. *hist. tom. 3. n.* 2079.

Lichen cinereo-albidus, lineolis characteriformibus, divaricatis. NECKER. *Meth. musc. p.*

45. *n.* 2.

Lichen crustaceus, tuberculis sessilibus in lineas ordinatis. SCOP. *Fl. Carn. p.* 77. *n.* 9. *ed. 2. n.* 1367.

Lichenoides crusta tenuissima, peregrinis veluti literis inscripta. DILL. *hist. musc. 125. tab. 18. f.* 1.

Loc. In corticibus arborum vulgaris.

1536. LICHEN geographicus.

Lichen leprosus flavescens, lineolis nigris mappam referens. LINN. *spec. p.* 1607.

Lichen crusta inseparabili flava, scutellis nigris confluentibus. HALL. *hist. tom. 3. n.* 2063.

Lichen flavicundus mappiformis, lineolis ramosis, punctis atris intermixtis. NECKER.

Meth. musc. p. 46. *n.* 2.

Lichen crustaceus saxatilis luteus, lineis nigris variis. MICH. *gen.* 97.

Lichenoides nigro-flavum, tabulae geographicae insar pictum. DILL. *hist. musc. 126. tab. 18. f.* 5.

Loc. Frequens in saxis.

1537. LICHEN cruentus WEB. *Spicil. n.* 232.

Lichen crustaceus tartareus glaucus, sculis difformibus planis ruberrimis. HALL. *hist. tom. 3. n.* 2050.

Lichen crustaceus, verrucosus cinereus, scutellis rubris. HALL. *Jen. p.* 379.

Loc. Saxis, & rupibus innascitur.

1538. LICHEN rugosus.

Lichen leprosus albicans, lineolis simplicibus, punctisque nigris confertis. LINN. *spec. p.* 1607.

Lichen subrubellus, minimus, sculis in saxum immersis. HALL. *hist. tom. 3. n.* 2077.

Lichen albidus: punctis, lineolisque aggregatis atris. NECKER. *Meth. musc. p.* 46. *n.* 3.

Lichenoides punctatum, & rugosum nigrum. DILL. *hist. musc. 125. tab. 18. f.* 2.

Loc. In corticibus Fagi frequens.

1539. LICHEN cinereo-fuscus WEB. *Spicil. n.* 244.

Lichen crusta tenuissima cinerea, scutellis fuscis. HALL. *hist. tom. 3. n.* 2070.

Lichenoides leprosum tuberculis fuscis, & ferrugineis. DILL. *hist. musc. p.* 126. *tab. 18. fig. 4.*

Loc. Cortices arborum inhabitat in sylvis.

1540. LICHEN Elveloides WEB. *Spicil. n.* 243.

Lichen crusta tartarea verrucosa cinerea, scutellis carneis planissimis. HALL. *hist. tom. 3. n.* 2044.

Lichen crustaceus alpinus, lignis putridis adnascens, glaucus, receptaculis florum carneis, & immixtis. MICH. *gen. p.* 98. *n.* 38.

Loc. Corticibus arborum demortuarum innascitur locis montanis, & subalpinis.

2541. LICHEN Fagineus.

Lichen leprosus albus, tuberculis albis farinaceis. LINN. spec. p. 1608.

Lichen verrucosus crustaceus, albus, orbiculis villosis concoloribus. HALL. hist. tom. 3. n. 2086.

Lichen albicans, scutellis concoloribus difformibus. NECKER. Meth. musc. p. 50. n. 10.

Lichen crustaceus arboribus adnascens farinaceus albus, superficie in acetabulis pulverulentis efflorescente. MICH. gen. 99.

Lichenoides candidum, & farinaceum, scutellis fere planis. DILL. hist. musc. 131. tab. 18. f. 11.

Lichen crustaceus albus, tuberculis sessilibus farinaceis. SCOP. Fl. Carn. p. 79. n. 11. ed. 2. n. 1371.

Loc. Ad rimas arborum passim locis montanis.

2542. LICHEN Carpineus.

Lichen leprosus cinereus, tuberculis albidis rugosis. LINN. spec. p. 1608.

Loc. Habitat in Carpino.

2543. LICHEN ericetorum.

Lichen leprosus candidus tuberculis incarnatis. LINN. spec. p. 1608.

Lichen crusta tenace verrucosa albida, fungis incarnatis. HALL. hist. tom. 3. n. 2042.

Lichen albidus tuberculis plano-convexis sessilibus, stipatisve. NECKER. Meth. musc. p. 49.

Lichen crustaceus albicans, tuberculis stipticis, carneis. SCOP. Fl. Carn. p. 163. n. 8. ed. 2. n. 1363.

Lichen crustaceus terrestris, crusta granulosa ex albo subcinerea, receptaculis florum rotundis, carneis pediculo insidentibus. MICH. p. 100. tab. 50.

Coralloides fungiforme carneum, basi lignosa. DILL. hist. p. 76. tab. 14. f. 1.

Loc. Frequens locis udis, & sterilibus prope San. Pancrazio, & loco dicto la Caccia.

LEPROSI SCUTELLATI

2544. LICHEN candelarius.

Lichen crustaceus flavus, scutellis luteis. LINN. spec. p. 1607.

Lichen fronde laciniata, rotunde lobata, flava concolore. HALL. hist. tom. 3. n. 2023.

Lichen (fulvus) fronde subrotunda, germinante asperiuscula primordialibus nudis, crustaceo-pulverulentis. NECKER. Meth. musc. p. 51. n. 12.

Lichen crustaceus saxatilis crusta tenuiore flava, receptaculis florum saturo-aureis. MICH. gen. 97.

Lichen crustaceus flavus, scutellis sessilibus planis. SCOP. Fl. Carn. p. 81. n. 16. ed. 2. n. 1378.

Lichenoides crustosum orbiculare incanum. DILL. hist. musc. p. 236. tab. 18. f. 18.

Loc. Frequens in muris, & rupibus.

2545. LICHEN tartareus.

Lichen crustaceus ex albidio-virescens scutellis flavescenibus, margine albo. LINN. spec. p. 1608.

Lichenoides tartareum farinaceum, scutellarum umbone fusco. DILL. hist. musc. 132. tab. 18. f. 12.

Lichen crustaceus saxatilis farinaceus verrucosus candidus omnium crassissimus, receptaculis florum nigricantibus. MICH. gen. 96. tab. 52. f. 6.

Loc. Frequens in rupibus ad montium radices.

2546. LICHEN pallescens.

Lichen crustaceus albicans, scutellis pallidis. LINN. spec. p. 1608.

Lichen fronde laciniata, appressa cervina concolore. HALL. hist. tom. 3. p. 93. n. 2024.

Lichen fronde germinante suborbiculari, scutellifera, difformi, primordialibus nudis granulosis viridiusculis. NECKER. Meth. musc. p. 54. n. 15.

Lichen pulmonarius saxatilis, farinaceus glauco virescens angustioribus segmentis, receptaculis florum griseis. MICH. obs. 30. tab. 51. f. 4.

Lichenoides crustosum orbiculare incanum. DILL. hist. musc. 135. tab. 18. f. 17.

Loc. In corticibus arborum locis subalpinis.

1347. LICHEN subfuscus.

Lichen crustaceus albicans scutellis nigris, junioribus urceolatis covis. LINN. syst. 12. p. 712.

Lichen crassa tenax, verrucosa, cinereo, scutellis rufis marginatis. HALL. hist. tom. 3. n. 2049.

Lichen rugosus subcinereus, scutellis subfuscis, margine crenulatis. NECKER. Meth. musc. p. 53. n. 14.

Lichen crustaceus arboribus adnascens, ex cinereo-albicans, receptaculis florum rubris subfuscis, limba albo crenato. MICH. gen. 97.

Lichen crustaceus, verrucosus albicans, scutellis subfuscis, sessilibus planis, margine cinereis, subcrenatis. SCOP. Fl. Carn. p. 82. n. 16. ed. 2. n. 1377.

Lichenoides crustaceum, & leprosum, scutellis subfuscis. DILL. hist. musc. 134. tab. 18. fig. 16.

Loc. In rupibus, & corticibus arborum non infrequens, locis montanis.

IMBRICATI

1348. LICHEN centrifugus.

Lichen imbricatus, foliolis multifidis, obsolete laevibus, albidis centrifugis, scutellis rufis. LINN. spec. p. 1629.

Lichen fronde profunde laciniata, semipinnata, rotunde lobata, crassa villosa. HALL. hist. tom. 3. n. 2015.

Lichen fronde germinante pulverulenta, subrotunda, subius villosa-atra, frondulis interioribus centrifugis. NECKER. Meth. musc. p. 99. n. 67.

Lichen foliis planis multifidis obtusis, laciniis linearibus, calycibus concavis. LINN. Flor. Lapon. 448. tab. 11. f. 2.

Lichen pulmonarius saxatilis, tenuiter laciniatus, elegantis sulphurei coloris. BUXB. Cent. 11. tab. 7. f. 3.

Lichenoides imbricatum viridans, scutellis badiis. DILL. hist. musc. 180. tab. 24. f. 75.

Loc. In rupibus locis alpinis, & subalpinis.

1349. LICHEN saxatilis.

Lichen imbricatus, foliolis sinuatis scabris, lacunatis, scutellis badiis. LINN. spec. p. 1609.

Lichen subviridis fronde semipinnata, rotunde lobata, lineis pulverulentis reticulata inferne scabra carbonario. HALL. hist. tom. 3. n. 2211.

Lichen saxatilis fronde lacunata laevi scutellifera, germinante aperienscula, primordiis aperiensculis. NECKER. Meth. musc. p. 90. n. 59.

Lichen pulmonarius foliis eleganter divisis, inferne nigerrimis, cirrhorisque superne lacunatis, glauco cinereis. MICH. gen. 92. tab. 49. f. 1.

Lichen foliaceus, repens, reticuloso-lacunosus, inferne villosus, ater, scutellis rubris. SCOP. Fl. Carn. p. 104. n. 37. ed. 2. n. 1396.

Lichenoides vulgissimum cinereo-glauco lacunosum, & cirrhatum. DILL. hist. musc. 188. tab. 24. f. 83.

Loc. Passim in corticibus arborum.

1350. LICHEN pullus.

Lichen fronde semipinnato, rotunde lobata olivacea, scutellis laevibus. HALL. hist. tom. 3. n. 2013.

Lichen fronde laevi scutellifera, germinante distorta, primordiis granulosis. NECKER. Meth. p. 94. n. 63.

Lichen pulmonarius saxatilis, subius nigricans, desuper olivae candidae coloris, receptaculis florum cancellatis. MICH. gen. p. 89. O. XIX. tab. 51.

Lichen imbricatus, foliolis lobatis olivaceis, scutellis integerrimis. SCHREB. Spicil. p. 131. n. 1227.

Lichenoides olivaceum scutellis laevibus. DILL. hist. p. 182. tab. 24. f. 77. A. B. C.

Loc. Locis montanis arborum cortices inhabitat.

ALLIOTI Fl. Pedem. Tom. II.

LIII

2551. LICHEN olivaceus.

Lichen imbricatus, foliolis lobatis nitidis lividis. LINN. spec. p. 1610.

Lichen fronde semipinnata rotunde lobata, olivacea pulla, scutellis crenatis. HALL. hist. tom. 3. n. 2014.

Lichen olivaceus fronde supra nitida scutellifera, margine scutellarum crenato. NECKER. Meth. musc. p. 93. n. 61.

Lichen foliaceus, repens, lobatus, nitidus, superne lividus, verrucosus, inferne-fuscus. SCOP. Fl. Carn. p. 106. n. 41.

Lichenoides olivaceum, scutellis amplioribus verrucosis. DILL. hist. musc. 184. tab. 24. fig. 78.

Loc. In rupibus, & corticibus arborum.

2552. LICHEN parietinus.

Lichen imbricatus foliis crispis fulvis, pelvis concoloribus fulvis. LINN. spec. p. 1610.

Lichen fronde rugosa, rotunde lobata, flava concolore. HALL. hist. 3. p. 93. n. 2015.

Lichenoides vulgare sinuosum foliis, & scutellis luteis. DILL. hist. musc. 180. tab. 24. fig. 76.

Loc. In muris, & rupibus.

2553. LICHEN physodes.

Lichen imbricatus, laciniis obtusis subinflatis. LINN. spec. p. 1610.

Lichen foliaceus subdepressus laevis, laciniis integerrimis truncatis, subus concavis locunosis atris. LINN. Fl. Svec. 951. 1081.

Lichen fronde profunde laciniata, cava, cornibus pulverulentis. HALL. hist. tom. 3. n. 2018.

Lichen fronde scutellifera laevi, frondulis subbulosis, apice dilatiusculis, fariniferis. NECKER. Meth. musc. p. 92. n. 60.

Lichen crustae nudo modo arboribus adnascens, tenuiter divisus. BUXE. Cent. 3. p. 272. tab. 14. f. 1.

Lichen foliaceus, laciniatus, glaber, laciniis tubulosis, obtusis, clausis. SCOP. Fl. Carn. p. 109. n. 50. ed. 2. n. 1405.

Lichen pulmonarius arboribus adnascens: desuper cinereus, subus anthracinus: segmentis teretibus tubulosis. MICH. gen. 91. tab. 50. f. 1. 2.

Lichenoides ceratophyllum obtusius, & minus ramosum. DILL. hist. musc. 154. tab. 20. fig. 49.

Loc. Locis montanis ad cortices arborum inhabitat.

2554. LICHEN tenellus.

Lichen fronde profunde laciniata, semisubulosa ciliata. HALL. hist. n. 2019.

Lichen foliaceus, laciniatus, albus, laciniis suberectis, obtusis pilosis, scutellis sessilibus. SCOP. Fl. Carn. p. 110. n. 51. ed. 2. n. 1406.

Lichenoides hispidum-minus, & tenerius, scutellis nigris. DILL. hist. musc. p. 152. tab. 20. f. 46.

Lichen pulmonarius minor &c. MICH. gen. plant. p. 93.

Lichen cinereus minor, marginibus pilosis. VAILL. paris. tab. 20. f. 5.

Loc. Passim in sylvis montanis.

2555. LICHEN stellatus.

Lichen imbricatus: foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis. LINN. spec. p. 1611.

Lichen fronde cinerea, profundius divisa, laciniata, obtuse lobata, scutellis glaucis nigrescentibus. HALL. hist. tom. 3. n. 2017.

Lichen fronde cinerascens, lineari-multifida, scutellis fuscis. NECKER. Meth. musc. p. 89. n. 58.

Lichen foliaceus, repens, coriaceus, crispus, scutellis atris. SCOP. Fl. Carn. p. 107. n. 45.

Lichen pulmonarius vulgarissimus, superne albo-cinereus, inferne nigricans, segmentis angustis, receptaculis nigricantibus. MICH. gen. 91. tab. 43. f. 2.

Lichenoides cinereum, segmentis argutis stellatis, scutellis nigris. DILL. hist. musc. 176. tab. 24. f. 70.

Loc. Frequenter ramos arborum tegit in sylvis.

FOLIACEI

2556. LICHEN ciliaris.

Lichen foliaceus erectiusculus, laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. LINN. spec. p. 1611. HUDS. Fl. Angl. p. 448.

Lichen carniculatus planus, ramulis capillaribus, scutellis petiolatis. HALL. hist. tom. 3. n. 1980.

Lichen fronde erectiuscula, laciniis linearibus ciliatis, scutellis concaviusculis nigris sulcatis. NECKER. Meth. musc. p. 101. n. 71.

Lichen foliaceus, laciniatus, cinereus, laciniis erectiusculis acutis pilosis, scutellis pedunculatis. SCOP. Fl. Carn. p. 110. n. 52. ed. 2. n. 1388.

Lichenoides hispidum majus, & rigidius scutellis nigris. DILL. hist. musc. 150. tab. 20. f. 45.

Lichen cinereus arboreus, marginibus fimbriatis. TOURN. inst. p. 550. tab. 325. f. 5.

VAILL. paris. tab. 20. f. 4. MICH. gen. plant. p. 9.

Loc. Vulgatissimus in sylvis montanis, arboribusque innascitur.

2557. LICHEN islandicus.

Lichen foliaceus adscendens laciniatus, marginibus elevatis ciliatis. LINN. spec. p. 1611. HUDS. Fl. Angl. p. 448. n. 32.

Lichen fronde convexa ciliata pusillata, obtuse ramosa, utrinque laevi, ramulis brevissime bicornibus. HALL. hist. tom. 3. n. 1978.

Lichen fronde erectiuscula, laxa, margine ciliata, scutellis subrotundis terminalibus plants. NECKER. Meth. musc. p. 108. n. 79.

Lichen pulmonarius minor &c. MICH. p. 85. tab. 44. f. 4.

Lichen terrestris foliis eryngii. BUXB. cent. 2. p. 11. tab. 6. f. 1. 2.

Lichenoides rigidum, eryngii folia referens. DILL. hist. musc. p. 209. tab. 128. f. 111.

Off. Muscus cumatilis, sive islandicus.

Loc. Terrae, & lapidibus innascitur frequentissimus in sylvis montanis, maximeque subalpinis, neque alpinis locis desideratur.

U^{sz}. Multiplex est apud Septentrionales LICHENS islandici usus. Eo, si recens fuerit, decocto alvum ducunt, quam vim purgantem tribuant acribus quibusdam particulis, quae per exsiccationem dissipantur. Siccatus autem per levem torrefactionem, aut in aqua macerationem his acribus particulis, atque etiam majori amaritie orbat. Tunc ex hac planta in pulverem reducta cum addita farina frumenti, nutrirem panem componant. Eadem lacti incocta, explicita gelatina, pulmenti speciem constituit, quod non modo nutrit, verum etiam iis, qui phthisi, aut macie conficiuntur, multum prodesse dicitur.

2558. LICHEN nivalis.

Lichen foliaceus adscendens laciniatus crispus glaber lacunosus albus, margine elevatus. LINN. spec. p. 1612.

Lichen convexa concavus, lacunatus, & glaber, ramis crispatis, subluteis. HALL. hist. tom. 3. n. 1977.

Lichen nivalis fronde laciniata glabra, erecta nitida, punctis marginalibus obscuris. NECKER. Meth. musc. p. 103. n. 72.

Lichen candidus. LAM. Fl. Franc. tab. 1. p. 81.

Lichenoides lacunosum candidum glabrum, endiviae erispae facie. DILL. hist. musc. 162. tab. 21. f. 56.

Loc. Ubique frequens in summis rupibus alpium.

2559. LICHEN pulmonarius.

Lichen foliaceus laciniatus obsusus glaber, supra lacunosus, subtus tomentosus. LINN. spec. p. 1612.

Lichen lacunosus inferne gibbosus, reticulo farinato, scutellis lateralibus. HALL. hist. tom. 3. n. 1986.

Lichen fronde obtusa, glabra, supra locunoso-reticulata, subius tomentosa. NECKER.
Meth. musc. p. 108. n. 78.

Lichen foliaceus, laciniatus, repens, supra reticulato-lacunosus, scutellis sparsis. SCOP.
Fl. Carn. p. 101. n. 32. ed. 2. n. 1392.

Lichenoides pulmonarius reticulatum vulgare, marginibus petiiferis. DILL. hist. musc. p. 112. tab. 29. f. 113.

Muscus pulmonarius. BAUH. pin. 361.

Pulmonaria. MATTH.

Loc. In sylvis umbris, arboribus innascitur, praesertim quercui, & fago.

VIR. Ab usibus, quos dat in pulmonum morbis, *pulmonarius* appellatus est hic LICHEN.

In haemophoe, nimio mensium fluxu, destillatione ad pecus continenda, atque in ipsa phitisi multis laudibus elatus est. Non est certe contemnendus, cum vere adstringentes vires habeat cum aliqua abstergente proprietate conjunctas: aliquid etiam glutinosi tenet. Dari plerumque solet ex aqua decoctus a drachmis duabus ad unciam semis; majoti autem aestimatione habetur, qui quercuum corticibus innascitur.

2560. LICHEN furfuraceus.

Lichen foliaceus decumbens furfuraceus, laciniis acutis, subius lacunosus aëris. LINN.
spec. p. 1612. HUDS. Fl. Angl. 430.

Lichen cornubus planiusculis acutis, superne farinosus, inferne aëris, & reticulatis. HALL.
hist. tom. 3. n. 1976.

Lichen fronde ramosissimo, superne cinerea, subvillosa, inferne nigra, ramulis acutis. NECKER. Meth. musc. p. 107. n. 77.

Lichenoides cornuum amarum desuper cinereum, inferne nigrum. DILL. hist. musc. p. 117. tab. 21. f. 52.

Muscus amarus abanthii folio. BAUH. hist. III. p. 764.

Lichen arboreus, cornua cervi referens, subius ambracinus, desuper cinereus, receptaculis florum ampliusculis intus fuscis. MICH. p. 76. tab. 38. f. 1.

Lichen abanthifolius. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 82.

Loc. In alpium sylvis non infrequens est, arboribusque innascitur.

2561. LICHEN farinaceus.

Lichen foliaceus erectus, compressus, ramosus, verrucis marginalibus farinosis. LINN.
syst. 12. p. 711.

Lichen lacunosus complanatus ramis acutissimis, orbiculis farinosis marginalibus, frequentissimus. HALL. hist. tom. 3. n. 1981.

Lichen fronde lineari ramosa, laterali verrucosa, verrucis planis farinosis. NECKER.
Meth. musc. p. 104. n. 74.

Lichen rostratus foemina. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 378.

Lichen foliaceus erectus, laciniatus, laciniis acutis rugosis rigidis, verrucis lateralibus. SCOP. Fl. Carn. p. 97. n. 27.

Lichenoides segmentis angustioribus ad margines verrucosis, & pulverulentis. DILL. hist. musc. p. 172. tab. 23. f. 63.

Lichen cinereus angustior, sculis in marginibus segmentarum. VAILL. poris. 115. tab. 20. f. 13. 14. 15. MICH. gen. plant. p. 75. n. 4.

Loc. In sylvis montanis, & fraxinorum trunco saepius innascitur.

2562. LICHEN calicaris.

Lichen foliaceus erectus linearis ramosus lacunosus convexus mucronatus. LINN. spec. p. 1613. HUDS. Fl. Angl. 431.

Lichen utrinque locunatus, complanatus farinosus, & scutellifer. HALL. hist. tom. 3. n. 1983.

Lichen fronde cartilaginea glabra ramoso erecto, scutellis appendiculatis terminalibus. NECKER. Meth. musc. p. 106. n. 76.

Lichen rostratus mar. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 376. n. 382.

Lichen foliaceus, erectus, laciniatus, laciniis linearibus, acutis rigidis, scutellis terminalibus. SCOP. Fl. Carn. p. 95. n. 34.

Lichenoides caralliforme rostratum, & canaliculatum. DILL. hist. musc. p. 170. tab. 23. fig. 62. A. B. C.

Lichen cinereus, laeifolius, ramosus. VAILL. paris. p. 115. tab. 20. f. 6. MICH. gen. plant. p. 75. n. 3.

Loc. In sylvis vallis Segusinae, arboribusque insidet.

1563. LICHEN fraxineus.

Lichen foliaceus erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunosus glaber, scutellis subpedunculatis. LINN. spec. p. 1614. HUDS. Fl. Angl. p. 451.

Lichen urinque lacunosus, fronde latissima, scutellis uberrimis. HALL. hist. tam. 3. n. 1985.

Lichen foliaceus erectus, laciniatus, laciniis lanceolatis, obtusis, rugosis, rigidis, scutellis subsessilibus confertis sparsis. SCOP. Fl. Carn. p. 96. n. 25. ed. 2. n. 1383.

Lichen pulmonarius, cinereus mollior in amplis laciniis divisus. TOURN. inst. 549. tab. 325. f. A. B.

Lichenoides longifolium rugorum rigidum. DILL. hist. musc. p. 165. tab. 22. f. 59.

Lichen pulmonarius rufescens, durior, in amplis laciniis divisus. MICH. gen. plant. p. 74. tab. 36. f. 1.

Loc. Frequentissimus locis montanis in sylvis, atque corticibus arborum innascitur.

1564. LICHEN prunastri.

Lichen foliaceus erectusculus lacunosus subtus tomentosus albus. LINN. spec. p. 1614.

Lichen complanatus urinque lacunosus undique farinosus. HALL. hist. tam. 3. n. 1984.

Lichen fronde verrucifera molliusecula, tomentosa, scutellifera, cartilaginea, glaberrima, scutellis terminalibus urinque planis. NECKER. Meth. musc. p. 103. n. 73.

Lichen foliaceus suberectus laciniatus, laciniis furfuraceis subtus lacunosus. SCOP. Fl. Carn. 97. n. 28. ed. 2. n. 1384.

Lichen pulmonarius mollior dichotomus, superne cinereus, inferne albus, receptaculis florum interna parte ferrugineis. MICH. p. 75. tab. 36. f. 13.

Lichenoides cornutum bronchiale molle subtus incanum. DILL. hist. musc. p. 160. tab. 21. f. 55.

Muscus arboreus ramosus. BAUH. hist. III. p. 764.

Loc. Vulgare est in corticibus arborum emortuarum.

1565. LICHEN capreatus.

Lichen pallide viridis, rugosus, margine undulatus. LINN. spec. p. 1614. HUDS. Fl. Angl. p. 452.

Lichen fronde rotunde lobata, rugosa, inferne atra, & aspera. HALL. hist. tam. 3. p. 2005.

Lichen fronde juniore supra rugosiuscula, germinante pulverulenta, frondulis extimis laevibus, laevioribus obtusis. NECKER. Meth. musc. p. 95. n. 64.

Lichen foliaceus, repens lobatus, supra luteo-virescent, infra laevis, ater, scutellis verrucosis, sessilibus umbilicatis rubris. SCOP. Fl. Carn. p. 103. n. 34. ed. 2. n. 1394.

Lichenoides capreatum rosaceae expansum e sulphureo virens. DILL. hist. musc. p. 193. tab. 25. f. 97.

Lichen pulmonarius saxii, & arbaribus adnascens, major, inferne nigricans, superne ex sulphureo cinereus, receptaculis florum amplioribus, interne sordide, & obsolete viridibus. MICH. gen. plant. p. 89. tab. 48. f. 1.

Loc. Locis montanis, & umbrosis, tum in corticibus arborum, tum in rupibus frequens.

1566. LICHEN glaucus.

Lichen foliaceus depressus lobatus glaber, margine crispo forinaceo. LINN. spec. p. 1615.

Lichen fronde laciniata, nitido, margine crispo-farinosa, subtus atra, punctis scutelliformibus, brunneis. NECKER. Meth. musc. p. 100. n. 69.

Lichen foliaceus repens lobatus, supra cinereus, subtus ater, marginibus verrucosis. SCOP. Fl. Carn. 1. p. 104. n. 35. ed. 2. n. 1395.

Lichenoides endiviae foliis crispis splendens, subtus nigricantibus. DILL. hist. musc. p. 192. tab. 25. f. 96.

ALLIONI Flor. Pedem. Tom. II.

M m m m

Lichen pulmonarius saxatilis, cinereus, minor, umbilicis nigricantibus. VAILL. bot. tab. 21. f. 12.

Loc. In sylvis etiam montanis non infrequenter provenit.

1567. LICHEN caninus.

Lichen coriaceus, repens, lobatus, obtusus, planus, subtus venosus, villosus, pelis marginali adscendens. LINN. syst. 12. p. 712.

Lichen fronde subrotunde lobata, inferne reticulata, pelis convexo-concavis. HALL. hist. tom. 3. n. 1988.

Lichen fronde simplici obtusa, sinuato-lobata, subtus venoso-villosa, pelis ovatis adscendentibus. NECKER. Meth. musc. p. 79. n. 44.

Lichen foliaceus, repens, subtus reticulato-venosus, pelis marginalibus suberectis. SCOP. Fl. Carn. p. 99. n. 30. ed. 2. n. 1389.

Lichenoides digitatum cinereum, lactucae foliis sinuosis. DILL. hist. musc. 100. tab. 17. fig. 102.

Lichen pulmonarius, saxatilis, digitatus. VAILL. paris. tab. 21. f. 16.

Off. Lichen cinereus terrestris.

Loc. In sylvis sterilibus montanis frequens, & rupibus, terraeque innascitur.

VIR. Magnam famam sibi olim comparavit hic LICHEN propter vires antilyscas, ortumque dedit pulveri antilyscico Londinensi. Nemo autem in praesentiarum est, qui huic plantae credat ad tanti mali curationem. Vim habet abstergentem, & urinam ciemem. In pulverem tedactus dari solet a drachma semisse ad drachmam unam.

1568. LICHEN aphosus.

Lichen coriaceus, repens, lobatus, obtusus, planus, verrucis sparsis, pelis marginali adscendens. LINN. syst. 12. p. 712.

Lichen fronde obtuse lobata, superne verrucosa, inferne villosa. HALL. hist. tom. 3. n. 1992.

Lichen fronde lobata repente, supra verrucosa, pelis oblongis, marginalibus adscendentibus. NECKER. Meth. musc. p. 80. n. 46.

Lichenoides digitatum laete virens, verrucis nigris notatum. DILL. hist. musc. p. 107. tab. 18. f. 106.

Lichen pulmonarius maximus, verrucosus, superne cinereo-virescens, inferne obscurus, receptaculis florum rubris, & circinnatis. MICH. gen. pl. p. 85.

Muscus pulmonarius, corpusculis fuscis papillatus. LOESL. p. 172. n. 474.

Loc. Habitat in sylvis abiegnis; inter Braman, & Modane legi.

1569. LICHEN saccatus.

Lichen foliaceus repens subrotundus, pelis depressis subtus saccatis. LINN. spec. p. 1616.

Lichen fronde coriacea, rotunde lobata, scutellis immersis. HALL. hist. tom. 3. n. 1993.

Lichen foliaceus, repens lobatus, glauco virescens, scutellis immersis, fuscis. SCOP. Fl. Carn. p. 109. n. 49. ed. 2. n. 1404.

Lichenoides lichenis facie, pelis acetabulis immersis. DILL. hist. musc. p. 121. tab. 30. f. 121.

Lichen pulmonarius alpinus terrestris glauco-virescens receptaculis florum fuscis. MICH. gen. plant. p. 95. tab. 52.

Loc. Rupes alpium editiorum inhabitat.

UMBILICATI SQUALENTES QUASI FULIGINE

1570. LICHEN miniatus.

Lichen umbilicatus gibbus punctatus, subtus fulvus. LINN. spec. p. 1617.

Lichen fronde imbricata, rotunde lobata, cinerea punctata, inferne ochrea subaspera. HALL. hist. tom. 3. n. 1999.

Lichen miniatus fronde complicata lobata supra punctata. NECKER. Meth. musc. p. 76. n. 40.

Lichenoides coriaceum nebulosum cinereum punctatum subtus fulvum. DILL. hist. musc. 123. tab. 30. f. 127.

Loc. In rupibus alpium locis umbris passim.

2571. LICHEN pustulatus.

Lichen foliaceus umbilicatus subius lacunosus. LINN. spec. p. 1617.

Lichen fronde cinerea inferne lacunata, arbusculus superne nigris. HALL. hist. tom. 3. n. 1996.

Lichen fronde lobato fusca, subius lacunata, furfure marginali concolore. NECKER. Meth. musc. p. 75. n. 37.

Lichenoides pustulatum cinereum, & veluti ambustum. DILL. hist. musc. p. 227. tab. 30. f. 131.

Loc. In rupibus, & locis apricis montanis.

2572. LICHEN proboscideus.

Lichen umbilicatus pelvis turbinatis, truncatis perforatis. LINN. syst. 12. p. 712.

Lichen (cylindricus) foliaceus repens, farinaceus glaber, supra glaucus, infra villosus ater, marginibus elevatis pilosis. SCOP. Fl. Carn. p. 105. n. 38. ed. 2. n. 1397.

Lichenoides glaucum, foliorum laciniis crispis. DILL. hist. musc. p. 149. tab. 20. f. 42.

Loc. In sylvis abiegnis minime rarus.

2573. LICHEN deustus.

Lichen umbilicatus undique laevis. LINN. spec. p. 1618.

Lichen fronde rotunde lobata, inferne nigerrima globoso. HALL. hist. tom. 3. n. 1998.

Lichen fronde siccitate fragili laevi. NECKER. Meth. musc. p. 74. n. 36.

Lichenoides coriaceum cinereum pelvis atris compressis. DILL. hist. musc. p. 219. tab. 30. f. 117.

Lichen pulmonarius soxatilis e cinereo-fuscus minimus. VAILL. Bot. tab. 21. f. 14.

Loc. Etiam rupium locis apricis indigenus est.

2574. LICHEN polyrhizos.

Lichen umbilicatus polyphyllus utrinque laevis polyrhizos. LINN. syst. 12. p. 712.

Lichen fronde imbricata subrotunda punctata inferne villosa, atris acutellis. HALL. hist. tom. 3. n. 2000.

Lichen polyrhizos frondalis superne lacunatis, subius villosis. NECKER. Meth. musc. p. 77. n. 41.

Lichenoides pullum superne glabrum, inferne nigrum, & cirrhosum. DILL. hist. musc. 226. tab. 30. f. 130.

Loc. Ad rupes supra la Ferrière.

SCYPHIFERI

2575. LICHEN cocciferus.

Lichen scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. LINN. spec. p. 1618. HUDS. Fl. Angl. p. 455.

Lichen scyphiger, infundibulorum fungulis coccineis. HALL. hist. tom. 3. n. 1918.

Lichen stipite cylindrico, scyphifero, scyphis integerrimis. NECKER. Meth. musc. p. 57. n. 18.

Lichen (Scypho coccifero) coralloides, coule simplici, pyxidato: marginibus tuberculosis, tuberculis coccineis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 372.

Coralloides scyphiforme, tuberculis coccineis. DILL. hist. musc. p. 82. tab. 14. fig. 7. F. G. M.

Lichen pyxidatus oris coccineis, & tumentibus. VAILL. paris. p. 115. tab. 21. f. 4. MICH. gen. plant. p. 82. n. 3. 4. tab. 41. f. 3.

Loc. Nihil frequentius in sylvis montanis, & collinis.

2576. LICHEN cornucopioides.

Lichen scyphifer simplex folio brevior, tuberculis coccineis. LINN. spec. p. 1619.

Coralloides scyphiforme: marginibus radiatis, & foliosis. DILL. hist. musc. 85. tab. 14. fig. 9.

Loc. In sylvis sterilibus, quae ex Villa Avenatica usque ad alpes porrigitur, quandoque occurrit.

2577. LICHEN pyxidatus.

Lichen scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. LINN. spec. p. 1619.

Lichen scypho infundibuliformi simplici. HALL. hist. tom. 3. n. 1913.

Lichen scypho crenulato, tuberculis sessilibus, stipatisve. NECKER. Meth. musc. p. 55. n. 16.

Lichen coralloides caule simplici pyxidato, marginibus tuberculosis, tuberculis sessilibus fuscis. SCOP. Fl. Corn. p. 87. n. 8. ed. 2. p. 371. n. 8.

Lichen pyxidatus major. TOURN. inst. p. 549. tab. 325. Fig. D.

Coralloides scyphiforme tuberculis fuscis. DILL. hist. musc. 79. tab. 14. f. 6.

Off. Lichen pyxidatus.

Loc. Nihil frequentius in sylvis montanis, & collinis.

Vla. Similia fere cum plerisque LICHENIBUS principia possides subadstringentia, & abstergentia; aliquid etiam mucilacinoso-oleosi præbet. Commendatur in rassi convulsiva puerorum, sed vidi sæpius elusam fuisse Medici expectationem. Puto alicuius usus esse posse in tenui, & acri destillatione ad pectus vi demulcente, & subadstringente. Datur in pulverem redactus dosi drachmæ semissis ad drachmam unam, aut aqua decoquitur a drachmis duabus ad unciam semissem.

2578. LICHEN fimbriatus.

Lichen scyphifer simplex denticulatus stipite cylindrico. LINN. spec. p. 1619.

Lichen scyphiger, infundibulis serratis, coronatis. HALL. hist. 3. n. 1915.

Lichen coralloides, caule simplici pyxidato, marginibus serratis. SCOP. Fl. Corn. 2. p. 370. n. 7.

Coralloides scyphiforme gracile, marginibus serratis. DILL. hist. musc. p. 84. tab. 14. fig. 8.

Lichen pyxidatus minor. VAILL. Paris. p. 111. tab. 21. f. 6. MICH. gen. 83. tab. 41. fig. 45.

Loc. In sylvis sterilibus, truncis, & corticibus arborum innascitur.

2579. LICHEN gracilis.

Lichen scyphifer romosus denticulatus filiformis. LINN. spec. p. 1619.

Lichen infundibulis proliferis, & corniculatis erectis. HALL. hist. 3. n. 1946.

Lichen stipite scyphifero, filiformi, simplici, romosoque: scyphis denticulatis. NECKER. Meth. musc. p. 56. n. 17.

Coralloides scyphiforme serratum elatius, coulibus gracilibus glabris. DILL. hist. musc. p. 88. tab. 14. f. 13.

Lichen pyxidatus, & corniculatus romosus alpinus, e fusco-cinereo; pyxidulis crenatis. MICH. gen. 81. tab. 41. f. 5.

Loc. Vulgaris in sylvis sterilibus.

2580. LICHEN digitatus.

Lichen scyphifer romosissimus romis cylindricis, calycibus integris nodosis. LINN. spec. p. 1620.

Lichen infundibulis palmatis, singulis coccineis. HALL. hist. 3. n. 1939.

Lichen caule inordinato ramoso, ramis in calyces turbinatos margine cornosos desinentibus. LINN. Fl. Lapp. 436.

Lichen stipite crustaceo, ramoso, ramulis terminalibus palmatis, tuberculatisque. NECKER. Meth. musc. p. 59. n. 20.

Lichen coralloides caule ramoso, ramis in tuberculo coccinea desinentibus. SCOP. Fl. Corn. 1. p. 92.

Coralloides ramulosum, tuberculis coccineis. DILL. hist. musc. p. 96. tab. 15. f. 19.

Loc. Similibus locis adinventur.

2581. LICHEN cornutus.

Lichen Scyphifer simpliciusculus subvenricosus, calycibus integris. LINN. spec. p. 1620. HUDS. Fl. Angl. 458.

Lichen cornutus subramosis acutis farinosis. HALL. hist. 3. n. 1903.

Lichen coralloides, caule subulato bifido. SCOP. Fl. Corn. 2. p. 374. n. 14. a.

Lichen stipice subnudo diffarmi subventricosus, scyphis proliferis. NECKER. Meth. musc.

p. 59. n. 19.

Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. DILL. hist. musc. p. 90. tab. 15. f. 14.

Loc. Frequens in sylvis sterilibus glareosis.

1581. LICHEN deformis.

Lichen scyphifer simpliciusculus subventricosus calycibus densotis. LINN. spec. p. 1620.

Lichen pyxidatus difformis, acetabulis cornigeris. HALL. hist. tom. 3. n. 1938.

Lichen caule simplici, apice acuto, s. calyce turbinate terminato. LINN. Fl. Lapp. 433. tab. 11. f. 3.

Lichen pyxoides ieres, acetabulis minoribus repandis. MICH. gen. p. 80. tab. 41. f. 1.

Coralloides crassius subincauum, calycibus dematis. DILL. hist. musc. 95. tab. 15. f. 18.

Loc. In montanis sylvis sterilibus.

FRUTICULOSI

1583. LICHEN rangiferinus.

Lichen fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. LINN. spec. p. 1620.

Lichen fruticosus farinosus, surculis innumeris nutantibus. HALL. hist. 3. n. 1957.

Lichen fronde tereti adula ramosissima laevi, alis perforata, ramulis nutantibus furcatis tuberculiferis. NECKER. Meth. musc. p. 88. n. 26.

Lichen coralloides caule ramoso candido &c. SCOT. Fl. Corn. 2. p. 377. n. 20.

Coralloides montanum, fruticuli specie ubique candicans. DILL. hist. musc. p. 107. tab. 16. f. 29.

Musco-fungus coralloides montanus ramosissimus cinereus vulgaris. MORIS. hist. 3. p. 633. 2. 15. tab. 7. f. 9.

Muscus coralloides, s. cornutus montanus. BAUH. pin. 361.

Muscus corallinus, s. Corollina montana. BAUH. hist. 1198.

Loc. In sylvis sterilibus alpinis, & subalpinis passim.

1584. LICHEN sylvaticus.

Lichen caule ramoso, alis perforatis, romis capitatis. LINN. spec. p. 1621. ROYEN.

Lugd. 511.

Coralloides fruticuli specie candicans corniculis rufescentibus. DILL. hist. musc. p. 110. tab. 16. f. 30.

Muscus terrestris coralloides erectus corniculis rufescentibus. BAUH. pin. 361. prodr. 152.

Loc. In pascuis, & sylvis sterilibus alpium passim occurrat.

1585. LICHEN uncialis.

Lichen fruticulosus laevis perforatus, cauliculis palmatis brevissimis acutis. LINN. spec. p. 1621.

Lichen fruticulosus levis, perforatus, cauliculis palmatis brevissimis. HALL. hist. 3. n. 1960.

Lichen caule ramoso, alis perforatis, ramis brevissimis acutis. LINN. Fl. Lapp. 438. ROY. Lugd. 511.

Coralloides perforatum minus molle, & senae. DILL. hist. musc. p. 99. tab. 16. f. 22.

Loc. Locis montanis, & collinis sylvaticis.

1586. LICHEN ceranoides.

Lichen fruticosus laevis perforatus, spinosus, ramulis punctiferis. HALL. hist. tom. 3. n. 1959.

Lichen fronde tereti, aculeata, alis perforata, laevi, ventricosa, ramulis terminolibus subradiatis. NECKER. Meth. musc. p. 63. n. 21. WEB. Spicil. p. 204.

Lichen coralloides, tubulosus, albidus, major, & mollior &c. MICH. gen. p. 79. n. 6. tab. 40. f. 2.

Coralloides perforatum majus molle, & crassum. DILL. hist. musc. p. 98. tab. 16. f. 21.

Loc. In alpihus Viennensibus lectus est.

2587. LICHEN subulatus.

Lichen fruticulosus subdichotomus, ramis simplicibus subulatis. LINN. spec. p. 1621.

Lichen caule fruticoso, erecto, ramis adscendenibus dichotomis. HALL. hist. 3. n. 1959.

Lichen caule erecto dichotomo, ramis subulatis tuberculis feris. NECKER. Meth. musc. p. 63. n. 23. B.

Coralloides corniculis longioribus, & rarioribus. DILL. Musc. 102. tab. 16. f. 26.

Musci corniculatus. TABERN. ic. 809. BAUH. hist. 3. p. 767.

Loc. In pascuis, & sylvis sterilibus alpium passim occurrit, & in pascuis sylvaticis collium Taurinensium circa Superga legi.

2588. LICHEN paschalis.

Lichen fruticulosus solidus, rectius foliolis crustaceis. LINN. spec. p. 1611.

Lichen caule fruticoso fungifero, verrucis calcariis recto. HALL. hist. 3. n. 1963. Ic. Oeder. tab. 151.

Lichen fronde ramosa, crustaceis foliolis tecta, ramulis tuberculatis. NECKER. Meth. musc. p. 66. n. 24.

Lichen caule ramoso scido, foliolis crustaceis recto. LINN. Fl. Lapp. 439. ROY. Lugd. 512.

Lichen alpinus glaucus ramosus bostryoides. SCHEUCHZ. h. alp. 137. tab. 19. f. 4.

Coralloides crispum, & bostryoides alpinum. DILL. hist. musc. p. 114. tab. 17. f. 33.

Loc. Frequens in summis alpihus locis alpestribus.

2589. LICHEN Roccella.

Lichen fruticulosus, solidus, aphyllus, subramosus, tuberculis alternis. LINN. syst. 12. p. 713.

Coralloides corniculatum, fasciculare, tinctorum fusi teretis facie. DILL. musc. 120.

Musci ceranoides albus, fungosus apicibus nigris. FLUK. alm. 255. tab. 205. f. 6.

Fucus marinus Roccella tinctorum. BAUH. pin. 365.

Loc. Ad rupes maris Nicaeensis.

FILAMENTOSI

2590. LICHEN plicatus.

Lichen filamentosus pendulus ramis implexis, scutellis radiatis. LINN. spec. p. 1622.

Lichen ramis filiformibus, ramosis pendulis confertis. LINN. Fl. Lapp. 457.

Lichen fronde pendula ramosissima tereti implexa scutellis lateralibus margine radiatis. NECKER. Meth. musc. p. 71. n. 32.

Usnea vulgaris, loris longis implexis. DILL. musc. 56. tab. 11. f. 1.

Musci arboreus, Usnea officinarum. BAUH. pin. 361.

Lichen implexus. LAM. Fl. Franc. 100. 1. p. 91?

Loc. In sylvis montanis frequens.

2591. LICHEN barbatus.

Lichen filamentosus pendulus, subarticulatus, ramis patentibus. LINN. spec. p. 1622.

Lichen barbatus trunco articulo levit. HALL. hist. 100. 3. n. 1970.

Lichen barbatus fronde pendula subarticulata longissima; verrucis longissime sparsis. NECKER. Meth. musc. p. 71. n. 31.

Lichen caule tereti coriaceo, ramulis tenuissimis cinereis. ROY. Lugd. 513.

Usnea barbata, loris tenuibus fibrosis. DILL. hist. musc. 63. tab. 12. f. 6.

Musci capillaceus longissimus. BAUH. pin. 361.

Loc. Legi in alpihus Fenestrellarum.

2592. LICHEN divaricatus.

Lichen filamentosus pendulus angularis articulatus, intus tomentosus, ramis divaricatis, peltis orbiculatis sessilibus. LINN. syst. 12. p. 713.

Lichen ramosus lacunatus flaccidus. HALL. hist. 3. n. 1975.

Lichen (mollis) fronde articulata, pendula, intus tomentosa, ramis furcatis compressis; scutellis orbiculatis glabris. NECKER. Meth. p. 74. n. 35.

Lichen filamentosus pendulus, loris compressis lacunosis glabris. SCOP. Fl. Carn. p. 75. n. 6. ed. 2. p. 357. n. 1560.

Lichen longissimus ex cinereo condicans rugosus, & mollior alter. MICH. gen. plant. p. 77

Usnea mollis ramis longis compressis, DILL. hist. musc. p. 62. tab. 12. f. 5.
 Loc. In alpinis, & montibus Valsensium observavi.

1593. LICHEN jubatus.

Lichen filamentosus pendulus, axillis compressis, LINN. spec. p. 74.
Lichen barbatus pendulus, filamentis nigris prolixis, HALL. hist. 3. n. 1968.
Lichen jubatus fronde pendula ramosa, filamentis, compressis teretibusque verrucosis,
 NECKER. Meth. musc. p. 72. n. 33.
Lichen filamentosus pendulus, tuberculis lateralibus innatis, SCOP. Fl. Carn. p. 74. n. 5.
 ed. 2. n. 1362.
Lichen ramis filiformibus ramosis pendulis, alis compressis, LINN. Fl. Lapp. 456.
Usnea jubata nigricans, DILL. hist. musc. 64. tab. 12. f. 7.
 Loc. In sylvis abiegnis alpinum frigidiorum frequens.

1594. LICHEN lanatus.

Lichen filamentosus ramosissimus decumbens implicatus opacus, LINN. spec. p. 1623.
Lichen fruticosus minimus, flexuosus, cauliculis nigris copilloceis, HALL. hist. n. 1967.
Usnea lanata nigrae innat saxis adhaerens, DILL. hist. musc. 66. tab. 13. f. 8.
 Loc. Rupes alpinas frigidas inhabitat.

1595. LICHEN hirtus.

Lichen filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis, LINN. spec. p. 1623. HUDS. Fl. Angl. p. 462.
Lichen barbatus teretibus cauliculis, ramis simplicibus paralellis, HALL. hist. tom. 3. n. 1973.
Lichen fronde ramosissima laevi, verrucosave tereti, verrucis farinaceis congestis, sparsisque, NECKER. Meth. musc. p. 69. n. 28.
Usnea vulgarissima tenuior, & brevior sine orbiculis, DILL. hist. musc. p. 67. tab. 13. f. 12.
 Loc. In sylvis montanis, & subalpinis ad arbores emortuas.

1596. LICHEN vulpinus.

Lichen filamentosus ramosissimus erectus fastigiatus inaequali-angulosus, LINN. spec. p. 1623.
Lichen vulpinus fronde fastigiata erecta ramosissima luteo, NECKER. Meth. musc. p. 70. n. 30.
Usnea capillacea cirinea, fruticuli specie, DILL. hist. musc. 73. tab. 13. fig. 16.
Lichen aureus, LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 92.
 Loc. In sylvis montanis Valsensium occurrit.

1597. LICHEN floridus.

Lichen filamentosus ramosus erectus scutellis radiatis, LINN. spec. p. 1624. HUDS. Fl. Angl. p. 463. SCOP. Fl. Carn. p. 73. n. 1.
Lichen barbatus ramis teretibus, surculis paralellis simplicibus, scutellis radiatis, HALL. hist. tom. 3. n. 1972.
Musci arboreus cum orbiculis, BAUH. pin. 361.
Usnea vulgarissima tenuior, brevior cum orbiculis, DILL. hist. musc. p. 69. tab. 13. f. 13.
Lichen fronde ramosa erecta tereti solida, apice scutellifera, scutellis ciliatis, NECKER. Meth. musc. p. 1624.
 Loc. Vulgaris in sylvis montanis, & subalpinis ad arbores emortuas.

TREMELLA. LINN. gen. n. 1067. syst. n. 1206.

Fructificationes vix manifestae in corpore gelatinoso.

1598. TREMELLA juniperina.

Tremella sessilis membranacea auriformis fulva, LINN. syn. 12. p. 714.
Agaricum gelatinosum, flavo-rufum, superiore tuberculorum, HALL. hist. tom. 3. n. 2260.
Byssus gelatinosa fugax, junipero innascens, LINN. Fl. Lapp. 531.
 Loc. In corticibus Juniperi frequens est.

1599. TREMELLA nostoc.

Tremella plicata undulata. LINN. syst. 12. p. 714.

Lichen gelatinosus, plicatus, undulatus, laciniis crispatis granulosis. HALL. hist. tom. 3. n. 2041.

Tremella terrestris sinuosa pinguis, & fugax. DILL. hist. musc. 52. tab. 10. f. 14.

Linkia terrestris gelatinosa membranacea vulgarissimo. MICH. gen. 126. tab. 67. f. 1.

Loc. In pascuis, & ambulacris humidis post pluviam apparet.

1600. TREMELLA Lichenoides.

Tremella eresia plana, margine crispo lacinulato. LINN. syst. 12. p. 714.

Lichen atro-caeruleus, laciniatus, & ciliatus. HALL. hist. tom. 3. n. 2032.

Lichenoides pellucidum, endiviae foliis tenuibus crispis. DILL. hist. musc. 143. tab. 19. fig. 31.

Lichen terrestris membranaceus mollior fuscus. MICH. gen. 126. tab. 38.

Musco-fungus terrestris minor fuscus, foliis e latitudine crenatis, musco innascens. MORIS. hist. 3. p. 632. s. 15. tab. 7. f. 4.

Loc. Ad radices montium locis muscosis frigidis humidis.

1601. TREMELLA verrucosa.

Tremella tuberculosa solido rugosa. LINN. syst. 12. p. 714.

Tremella lobata, & rugosa. HALL. hist. tom. 3. n. 2127.

Lichen crispus foliaceus, gelatinosus, foliorum segmentis copilloceis, teretibus ramosis. SCOP. Fl. Carn. p. 113. n. 59. ed. 2. n. 1412.

Tremella fluvialis gelatinosa, & ueruculosa. DILL. hist. musc. 54. tab. 10. f. 6.

Linkia palustris gelatinosa, saxi adnascens, ex obscuro fulva, & concava, vesicam referens. MICH. gen. 126. tab. 67. f. 2.

Loc. Vidi in valle di Lanze ad rivulos lente decedentes supra lapides.

1602. TREMELLA purpurea.

Tremella subglobosa sessilis solitaria glabro. LINN. syst. 12. p. 714.

Sphaeria convexa miniatio hirsuta. HALL. hist. 3. n. 2189.

Lichenoides tuberculatus omoene purpureum. DILL. hist. musc. 127. tab. 18. f. 6.

Loc. Frequens in arborum ramis emortuorum.

FUCUS. LINN. gen. n. 1097. syst. n. 1205.

Masc. Vesiculæ villis intertextæ. Fem. Vesiculæ adspersæ granis immersis apice prominulis. Semina solitaria.

1603. FUCUS serratus.

Fucus fronde plana dichotoma serrato-dentata, fructificationibus terminalibus tuberculosis. LINN. syst. 12. p. 715.

Fucus fronde oblonga plana dentata, utrinque pilifera tuberculis terminalibus. NECKER. Meth. 27.

Fucus, sive Alga latifolia major dentata. MORIS. hist. 3. p. 648. s. 15. tab. 9. fig. 1. GMEL. Fuc. p. 27.

Fucus planus dichotomus serratus ad apices tuberculatus. LINN. spec. pl. 1158. Fl. Svec. 1144. HUDS. Fl. Angl. p. 466.

Loc. In mari Nicaeensi, & Unelienii.

1604. FUCUS vesiculosus.

Fucus fronde plana dichotoma integerrimo: vesiculis axillaribus geminis: terminalibus tuberculatis. LINN. syst. 12. p. 715.

Fucus fronde dichotoma integra, caule medium folium transcurrente, vesiculis verrucosis terminalibus. LINN. spec. pl. 2. p. 1626. n. 2. GMEL. Fuc. 60. HUDS. Fl. Angl. p. 466. n. 2.

Fucus fronde plana integerrima, vesiculis terminalibus verrucosis, primordialibus linearibus. NECKER. Meth. 18.

Fucus marinus, s. *Quercus maritima* vesiculas habens. BAUH. pin. 365.

Quercus marinus. LÖB. ic. 2. p. 255.

Loc. In mari Nicaeensi, & Uneliensi.

1605. *FUCUS canaliculatus*.

Fucus fronde plana dichotoma, integerrima, canaliculata lineari, fructificationibus tuberculatis bipartitis obtusis. LINN. syst. 12. p. 716. GMEL. *Fuc.* p. 73. tab. 1. o. fig. 2.
Fucus fronde ramosa, hinc canaliculata, vesiculifera: apicibus obtusis, bifidis rugatis. NECKER. Meth. 22.

Fucus Kali arabum diviura angulis ad divaricationem ratundiusculis. PLUK. alm. 160.

Fucus dichotomus, membranaceus, & viridi flavescens ceranoides, angulos ratundiusculos efformans. MORIS. oxon. p. 646. t. 15. tab. 8. f. 11.

Fucus dichotomus linearis, axillis divaricatis. LINN. spec. pl. 2. p. 1627. n. 10. HUDS. Fl. Angl. p. 468. n. 8.

Loc. Ad rupes litoris Nicaeensis.

1606. *FUCUS nodosus*.

Fucus fronde compresso dichotoma foliis distichis integerrimis, vesiculis innatis salinariis dilatatis. LINN. syst. 12. p. 716. GMEL. *Fuc.* p. 78. tab. 1. B. f. 1.

Fucus fronde compressa, vesiculis oblongis interjecta, frondulis integerrimis. NECKER. Meth. 17.

Fucus maritimus vesiculis majoribus singularibus per intervalla dispositis. MORIS. hist. 3. p. 647. t. 15. tab. 8. f. 2.

Fucus maritimus nodosus. DOD. pempt. 781.

Loc. Ad mare Nicaeense, & Uneliac.

1607. *FUCUS siliquosus*.

Fucus fronde compresso ramosa, foliis distichis alternis integerrimis, fructificationibus pedunculatis oblongis mucronatis. LINN. syst. 12. p. 716. GMEL. *Fuc.* 81. tab. 2. B. f. 1.

Fucus caule tereti ramosissimo, pedunculis alternis, vesiculis oblongis acuminatis. LINN. Fl. Lapp. 463. HUDS. Fl. Angl. p. 468. n. 11.

Fucus fronde ramosa, vesiculis oblongis siliquiformibus mucronatis, primordioliis linearisubulatis. NECKER. Meth. p. 18.

Fucus maritimus alter, tuberculis paucissimis. BAUH. pin. 365.

Fucus marinus quartus. DOD. pempt. 480.

Loc. Ad rupes litoris Nicaeensis.

1608. *FUCUS selaginoides*.

Fucus fronde filiformi ramosissima, ramis dichotomis, foliis subulatis alternis, basi vesiculosus. LINN. Mant. p. 134.

Fucus Alies marina. GMEL. *Fuc.* 83. tab. 2. a f. 1.

Fucus folliculaceus foliis abrotani. BAUH. pin. 365.

Fucus crispus loricatus nigricans. BARR. ic. 290. BOCC. mus. 7. tab. 12.

Loc. Ad litus Nicaeense, & Uneliense.

1609. *FUCUS foeniculaceus*.

Fucus fronde filiformi ramosissimo, vesiculis ovatis terminatis, foliolis multipartitis obtusis apice fructificans. LINN. syst. 12. p. 717. GMEL. *Fuc.* 86. tab. 2. a. fig. 2.

Fucus fronde ramosa caarctata vesiculis terminalibus, tuberculatis mucronatis. NECKER. Meth. mus. p. 23.

Fucus folliculaceus foliis faeniculi brevioribus. BAUH. pin. 362. n. 7.

Fucus vesiculis ovatis alternis pedunculatis terminatis, foliis linearibus. LINN. sp. pl. 2. p. 1629. n. 20.

Fucus vesiculis ovatis alternis pedunculatis, frondibus multifidis linearibus. HUDS. Fl. Angl. p. 469. n. 14.

Loc. In rupibus litoris Nicaeensis, & Uneliac.

1610. FUCUS abrotanoides.

Fucus fronde ramoso copillari multifido fasciculata, vesiculis globosis. NECKER. *Meth. musc.* p. 24.

Fucus abrotanoides vesiculis porvis rotundis ornatus. MORIS. *ox.* 3. p. 648. tab. 8. f. 17.
Loc. In mari Nicaeensi, & Uneliæ.

1611. FUCUS natans.

Fucus caule filiformi ramoso, foliis lanceolatis serratis, fructificationibus globosis pedunculatis. LINN. *syst.* 12. p. 715.

Fucus Sorgoso. GMEL. *Fuc.* p. 92.

Fucus caule tereti romosissimo, foliis lanceolato-serratis, fructificationibus globosis pedunculatis subrotatis. ROY. *Lugdb.* 513.

Fucus folliculaceus serrato folio. BAUH. *pin.* 365.

Loc. In mari Nicaeensi.

1612. FUCUS acinarius.

Fucus caule filiformi ramoso, foliis linearibus integerrimis, fructificationibus globosis pedunculatis. LINN. *syst.* 12. p. 715. GMEL. *Fuc.* p. 99.

Lenticulo morina serapionis, & ovo marino quorundam. LOB. *ic.* p. 256.

Actinoria imperoi. DONAT. *morin.* 35. tab. 4. f. 1.

Fucus folliculaceus Linariae folio. BAUH. *pin.* 365. MORIS. *hist. oxon.* p. 648. PLUK. *alm.* 161.

Loc. In mari Nicaeensi, & Uneliæ.

1613. FUCUS linearis.

Fucus dichotomus planus linearis oculus, vesiculis ovatis sparsis. HUDS. *Fl. Angl.* p. 467. n. 6.

Fucus elongatus. GMEL. *Fuc.* p. 103.

Fucus longo angusto, crassoque folio. BAUH. *pin.* 364. *prodr.* 155. n. 3.

Fucus caule lineari ophylo dichotomo. ROY. *Lugdb.* 514.

Loc. Ad rupes maris Nicaeensis.

1614. FUCUS fastigiatus.

Fucus fronde filiformi dichotoma romosissima fastigiato obtusa. LINN. *syst.* 12. p. 718.

Fucus dichotomus ramosissimus teres uniformis fastigiatus. LINN. *spec. pl.* 2. p. 1631. n. 29. GMEL. *Fuc.* 106. tab. 6. f. 1.

Fucus fronde filiformi ramosissimo dichotomo: vesiculis terminalibus primordialibus laterolibus. NECKER. *Meth.* 22.

Fucus caule lineari dichotomo. ROY. *Lugdb.* 514.

Fucus palmaris tenuis in orbem expansus, in segmenta bifido brevioro teretio divisus. MORIS. *hist.* 3. p. 649. t. 15. tab. 9. f. 9.

Loc. Ad rupes maris Nicaeensis.

1615. FUCUS rotundus.

Fucus teres subdichotomus uniformis, ramis obtusis verrucosis. HUDS. *Fl. Angl.* p. 471. n. 24. GMEL. *Fuc.* p. 110. tab. 6. f. 3.

Fucus Kali-geniculato similis, non tomen geniculatus. RAJ. *Syn.* 43.

Loc. In mari Nicaeensi, & Uneliæ.

1616. FUCUS ceranoides.

Fucus fronde plana dichotomo integerrima punctata lanceolata, fructificationibus tuberculatis bifidis terminalibus. LINN. *syst.* 12. p. 715. GMEL. *Fuc.* p. 115. tab. 7. f. 1.

Fucus fronde plana laciniato-multifida dichotoma, globulis aris laterolibus. NECKER. *Meth.* 19.

Fucus membranaceus-ceranoides varie dissectus. RAJ. *Syn.* p. 44. n. 56.

Fucus humilis dichotomus ceranoides, latioribus foliis, ut plurimum verrucosis. MORIS. *hist.* 3. p. 646. t. 15. tab. 8. f. 13.

Loc. In mari Nicaeensi.

1617. FUCUS dentatus.

Fucus frondibus membranaceis enerviis alternatim pinnatifidis, luciniis apice crosis.
LINN. mant. p. 135.

Fucus membranaceus rubens, foliis latiusculis ad extrema dentatis. MORIS. hist. 3. p. 646. t. 15. tab. 8. f. 5.

Loc. In mari Nicaeensi.

1618. FUCUS pseudoceranoides.

Fucus parvus cauliculis teretibus, summis foliis membranaceis dilatatis, & laceris. HUDS. Fl. Angl. p. 466. n. 3. B. GMEL. Fuc. p. 119. tab. 7. f. 4.

Fucus marinus ceronoides cornu cervi divisum, globulis verrucosis signatus. MORIS. hist. ox. 648. §. 8. n. 1.

Loc. Ad rupes maris Nicaeensis.

1619. FUCUS tamariscifolius.

Fucus caule tereti ramulissimo, foliis alternis subulatis, vesiculis rotundis imbricatis sessilibus axillaribus. HUDS. Fl. Angl. p. 469. n. 13.

Fucus (ericoides) fronde nodosa, ramulis imbricatis globuliferis, denticulis subulatis. NICKER. Meth. musc. p. 28.

Fucus filiformis ramosissimus hirtus. LINN. sp. pl. 1631.

Fucus Erico marina. GMEL. Fuc. p. 118. tab. 11. f. 2.

Fucus foliis Ericae, seu Tomarisci. RAJ. Syn. 49.

Fucus tamarisco similis maritima. BAUH. pin. 365.

Erico marina quibusdam. BAUH. hist. III. 799.

Loc. Ad rupes maris Nicaeensis.

1620. FUCUS muscoides.

Fucus fronde tereti ramulissima: ramis sparsis, spinis mollibus alternis. LINN. syst. 12. p. 717. GMEL. Fuc. p. 130. tab. 12.

Fucus tenuifolius foliis dentatis. MORIS. hist. 3. p. 648. t. 15. tab. 9. f. 4.

Fucus angustifolius foliis dentatis. RAJ. Syn. 45.

Hippuris setaceus. BARR. ic. 1123. n. 1.

Loc. In mari Nicaeensi, & Unelice.

1621. FUCUS Helminthochorton. DE LA TOURR. diss. helminth. p. 18.

Conferro Helminthochortos, dichotoma, unciolis, rufescens, ramis horizontalibus. SCHWEND. helminth. hist. dissert. med. Argentor. pag. 90.

Corallina minimo bifida. BARR. obs. p. 120.

Muscus coralloides, bifidus. BARR. icon. 1276. n. 3.

Loc. Lectus est in rupibus maris Nicaeensis.

VIR. Nuptae observationes magnum efficacem anthelminticum esse comprobant, ego ipse etiam utiliter dedi: dosis est a drachma semisse ad drachmam unam.

1622. FUCUS verrucosus.

Fucus filiformis teres ramosus, ramis simplicibus vesiculis rotundis laterolibus. HUDS. Fl. Angl. p. 470. n. 21. GMEL. Fuc. p. 136. tab. 14. f. 1.

Fucus marinus purpurascens parvus, coule, & ramulis, sive foliolis teretibus. RAJ. Syn. p. 50. n. 50.

Loc. Ad rupes maris Nicaeensis.

1623. FUCUS longissimus.

Fucus teres rubens minus ramosus in longum protensus. RAJ. Syn. p. 51. n. 53. GMEL. Fuc. p. 134. tab. 13.

Fucus, 1. Alga lene capillacea pallida flagellis ramosis, chordas muscas minores referentibus. MORIS. ox. 649. n. 11.

Loc. In mari Nicaeensi, & Unelice.

1624. FUCUS purpureus.

Fucus filiformis teres ramosissimus, ramis alternis, ramulis confertis fructiferis, fructibus globosis. HUDS. *Fl. Angl.* p. 471. n. 22. GMEL. *Fuc.* p. 139.

Fucus teres rubens ramosissimus. RAJ. *Syn.* p. 51. n. 52.

Loc. Ad mare Nicaense.

1625. FUCUS plicatus.

Fucus capillaris unifarmis ramosissimus implicatus subdiaphanus. HUDS. *Flor. Angl.* p. 470. n. 19. GMEL. *Fuc.* p. 142. tab. 14. f. 3.

Fucus parvus aphyllus ramosus subflavus, ramulis chordas musicas majores referentibus. MORIS. 648. §. 8. n. 2.

Fucus trichoides nostras aurei coloris, ramulorum apicibus furcatis. PLUK. *phyt.* tab. 184. fig. 3.

Alga exigua dichotoma avenocci coloris. RAJ. *Syn.* 4. 50.

Loc. Ad rupes maris Nicaensis.

1626. FUCUS corneus.

Fucus cartilagineus, caule secretiusculo, compresso ramosissimo, ramis subpinnatis, laciniis oculis fructiferis. HUDS. *Fl. Angl.* p. 474. n. 38. GMEL. *Fuc.* p. 144. tab. 14. f. 3.

Fucus flavicans teretifolius, ramulis pennatis enascentibus. RAJ. *Syn.* 50.

Loc. Ad rupes maris Nicaensis.

1627. FUCUS conservoides.

Fucus subdichotomus teres filiformis ramosissimus, ramis inaequalibus setaceis. LINN. *spec. pl.* 1629.

Fucus fronde ramosa tereti pinnata: pinnis fasciculatis setoecis. NECKER. *Mem. musc.* p. 30.

Fucus caule tereti brevissimo ramulis alternis fasciculatis brevissimis tuberculatis scabris. HUDS. *Fl. Angl.* p. 474. n. 40.

Fucus conservoides. GMEL. *Fuc.* p. 147. tab. 15. f. 2.

Loc. In mari Nicaensi, & Uneliae.

1628. FUCUS plumosus.

Fucus caule filiformi subcompresso ramoso, frondibus lanceolatis bipinnatis plumosis coloratis. LINN. *man.* p. 134.

Fucus fronde ramosa cartilaginea laciniis pinnatifidis, superioribus terminalibus tuberculosis. NECKER. *Mem. musc.* p. 30.

Fucus caule teretiuticulo compresso ramoso, ramis duplicato-pinnatis coloratis. HUDS. *Fl. Angl.* p. 473. n. 35. GMEL. *Fuc.* p. 152.

Fucoides purpureum eleganter plumosum. RAJ. *Syn.* 38. tab. 2. f. 5.

Loc. In mari Nicaensi, & Uneliae.

1629. FUCUS pinnatifidus.

Fucus frondibus planis ramosis, ramis dentato-pinnatifidis marginibus callosis. HUDS. *Fl. Angl.* p. 437. n. 32. GMEL. *fuc.* p. 156. tab. f. 3.

Fucus dealensis pedicularis rubrae folio. RAJ. *syn.* 48. n. 37.

Alga cervi cornu divisura. BAUH. *hist.* III. 797.

Loc. Ad rupes maris Nicaensis.

1630. FUCUS cartilagineus.

Fucus fronde cartilaginea compressa supradecomposita pinnata, laciniis linearibus. LINN. *syn.* 12. p. 719.

Fucus cartilagineus compressus ramosissimus, ramulis alternatim secundis fructibus globosis lateralibus. HUDS. *Fl. Angl.* p. 473. n. 34. GMEL. *fuc.* p. 153.

Frutices morini. SER. *mus.* 3. tab. 102. f. 1. 2.

Muscus morinus erectior ramulis in tenuiora, & tenuissimis copillamentis divisus. RAJ. *hist.* 79. n. 24.

Fucoides rubens varie dissectum. RAJ. syn. p. 37. n. 1.

Loc. Ad rupes maris Nicaeensis.

1631. FUCUS volubilis.

Fucus fronde plana, spirali, perfoliata, repando-dentata. LINN. syst. 12. p. 715. GMEL. *Fuc.* p. 180.

Fucus fronde spirali convoluta, margine dentata. NECKER. *Meth.* 37.

Alga spiralis maritima. BOCC. sic. 70. tab. 38. f. 2.

Loc. Ad mare Nicaeense.

1632. FUCUS spiralis.

Fucus fronde plana dichotoma integerrima punctata, inferne lineari-canalliculata, fructificationibus tuberculatis geminis. LINN. syst. 12. p. 715.

Fucus dichotomus integer caule salium percurrente, inferne nudo, vesiculis verrucosis terminalibus. HUDS. *Flor. Angl.* p. 467. n. 4.

Fucus spiralis maritimus major. RAJ. *Angl.* 3. p. 41.

Loc. Ad mare Nicaeense.

1633. FUCUS palmatus.

Fucus fronde palmata plana. LINN. syst. 12. p. 718. GMEL. *Fuc.* p. 102. tab. 30.

Fucus frondibus planis palmatis. HUDS. *Fl. Angl.* p. 472. n. 29.

Fucus, 1. *Alga Lufialia charae similis, casta carens*. BAUH. *pin.* 364.

Fucus arboreus polyschides. RAJ. *hin.* 1. p. 75.

Loc. Ad rupes maris Nicaeensis.

ULVA. LINN. *gen. n.* 1069. *syst. n.* 1206.

Fructificationes in membrana diaphana.

1634. ULVA pavonia.

Ulva plana reniformis sessilis decussatim striata. LINN. syst. 12. p. 719.

Fucus (pavonius) fronde sessili reniformi decussatim striata. LINN. *spec. ed.* 2. p. 1630. GMEL. *Fuc.* p. 169.

Fucus fronde plana reniformi decussatim striata, primordialibus simplicissimis. NECKER. *Meth.* 40.

Fucus maritimus gallapavonis pennas referens. BAUH. *prodr.* 155. MORIS. *hist.* 3. p. 645. s. 15. tab. 8. f. 7.

Alga marina gallapavonius plumas referens. BAUH. *pin.* 364.

Loc. In mari Nicaeae.

1635. ULVA umbilicalis.

Ulva plana orbicularis sessilis pelata coriacea. LINN. syst. 12. p. 719.

Fucus fronde concaviuscula pelata coriacea. NECKER. *Meth.* 39.

Fucus Tremella umbilicalis. GMEL. *Fuc.* 219.

Tremella marina umbilicata. DILL. *musc.* 45. tab. 8. f. 3.

Fucus umbilicus marinus dictus. BAUH. *pin.* 364.

Loc. Habitat ad rupes maris.

1636. ULVA intestinalis.

Ulva tubulosa simplex. LINN. syst. 12. p. 719.

Ulva tubulis cylindricis tuberosis. HALL. *hist.* n. 2128.

Conferva tubulosa simplex, primordialibus filamentosis. NECKER. *Meth.* 12.

Tremella marina tubulosa intestinalium figura. DILL. *mus.* 47. tab. 9. f. 7.

Loc. In mari Nicaeae, & Uneliae.

1637. ULVA compressa.

Ulva tubulosa ramosa compressa. LINN. syst. 12. p. 719.

Conserva simplex, ramosaque. NECKER. Meth. 13.

Tremella marina tenuissima, & compressa. DILL. musc. 48. tab. 9. f. 8.

Loc. Habitat in mari Nicaeae, & Uneliae.

1638. ULVA lactuca.

Ulva polvosa prolifera membranacea, ramentis inferne angustatis. LINN. syst. 12. p. 719.

Fucus Tremella lactuca. GMEL. Fuc. 215.

Fucus fronde imbricata, frondibus partialibus erectiusculis sinuato-lacinatis obtusis. NECKER. Meth. p. 39.

Ulva marina lactucae similis. RAJ. Angl. 3. p. 62.

Tremella marina vulgaris, lactucae similis. DILL. musc. tab. 8. f. 5.

Loc. Habitat in mari Nicaeae, & Uneliae.

1639. ULVA labyrinthiformis.

Ulva cellulis labyrinthiformibus, prominentisque clavatis. LINN. syst. 12. p. 720.

Thermopsis valvulosa erecta simplex capitulo subrotundo. VANDERL. therm. 120. tab. 2.

Loc. Habitat in thermis Vinatii, & Valderii, & gradu caloris quinquagesimo.

1640. ULVA Linza.

Ulva fronde oblonga bullata. LINN. syst. 12. p. 720.

Tremella marina fasciata. DILL. musc. 46. tab. 9. f. 6.

Fucus Linza dictus, lactucae marinae similis. BAUM. hist. III. p. 81.

Mucus lactucae marinae similis. BAUM. pin. 364.

Loc. In mari Nicaeae, & Uneliae.

CONFERRA. LINN. gen. n. 1070. syst. n. 1207.

Tabercula inaequalia in fibris capillaribus, longissimis.

1641. CONFERRA rivularis.

Conserva filamentis simplicissimis aequalibus longissimis. LINN. syst. 12. p. 720. HALL. hist. n. 2115.

Conserva capillaris simplicissima enodis. ROY. Lugd. 511.

Conserva fluvioatilis sericea vulgaris, & fluitans. DILL. hist. musc. 12. tab. 2. f. 2.

Byssus polustris confervoides non ramosa viridis, sericum referens, filamentis longis tenuissimis. MICH. gen. 210. n. 3. tab. 89. f. 7.

Loc. Secus puras lente fluentes aquas.

1642. CONFERRA fontinalis.

Conserva filamentis simplicissimis aequalibus digito brevioribus. LINN. syst. 12. p. 720.

Conserva caespitosa, filis rectis, undique divergentibus. HALL. hist. n. 2114.

Conserva minima byssi facie. DILL. hist. musc. 14. tab. 2. f. 3.

Byssus. MICH. gen. 211. n. 8. tab. 89. f. 8, & n. 14. tab. 89. f. 10. & n. 15. tab. 89. f. 11.

Loc. Ad originem fontium lente profluentium.

1643. CONFERRA bullosa.

Conserva filamentis aequalibus ramosis aëreas bullas includentibus. LINN. syst. 12. p. 720.

Conserva pilis tenerissimis, vellere gossypiaceo. HALL. hist. n. 2120.

Conserva palustris bombycina. DILL. hist. musc. 18. tab. 3. f. 11.

Alga bombycina. BAUM. pin. 363.

Loc. Frequens in aquis stagnantibus.

1644. CONFERRA foeniculacea.

Conserva filamentis aequalibus ramosissimis, ramis, ramulisque longissimis sparsis. HUDS.

Flor. Angl. p. 479.

Conserva marina foeniculacea. DILL. musc. 16. tab. 2. f. 8.

Loc. Habitat in rupibus maris Nicaeensis.

1645. CONFERVA tomentosa.

Conferva filamentis aequalibus ramosissimis, ramis simplicibus confertis fuscis. HUDS.
Flor. Angl. p. 480.

Conferva marina tomentosa, tenerior, & albicans. RAT. *Syn.* 59. DILL. *musc.* 19. tab. 3. f. 12.

Muscus maritimus gossypio similis. BAUH. *pin.* 663.

Loc. Ad litus maris Nicaeensis.

1646. CONFERVA canalicularis.

Conferva filamentis aequalibus basin versus ramosioribus. LINN. *syn.* 12. p. 720.

Conferva filamentis tenuibus ramis imbricatis fuscis. HALL. *hist. n.* 2118.

Conferva densissima congesta: filamentis basin versus ramosioribus. NECKER. *Meth.* 5.

Conferva rivulorum capillacea, densissime congestis ramulis. DILL. *musc.* 21. tab. 4. f. 15.
Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus. BAUH. *pin.* 364.

Loc. Habitat in aquaeductibus, & rivulis.

1647. CONFERVA amphibia.

Conferva filamentis aequalibus ramosis, exsiccatione coarctatis in aculeos. LINN. *syn.* 12. p. 720.

Conferva amphibia fibrillosa, & spangiosa. DILL. *musc.* 22. tab. 4. f. 17.

Loc. In fossis, locisque inundatis.

1648. CONFERVA litoralis.

Conferva filamentis aequalibus ramosissimis elongatis scabriusculis. LINN. *syn.* 12. p. 720.
Conferva maritima filiformis longissima fusca, ramis alternis simplicibus brevioribus pallidis. LINN. *Fl. Svec.* 1028.

Conferva marina capillacea longa ramosissima. DILL. *musc.* 23. tab. 4. f. 19.

Loc. Habitat in rupibus litoris Nicaeensis.

1649. CONFERVA aeruginosa.

Conferva filamentis ramosis mollibus digito brevioribus viridissimis. LINN. *syn.* 12. p. 720.

Conferva marina capillacea brevis viridissima mollis. DILL. *musc.* 23. tab. 4. f. 20.

Loc. Planis marinis litoris Nicaeensis innascitur.

1650. CONFERVA scoparia.

Conferva filamentis proliferis farigiatis hirsutis. LINN. *syn.* 12. p. 720.

Conferva filamentis fasciculato-plumosis. NECKER. *Meth.* 17.

Conferva marina pennans. DILL. *musc.* 24. tab. 4. f. 23.

Loc. Habitat in mari Nicaeensi.

1651. CONFERVA reticulata.

Conferva filamentis reticulato-condensatis. LINN. *syn.* 12. p. 720.

Conferva reticulata. HALL. *hist. tom.* 3. n. 2119. DILL. *hist. musc.* 20. tab. 4. f. 14.

Conferva reticulata crispa. PLUK. *alm.* 113. tab. 24. f. 2.

Muscus aquaticus bombycinus, retiformis. LOESEL. p. 173. ic. 54.

Loc. Paris aquis lente fluentibus innatat.

1652. CONFERVA gelatinosa.

Conferva filis ramosis moniliformibus: articulis globosis gelatinosis. LINN. *syn.* 12. p. 720.

Conferva gelatinosa globulis punctatis concatenatis. HALL. *hist. n.* 2124.

Chara (batrachosperma) caule ramoso filamentoso, ramis foliaceis capillaceis in glomeris lubricis geniculatis articulatim circa caulem dispositis. WEIS. *crypt.* 33. fig. C.

Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, major, & fusca. DILL. *musc.* 36. tab. 7. f. 42.

Conferva fontana nodosa spermatis ranarum instar lubrica, minor, & viridis. DILL. *musc.* 37. tab. 7. f. 43.

Corallina pinguis ramosa viridis. VAHL. *paris.* 40. tab. 7. f. 6.

Loc. Habitat in parvis rivulis fontium.

1653. CONFERVA corallina.

Conserva filis geniculatis dichotomis. LINN. *syn.* 12. p. 721.

Conserva (corallinoides) *ramosa articulata, apice dichotoma: filis nodosis.* NECKER. *Meth.* 10.

Conserva marina gelatinosa, corallinae instar geniculata crassior. DILL. *musc.* 33. tab. 6. f. 16.

Loc. In litore maris Nicaeensis collecta est.

1654. CONFERVA polymorpha.

Conserva filamentis geniculatis, ramis fasciculatis. LINN. *syn.* 12. p. 721.

Conserva filamentosa geniculatis, ramis fasciculatis apice dichotomis. NECKER. *Meth. musc.* p. 8.

Conserva marina geniculata nigra palmata. DILL. *hist. musc.* 32. tab. 6. f. 35. a. b. c. *Maurus tri-dactylites capillaceus maritimus multifidus niger, radice fibrosa.* BOCC. *mus.* 1. p. 268. tab. 5. f. 11.

Fucus crispus loricatus nigricans. BARR. *rar.* 1323. tab. 1301.

Loc. Ad litus maris Nicaeensis.

1655. CONFERVA rupestris.

Conserva filamentis geniculatis ramosissimis viridibus. LINN. *syn.* 12. p. 721.

Conserva filamentosa, geniculata, ramis subplumosis. NECKER. *Meth. musc.* p. 10.

Conserva marina trichodes ramosior. DILL. *hist. musc.* 28. tab. 5. f. 29.

Loc. Ad rupes litoris Nicaeensis.

1656. CONFERVA elongata.

Conserva filamentis geniculatis ramosissimis, ramulis longissimis distantibus acutis. HUDS. *Fl. Angl.* p. 484.

Conserva marina geniculata ramosissima lubrica, longis, sparsive ramulis. DILL. *hist. musc.* 35. tab. 6. f. 38.

Loc. Habitat in litore Nicaeensi.

1657. CONFERVA fasca.

Conserva filamentis geniculatis ramosissimis, ramulis alternis simplicibus. HUDS. *Fl. Angl.* p. 486.

Loc. In litore Nicaeensi.

BYSSUS. LINN. *gen.* n. 1071. *syn.* n. 1208.

Lanugo, aut pulvis simplicissimus.

1658. BYSSUS flos aquae.

Byssus filamentis plumosis natantibus. LINN. *spec.* p. 1637.

Byssus farinacea virescens aquae inperza. LINN. *Fl. Lapp.* 532. *Fl. Suec.* 1182. ROY. *Lugd.* 520.

Conserva crumacea, tenerima subviridis. HALL. *hist. n.* 2113.

Byssus parasitica capillacea flava. SCOP. *Fl. Carn.* p. 70. n. 4.

Loc. Habitat super aquas in fossis verno tempore stagnantes.

1659. BYSSUS velutina.

Byssus capillacea viridis, filamentis ramosis. LINN. *syn.* 12. p. 721.

Byssus viridis filamentis ramosis. HALL. *hist. n.* 2101.

Byssus repens simplicissima, ramosaque, primordialibus convolutis. NECKER. *Meth. musc.* p. 2. n. 3.

Byssus tenerima viridis, velutina referens. DILL. *hist. musc.* p. 7. tab. 1. f. 14.

Byssus terrestris viridis herbacea, & mollissima, filamentis ramosis, & non ramosis. MICH. *gen.* 211. tab. 89. f. 11.

Loc. Habitat in terra, & ad muros septentrioni expositos.

1660. BYSSUS aurea.

Byssus capillacea pulverulenta, fructificationibus sparsis, filamentis simplicibus, ramosisque. LINN. spec. p. 1638.

Byssus pubinosa crocea. HALL. hist. n. 2106.

Byssus erecta glomerotim congesta simplex, ramosaque, primordialibus sparsis. NECKER. Meth. musc. p. 1. n. 1.

Byssus petroea cracea, glomerulis lanuginosis. DILL. hist. musc. p. 8. tab. 1. f. 16.

Byssus minima saxatilis inodoro, filamentis partim simplicibus, partim ramosis. MICH. gen. 210. tab. 89. f. 2.

Loc. Habitat in rupibus, & supra lapides.

1661. BYSSUS saxatilis.

Byssus pulverulenta cinerea, rupes operiens. LINN. spec. p. 1638.

Loc. Saxa, atque rupes obtegit.

1662. BYSSUS candelaris.

Byssus pulverulenta flavo, lignis adnascens. LINN. spec. p. 1639.

Lichen crusta tenuissima flava. HALL. hist. n. 2096.

Lichen farinaceus flavus. NECKER. Meth. musc. p. 112. n. 81.

Lichen crustaceus, arboribus adnascens, tenuissimus, pulverulentus, aureus, colore elegantissimo, & immutabili. MICH. gen. p. 180. n. 69.

Loc. In muris, & corticibus arborum humido aëri expositis.

F U N G I.

AGARICUS LINN. gen. n. 1074. syn. n. 1109.

Fungus horizontalis, subtus lamellosus.

I. STIPITATI

A. Pileo, & lamellis concoloribus, aut fere concoloribus.

1. albi.

1663. AGARICUS candidus.

Agaricus caulescens, plerumque solitarius, carnosus; pileo plano, pilose squamoso, albido, centro depresso, lamellis crassis, ramosis, connexis albidis; petiolo tereti, brevi, crasso, pleno, albido; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tab. 125.

Agaricus albus acris, pileolo turbinato, centro depresso, lamellis angustis, undulatis, ramosis, & saepius conjunctis. GLED. fung. p. 99. n. 10. var. 6.

Amanita moximus albus infundibuliformis. HALL. hist. n. 2339.

Omphalomyces erossus. BATT. fung. p. 38. tab. 17. c.

Fungus esculentus, tatus albus, pileolo plano, pediculo breviate. MICH. gen. p. 145. n. 2.

Loc. In sylvis montanis frequens. Edulis.

1664. AGARICUS extinctorius.

Agaricus stipitatus, pileo companiformi, albido, lacero, lamellis niveis, stipite subbulboso subulato nudo. LINN. spec. p. 1643.

Agaricus caulescens albus, pileo conico, stipite cylindraceo. LINN. Flor. Lapp. 481. Flor. Svec. 1037. 1044.

Agaricus condescens albus, petiolo longissimo, pileo canico. LINN. Flor. Lapp. 480.

Amanita albus, petiolo villosa, pileolo umbonato striato. HALL. hist. tom. 3. n. 2342.

Loc. In rudertis, & fimeis.

1665. AGARICUS plicatus SCHÆFF. tab. 31.

Agaricus pilea hæmisphaerica, petiolo tenuissimo cylindraceo. GLED. Fung. p. 119.

Amanita albus, petiolo gracili prælongo, pileo striato canico. HALL. hist. n. 2345.

Fungus parvus gracillimus totus albus, pileo conico, a media sui parte ad usque aros

striato, pediculo bianciali prætenui. MICH. gen. p. 170. n. 5. & tab. 73. f. 4.

Fungus capitulo canico, pallide cinereo, centro fusco. VAILL. 65.

Agaricus gracilis. LAM. Fl. Franc. 1. p. 114.

Loc. In montibus inter muscos mense Augusti provenit.

1666. AGARICUS pustulatus.

Agaricus caulescens, pileo convexo cinereo; verrucis, lamellisque albis: stipite basi crassiusculo. LINN. Flar. Svec. 2. 1236. SCOP. Flor. Carn. ed. 3. n. 1461.

Amanito petiolo procero, fistuloso, annulato, pileolo plano, striato, verrucoso, sordido, lamellis olbis. HALL. hist. 3. n. 2397.

Agaricus amplissima valva exceptus, pileala plano spadicea verrucoso in margine striata, lamellis candidis, petiolo annulato, & fistulosa, radice tuberosa. GLED. Fung. p. 85.

Fungus phalloides. VAILL. p. 74. n. 4.

Leucomyces gemmatus. BATT. tab. 6. b. p. 28.

Fungi albi venenati viscidis. BAUH. hist. III. p. 826.

Loc. In pascuis, & sylvis montanis.

1667. AGARICUS valens.

Agaricus olbus, tener, pileo convexa viscida; stipite cylindrico, annulato, pleno, sæpius cespitoso. SCOP. Flor. Carn. p. 15. (a) ed. 2. n. 1487.

Agaricus candidus, & viscidus, ex una basi multiplex; pileo campanulato in centro depressa, pileolo cylindraceo, gracili. GLED. Fung. p. 130. (a)

Amanita albus viscidus, lamellis tenuissimis. HALL. hist. n. 2341.

Fungus nemorosus, viscidus, lactea candare fulgens. MICH. gen. p. 145. n. 15. & p. 190. n. 4.

Fungi albi lucentes ex uno basi plures. BAUH. hist. III. p. 835. TOURN. inst. p. 559.

VAILL. Paris. p. 64. n. 26.

Loc. Ad caudices arborum in sylvis.

1668. AGARICUS bulbosus.

Agaricus caulescens, solitarius, parum carnosus; pileo primum globoso, demum hemisphaerica, albo, lamellis concoloribus; petiolo tereti, procero, annulato, pleno, concoloris, basi tuberoso, volvano; valva evanida, velo membranaceo, & annulo persistente olbis. SCHÆFF. Fung. tab. 241. t. 4. pag. 61.

Amanita albus, laevis, pulvinatus, annulatus. HALL. hist. n. 2353.

Loc. In campis aestate, & autumnis: vulgo Cucumelle. Edulis.

1669. AGARICUS lacer.

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, non cornosus; pileo primum canico, demum planiusculo, olbida, centro fasciata, margine striato, sæpe revoluta, laccata; lamellis concoloribus; petiolo tereti, striato, plano, olbido, basi erossiusculo, sæpe radicata; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. Fung. tab. 257. t. 4. pag. 68.

Fungus subalbidus, oris laceris, pediculo crassiore, radice granulata. MICH. gen. 145. n. 5.

Loc. In agris autumnis.

1670. AGARICUS umbelliferus.

Agaricus stipitatus, pileo plicato membranaceo; lamellis basi latoribus. LINN. spec. p. 1643.

Agaricus pileo convexo, plicato, membranaceo, tenero; lamellis remosis, stipite procero, capillaceo nudo; lamellis concoloris. SCOP. Fl. Carn. 1. p. 30. (c), ed. 2. n. 1571.

Amanito olbus tener, pileolo campanulato striato. HALL. hist. n. 2346.

Fungus minimus totus albus, pileolo hemisphaerico utrinque striato, lamellis rarioribus.

MICH. gen. p. 166. tab. 80. f. 11.

SCHÆFF. Fung. tab. 309.

Fungus porvus candidissimus lamellatus, pediculo longo gracili. RAJ. Angl. 3. pag. 9.

BUXB. Cent. IV. p. 21. tab. 32. f. 3.

Loc. In foliis congestis, & putridis autumnis praesertim reperitur.

2. *flavi*

1671. AGARICUS croceus.

Agaricus caulescens, saepe cespitosus, parum carnosus, siccus; pileo convexo, saturate croceo, lamellis flavis, crassis, petiolo tereti toruli, fusuloso, flavo; velo filamentoso; annulo nullo. SCHAEFF. Fung. tab. 3.

Agaricus flammeo-croceus, demum flovescens; pileo convexo; stipite cylindrico, fusuloso, nudo. SCOP. Flor. Carn. 1. p. 17?

Amanita leoniana sericeus. HALL. hist. n. 2431.

Loc. In sylvis, locisque muscosis provenit.

1672. AGARICUS miniatus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1524.

Fungus pilea planiori, supra miniatus, inferne flavus. HALL. enum. pag. 47. n. 66.

Loc. In pascuis montanis.

1673. AGARICUS caesareus.

Agaricus omphitima volva exceptus, aureus, pileolo hemisphaerico, in margine striata; petiolo annulato, crasso, annulo latissimo cinereo. GLED. Fung. pag. 85. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1466.

Amanita flavus, valvatus, annulo latissimo. HALL. hist. n. 2430.

Amanita plana orbiculata, aurea. DILL. cat. gress. pag. 179.

Fungus planus, orbiculatus, aureus. BAUM. pin. p. 371. TOURN. inn. p. 357. MICH. nov. gen. plant. p. 186. tab. 77. f. 1.

SCHAEFF. Fung. tam. 4. p. 64. tab. 258.

Loc. Locis pinguibus humidis autumnis.

1674. AGARICUS cantharellus.

Icon. TAUR. Vol. XII. tab. 82. f. 6.

Agaricus stipitatus lamellis ramosis decurrentibus. LINN. spec. p. 1639.

Agaricus luteus, pileo plicato, lobato; lamellis venosis, ramosis, decurrentibus. SCOP. Flor. Carn. 1. p. 31. (a)

Agaricus luteus; pileolo turbinato, in margine anguloso, laciniato, & varie camorta; lamellis crassis, venosis, ramosis, & crispis. GLED. Fung. p. 103.

Merulius cantharellus. SCOP. Flor. Carn. ed. 2. n. 1581.

Merulius flavus, oris comatis, & laceris. HALL. hist. n. 2326.

Fungus exculentus acris colore vitellino; pileolo turbinato; oris expansis, undulatis, & pulchre laciniatis; lamellis, seu castis crispis, & veluti ramosis. MICH. gen. p. 144.

Fungus angulosus, & veluti in laciniis dissectus. BAUM. pin. p. 358. VAILL. Paris. p. 60. tab. 11. fig. 14. 15.

SCHAEFF. fung. tab. 82.

VERN. Galiole.

Loc. Ad oras sylvarum in montibus, & collibus. Edulis.

1675. AGARICUS cinnamomeus.

Agaricus stipitatus, pileo sordide flavo, lamellis luteo-rufis. LINN. spec. p. 1642.

Agaricus caulescens flavus, pileo plano. LINN. Fl. Lapp. p. 594.

Amanita siccus leoninus, annulo araneoso. HALL. hist. n. 2432.

Amanita dura, ex fusco rubens, quercino. DILL. syn. 3. p. 5. n. 20.

Loc. Ad sylvarum margines.

1676. AGARICUS nitens.

Agaricus caulescens, solitarius, parum carnosus; pileo convexo, demum infundibuliformi, viscido, flavido-albo; lamellis crassis, ramosis, concoloribus; petiolo tereti, pleno, curvo, cancolore, basi crassiuscula; vela, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tab. 138.

- Fungus esculentus albus, pileola plano, viscidus, lamellis crispis.* MICH. gen. p. 145. n. 2.
 Loc. In sylvis autumnis. Edulis.
1677. *AGARICUS conicus.* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1515.
Amanita glutinosus flavus; pilea umbonato. HALL. hist. n. 2420.
Amanita pileo obtuse conico, coccineus, ora lamellarum flava. HALL. enum. helv. p. 48. n. 67.
Fungus aureus, capitulo in canum abeunte. VAILL. Paris p. 67. n. 49.
Fungus parvus lubricus aureus, lamellis raris, amplioribus &c. MICH. gen. 147. n. 64.
 Loc. In sylvis inter S. Ambrogio, & S. Michele della Chiusa legi.
1678. *AGARICUS deliciosus.*
Agaricus stipitatus pileo testaceo, succo lutescente. LINN. spec. p. 1641.
Amanita fulvus, lacte croceo. HALL. hist. n. 2419.
Agaricus lateritii coloris, pilea concava, crocea, & acri lacte turgido, lamellis ramosis; stipite cylindrico, maculata, brevi. SCOP. Fl. Carn. 1. p. 35. (2), ed. 2. n. 1532.
Agaricus pileolo hemisphaerico, in centra depressa, & in margine farnicato; petiolo brevi, & crasso. GLED. fung. p. 101. n. 11.
Fungus esculentus, lateritio colore immutabili, succum acrem, & croceum fundens, pediculo breviori. MICH. gen. p. 141.
Omphalomyces acris, lateritii coloris. BATT. fung. tab. 16. H.
 SCHÆFF. fung. tab. 11.
 Loc. In sylvis montanis. Edulis.
1679. *AGARICUS filamentosus.*
 SCHÆFF. fung. tab. 109.
Fungus ex luteo rufescens, cute supernas pilei partis lacero, & veluti squamoso. MICH. gen. pag. 147. n. 8.
Amanita flavus, pilea hemisphaerico squamoso. HALL. hist. n. 2424.
Fungus satius per maturitatem coloris ousonii. VAILL. Paris. pag. 64. n. 20.
 Loc. Ad ligna autumnis.
1680. *AGARICUS granulatus.*
Agaricus caulescens, plerumque solitarius, cornosus, pileo ourantia, granulis quasi adspersa, medio fastigiato, versus marginem flavo, striata, carnosa, lamellis flavis plurimis; petiolo tereti, plano, flavo, punctato-variegato, velo, & oculo destitutus. SCHÆFF. fung. tab. 21.
 Loc. In sylvis aridis, & pratis in declivio positus initio autumnis.
1681. *AGARICUS mutabilis.*
 ICON. TAUR. Val. XII. tab. 83. f. 6. 7.
Agaricus luteus, pilea convexo, lamellis congestis, stipite nudo cylindraceo pleno. SCOP. Fl. Carn. 1. p. 19. (a), ed. 2. n. 1515.
Fungus esculentus totus luteus, ex uno pede multiplex, pediculo longo, cylindrico annulato. MICH. gen. p. 197.
Fungi species altera. BAUH. hist. III. p. 385. cap. 33.
 SCHÆFF. fung. tab. 9.
 VERN. Famiole.
 Loc. Ad truncos nucum, juglandium, & motorum autumnali tempore. Edulis.
1682. *AGARICUS minutulus.*
Agaricus caulescens, solitarius, non cornosus; pileo campanulato, luteo; lamellis raris, flavidis; petiolo tereti, gracili, curvulo, pleno, albedo; velo & oculo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 72. tab. 308.
 Loc. Super ramos arborum emortuarum, frequentius super pyrum.

1683. AGARICUS floccosus.

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, carnosus; pileo convexo, planiusculo, flavo, saturatus piloso-squamosa, centra fastigiato, margine striato; lamellis flavidis, demum terreis; petiolo tereti, pleno, flavo saturatus piloso-squamosa; velo nullo; annulo spurio. SCHÆFF. fung. tab. 61.

Amanita pileo flavescente squamosa, lamellis terreis obscuris, annulo araneoso. HALL. hist. n. 2412.

Loc. Ad radices arborum, praesertim salicum, nascitur.

1684. AGARICUS cyathiformis.

Agaricus caulescens, solitarius, vix carnosus; pileo infundibuliformi, luteo, punctato-striato, margine repando, sublobato, naanihil subverso; lamellis pallidis, ramosis, decurrentibus; petiolo tereti, brevi, pleno, pallide luteo, velo, & annulo denitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 66. tab. 252.

Fungus aureus infundibuli forma: Pevera malefica dorata. MICH. gen. pag. 147.

VERN. Galleus.

Loc. In sylvis Autumno.

1685. AGARICUS equestris.

Agaricus stipitatus, pileo pallido; disco stellatim luteo, lamellis sulphureis. LINS. spec. p. 1642.

Agaricus caulescens, pileo convexo sordida, margine inflexa, lamellis pallidis, basi rematis, stipite cylindraceo. LINS. Fl. Lapp. 302.

Loc. In sylvis montanis.

1686. AGARICUS gilvus.

Agaricus caulescens, solitarius, carnosus; pileo convexa, planiusculo, saepe defarmit, pallide luteo; lamellis crassis, luteo-albidis; petiolo tereti, crasso, pleno, albido, basi crassiore; velo spurio; annulo nullo. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 52. tab. 221.

Amanita sicca, pileolo albido, lamellis crassis flavescenibus. HALL. hist. n. 2416.

Loc. In sylvis Autumno.

1687. AGARICUS fragilis.

Agaricus stipitatus, pileo convexo viatica pellucido, lamellis luteis, stipite nudo. LINS. syst. 12. p. 723.

Amanita flavo-cinnamomea, viscidus, striatus, papillatus. HALL. hist. n. 2425.

Amanita parva striata, flavo-fusci ubivis coloris. DILL. cat. gress. p. 182.

Fungus parvus, flavo-fuscus, pileolo galericulata, a medio ad peripheriam striato. MICH. gen. p. 170.

Fungus pedicula croceo, splendoris particeps. VALL. Paris pag. 69. tab. 11. f. 16. 17. 18.

Loc. Ad ligna putrida Æstate, & Autumno.

3. aliorum colorum.

1688. AGARICUS vaccines.

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, carnosus; pileo convexo, squamoso-striato, sordide rufo; lamellis pallide rufis; petiolo tereti, striato, pleno, concalare, apice dilatato; velo & annulo denitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 13. tab. 25.

Loc. Sylvas Canopicienses incolit, observante Cl. BELLARDI.

1689. AGARICUS rubellus

Agaricus caulescens, subsolitarius, non carnosus; pileo primum subcanico, demum planiusculo, cum purpura albido, centra fastigiato, margine striata; lamelli paucide purpureis; petiolo tereti, gracili, curvulo, fistuloso, pilei colore, basi crassiusculo; velo, & annulo denitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. p. 71. tab. 303.

Loc. In pratis, agris, & nemoribus apricis.

ALLIOTTI Fl. Pedem. Tom. II.

R r r r

1692. AGARICUS laccatus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1530.

Agaricus pileolo hemisphaerico integerrimo, lamellis amplissimis, petiolo nudo, & cava.
GLED. fung. p. 95.

Amanita petiolo fistuloso lineata, pileo convexo flavo-rufa. HALL. hist. n. 2436.

Fungus parvus esculentus, odoratus, coriaceus, rufus, lamellis inter se longe distantibus.
MICH. gen. p. 148.

Fungus multiplex sardide carneus. VAILL. Paris. p. 66.

SCHÆFF. fung. tab. 13.

Loc. In sylvis Canapiciensibus Cl. BELLARDI.

1693. AGARICUS mammosus.

Agaricus stipitatus, pileo convexa, acuminato griseo, lamellis convexis griseis, erenatis, stipite nuda. LINN. spec. p. 1642.

Agaricus caulescens, pilea convexa, sordido, umbilico prominente, lamellis pallidis, stipite cylindraceo. LINN. Fl. Lapp. 521. Fl. Svec. 1218.

Fungus minar, capitulo pileum novitum referente, pediculo longiore. BUXB. cent. 4. p. 13. tab. 21. f. 1.

Loc. In pascuis sylvarum.

1694. AGARICUS crinitus.

Agaricus caulescens, solitarius, carnosus, succo flavescente acricasens, pileo convexa, pilosa, rufo-griseo, centra concava, margine fornicato, subverso, lamellis ramosis, concoloribus; petiolo tereti, brevi, pleno, concolare, vela spurio pilam, annulo nullo.
SCHÆFF. fung. tab. 228. tom. 4. pag. 55.

Loc. In sylvis nemorum Autumno.

1695. AGARICUS griseus.

Agaricus caulescens, solitarius, non cornosus, pileo convexa, cinereo, per temperatam spadiceo; lamellis concoloribus paucis, petiolo tereti, gracili, suborili, fistuloso, radicata, eancolore; vela & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tab. 236. tom. 4. pag. 59.

Fungus griseus gracillimus, pileo galericulato, pediculo lineam crasso, praesalto, fistuloso. MICH. gen. 147.

Loc. In sylvis ad radices arborum.

1696. AGARICUS brunneus.

Agaricus caulescens, plerumque cespitosus, parum cornosus, pileo hemisphaerico, sulcata, fusciscente, vertice tumida; lamellis concoloribus, petiolo tereti, gracili, fragili concolare fistuloso, velo & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tab. 32. tom. 4. p. 16.

Loc. In humidis Autumno: aliquibus edulis.

1697. AGARICUS fusciscens.

Agaricus caulescens, cespitosus, vix carnosus, hydrophorus, pileo multifarmi, primum subconico, postea campanulato, tandem planiusculo, medio fastigiato, fusciscente, margine grisea, tandem locero, revoluta; lamellis obscure cervinis, demum fuscis, petiolo tereti, curvo, fistuloso, albido, annula fugati, velo nullo. SCHÆFF. Fung. Tom. 4. pag. 10. tab. 17.

Fungus viscidus, pileolo farnicata, desuper rufo-pallido, lamellis ochroleucis, pediculo longo, cylindrico, albicante, ac annulo momentanea cinco. MICH. gen. pag. 180.

Loc. In truncis arborum caesarum.

B. Pileo discolore.

1. lamellis albis

1698. AGARICUS androsaceus.

Agaricus stipitosus albus, pileo plicato, membranaceo, stipite nigro. LINN. spec. p. 1644.

Agaricus pileo convexo, plicato, membranaceo, lamellis ramosis, stipite nigra, procera, capillaceo, nudo. SCOP. Flor. Carn. 1. p. 29. (b)

Agaricus pileolo striato, hemisphaerico, parva; lamellis angustissimis, paucis; petiolo copillacea olivissimo. GLED. Fung. p. 108. n. 15.

Agaricus coulescens albus minimus, petiolo angusto, pileo plano verrucoso, margine octofido. LINN. Fl. Lapp. 472.

Amanita pileolo nigro, pileo albo striata excarni. HALL. hist. n. 2351.

Fungus caule nigro capillari, androsaces capitulo. BOCC. mus. 143. tab. 104.

Fungus pileo candicante, lamellis paucis, pediculo fusco splendente. VAILL. Poris. p. 69. tab. 11. f. 21. 22. 23.

SCHÆFF. Fung. tab. 239.

Loc. In sylvis abiegnis.

1697. AGARICUS excoriarius.

Agaricus caulescens solitarius, & caespitosus, parum cornosus; pileo ompho, albide testaceo; media subconica; margine farnicato, locera, filamentos; lamellis inaequalibus, albidis; petiolo tereti, procera, valvata, fistulosa, olvida: basi bulbosa, annula peculiaris pilei inserta; vela nullo; annulo persistente, & fugaci. SCHÆFF. Fung. tab. 18. & 19.

Amanita petiolo procera onnulata, pilea, & lamellis cervinis. HALL. hist. n. 2402.

VERN. Cucamelle.

Loc. In pratis, & vinetis. Edulis.

1698. AGARICUS alliaceus. SCOP. Flar. Carn. ed. 2. n. 1561.

Agaricus stipitatus; pileo convexo glabro, e fusco pallescente; lamellis olbidis; stipite atra nitido. JACQ. Austr. p. 196. abo. 100. SCOP. Carn. 2. pag. 454. n. 1561.

Agaricus pileo cervino, campanulato, laevi; lamellis cancellatis; stipite obtuse rubra, nuda, procera, cylindraceo fistulato. SCOP. Carn. 1. p. 27. (i)

Fungus compestris, parvus, luteus, odore allii, lamellis olbis, pediculo superna porte cancellare. MICH. gen. p. 144. tab. 78. f. 3.

SCHÆFF. Fung. tab. 99.

Loc. In sylvis apricis.

1699. AGARICUS flavidus.

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 83. f. 9.

Agaricus caulescens, plerumque caespitosus, carnosus; pilea hemisphaerico, centra soepe fastigiato, pallide flava; lamellis albidis; petiolo tereti, tarsiili, pleno, basi crassiuscula, fusca, superne pallide flava, velo filamentos, annula nullo. SCHÆFF. Fung. tab. 35.

Amanita pilea pulvinato flava, aris, & lamellis albis. HALL. hist. n. 2368.?

Fungus luteus, lamellis, & pediculo albis. BUXB. Cent. V. tab. 45. f. 2.?

Loc. In sylvis frequens.

1700. AGARICUS lateralis.

Agaricus caulescens, plerumque solitarius, carnosus; pilea convexa, obscure spadicea; lamellis decurrentibus, olbidis, demum ochroleucis; petiolo crasso, brevissimo, laterali, pleno, spadiceo, basi tuberosa; vela, & annulo destitutus. SCHÆFF. tab. 71. tab. 4. pag. 31.

Loc. Prope saxa, & ligna: alicubi Carcoteria.

1701. AGARICUS guttatus.

Agaricus coulescens solitarius, carnosus; pilea primum subconica, demum planiuscula, rubello, lacero-squamoso, squamis tropazilis rufo-fuscis, volvoe reliquis, margine striata; lamellis albidis, alternis integris, interne laxioribus, dimidiatis versus orbium interjectis; petiolo tereti, brevi, pleno, albidis, basi tuberoso, valvata; ovulo inferne evanida; vela & annula destitutus. SCHÆFF. Fung. tom. 4. pag. 61. tab. 246.

Loc. In altis nemoribus Autumno.

1702. AGARICUS galericulatus.

Agaricus pileo fusco, campanuloso, laevi, stipite nudo, procero cylindraceo, fistuloso, fovo, cespitoso. SCOP. Flor. Carn. 1. p. 27. (h) ed. 2. n. 1564.

Amanita pileolo canico spadicea, lamellis albis. HALL. hist. n. 2393.

Fungus fasciculatus, pileo obscuro, extensorii forma, e medio ad peripheriam striato; lamellis albis; pediculo aliori, luteo, fistuloso. MICH. gen. p. 197.

Fungus multiplex, companiformis, colore castaneo. VAILL. Paris. p. 73. tab. 12. fig. 3. 4. SCHLEFF. Fung. tab. 52.

Loc. In lignis putridis reperitur.

1703. AGARICUS georgii.

Agaricus stipitosus, pileo fovo convexa, lamellis albis. LINN. spec. p. 1642.

Amanita pileo flava, oris striatis, & laevigatis, lamellis albis. HALL. hist. n. 2367.

Fungi plures ex uno pede e prunorum radicibus enoti. VAILL. p. 68. n. 51. & p. 71. n. 5.

Agaricus flavidus. LAM. Flor. Franc. tom. 1. n. 112.

SCHLEFF. Fung. tab. 35.

Loc. In sylvis montanis, & collinis. Edulis.

1704. AGARICUS integer.

Agaricus stipitatus, lamellis omnibus magnitudine aequalibus. LINN. spec. p. 1640.

Agaricus caulescens, pileo plano-concava purpurea, lamellis, stipiteque albis. LINN. Fl. Lapp. 486.

Amanita petiola farto, pileolo convexo umbilicato, oris rugasis, lomellis crassis, & albis. HALL. hist. n. 2374.

Agaricus pileolo orbiculari in margine rugasa, & striato, vertice tumido, petiolo brevi. GLED. p. 106. n. 14.

Agaricus sylvaticus. LAM. Flor. Franc. tom. 1. p. 106.

SCHLEFF. Fung. tab. 75.

VERN. Pisacan.

Loc. In sylvis apricis, & gaudet arborum umbra.

1705. AGARICUS jozizolus.

Agaricus albus; pilea convexo viscido; lamellis romosis; stipite cylindraceo, nudo, procero, tandem fistuloso. SCOP. Fl. Carn. p. 22. ed. 2. n. 1489.

Amanita pulvinatus, pileolo cervina, lomellis albis undulatis. HALL. hist. n. 2358.

Fungus esculentus albus, pileolo plana, viscidus, lamellis crispis. MICH. gen. p. 145. n. 3.

Loc. In sylvis collium Taurinensium quandoque occurrit.

1706. AGARICUS melleus.

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 82. f. 1.

Agaricus caulescens, solitarius & cespitosus, parum carnosus; pileo convexo fovo, centro fastigiato truncato: margine striata, pallidiari, lomellis albidis, petiolo tereti, procera gracili, flavesceme fistulosa; velo & annulo densius. SCHLEFF. Fung. tab. 45.

Amanita viscidus, pileo flavesceme, laminis albis. HALL. hist. n. 2363.

Polymyces simplex melleus. BATT. p. 49. tab. 22. c.

Loc. In radicibus, & truncis arborum reperitur.

1707. AGARICUS multiformis.

Agaricus caulescens, plerumque solitarius carnosus; pileo terreo-fusco multiformi; lamellis sordide albis; petiolo tereti; soepe virili, pleno albido, fuscesceme, velo, & annulo densius. SCHLEFF. Fung. tab. 14.

Amanito petiolo farto gracili, pileo plano murino sericeis lineis striato, lamellis albis. HALL. hist. n. 2381.

Agaricus pileo plano lacero angusto, petiolo cylindraceo tenui. GLED. Fung. p. 112.

Fungus esculentus, pileo desuper cinereo, out murino, & in filamenta quasi lacerato, inferne candida, & tenuissime lomellato, pediculo plerumque condido. MICH. gen. p. 155. n. 11. & 12.

Loc. Ad radices arborum adinvenitur verno tempore.

1708. AGARICUS muscarius.

Agaricus stipitatus, lamellis dimidiatis solitariis, stipite ovato, apice dilatato, basi ovato. LINN. spec. p. 1640.

Agaricus caulescens, pileo sanguineo; verrucis, lamellisque albis, stipite albo, basi globoso. LINN. Fl. Lapp. 595.

Amanita petiolo onnulato sanguineo, lamellis albis. HALL. hist. n. 2373.

Agaricus pileo plano miniatu verrucoso, verrucis, & lamellis albis, stipite albo volvato, bulboso annulato, longo apice, dilatato, pleno. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1459.

Agaricus volva exceptus, pileolo conico, in margine striato, petiolo annulato in basin squamoso-tuberosum desinente. GLED. Fung. p. 82.

Fungus bulbosus, & volvo erumpens, pileolo superna parte aureo, & ad oras striato, inferne & annulato pediculo olivis, radice bulbosa. MICH. gen. p. 188. tab. 78. f. 2.

SCHEFF. Fung. tab. 27.

Loc. Ad oras sylvarum locis apricis.

VIR. Inter perniciosos Fungos locum habet, non modo principio acri ventriculum, & intestina male afficit, sed una etiam narcoticam vim exerit. Cardialgiam, vomendi conatus, tremorem, delirium, & convulsiones infert, inebriat, stupidosque homines, qui comederint, reddit. Cimices fugat, si eo asseres confricentur.

1709. AGARICUS olivaceus.

Agaricus caulescens solitarius, carnosus, carne sicca, fragili solido, albida; pileo primum globoso, dein convexo, centro depresso, subtiliter punctato, olivaceo, margine tandem sursum reflexo; lamellis crassis, aureis; petiolo tereti, brevi, crasso, pleno, roseo-olivido, velo, & onnulo destitutus. SCHEFF. Fung. tab. 204.

Amanita petiolo farto, pileolo convexo umbilicato, oris rugosis, lamellis crassis, & albis. HALL. hist. n. 2373. var. n.

Loc. In nemorosis autumnis.

1710. AGARICUS procerus.

Agaricus pileo pleno papillari; stipite convergente procero, annulato, fistuloso, annula peculiari inserto. SCOP. Flor. Carn. 1. p. 6. n. 6. ed. 2. n. 1465.

Amanita petiolo procero squamoso, annulato pileo conico, squamoso, subapadiceo, lominis albis. HALL. hist. add. p. 90.

Agaricus pileo papillari amplissimo in margine fornicato, lacero tomentoso, petiolo annulato procero, inferius tumido, pilei acetabulo inserto. GLED. Fung. p. 114. n. 20. SCHEFF. Fung. tab. 22. & 23.

Loc. In pascuis, & agris frequens.

1711. AGARICUS clavus.

Agaricus stipitatus pileo luteo convexo striato, lamellis, stipiteque albis. LINN. spec. p. 1644.

Amanita minimus, oris adtractis, flavus, inferne albus. HALL. hist. n. 2370.

Fungus minimus, aurantius, mamillaris. VAILL. Paris. p. 76. tab. 11. f. 19. 20.

SCHEFF. Fung. tab. 59.

VERN. Parasole.

Loc. In nemoribus sterilibus.

1712. AGARICUS lignorum.

Agaricus cespitosus, pileo campanulato, obsolete flavo, pulverulento, striato; vertice glabro tumido; lamellis demum atris, seminole pollen expladentibus; stipite subuloso, procero, fistuloso. SCOP. Flor. Carn. 1. p. 24. n. 29. ed. 2. n. 1482.

Amanita tener conicus lacer cervinus, lamellis nigris. HALL. hist. n. 2435.

Fungus pileolo ex fulvo ferrugineo, & ad centrum usque in plures partes plerumque se dividente, lamellis nigricantibus, pedicula seniori cylindrico purpureo. MICH. gen. p. 164.

SCHEFF. Fung. tab. 66.

Loc. Ad radices arborum putrescentium frequens.

2713. AGARICUS crassipes.

Agaricus coulescens solitarius, & cespitosus, carnosus, pileo valde mutabili, convexo, inciso, fusco; lamellis albidis, demum fusciscentibus; petiolo mutabili, fusco, sursum crassiori, sulcato pleno; velo, & annulo destitutus. SCHREFF. fung. tab. 87. & 88.
Fungus esculentus, ex una radice multiplex, saure rufescens, lamellis primum albis, demum concoloribus, pediculo duro, plerumque crispo, & complanato, ad radicem versus in acutum sensim attenuato. MICH. gen. p. 190.

Loc. In sylvis Conspiciendis ad radices arborum nasci observavit Cl. BELLARDI. Edulis.

2714. AGARICUS flabelliformis.

Agaricus coulescens, solitarius, & cespitosus, parum carnosus; pileo planiusculo, locero, multiformi, cervino; lamellis onosmosomatibus terreo-olbidis; petiolo tereti, brevi, pleno olvido; velo, & annulo destitutus. SCHREFF. fung. tom. 4. pag. 20. tab. 43. & 44.
VERN. Cresta d' Gal.

Loc. In lignis viridibus.

2. lamellis fulvis.

2715. AGARICUS mollis.

Agaricus oculis, solitarius, gelatinoso-membranaceus; pileo multiformi, albido coesio, & gilvo vario; lamellis ochroleucis; velo, & annulo destitutus. SCHREFF. fung. tom. 4. pag. 49. tab. 213.

Agaricus lacteus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. pag. 438. n. 1374.

Amanita semipetiolata, niveus. HALL. hist. n. 2337.

Loc. Ad arborea.

2716. AGARICUS prasinus.

Agaricus coulescens, solitarius carnosus, pileo convexo, planiusculo, luteo virescente, viscido, squamoso; lamellis numerosis, luteis; petiolo tereti, crasso, pleno, flavido, basi tuberoso; velo, ac annulo destitutus. SCHREFF. fung. tom. 4. pag. 51. tab. 218.

Amanita pileo pulvinoso viridi, lamellis obscure luteis. HALL. hist. n. 2434.

Fungus vesicus XXVII. LOESEL. pruss. pag. 86.

Loc. Locis mucosis initio autumn.

2717. AGARICUS badius.

Agaricus coulescens, solitarius, parum carnosus; pileo primum subovo, demum luteo conico, badio, margine striato; lamellis integris ochroleucis; petiolo tereti, crasso, longo, valde fistuloso, albido, basi tuberoso, volvato; valva corioceo, albida, persistente; velo, ac annulo destitutus. SCHREFF. fung. tom. 4. p. 63. tab. 245.

Fungus e volvo erumpens, pileolo desuper obscuro, & ad oras striato, inferne olbo, pediculo concolore, cylindrico, valde fistuloso. MICH. gen. 184.

Loc. In collibus autumn.

3. lamellis rubris.

2718. AGARICUS campestris.

Agaricus stipitatus, pileo convexo squamato albido, lamellis rufis. LINN. spec. p. 1641.

Agaricus campestris. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1478.

Agaricus pileolo omphalo hemisphaerico, fornicato; petiolo brevi; annulo permanente cinereo. GLED. fung. p. 115. n. 21.

Agaricus coulescens, petiolo sordido locero, pileo albo membranaceo, lamellis rufescentibus. LINN. Fl. Lapp. p. 481.

Amanita petiolo annulato, pileo componiformi olvido lamellis roseis. HALL. hist. n. 2443.

Fungus campestris, olbus superne, inferne rubens. BAUH. hist. III. p. 824. MICH. gen.

p. 174.
SCHREFF. fung. tab. 33.

Loc. In pascuis collinis frequens.

2719. AGARICUS lactifluus.

Icon. TAUR. Vol. 12. tab. 80. f. 7.

Agaricus pileo plano carneo, succo lactescente, lamellis rufis, stipite longo carneo. LINN. spec. p. 1641.

Agaricus (testaceus) ferrugineus; pileo concavo albo, & dulci lacte turgido; lamellis ramosis, stipite cylindraceo, brevi. SCOP. Fl. Carn. 1. p. 35. ed. 2. n. 1558.

Fungus flava-rufus, in medio depressus, locis non acris manans. HALL. enum. helv. p. 50. n. 80.

Fungus parvus, pediculo, & superna parte pileali ferrugineis; lamellis rufis; lacteum, & dulcem succum fundens. MICH. gen. p. 141.

SCHÆFF. Fung. tab. 5.

Loc. In sylvis, & locis humidis sub arboribus aestivo tempore.

2720. AGARICUS fasciatus.

Agaricus caulescens, solitarius, carnosus; pileo convexo, cervino, saepe deformi; lamellis purpurascensibus, petiolo tereti, sulcata, saepe squamosa, pleno, fusciscentie, basi crassiuscula, subpurpureo; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. p. 53. tab. 223.

Monomyces pusillus rigidus. BATT. fung. pag. 44. tab. 20. b.

Loc. Ad caudices arborum in sylvis montanis, & umbrosis.

2721. AGARICUS varius.

Agaricus caulescens, plerumque solitarius, carnosus; pilea convexo, planiusculo, vaccina, lamellis flexuosis, purpurascensibus, margine flavidis; petiolo tereti, crassiuscula, superne albido, pleno; basi tuberoso, rufescente; velo filamentosa; annulo nullo. SCHÆFF. tom. 4. p. 20. tab. 42.

Loc. In nemoribus autumnis. Edulis.

2722. AGARICUS leoninus.

Agaricus caulescens, solitarius, carnosus; pilea convexo, flavo multifarmi, centro fastigiato, margine tenuissime striato; lamellis incarnatis, margine flavidis, tandem terreis; petiolo tereti, procero, gracili, spiritaliter striato, pleno, flavicante, basi crassiusculo; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. p. 21. tab. 48.

Amanita leoninus, pileo conico, lineato. HALL. hist. n. 2454.

Loc. In lignis putridis.

2723. AGARICUS violaceus.

Agaricus stipitatus, pileo rimato; margine violacea tomentosa, stipite coerulescente; lona ferruginea. LINN. spec. p. 1641.

Agaricus pilea convexo globoso, stipite bulboso annulato pleno, annulo filamentoso. SCOP. Fl. Carn. 1. p. 11. n. 17. ed. 2. n. 1470.

Amanita violaceus, petiolo bulboso annulato, pilea plana. HALL. hist. n. 2455.

Fungus bulbosus, pileolo campanulato livido-fusco, ad oras dilute violacea, lamellis fulvis, pediculo supernae limbi pilei parti concalores, annulo non durobili ornatq. MICH. gen. p. 181.

Fungus major violaceus. VAILL. Paris. p. 67. n. 45.

SCHÆFF. Fung. tab. 3.

Loc. Ad oras sylvarum. Edulis.

2724. AGARICUS spadiceus.

Agaricus caulescens, solitarius, & caespitosus, non carnosus; pilea convexo, planiusculo, spadicea; lamellis subcarneis; petiolo tereti, fistuloso, olivido, basi crassiusculo; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. p. 37. tab. 60.

Amanita pileo campanulato, castaneus, lamellis subrufis. HALL. hist. n. 2450.

Loc. In sylvis Canopiciensibus Cl. BELLARDI.

2725. AGARICUS spadiceogriseus.

Agaricus caulescens, solitarius, & caespitosus, non carnosus; pileo primum canico, tandem

planiusculo, spadiceo-griseo, striato, centro laevi, fastigiato, lamellis violaceo-umbrinis, tandem terreis; petiolo tereti, procero, gracili, fistuloso, basi crassiusculo, albo; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. p. 89. tab. 237.

Monilia cinereo-sporidiceus, cute striata, lamellis umbrino-violaceis. HALL. hist. n. 2467. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, subfuscus, pileolo galericulato; ubivis striato; pediculo tenui, fistuloso. MICH. gen. p. 195.

Loc. Ad putrida etiam circa fimeia autumno.

2726. AGARICUS viscidus.

Agaricus stipitatus, pileo purpurascens, fusco-viscido, lamellis fusco-purpurascensibus. LINN. sp. p. 1642.

Agaricus caulescens pileo convexo purpurascens, lamellis rufis, stipite brevi, crassiusculo albo. LINN. Flor. Lapp. 485. Flor. Svec. 1229.

Loc. In sylvis.

2727. AGARICUS sylvaticus.

Agaricus caulescens, solitarius, parum carnosus; pileo primum subgloboso, demum planiusculo, squamoso, ochroleuco, lamellis sordide carneis; petiolo tereti, crasso, onulato, fistuloso, sordide albo, basi tuberoso, saepe curvo; velo & annulo persistente, membronaceis albidis. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 62. tab. 242.

Fungus esculentus, pileolo hemisphaerico, griseo cervino, inferne lamellis dilute purpureis, pediculo longo, cylindrico, albo, annulo perunguto cincto. MICH. gen. pag. n. 2.

Loc. In campis aestate, & autumno, vulgo Cucumelle. Edulis.

4. lamellis aliorum colorum.

2728. AGARICUS pallescens.

Agaricus caulescens, plerumque cespitosus, non carnosus, pileo subconico striato, spadiceo-cinereo; lamellis murinis; petiolo tereti, gracili, longo fistuloso albedo; velo & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tab. 211.

Fungus parvus ex uno pede multiplex, pileolo griseo, & ubivis striato, inferne nigricante, pediculo albo fistuloso. MICH. gen. p. 195. n. 2.

Loc. Inter muscos ad radices arborum.

2729. AGARICUS cervinus.

Agaricus caulescens, solitarius paullo carnosus; pileo cervino, primum fastigiato, dein fere hemisphaerico, striato; lamellis pallide testaceis; petiolo solido, ex albedo, striato, basi tuberoso; velo & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 6. tab. 10.

Loc. Innascitur substantiae interiori populi.

2730. AGARICUS cylindricus.

Agaricus caulescens, solitarius, volvatus, non carnosus; pileo squamoso striato cinereo, cylindraceo conico, tandem campanulato, lacero; lamellis umbrinis, per aetatem nigrescentibus diffluentibus; petiolo procero, fistuloso, albo, basi bulboso, annulo fugaci; velo nullo; volvo squamosa oblongo. SCHÆFF. fung. tab. 8.

Loc. In agris, & pratis sterilibus.

2731. AGARICUS fastigiatus.

Agaricus caulescens simplex, carnosus; pileo conico, longitudinaliter striato, flavo; lamellis fuscescentibus; petiolo tereti, pleno pallide flavo; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tab. 26.

Loc. In humidis sylvis. Autumno.

2732. AGARICUS degener. SCHÆFF. fung. tab. 243.

Agaricus plerumque multiplex; pileo fusco, plicato lobato; lamellis venosis, romasis, decurrentibus, flavis, stipite compresso, brevi, pariter flavo. SCOP. Flor. Carn. 1. p. 32. (8)

Merulius hispidulus. SCOP. Flor. Corn. ed. 2. n. 1582.

Loc. Ad radices arborum, & in lignis putridis advenitur.

2733. AGARICUS fimetarius.

Agaricus stipitatus, pileo componulato, locero, lamellis nigris, laterolibus flexuosis, stipite fistuloso. LINN. spec. p. 1643.

Agaricus caulescens pileo conico cinereo, lamellis nigris, margine lacero, stipite longissimo albo. LINN. Fl. Lopp. 503. Flor. Svec. 1215.

Agaricus solitarius, pileo campanulato, longinquo striato griseo, lamellis demum atris diffluentibus, stipite procero, fistuloso, annulo fugaci cinereo. SCOV. Fl. Carn. 2. p. 428. n. 1484.

Amanita albus, campanulatus, squamosus, nigrescens. HALL. hist. n. 2357.

Agaricus pileolo in conum acutum fontigioso piloso, petiolo in basi tumido. GLED. fung. p. 108, n. 17.

Fungus albus ovum referens. BUXB. Cent. 4. p. 16. tab. 27. f. 1.

Loc. Habitat in fimo.

2734. AGARICUS cinereus. SCHAEFF. fung. tab. 100.

Amanita pileo conico striato murino, lamellis nigris. HALL. hist. n. 2484.

Agaricus pileolo in conum acutum fontigioso piloso, petiolo in basi tumido. GLED. fung. p. 108, n. 17.

Fungus hirsutus porrus candidus tenerimus, ac facile in equam solubilis, pileolo in acutum conum fastigiato, lamellis nigricantibus. MICH. gen. p. 255.

Fungus murinus totus niger umbilicatus. VAILL. Paris. p. 66, n. 39.

Hydrophorus cinereus. BATT. fung. F. 53. tab. 25. e.

Loc. In montibus locis humidis.

2735. AGARICUS margaritaceus.

Agaricus caulescens, plerumque solitarius, corne denitutus, pileo primum fusiformi, dein semiovato, striato, purpureo-griseo, centro fuscicante, tandem campaniformi, margine lacero, revoluto; lamellis nigricantibus, demum atris, fuscicantibus; petiolo tereti, procero, sordide griseo, fistuloso, basi bulboso; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tab. 216.

Loc. In sylvis inter folia, & in lignis patridis reperitur.

2736. AGARICUS rufo-candidus.

Agaricus caulescens, plerumque solitarius, non cornosus; pileo primum cylindrico, & rufo condicante, striato, demum planiusculo, fusco, margine lacero, revoluto, fuscicante; lamellis nigrescentibus, demum atris, deliquescentibus; petiolo tereti, valde procero, albido, contorto, fistuloso, basi bulboso; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tom. 4. p. 44. tab. 201.

Loc. Ad caudices arborum autumn.

2737. AGARICUS acuminatus.

Agaricus caulescens, solitarius, non cornosus; pileo conico, pollide murino; lamellis nigrescentibus, demum atris; petiolo tereti, gracili, orrorubente, fistuloso, basi bulboso; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tom. 4. p. 44. tab. 202.

Loc. Ut praecedens.

2738. AGARICUS helveolus.

Agaricus caulescens, solitarius, non cornosus; pileo primum conico, tandem componulato, squamoso, sordide luteo; lamellis terreis, nigro polline infectis, demum atris; petiolo tereti, gracili, longo, fistuloso, fuscicante; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tom. 4. p. 48. tab. 210.

Fungus fimetarius, pileolo extinctorii formae, leucophaeo, lamellis nigris, pediculo tenuiori, praefecto, fistuloso, & supernae pileoli porri concolore. MICH. gen. pag. 157. n. 7.

Loc. Ubique nascitur quovis tempore, aestate praesertim.

1739. AGARICUS truncorum.

Agaricus cespitosus, pileo campanulato, obsolete flavo, pulverulento, striato, vertice laevi tumido; lamellis demum atris diffuentibus, saepe cylindraceo, fistuloso, pro-cero, condicome. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1480.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo galericulato, rufo-fulvo, vertice laevi, reliqua parte striato, subtus lamellis nigricomibus; pediculo albo fistuloso. MICH. gen. p. 195. tab. 79. f. 5.

Agaricus rufescens. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 110.

Fungus multiplex ovatus cinereus minor. VALL. 72.

SCHAEFF. fung. tab. 6.

Loc. Loci humidis, & umbris supra ramos arborum corruptos aestivo tempore, & autumno.

1740. AGARICUS glutinosus.

Agaricus caulescens, solitarius, cornosus; pileo fusco, glutinoso, primum hemisphaerico, tandem infundibuliformi; lamellis sordide albis romosis, petiolo tereti, pleno, vol-vuto, superne olvido, basi tuberoso, fusco; velo viscoso, splendeme, annulo apurio. SCHAEFF. fung. tom. 4. p. 17. tab. 36.

Agaricus limocinus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1471.

Loc. In nemoribus umbris autumno.

II. SESSILES.

1741. AGARICUS alneus.

Agaricus acaulis lamellis bifidis pulverulentis. LINN. spec. p. 1645.

Agarico-fungus lamellis bifidis pulverulentis. HALL. helv. 58.

Amanita sessilis lominis pulverulentis bifidis. HALL. hist. n. 2333.

Agaricus sessilis squamosus lobatus, & villosus, lamellis dissectis. GLED. p. 134.

Loc. Alni trunco solet insidere.

1742. AGARICUS betulinus.

Agaricus acaulis coriaceus villosus; margine obtuso, lamellis romosis onatomosonibus. LINN. spec. p. 1645.

Agaricus flabelliformis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1579.

Agaricus flabelliformis villosus, pileoli margine fornicato. GLED. fung. p. 133.

Amanita sessilis hirsutus fulvus, lamellis concoloribus. HALL. hist. n. 2331.

Loc. Frequenter in truncis arborum emortuarum occurrit.

1743. AGARICUS piperatus.

Agaricus stipitatus pileo planiusculo lactescente, margine flexo, lamellis incarnato-pollidis. LINN. spec. p. 1641.

Amanita umbilicatus albus, lacte otri manans. HALL. hist. n. 2338.

Agaricus pileo concavo, stipite locrescente; lamellis romosis, stipite nudo cylindraceo. SCOP. Fl. Carn. 2. n. 1550.

Agaricus pileolo pulvinato integerrimo, & in centro profundius depresso, lamellis con-nexis angustis, & compactis, petiolo continuo, cylindrico, & crasso. GLED. p. 97.

Fungus piperatus albus crassus, lacteo succo surgens. MICH. gen. 141.

Fungus obtus acris. BAUH. pin. 371.

SCHAEFF. fung. tab. 83.

Loc. Frequens in pascuis, & sylvis.

VIR. Lacie acri turgens, nec eodem nostrates ad cibi usum utuntur.

1744. AGARICUS quercinus.

Agaricus oculus, lamellis labyrinthiformibus. LINN. spec. 1644.

Amanita sessilis durissimus, lamellis coriagineis imbricatis. HALL. hist. n. 2330.

Agaricus quercinus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1578.

Agaricus coriaceus, durusve. GLED. fung. p. 134. n. 30.

Agaricus villosus, lamellis sinuosis, & invicem implexis. BUXB. cent. 4. tab. 4. f. 1.
SCHÆFF. fung. tab. 57.

Loc. Ad arborum truncos, praesertim in quercubus adinventur.

VIR. Ad escam parandam pro concipiendo igne adhibetur.

BOLETUS. LINN. gen. n. 1075. syn. n. 1210.

Fungus horizontalis, subrus porosus.

2745. **BOLETUS fulvus.**

Boletus oculis solitarius, lignosus, pileo superne convexo, tuberculato, glabro, versicolore, fulvo, & purpuroscens, inferne plano, ochroleuco, seu pallido; tubulis non secedentibus, rotundiusculis pallidis, seu ochroleucis. SCHÆFF. fung. tab. 161.

Loc. Ad caudices arborum siccarum provenire solet.

2746. **BOLETUS annulatus.**

Boletus acaulis solitarius, lignosus, pileo semielliptico, convexo, glabro, versicolore, margine acuto, fasciis concentricis, ochroleucis, foveis; pollidus rufis, subcoeruleis ovis, tubulis angularis, tenuissimis brevibus, non secedentibus olividis, demum fuscis. SCHÆFF. fung. tab. 106.

Polyporus sessilis, convexo planus, annulis versicoloribus, poris albis tenuissimis. HALL. hist. n. 1283.

Agaricus imbricatus laciniatus major. BUXB. cent. 5. p. 1. tab. 1.

Loc. In lignis emortuis, atque ad radices arborum praesertim mali, & pyri.

2747. **BOLETUS igniarius.**

ICON. TAUR. Vol. XII. tab. 78. f. 2.

Boletus oculis fulviusculus, laevis, poris tenuissimis. LINN. spec. p. 1615.

Polyporus convexo-planus durissimus, cinereus, inferne albidus. HALL. hist. n. 1288.

Boletus igniarius. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1594.

Boletus subrotundus, petiolo horizontali brevissimo, tubulis subtilissimis. GLED. fung. p. 78. n. 12.

Agaricus igniarius, Agarici officinalis foveis, sed non odoratum, superne ex albo cinereum, & glabrum, inferne primum ejusdem coloris, deinde argenteum, & densissime perforatum, foraminulis rotundis. MICH. gen. p. 117.

Fungus in caudicibus nascens ungulis equini figura. BAUH. pin. 373.

Fungi arborei ad ellychnia. BAUH. hist. III. p. 840.

Boletus unguis. SCHÆFF. fung. tab. 137. & 138.

Loc. Frequens in truncis arborum siccis.

VIR. BOLETUS igniarius ad instruendam escam igniariam praeparatus; in taleolas secius, malleoque comusus laudatur, atque apta ratione applicitus est ad haemorrhagias continendos.

2748. **BOLETUS agaricum.**

Polyporus sessilis, convexo-planus, annulis discoloribus fulvis, poris ochroleucis. HALL. hist. n. 1284.

Agaricum, seu Fungus Laricis. BAUH. pin. 375. MICH. p. 119. n. 1.

Off. Agaricum.

Loc. Larici innascitur, frequentius in alpinis Augustae Proetoriae.

VIR. Ab antiquissimis temporibus AGARICUM in usum medicinale receptum est.

Nostro aevo in tanta purgantium medicamentorum copia multum exolevit.

Soler enim cum cruciatus, torminibus, lenteque alvum movere. Nauseam etiam saepe gignit, vomitumque excitat. Neque solet simpliciter, ut dicitur, in substantia solum exhiberi; sed ingreditur quaedam composita purgantia medicamenta.

Usus viget mellis rosati solutivi cum Agarico, qui cochleatum exhibetur infantibus ad alvum movendam. Agaricum fortiter extimulat, vascidamque pituitam educit; neque datur iis, quos febris tenet. Convenit tantummodo in morbis ex

viscida pituita. Dosis est a drachma una ad drachmas duas, vel tres. Consueverunt Medici trochiscis ex Agarico ui, atque incommodam Agarici actionem aromaticis, & solventibus emendare. Vermibus infensum est, atque hircinam alpinam incaute ingurgitam expellit, (Vid. *Miscel. Taur. vol. III. pag. 203.*) quæ diros abdominis cruciatus, atque mortem apud alpicolas quandoque infert.

2749. BOLETUS variegatus.

Boletus subacutus solitarius lignosus, pileo semi-elliptico, convexo punctato, margine repondo, lobato, vel etiam plicato, diversicolore, fasciis concentricis, pollidis, citrinis, aureis, rufis, fuscis, tubulis sordide olbis, seu leucophæis, parvis, difformibus, oon secedentibus, petiolo difformi, brevi, crasso, fusco, aut nullo. SCHÆFF. fung. tab. 263.

Loc. Super truncos arborum reperitur.

2750. BOLETUS versicolor.

Icon. *Taur. Vol. XII. tab. 78. f. 1. & 3.*

Boletus acutius, fasciis bicoloribus, poris olbis. LINN. spec. p. 1645.

Boletus oculatus, pileo coriáceo villosa, lineis concentricis bicoloribus fasciato, tubulis olbis tenuissimis. SCOP. Fl. Carn. 2. n. 1592.

Boletus coriáceus squamosus sessilis, & multiplex lobis varie divisus, & expansis, tubulis tenuissimis connexis angulosis. GLED. p. 70.

Polyporus sessilis, capitosus planus, hirsutus, annulis versicoloribus. HALL. hist. 3. n. 2282.

Fungorum perniciosorum genus V. CLUS. p. 277.

Agaricum squamosum, superne sericeum, inferne olbum foraminulis brevibus densissimis, angustissimis, & quasi pentagonis. MICH. p. 119. n. 11.

Agaricus squamis iridisformibus. BATT. tab. 35.

SCHÆFF. tab. 136. & 269.

Loc. Frequens in truncis, & ad caudices arborum.

2751. BOLETUS hepaticus.

Boletus superne mollis, oc purpurescens, hepatis fociæ. POLLICH. hist. plant. Polat. p. 300. n. 1178.

Polyporus sessilis sanguineus, crassus, mollis, obscure lobatus. HALL. hist. 3. n. 2315.

Fungus jecoriorius prætexiorius, s. erinatus. BOCC. musc. di Fisic. p. 305.

Linguae in coquidibus castaneæarum. CÆSALP. p. 619.

Agaricum enculentum, castaneis odnascens, latissimum, hepatis fociæ, superne ex rubro ferrugineum, interne sanguineum, subius ochroleucum. MICH. p. 117. tab. 60.

Boletus corpore sessili latissimo, superius lobato, inferius gibboso. GLED. p. 77.

SCHÆFF. tab. 117. 118. 119. & 120.

VANN. Lenghe.

Loc. Ad caudices vetustarum arborum, & præsertim quercuum, & castaneæarum. Edulis.

2752. BOLETUS luteus.

Boletus stipitatus, pileo pulvinato subvixido, poris roundatis, convexis, flavissimis, stipite olbo. LINN. spec. p. 1646.

Boletus pileo plano carnoso, glabro, tubulis difformibus, stipite onnulato, longo. SCOP. Fl. Carn. 2. n. 1587.

Boletus canescens pileo livido, subvixido, poris flavis convexis, stipite albedo. LINN. Fl. Svec. 1247. DALL. Paris. 381.

Polyporus corne secedente petiolatus, onnulatus. HALL. hist. 3. n. 2301.

Boletus luteus. DILL. cat. giss. p. 18. tab. 10. n. 1.

Fungus porosus autumnolis viscidus. BUXB. cent. 5. p. 7. tab. 14.

SCHÆFF. Fung. tab. 114.

Loc. In pratis, & sylvis autumnis.

2753. BOLETUS umbilicatus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1589.

Polyporus petiolatus pileo fusco depresso. HALL. hist. 3. n. 2299.

Polyporus exiguus, coriaceus fulvus pileolo concavo, ac in medio nonnihil umbilicato.

MICH. p. 130. tab. 70. f. 9.

Boletus tubulis tenuissimis connexis pileolo orbiculari, ad oras fornicato, centro depresso, petiolo gracili, radice bulbosa. GLED. p. 73.

Loc. In sylvis, & ramis arborum innascitur.

2754. **BOLETUS bovinus.**

Icon. TAUR. Vol. 12. tab. 81. f. 3.

Boletus stipitatus, pileo globo pulvinato marginato, poris compositis oculis: porulis angulatis brevioribus. LINN. spec. p. 1646.

Boletus stipitatus, pileo pulvinoso glabra, tubulis connexis angulatis, carne pilei brevioribus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. p. 463. n. 1586.

Polyporus carne secedente petiolatus, fulvus, inferne virescens. HALL. hist. rom. 3. n. 2302.

Boletus coulescens, pileo sentesco, poris compositis angulatis griseis. LINN. Fl. Svec. 1087. 1246. DALIB. Poris. 382.

Boletus pileolo hemisphaerico, tubulis angulatis, petiolo ventricoso. GLED. p. 63.

Suillus esculentus crassus, superne fulvus, inferne initio albidus, deinde ex flosco virescens, pediculo ventricoso, & supernae parti pilei concolore. MICH. p. 127.

Boletus. SCHAEFF. fung. tab. 103. 105. 707. 112.

Fungus porosus. BAUH. hist. III. p. 833.

Loc. In sylvis apicis praesertim castanearum, & quercuum. Edulis.

2755. **BOLETUS caudicinus.**

Boletus acaulis, pileo rugoso, lobato; tubulis tenuissimis. SCOP. Fl. Carn. p. 46. ed. 2. n. 1596.

Agaricus speciosus. BATT. fung. p. 68. tab. 34. h.

Fungus cerazorum imbricatum aliter alteri innatus, voringotus. BAUH. pin. p. 372.

SCHAEFF. fung. tab. 131. 132.

Loc. Ad caudices arborum provenit.

2756. **BOLETUS cupreus. SCHAEFF. tab. 133.**

Polyporus corne secedens purpureus, inferne flosus. HALL. hist. 3. n. 2305.

Suillus esculentus crassus, superne sordide rubens, inferne dilute luteus. MICH. gen. p. 127.

Loc. In umbrosis sylvarum pascuis praesertim sub Populo, & Tremula.

2757. **BOLETUS ramosissimus. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1598.**

Polyporus frondosus caespitosus, imbricatus apodiceus, poris albidis. HALL. hist. n. 2276.

Agaricum squamosum caespitosum, esculentum, crissotum, & lactinotum, superne obscurum, inferne album, foraminulis brevissimis, rotundis, exiguis. MICH. gen. p. 119. n. 13.

Fungus major carnosior, dendroides crissotus. BOCC. mus. p. 302.

SCHAEFF. fung. tab. 111.

VERN. Roscel.

Loc. Secus vias locis apicis frequentissimus.

HYDNUM. LINN. gen. n. 1076. syst. n. 1211.

Fungus horizontalis, subtus echinatus.

2758. **HYDNUM imbricatum.**

Hydnum stipitatum pileo convexo imbricato. LINN. spec. p. 1647.

Echinus petiolatus albicans, superne squamosus. HALL. hist. 3. n. 2324.

Erinococcus esculentus, albus, crassus. MICH. gen. 132. tab. 72. f. 2.

Fungus pene candidus, prona parte erinaceus. BAUH. hist. III. p. 828.

SCHAEFF. fung. tab. 140. 173.

Loc. In sylvis, atque truncis arborum insidet.

ALLIONI Fl. Pedem. Tom. II.

V v v v

1759. HYDNUM repandum

Icon. TAUR. Vol. XII. tab. 82. f. 5.

Hydnum stipitatum, pileo convexo, laevi, flexuoso. LINN. spec. p. 1647.

Echinus petiolosus subrufus, petiolo laevi. HALL. hist. 3. n. 2325.

Erinaceus coloris pallide citrei. DILL. catal. gress. p. 188. tab. 1.

Erinaceus esculentus pallide luteus. MICH. gen. 132. tab. 72. f. 3.

Boletus pileo pulvinato integerrimo, tubulis connatis, echinato-denticulatis. GLED. 4. Loc. in sylvis.

1760. HYDNUM gelatinosum.

Boletus acaulis gelatinosus, subtus aculeatus. SCOP. Fl. Carn. p. 48. n. 10. ed. 2. n. 1601.

Echinus gelatinosus crystallinus. HALL. hist. 3. n. 2319.

Loc. in lignis putridis.

1761. HYDNUM Coralloides. SCOP. Fl. Carn. n. 1602.

Clavaria ramosa, extremis ramulis teretibus subulatis, recta deorsum descendens.

SCOP. Fl. Carn. p. 61. n. 5.

Echinus tomentosus, aculeis parallelis. HALL. hist. n. 2317.

Agaricum esculentum, album, cespitosum multifidum, & denticulatum; denticulis asperis.

MICH. gen. p. 112. n. 2. tab. 64. f. 2.

SCHÆFF. fung. tab. 142.

Loc. in truncis arborum in sylvis collinis quandoque occurrit. Edulis.

1762. HYDNUM auriscalpium.

Hydnum stipitatum pileo dimidiato. LINN. spec. p. 1648.

Echinus petioli gracili, laterali, pileolo plano obscuro. HALL. hist. 3. n. 2322.

Erinaceus parvus hirsutus, ex fusco-fulvus, pileolo semiorbiculari, pediculo tenuiore.

MICH. p. 132. tab. 72. f. 4.

Fungus erinaceus parvus, in conis abiegnis nascent. BUXB. Cent. 1. tab. 57. f. 1.

Boletus pileo orbiculari ec. GLED. p. 74. n. 7.

Loc. in sylvis subalpinis locis mucosis.

1763. HYDNUM cyathiforme.

Hydnum caulescens, solitarium, & cespitosum, coriaceum; pileo infundibuliformi, striato, piloso, fusco, circulis concentricis, alternis, pallidioribus, & saturatioribus, albidis; petiolo inverse conico, fusco, basi radicato. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 93. tab. 139.

Echinus infundibuliformis, rufus, intus annulatus. HALL. hist. n. 2320.

Boletus coriaceus, pileo campanulato, inverso, desuper sericeo, & fulvo ferrugineo, lineis concentricis distincto; tubulis subius convexis echinato-denticulatis. GLED. fung. pag. 69.

Erinaceus infundibulum imitans, coriaceus, colore ex fulvo ferrugineo, pileo desuper veluti sericeo, & pluribus striis circularibus excavato. MICH. gen. pag. 132. tab. 72. fig. 4.

Fungus campanulatus lignosus. STERN. theatr. fung. pag. 258. tab. 27. 1.

Loc. in sylvis, locisque mucosis ad arborum truncos.

PHALLUS. LINN. gen. n. 1077. syn. n. 1212.

Fungus supra reticulatus, subtus laevis.

1764. PHALLUS esculentus.

Icon. TAUR. Vol. XII. tab. 88. f. 1.

Phallus pileo ovato celluloso, stipite nudo rugoso. LINN. syn. 12. p. 724.

Phallus alveolatus pileo plicato &c. SCOP. Fl. Carn. 2. n. 1604.

Phallus petiolo nudo, pileo subtus laxo. LINN. Hort. Cliff. 479.

Phallus petiolo nudo, pileo subius undique annexo. LINN. Hort. Cliff. 879. ROY. Lugd. B. 517.

Boletus capite terete reticulato. HALL. hist. 3. n. 2247.

Boletus esculentus rugosus, albicans, quasi fuligine infectus J. R. H. 561. tab. 329. f. 1. A.

Fungi esculenti species tres. CLUS. hist. 2. p. 164.

Boletus esculentus, rugosus 1. 2. 3. MICH. gen. 230. tab. 85. f. 1. 2.

VERN. Pungole.

Loc. In pascuis ad oras sylvarum. Edulis.

1765. PHALLUS impudicus.

Phallus volvatus nupitatus pileo celluloso. LINN. syst. 12. p. 724.

Phallus volva exceptus, capituli apice patulo. HALL. hist. tom. 3. n. 2248.

Phallus vulgaris totus albus volva rotundo, pileo cellulato, ac summa parte umbilico pervio ornato. MICH. gen. 201. tab. 83.

Phallus volva exceptus, pilei apice pervio. LINN. Hort. Cliff. 478. ROY. Lugd. 517.

Phallus hollandicus, s. bosavicus. DAL. hist. 1398.

Fungus foetidus penis imaginem referens. BAUH. pin. 374.

Phallus foetidus. LAM. Fl. Franc. tom. 1. p. 121.

Loc. In sylvis collium Taurinensium.

CLATHRUS. LINN. gen. n. 1078. syst. n. 1213.

Fungus subrotundus, cancellatus.

1766. CLATHRUS cancellatus.

Clathrus acaulis subrotundus. LINN. spec. p. 1648.

Clathrus (cancellatus) acaulis subrotundus volvo infundibuliformi maxima. GOU. flor. monsp. p. 463. n. 1.

Clathrus ruber. MICH. gen. 224. tab. 93.

Boletus cancellatus purpureus. TOURN. inst. 561. tab. 329. f. 6.

Fungus coralloides cancellatus. CLUS. app. alt.

Fungus rotundus cancellatus. BAUH. pin. 375.

Loc. In pascuis, & collinis Octobri, & Novembri.

ELVELA. LINN. gen. n. 1079. syst. n. 1214.

Fungus turbinatus.

1767. ELVELA mitra.

Elvela pileo deflexo odnaso lobato difformi. LINN. spec. p. 1649.

Boletus capitulo explanato lacinioso. HALL. hist. tom. 3. n. 2246.

Fungoides fungiforme crispum laciniosum, & varie complicatum. MICH. gen. 204. tab. 86. f. 7.

Elvela petioli lamina in formam capituli deorum plicata, laciniosa, & crispata, petiolo fistuloso, striato, & rimoso. GLED. p. 36.

SCHAEFF. fung. tab. 159. 160. 161. 162.

Loc. Frequens in sylvis. Edulis.

1768. ELVELA cornucopioides.

Elvela nupitata; pileo infundibuliformi, punctato, margine reflexo. SCOP. Fl. Corn. p. 52. n. 2., ed. 2. n. 1608.

Periza infundibuliformis disco patente, sinuato, punctato. LINN. syst. 12. p. 725.

Elvela corpore infundibuliformi inus fusco, exius cinereo; margine tumido, extrorsum reflexo. GLED. fung. p. 41.

Periza membranacea, tubae similis, marginibus replicatis. HALL. hist. n. 2216.

Fungoidaster. MICH. tab. 81. f. 5. 6.

Fungoides nigricans majus cornucopiae forma. VAILL. tab. 13. f. 22.

SCHAEFF. tab. 165.

Loc. In sylvis.

1769. ELVELA sambucina.

Elvela sessilis auriformis gelatinosa cinereo. SCOP. *Fl. Carn.* p. 56. n. 7. ed. 2. n. 1612.

Tremella sessilis membranacea auriformis cinerea. LINN. *syn. nat.* p. 1344.

Peziiza bracteata, cespitosa, plana, extus sericea. HALL. *hist.* n. 2220.

Elvela sessilis membranacea rugoso, & crispo, in formam gyrosam, & concavam varie complicata. GLED. *fung.* p. 39.

Agaricum auriculæ forma. MICH. *gen.* p. 124. tab. 66. fig. 1.

Loc. Frequens in sambuco, & in corticibus vetustarum arborum.

1770. ELVELA ochracea.

Elvela acaulis solitaria, & cespitosa, cartilaginea, fragilis; pileo concava plicato, multifidiformi ochraceo. SCHÆFF. *fung.* tab. 155.

Peziiza broceata, sordide lutea, subvillosa. HALL. *hist.* n. 2223.

Fungoides crispum, & undosum, acetabuli forma, intus, & foris obscurum. MICH. *gen.* p. 206. n. 4.

Loc. In ligno putrescenti, atque etiam in fimo reperitur.

1771. ELVELA flammea.

Elvela sessilis, auriformis, gelatinosa, rubra. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 1613.

Peziiza gelatinosa, coccinea, scyphis conicis simplicibus, & gregariis. HALL. *hist.* n. 2221.

Loc. In ramis arborum putridis.

1772. ELVELA albida.

Elvela acaulis salistoria, & cespitosa, ciliacea; pileo concava hemisphaerica, intus e caeruleo albido, glabro, extus subfusco, hirsuto, margine inaequali piloso, inferne radicans. SCHÆFF. *fung.* tab. 151.

Peziiza sessilis, hemisphaerica, extus villosa spadicea. HALL. *hist.* n. 2231.

Elvela hemisphaerica, excavata, sessilis, radice longa. GLED. *fung.* p. 46. n. 9.

Fungoides scutellatum, inferne album, externe obscurum, & subhirsutum. MICH. *gen.* p. 208. n. 8. tab. 86. f. 4.

Loc. In arboribus demortuis reperitur.

1773. ELVELA coccinea.

Elvela pileo cyathiformi, intus coccineo, extus albo, stipite poriter albo. SCOP. *Fl. Carn.* p. 53. ed. 2. n. 1615.

Peziiza minimo, petiolata, coccinea, hirsuta. HALL. *hist.* n. 2240.

Elvela hemisphaerica, excavata intus coccineo, extus alba, petalo longissimo cancolore. GLED. *fung.* p. 47.

Fungoides pyxidatum, intus coccineum, extus albidum, pediculis pariter albo. MICH. *gen. plant.* p. 205. tab. 86. f. 5.

Loc. Locis humidis, & ramulis in terra corruptis.

1774. ELVELA ciliata.

Elvela sessilis disco coccinea, plano; oris ciliatis. SCOP. *Fl. Carn.* p. 54. ed. 2. n. 1620.

Peziiza plana; margine convexa pilosa. LINN. *syn.* 12. p. 725.

Elvela orbicularis minima, sessilis, coccinea plana, margine ciliato, vel nuda. GLED. *fung.* p. 45.

Peziiza sessilis aurantia, plana, annulata. HALL. *hist.* n. 2242.

Fungoides coccineum, lentiforme; oris pilatis. MICH. *gen.* p. 207. tab. 86. f. 19.

Loc. In lignis humidis, & quae corrumpi incipiunt.

1775. ELVELA lentiformis.

Elvela sessilis, disco flavo plano, glabro. SCOP. *Fl. Carn.* p. 55. n. 5. ed. 2. n. 1621.

Peziiza flava brevissima petiolata plana. HALL. *hist.* n. 2241.

Elvela disciformis sessilis, & plana minima, aurantii coloris. GLED. *fung.* p. 45.

Loc. In sylvis montanis, & ramulis terræ insepultis inascitur.

CLAVARIA. LINN. *gen. n.* 1078. *yst. n.* 1216.

Fungus laevis, oblongus.

1776 CLAVARIA pistillaris.

Clavaria clavata-formis simplicissima. LINN. *spec. p.* 1651.*Clavaria simplex*. SCOP. *Fl. Carn. 2. p.* 482. *n.* 1612.*Clavaria alba longe petiolata*. HALL. *hist. 3. p.* 125. *n.* 2203.*Clavaria ex una basi multiplex fistulata &c.* GLED. *p.* 30.*Clavaria alba pistilli forma*. VAILL. *Paris. p.* 39. *tab. 8. f.* 5.*Clavaria major lutea*. MICH. *gen. 208. tab. 87. f.* 1.*Fungus clavatus albidus pistillaris*. BOCC. *mus. 1. tab.* 307.*Loc.* In sylvis sterilibus, & umbrosis.

1777. CLAVARIA ophioglossoides.

Clavaria clavata integerrima compressa obtusa. LINN. *spec. pag.* 1652.*Clavaria indivisa, nigra, compressa*. HALL. *hist. n.* 2206.*Clavaria ophioglossoides nigra*. VAILL. *Paris. pag.* 39. *tab. 9. fig.* 3. MICH. *gen. p.*208. *tab. 87. fig.* 4.SCHEFF. *fung. tab.* 327.*Loc.* In sylvis mucosis humidis collium.

1778. CLAVARIA digitata.

Clavaria ramosa lignea nigra. LINN. *spec. p.* 1652.*Agaricus digitatus niger*. TOURN. *inst.* 562.*Loc.* In sylvis frequens, truncis arborum innascens.

1779. CLAVARIA hypoxylon.

Clavaria ramoso-cornuta compressa. LINN. *spec. p.* 1652.*Sphaeria nigerrima, aspera, palmata, cornutus planis, carnosus pulverulentis*. HALL. *hist. 3. n.* 2194.*Valsa digitata*. SCOP. *Fl. Carn. 2. n.* 1413.*Lichen agaricus digitatus, niger, apicibus albo-rufis, seminibus griseis undique confertus*. MICH. *gen. p.* 104. *n.* 4. *tab. 54. f.* 5.*Fungus ramosus, niger, compressus, parvus, apicibus albidis*. RAI. *Angl. 3. p.* 15.*Clavaria cornuta*. LAM. *Fl. Franc. tom. 1. p.* 126.SCHEFF. *fung. tab.* 328.*Loc.* In ligno corrupto adhaerent.

1780. CLAVARIA palmata.

Clavaria ramosa, ramis compressis. SCOP. *Fl. Carn. p.* 60. *ed. 2. n.* 1624.*Clavaria caule plana, sulcata, ramis serratis*. HALL. *hist. 3. n.* 2200.*Coralloides minor cristata*. BUXB. *cent. 4. p.* 39. *tab. 66. f.* 1.*Coralloides ramosum ex rufa carneum, platyceran, seu latis cornutus, apicibus brevioribus*. MICH. *gen. tab. 89. f.* 3.*Coralloides amethystina*. BATT. *T. J. C.**Loc.* Frequens in montibus ad oras sylvarum.

1781. CLAVARIA coralloides.

Clavaria ramis confertis ramosissimis inaequalibus. LINN. *spec. p.* 1652.*Clavaria caule crassissima, ramis innumerabilibus, cespitosus breviter dentatis*. HALL. *hist. 3. n.* 2202.*Clavaria ramosa, ramis teretibus erectis*. SCOP. *Fl. Carn. 1. p.* 60. *n.* 4.*Clavaria corpore multifido inaequali, & ramosissimo, in apices graciles terminato*. GLED. *fung. p.* 31.ALLSONII *Flor. Pedem. Tom. II.*

X x x

SCHLEFF. fung. tab. 173.

Corallo-fungus flavus. VAILL. Paris. p. 41. tab. 8. f. 4.

Loc. Passim in sylvis montanis.

2782. *CLAVARIA muscoides*.

Clavaria ramis ramosis, acuminatis inaequalibus luteis. LINN. spec. p. 1632.

Clavaria caule ramoso, ramis incurvis acutis. HALL. hist. n. 2199.

Fungus parvus luteus ramosus. RAI. angl. p. 16. tab. 24. f. 7.

Clavaria corniculata. SCHLEFF. fung. tab. 173.

Loc. Ramis, & truncis arborum corruptis innascens interdum reperitur.

PEZIZA. LINN. gen. n. 1080. syst. n. 1215.

Fungus campanulatus, sessilis.

2783. *PEZIZA lentifera*.

Peziza campanulata lentifera. LINN. spec. p. 1649.

Peziza calyce campanulato. LINN. hori. cliff. 479. ROY. lugdb. B. 318.

Peziza (cyathiformis) sessilis campanulata. SCOP. Fl. Carn. p. 57. n. 1. ed. 2. n. 1629.

Cyathus sericeus intus laevis. HALL. n. 2215.

Peziza sessilis corpore campanulato, intuserrimo. GLED. fung. p. 137.

Cyathoides cyathiforme cinereum, & veluti sericeum. MICH. gen. 222. tab. 102. f. 1.

Fungoides infundibuliforme semine satum. VAILL. Paris 56. tab. 11. f. 6. 7.

Fungus campaniformis, niger parvus, multa semina in se continens. FLUK. phys. 184. f. 9.

Fungus pyxoides seminifer. LOESEL. Pruss. 98. tab. 16.

Fungus spermatias. BOCC. musc. 1. tab. 301. f. 1.

Loc. In trabibus, & asseribus, quae putrescere incipiunt.

2784. *PEZIZA crucibuliformis*. SCOP. Flor. Carn. ed. 2. n. 1630.

Peziza sessilis campanulata exigua aurea, & glabra. GLED. fung. p. 132. n. 1. var. b.

Cyathoides luteum crucibuliforme. MICH. gen. p. 222. tab. 102. fig. 3.

SCHLEFF. fung. tab. 179.

Loc. Autumno in sylvis umbris ligno innascitur.

2785. *PEZIZA acetabulum*.

Peziza cyathiformis: extus angulata venis ramosis. LINN. syst. 12. p. 725.

Peziza bracteata sordide lutea subvillosa. HALL. hist. n. 2223.

Fungoides fuscum acetabuliforme: externe ramificatum. VAILL. Paris. 57. tab. 13. f. 1.

Fungoides fuscum majus. BUXH. act. 4. p. 283. tab. 29. f. 1. 2.

Fungoides maximum vasis fusarii forma. MICH. gen. 206. tab. 86. f. 1.

Loc. Juxta vias locis humidis, & ad oras sylvarum.

LYCOPERDON. LINN. gen. n. 1082. syst. n. 1217.

Fungus subrotundus, seminibus farinaceis repletus.

2786. *LYCOPERDON Tuber*.

Lycoperdon globosum solidum muricatum, radice destitutum. LINN. syst. 12. p. 726.

Lycoperdon subterraneum conglomeratum cortice nigro. HALL. hist. n. 2177.

Lycoperdon globosum subterraneum, solidum, & scabrum, basi, & radice carens; capsulis seminibus magnis. GLED. fung. p. 157. n. 6.

Lycoperdon gulosorum. SCOP. Fl. Carn. 2. n. 1635.

Tuber brumale pulpa obscura odorata. MICH. gen. 221. tab. 164.

VENN. Trifole.

Loc. Frequens in collibus Liguriae, Montisferrati, & Astensis provinciae.

VIR. Saave, alliaceo-aromaticum Fungi genus est, in mensis expectum, & aphrodisiacum.

1787. LYCOPERDON cervinum.

Lycoperdon globosum solidiusculum centro farinifero, radice destitutum. LINN. *yst.* 12. p. 726.

Sphaeria subrotunda, tuberculis minimis, medulla atra, pulverulenta. HALL. *hist.* n. 2191.

Lycoperdastrium tuberosum arrhizon fulvum, cortice duriore crosso, & granulato, medulla ex albo purpurascens, semine nigro crassiore. MICH. *gen.* 220. tab. 99. f. 4.

Tubera cervina. BAUH. *pin.* 376. LOB. *ic.* 276.

Tuberum genus quibusdam cervi Boletus. BAUH. *hist.* 3. p. 851.

Loc. In pascuis collinis.

1788. LYCOPERDON bovista.

Lycoperdon subrotundum: lacerato-dehiscens. LINN. *yst.* 12. p. 726.

Lycoperdon saccatum cinereum, polline obscure viridi. HALL. *hist.* n. 2172.

Lycoperdon vulgare. TOURN. *inst.* 563.

Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus germanis Bofst. BAUH. *hist.* 3. p. 848.

Loc. In pascuis montanis, & collinis passim.

1789. LYCOPERDON aurantium.

Lycoperdon sphaeroidale basi rugosum stipitatum: laciniis obtuse emarginatis dehiscens. LINN. *yst.* 12. 726.

Lycoperdon aurantii coloris, ad basin rugosum. VAILL. *Paris.* 123. tab. 16. f. 9. 10.

Loc. In sylvis collium Taurinensium lectum est.

1790. LYCOPERDON stellatum.

Lycoperdon volva multifida patente, copula glabro: ore acuminato plicato. LINN. *yst.* 12. p. 726.

Lycoperdon cortice exteriori revoluta stellato. HALL. *hist.* n. 2174.

Lycoperdon volva multifida, patente coriacea inflexo; capitulo glabra, globoso, sessili, ore acuminato dentato. SCOP. *Fl. Carn.* 1. p. 63. n. 2. ed. 2. n. 1633.

Lycoperdon globosum, & sessile, volva radiata, patente, ore acuminato. GLED. *fung.* p. 151. n. 5.

Lycoperdon stellatum, calyce inverso. BUXH. *cent.* 2. p. 45. tab. 49. f. 3.

Geaster major, umbilico fimbriata. MICH. *gen.* 200. tab. 100. f. 1. 2. 3.

Fungus pulverulentus, crepitus lupi dictus, coronatus, & inferne stellatus. RAJ. *angl.* 3. p. 27. tab. 1. f. 1.

Fungus stellatus. BOCC. *mus.* 1. tab. 305. f. 4.

Loc. Muscosis, & collinis locis autumnis tempore.

1791. LYCOPERDON pedunculatum.

Lycoperdon stipite longo, capitulo globoso glabro: ore cylindrico integerrimo. LINN. *yst.* 12. p. 726.

Lycoperdon petalo gracili, capite sphaerico, locvi, papillato, perforato. HALL. *hist.* n. 2170.

Lycoperdon sphaerico-papillatum, petiolo longissimo. GLED. *fung.* 150. n. 3.

Lycoperdon parisiense minimum, pediculo donatum. TOURN. *inst.* 563. tab. 331. f. E. F.

Fungus pulverulentus minimus, pediculo longo insidens. RAJ. *angl.* 3. p. 27.

Loc. In hortis proprio vidit Cl. BELLARDI.

1792. LYCOPERDON excipuliforme.

Lycoperdon turbinatum candidum asperum, basi oblonga crassissima crispa. SCOP. *Fl. Carn.* ed. 2. n. 1631. var. 4.

Lycoperdon saccatum cinereum polline obscure viridi. HALL. *hist.* n. 2172. var. A. B. 1. & B. 1.

Lycoperdon pyriforme cinereum. BATT. *fung. arim.* p. 65. tab. 31. f. F.

Lycoperdon album asperum leviter fanigiatum, basi altiore, & crispa donatum. MICH. *nov. gen. plant.* p. 217. n. 6.

Lycoperdon excipuli chymiei forma. VAILL. *Paris.* p. 123. tab. 22. f. 15.

SCHEFF. *fung.* tab. 187. 292. & 295.

Loc. In sylvis montanis.

2793. LYCOPERDON variolesum.

Lycoperdon parasiticum sessile subrotundum, carice exteriori fulvo deciduo: farina atra compacta. LINN. syst. ed. 13. append. p. 234.

Sphaeria atra convexa, carne nigra. HALL. hist. n. 2187.

Lichenaides tuberculosum compressum nigrum lignis putridis adnascens. DILL. musc. 127. tab. 18. f. 7.

Lycogala globosum grani pisi magnitudine, aëris recoci colore. MICH. gen. 216. tab. 15. f. 2.

Loc. Habitat in arborum ramis emortuis.

MUCOR. LINN. gen. n. 1083. syst. n. 1218.

Fungus vesiculis stipitatis.

2794. MUCOR sphaerocephalus

Mucor perennis, stipite filiformi, nigro, capitulo globoso cinereo. LINN. spec. p. 1655.

Trichia petiolata nigra, capitula sphaerico, villa ochroleuca. HALL. hist. n. 2161. tab. 48. f. 3.

Loc. In parietibus, & supra lignos putridos.

2795. MUCOR embolus.

Mucor seta nigra, villo fusca. LINN. spec. p. 1655.

Embolus nigerrimus, albo villo adpressus. HALL. hist. n. 2137.

Loc. In lignis putridis.

2796. MUCOR mucedo.

Mucor stipitatus, capsula globosa. LINN. spec. p. 1655.

Mucor filamentosus granulatus fugacibus putrescentibus innatis. LINN. Fl. Lapp. 534. Fl. Svec. 1284. ROY. Lugdb. 520.

Mucor petiolatus cinereus. HALL. hist. n. 2147.

Mucor vulgaris, capitula lucida, per maturitatem nigra, pedicula grisea. MICH. gen. 215. tab. 95. f. 1.

Loc. In vegetabilibus putrescentibus.

2797. MUCOR glaucus.

Mucor stipitatus, capitulo subrotundo aggregato. LINN. spec. p. 1656.

Aspergillus capitatus capitulo glauca, seminibus rotundis. MICH. gen. 212. tab. 91. f. 1.

Loc. In fructibus corruptis.

2798. MUCOR crustaceus.

Mucor stipitatus, apicis digitatis. LINN. syst. 12. p. 727.

Byssus filamentosa fugax alba, putrescentibus innata. ROY. Lugdb. 520.

Bovrytis non ramosa alba, seminibus rotundis. MICH. gen. 213. tab. 91. f. 3.

Loc. In cibis corruptis.

2799. MUCOR cespitosus.

Mucor stipite ramosa, apicis ternatis. LINN. syst. 12. p. 727.

Aspergillus albus tenuissimus, graminis dactylodis facie, seminibus rotundis. MICH. gen. 213. tab. 91. f. 3.

Loc. In putrescentibus.

2800. MUCOR septicus.

Mucor uncinatus flavus. LINN. syst. 12. p. 727.

Fuligo buryacea crocea, cauliculis ramosis laciniatis. HALL. hist. n. 2133.

Mucor crustaceus ramosissimus, mollis, & fugax crocei coloris. GLED. fung. p. 160.

Loc. In lignis, & foliis putrescentibus.

ADDENDA ET EMENDANDA

Ad N. 35. Adde nomen specificum. *Galium nanum cauliculis erectis ramosis, foliis quinis ellipticis, fructibus rugosis flore majoribus.*

64. *VIR.* Non potest *Melissae* substitui, pro qua interdum adhibita est. Ejusdem usus negligitur, quamvis tamen efficaciam aliquam amaritiae, & odore promittat, qui ad *LAMI* odorem accedit. Laudata est in morbis pectoris, & praecipue ad calculum pellendum in infuso adhibita. Non videtur magna praestare posse ad renes calculo expediendos, sed alicujus utilitatis esse in serosis pulmonum morbis, ac residues menses posse propellere.

330. *Betonica foliis ovatis rotunde crenatis, spica ovata compacta.* HALL. hist. 2. n. 265.

353. * *TEUCRIUM* supinum.

Teucrium corymbo terminali, foliis linearibus margine revolutis. LINN. spec. p. 791.

JACQ. Fl. Austr. tab. 417.

Polium montanum supinum minimum. LON. ic. 488.

Polium montanum repens. BAUH. pin. 220.

Loc. Nasci in arenosis di *Scrivia* observavit Cl. BELLARDI. *PARANNE.*

339. Adde. Nascitur etiam in alpibus di *Tenda*, observante Cl. BELLARDI.

404. Adde Synonyma.

Campanula foliis ovatis glabris obsolete serratis, ramis brevissimis cauli approximatis. ROY. Lugdb. 246.

Campanula foliis ovatis margine cartilagineo crenatis, caule ramosissimo angustato. HORT. Cliff. 64.

Rapunculus hortensis lasiore folio, s. pyramidalis. BAUH. pin. 93.

458. *VIR.* Fructuum *Agni casti*, quibus olim vis tributa est Veneris stimulum retundendi, mentio aliqua facienda est, ut Tyroes Medicos moneamus nihil sperandum esse ab eorundem usu ad memoratum finem; quum imo videatur principio quodam acri aromatico potius ad Venerem extimulare. Planta insuper tota ex odore suo, affiniumque generum natura suspectae, & virulentiae indolis esse videtur. Aliis igitur medicamentis pollutionum frequentia, & praeternaturalis ad Venerem stimulus emendandus.

459. Adde. *Franciscus ALEXANDRI* innuit eam provenire in Comitatu *Nicaeensi*.

466. *VIR.* *CAPRIFOLIUM* sive *Italicum*, sive *Germanicum* ad similes usus adhibita sunt; hodie tamen negliguntur, aliis utilioribus herbis suffectis. Aliquid suspecti indicat odor. Evidens autem est vim adstringentem cum abstersiva qualitate foliis inesse. Gargarismatibus eadem recepta sunt in angina aquosa, atque etiam in oris ulceribus. Baccae acres sunt, & suspectae, vomitum movent a quinque ad octo exhibitae. Dictum est earundem infusum renes abstergere, & calculum pellere; sed id non sine periculo praestant, quum urinas sanguinolentas attulerint.

Pag. 131. post Polygonatum adde omissum ARISTOLOCHIE genus.

ARISTOLOCHIA LINN. gen. n. 911. syst. n. 1022.

Germen stigmatē sexpartito instructum sustinet corollam monopetalam, basi globosam, deinde hexagono-cylindraceam, denique in linguam formam eductam.

Antherae sex quadriloculares stigmatibus subtus adnatae sunt.

481.* **ARISTOLOCHIA** rotunda.

Icon. TAUR. Vol. VI. tab. 142. 143.

Aristolochia foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus solitariis. LINN. spec. p. 1364.

Aristolochia rotunda flore ex purpura-nigra. BAUH. pin. 307.

Aristolochia rotunda prima. CAUS. hist. 2. p. 70.

Aristolochia rotunda. MATTH.

Off. *Aristolochiae rotundae* radix.

VARN. *Surologia rotunda.*

Loc. In sylvis collinis umbrosis Pedemontanis, & Nicaensibus. PERENNIS.

481.** **ARISTOLOCHIA** clematitis.

Icon. TAUR. Vol. VI. tab. 141. & vol. XIX. tab. 17.

Aristolochia foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. LINN. spec. p. 1364.

Aristolochia clematitis recta. BAUH. pin. 307.

Aristolochia clematitis vulgaris. BAUH. hist. III. p. 370.

Aristolochia longa. MATTH.

Loc. In agro Tourinensi secus Padum, & Duriam in saxosis declivibus; frequens quoque in arvis subhumidis agri Pedemontani, Liguriae &c. PERENNIS.

481.*** **ARISTOLOCHIA** longa.

Aristolochia foliis cordatis petiolatis integerrimis obtusiusculis, caule infirmo, floribus solitariis. LINN. spec. p. 1364.

Aristolochia caule infirmo ramoso, foliis cordatis integerrimis longe petiolatis, floribus solitariis. SAUV. monsp. 111.

Aristolochia longa vera. BAUH. pin. 307.

Aristolochia longa. CAUS. hist. 2. p. 70.

Off. *Aristolochiae* longa.

Loc. Sponte nascitur in vineis Nicaensibus. PERENNIS.

VIR. Recensitae species ARISTOLOCHIAE tenent similia principia, similesque proprietates: verum apud nos solet rotunda frequentius adhiberi. Pars autem plantae in usum electa radix est. Acres, aromaticae, amarae, calefacientes sunt ARISTOLOCHIAE, visque activa residet in principio resinoso, & gummoso. Majorem acrimoniam resinorum principium imprimit, majorem autem amaritum extracrum aquosum. Mucum potenter haec planta incidit, ac haerentem parietibus vasorum abstergit, vasa valide exstimulat, aestum etiam aliquem in sanguine gignit: proficua autem est usu interno, & externo. In turundas efformatam radicem indant Chirurghi fistulis, atque foniculis ad eadem dilatanda, & majorem materiae proventum obtinendum. Pulverem etiam radicis inspersum adhibent, aut forti decoctione utuntur ad luxuriantes carnes absumendas, & sordida ulcera detergenda. Internus ARISTOLOCHIAE usus oppositus est in morbis stomachi, qui ex mico tenaci abstergendo proficiuntur: menses, & lochia pellit. Magnis autem laudibus elata est in arthritide, & podagra, in asthenate humido, in cachexia, & hydropse incipiente. Quod ad podagram pertinet, eas animadversiones, quae propositae sunt n. 148. & 159., iterum excitamus. Circa usum autem ARISTOLOCHIAE generatim monemus non nisi in frigidis, & pituitosis temperamentis, morbisque non febrilibus posse adhiberi, atque monita circa radicem Ari tradita etiam ad hujusce plantae radicem, licet minus acrem, transferri possunt. In pulverem trita radix datur a grans decem ad scrupulum unum; in infuso a drachma semisse ad drachmas duas.

Ad N. 498. Adde in acetariis libenter recipitur.

617. Dele *tab. 9. fig. 1.* & haec citatio pertinet ad n. 616. ad quem est referenda varietas ibi commemorata, & tradita *in specimine stirpium Pedemonii pag. 6. tab. 11. fig. 1.*

639. Excludatur TUSSILAGO sylvestris SCOFOLI.

657. *VIR.* Tota planta acris subaromatica, & pene urens est. Recens contrita, naribusque admota, aut siccata, & in pulverem trita sternutationem movet, ex quo effectu *Ptarmicae* nomen habet. Sive folia, sive radix, si masticentur, ac ore detineantur, sialogogam constituunt praesidium, utile in odontalgia, aliisque serosis capitis morbis, in quibus opportunum est salivationem valde incitare. Acetaria etiam ingreditur instar *Erucae*, & *Drounculii hortensis*. Parum usitata planta est, sed *POLYGONUM hydropiper* principiis suis acmulare videtur, & magnas militantes dare posse iis in morbis, in quibus acria, fortiterque incidentia desiderantur.

688. Deleatur hic numerus, quum *CHRYSANTHEMUM* inodorum recenseatur postea sub nomine *MATRICARIAE* inodorae.

730.* *SENECIO* crucifolius.

Senecio corollis radiantibus, foliis pinnatifidis densis subhirsitis, coule erecto. LINN. *syn. 12. p. 351.*

Jacobaea olivacea, foliis Erucae, Artemisiove similibus, & acmulis. RUFF. *jen. 176.*

Jacobaea incana repens. BARR. *rar. 1075. tab. 153.*

Jacobaea incana olivacea. BAUH. *pin. 131.*

Loc. In collibus ad oras sylvarum. PERENNIS.

743. *VIR.* Adde. Idem *Cl. BELLARDI* adnotavit Arnicam nocuisse paralytico, in quo morbus profectus erat ex materie acri repertussa.

787. Adde nomen specificum.

Hieracium coule simplicifoliosum, triflorum, aut quadriflorum, foliis villosis mollibus ovatis subintegerrimis.

849. Synonymum *HALLERT.* & icon hujusce numeri pertinere videntur ad *HYP-POCHERIM* helveticam.

858. *VIR.* Ad internum usum non venit, sed instar *Thymacae* adusum externum recipitur.

Post N. 866. Addatur omissum genus *CHAMÆROPS*.

CHAMÆROPS. LINN. *gen. n. 1084. syn. n. 1219.*

Ex ala spathae bifidae. Habitus ramosus floriget prodis. Calyx trifidus; petala tria; antherae sex adhaerentes filamento in membranam sexdentatam; germina tria mutantur singula in baccam monospermam.

866.* *CHAMÆROPS* hamilis.

Chamaerops frondibus palmatis plicatis, stipitibus spinosis. LINN. *spec. p. 1657.*

Palma humilis, s. Chamaerophes. BAUH. *hin. I. p. 368.*

Chamaerophes. DOD. *pempt. 820.*

Chamaerophes tricarpos spinosa, folio stabelliformi. PONT. *anth. 147. tab. 8.*

Loc. In agro Nicatensi. PERENNIS.

Ad N. 961. Lege. *Sinapis maritima* N. & Adde nomen specificum.

Sinapis glaberrima erecta ramosa, foliis subtruncatis sinuato-angulatis; siliquis glabris torulosus contortis, non cornutis,

1074. Adde nomen specificum.

Euphorbia glabra umbella multifida dichotoma; involucrellis bifoliis subcordatis, petalis bicornibus, romis sterilibus, foliis lanceolatis acuminatis.

1074. * *THALICTRUM* simplex.

Thalictrum caule folioso simplicissimo angulato. LINN. *yst.* 12. p. 377.

Tholicrum alpinum minus saxatile rutae folio, ramibus luteis. SEGU. *Veron.* 1. p. 174. tab. 11.

Loc. In saxosis alpium Cottiorum rarum non est. *PERENNE.*

1103. Adde. *Cl. BELLARDI* legit in pratis sterilibus di Cigliano, & Moncrivello prope lacum.

1105. Adde. *Cl. BELLARDI* vidit in summis collibus *Taurinensibus.*

1181. * *GENISTA* sibirica.

Genista foliis lanceolatis glabris, romis aequalibus teretibus erectis. LINN. *musci.* alt. p. 379.

JACQ. Hort. Vindob. tab. 190.

Loc. Abunde vidit, & legit in sylvis di *Borgomasino Cl. BELLARDI.* *PERENNIS.*

1201. Adde. Frequens est observante *Cl. BELLARDI* in vineis di *Borgomasino.*

1204. Excludatur *VICIA* pannonica CRANTZ.

1222. Adde nomen specificum.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis nervosis, seminibus subrotundis.

1262. *VIT.* Quamvis inusitata planta sit, atque vix officinis nota, eandem tamen omnino praetermittere nolo, nam odore, & sapore suo magna omnino praestare posse promittit, atque meretur, ut Medici eandem experiantur. Vites resolventes, & aperientes eidem tributa sunt, traditur etiam quartanam febrem debellare, si ex aqua decocta bibatur; hac ratione exhibita sudorem movet; crediderim etiam ad fatus recipi posse instar Sideritidis scopo resolvendi, & musculorum contracturas leniendi, quum affinia principia in utraque planta contineri videantur. Foliorum decoctionum dosis esse potest ab uocia una, ad duas, aut tres.

AD TOM. II.

1304. Adde. In montibus di *Fenestrelle* lectum est.

1317. *VIT.* Radices, & semina MET viribus suis multum conveniunt, sed semina magis carminativa sunt. Principia habent acria aromatica exstimulantia, & resolventia. Eorundem usu dicitur lac in mammis augeri. Radix praesertim commendatur ad mucum in pulmone haerentem incidendum, & ad menses pellendos. Inter diuretica medicamenta etiam locum habet.

1326. *VIT.* Folia *CORIANDRI* cimicem olent, & usu externo ad resolvendum inservire posse videntur, sed foetore suo omnem usum interdicunt. Semina probe matura grate aromatica sunt, sapore, & odore vera excellunt vi carminativa, & flatus discutiente, aliisque similibus virum seminibus anteposuntur; ut autem efficacius agant, non decoquenda, sed calenti aqua infundenda sunt, quum decoctio diutina activa principia diffuset, quae posita sunt in oleo quodam tenui essentiali aromatico.

Ad N. 1364. * *SISON* inundatum.

Sison repens umbellis bifidis. LINN. *syst.* 12. p. 212.

Sium foliis radiceolibus capillaribus, multifidis, caulibus pinnatis, ultima pinna trilobata. HALL. *hist.* 100. 1. n. 780.

Sium foliis submersis capillaribus, emersis pinnatis. ROY. *lugdb.* 109.

Sium minimum foliis imis ferolaceis. MORIS. *hist.* 3. p. 223. 2. 9. tab. 9. f. 5.

Sium inundatum. LAM. *Fl. Franc.* 100. 3. p. 460.

Loc. Lectum habet CL. BELLARDI prope la Rocca di Corio. *BIENNE*.

1366. *VIR.* Add. Incidentes durencas, & aliquo aromate extimulantes vires habet; in acetariis etiam recipitur locis maritimis, atque ex aqua decoctum lotii secretionem promovet. Nicaeenses non infrequenter adhibent, nostratibus in usum non venit.

1657. Adde nomen specificum.

Cistus arboreus exnupulatus, foliis cordato-lanceolatis rugoso-scribiculatis denticulatis.

1705. Deleatur nomen *ARENARIÆ* montanae, & leg. *ARENARIA* capillacea †. tab. 86. f. 2.

Arenaria foliis setaceis, rigidis, globosis, floribus erectis, petalis calyce majoribus. Deleatur etiam synonyma, quam distincta a montana planta sit, eaque *PERENNIS*.

1715. Excludatur synonymum *HALLERI*.

1729. * *CERASTIUM* lineare N. tab. 88. fig. 4.

Icon. TAUR. Vol. XXVII. tab. 46.

Cerastium foliis linearibus flaccidis aristatis, pedunculis subunisfloris tomentosis, capsulis oblongis.

Loc. In rupibus subhumidis alpium *Valdensium*, & *Montis Cenisi*. CL. BELLARDI frequenter nasci observavit in alpihus di *Viù*. *PERENNE*.

Obs. Dara descriptio *CERASTII* sub numero 1729. ad hanc speciem pertinet, quam habitae posteriores observationes, confirmante CL. *Mortino* VAHL, descriptam speciem differre docuerint a *CERASTIO aristo* LINNÆI, quod vulgarius nascitur locis siccis montanis, & subalpinis.

1775. Abunde nascitur prope la Turbio in Comitatu *Nicoensi*, observante CL. BELLARDI.

1784. * *PRUNUS* armeniaca.

Prunus floribus sessilibus, foliis subcordatis. LINN. *syst.* 12. p. 341.

Prunus foliis ovato-cordatis. ROY. *Lugdb.* 168.

Mala Armeniaca majora. BAUH. *pin.* 442.

VERN. Armagnon, o sia Arbicoc.

Loc. Vidit in sylvis, & sylvaticis *Montisferrosi* CL. BELLARDI. *ARBOR*.

1802. Adde nomen specificum.

Rosa germinibus ovatis, petiolis, pedunculisque hispidis, caule superne aculeatissimo. LINN. *suppl.* p. 262.

1808. CL. BELLARDI vidit ad sepes di *Villafranca* in Comitatu *Nicaensi*.

1844. Dele citationem *Iconographiae Tourinensis*.

1940. Adde nomen specificum.

Sempervivum caule simplici erecto, foliis elliptico-acutis inius planis, cima viridis, petalis senis ochroleucis.

ALLIONI Fl. Pedem. Tom. II.

Z z z

1001. Virtutes hic traditae transferantur ad n. 1000.

1481. * HYPNUM lucens.

Hypnum surculis ramosis, frondibus subpinnatis, foliolis punctatis. LINN. syst. 12. p. 703.

Hypnum fronde compressa ramosa, ramis vagis obtusis; foliis ovatis imbricatis reticulatis planis. SCOP. Fl. Carn. ed. 2. n. 1319.

Hypnum pennatum aquaticum lucens, longis, laetisque foliis. DILL. musc. 170. tab. 34. fig. 10.

Loc. Incolit loca paludosa.

1500. * HYPNUM riparium.

Hypnum surculis teretibus ramosis, foliis acutis patulis distantibus. LINN. syst. 12. p. 704.

Hypnum ramis teretibus, & pinnatis, foliis ovato-lanceolatis, pilo terminatis, setis caulinis brevibus. HALL. hist. n. 1746.

Hypnum caule ramoso tereti immerso subpinnato, foliis patentibus lanceolatis alternis, capsulo acuminato. NEKER. meth. musc. p. 184.

Hypnum aquaticum flagellis & teretibus, & pennatis. DILL. musc. p. 308. tab. 40. f. 44.

Loc. Secus fluvijs, & fluentes aquas.

1537. * LICHEN pertusus.

Lichen lapideus verrucis subsesselatis laevigatis pertusis, pora una, alterove cylindrica. LINN. syst. 12. p. 709.

Lichen crustaceus cinereus, scutellis virescentibus. HUDS. angl. 445.

Lichenoides verrucosum, & rugosum cinereum glabrum. DILL. musc. p. 128. tab. 18. fig. 9.

Lichenoides crustaceum arboreum tenuissimum cinereo-rufum, capsulis exiguis crebris. MICL. gen. 106. tab. 52. fig. 2.

Loc. Rupibus innascitur.

1747. Lin. 15. lege. In taleolas etiam sectus, malleoque contusus laudatur apta ratione applicitus ad haemorrhagias continendas.

1786. Add. Oss. Distinctiores duas varietates cinerei nimirum, & nigri ab auctoribus confusas ego distinguendas omnino puto: hanc autem observationem excito, ut Botanici diligenter inquirent; non modo autem colore, atque interiore substantia, sed & exteriori superficie differre videntur, quum in nigro eadem evidenter cancellata sit, laevis in altero; differunt etiam ratione temporis, quo eruantur, nigrum enim primi veris, & aetatis productum est, alterum autem solius autumn.

171. Vir. Add. Instar Carlinae acaulis edulis, sed suavior, & succosior, eosdemque usus praebere potest.

174. Vir. Add. Centaurii majoris, & Centaurii magni nomine olim in officinis recepta propter vires abstersivas, & ut ajunt, depurantes; nunc exolevit; allicubi quaedam praeparata adhuc ingreditur.

NOMINA GENERUM

Acarina Tom. l. p. 111.

Acer Il. 94.
Achilles L. 180.
Aconitum Il. 61.
Acorus Il. 117.
Acroscopicum Il. 288.
Actaea L. 394.
Adiantum Il. 288.
Adonis Il. 169.
Egilops Il. 362.
Egopodium Il. 16.
Echium Il. 18.
Agaricus Il. 117.
Agave L. 112.
Agrimonia Il. 72.
Agrostema Il. 66.
Agrostis Il. 316.
Aira Il. 142.
Aleo Il. 42.
Alchemilla Il. 104.
Aldrovanda Il. 37.
Alectrocephalus L. 18.
Alisma L. 314.
Allium Il. 115.
Alpecurus Il. 314.
Alnus Il. 110.
Althaea Il. 41.
Alyssum L. 141.
Amaranthus Il. 218.
Amaryllis Il. 111.
Ambrosia L. 142.
Ammi Il. 19.
Amygdalus Il. 116.
Anacyclis L. 163.
Anagallis L. 87.
Anagyris L. 140.
Andropogon Il. 260.
Androsace L. 90.
Androsaceum Il. 42.
Andryala L. 311.
Anemone Il. 170.
Anethum Il. 6.
Angelica Il. 9.
Anthriscum Il. 164.
Anthoceros Il. 314.
Anthoxanthum Il. 311.
Anthyllus L. 113.
Antirrhinum L. 64.
Aphanes Il. 194.
Aphyllanthus Il. 161.
Apium Il. 19.
Aquilegia Il. 64.
Arabis L. 268.
Arbutus L. 111.
Arenaria Il. 111.
Aristolochia Il. 363.
Arnica L. 204.
Artemisia L. 166.
Arum Il. 228.
Arundo Il. 216.
Asarum Il. 211.
Asclepias L. 104.
Asparagus Il. 166.
Asperugo L. 50.
Asperula L. 11.
Asphodelus Il. 161.
Asplenium Il. 284.

Aster L. 191.
Astragalus L. 140.
Astranea Il. 1.
Atracetylus L. 154.
Atragene L. 197.
Atriplex Il. 198.
Artopha L. 134.
Avena Il. 251.
Azalea L. 117.
Ballera L. 35.
Bartia L. 61.
Bellardia L. 61.
Bellis L. 191.
Berberis Il. 166.
Beta Il. 191.
Betonica L. 15.
Berula Il. 185.
Bidens L. 175.
Biscutella L. 247.
Boerhaavia L. 144.
Blasia Il. 114.
Blitum Il. 311.
Boadichia L. 146.
Boletus Il. 111.
Borago L. 48.
Brachiolobos L. 378.
Brassica L. 261.
Briza Il. 247.
Bromus Il. 249.
Bryonia L. 113.
Bryum Il. 300.
Buceras L. 313.
Bulonia L. 217.
Buglossum L. 47.
Bugula L. 41.
Bunias L. 217.
Bunium Il. 16.
Euphrasium L. 179.
Euphorbia Il. 13.
Buronis Il. 162.
Buxbaumia Il. 193.
Buxus Il. 230.
Byssus Il. 136.
Cacalia L. 177.
Cactus Il. 171.
Calendula L. 186.
Calitriche L. 311.
Caltha Il. 67.
Campanula L. 108.
Camphorosma Il. 210.
Capparis L. 301.
Cardamine L. 260.
Carduus L. 145.
Carduncellus L. 114.
Carex Il. 261.
Caulis L. 115.
Carpeum L. 161.
Carpinus Il. 188.
Carrhamus L. 114.
Carum Il. 11.
Caryophyllata Il. 60.
Catananche L. 207.
Caucalis Il. 13.
Celis Il. 226.
Cenchrus Il. 261.

Centaurea L. 157.
Centunculus L. 81.
Cerasium Il. 116.
Ceratoma Il. 119.
Ceratophyllum Il. 213.
Cercis L. 140.
Cerinthe L. 11.
Chaetophyllum Il. 11.
Chamaemelum L. 184.
Chamaerops Il. 163.
Chara Il. 213.
Cheiranthus L. 271.
Chelidonium L. 190.
Chenopodium Il. 191.
Cherisia Il. 119.
Chondrilla L. 214.
Chrysanthemum L. 189.
Chrysocoma L. 174.
Chrysosplenium Il. 213.
Cicer L. 111.
Cichorium L. 207.
Cineraria L. 101.
Cinerea L. 111.
Cirsium L. 148.
Cistus Il. 104.
Clathrus Il. 155.
Clavaria Il. 187.
Clematis L. 290.
Cinopodium L. 19.
Clypeola L. 146.
Cnecorun L. 214.
Cnicus L. 115.
Cochlearia L. 111.
Cnicus Il. 161.
Colchicum L. 117.
Colerus L. 111.
Comarum Il. 60.
Conferia Il. 114.
Conium Il. 13.
Convolvulus L. 106.
Conyza L. 171.
Coreopsis L. 179.
Coriandrum Il. 16.
Coriaria Il. 134.
Coris Il. 17.
Cortus L. 318.
Coronilla L. 114.
Coronopus L. 216.
Corrigiola L. 14.
Cortusa L. 91.
Corylus Il. 188.
Coryleae L. 180.
Crabbe L. 256.
Crataea Il. 111.
Crepis L. 219.
Cressa L. 88.
Crithmum Il. 27.
Crocus L. 84.
Croton Il. 47.
Crucianella L. 10.
Cuculus Il. 84.
Cuscuta L. 81.
Cyclamen L. 89.
Cynanchum L. 103.
Cynoglossum L. 49.
Cynurus Il. 141.
Cyperus Il. 274.

Cypripedium II. 151.
 Cytinus II. 114.
 Cytinus I. 159.

Danas II. 14.
 Dancus II. 30.
 Delphinium II. 61.
 Dentaria I. 159.
 Dianthus II. 74.
 Dictamnus II. 106.
 Digitalis I. 29.
 Digitalis II. 118.
 Diospyros I. 113.
 Dipsacus I. 137.
 Doernicum I. 101.
 Dorychnum I. 111.
 Draba I. 141.
 Dracocephalum I. 13.
 Dryas II. 169.

Echinophora II. 3.
 Echinops I. 143.
 Echium I. 54.
 Elaeagnus II. 126.
 Elatine I. 122.
 Elettaria II. 115.
 Elymus II. 112.
 Empetrum I. 116.
 Ephedra II. 177.
 Epilobium I. 179.
 Epimedum I. 118.
 Eriopactis II. 124.
 Equisetum I. 121.
 Erica I. 119.
 Eriogonum I. 198.
 Erigeron I. 71.
 Eriophorum II. 179.
 Ervum I. 127.
 Eryngium II. 2.
 Erysimum I. 173.
 Erythronium II. 161.
 Eupatorium I. 171.
 Euphorbia I. 181.
 Euphorbia I. 19.
 Evonymus II. 96.

Fagus II. 109.
 Ferula II. 3.
 Festuca II. 153.
 Ficus II. 231.
 Flago I. 171.
 Foeniculum II. 11.
 Fontinalis II. 107.
 Fossilina I. 146.
 Fragaria II. 130.
 Frankenia II. 90.
 Fraxinus II. 91.
 Frutularia II. 100.
 Fucus II. 128.
 Fumarica I. 199.

Galanthus II. 151.
 Galega I. 111.
 Galeopsis I. 29.
 Galium I. 4.
 Gardella II. 107.
 Gerani I. 111.
 Gerani I. 95.
 Geranium II. 11.
 Geropogon I. 139.
 Chidrius I. 81.
 Glacium I. 190.

Glac II. 111.
 Glechoma I. 11.
 Globularia I. 141.
 Gnaphalium I. 171.
 Gnathia I. 71.
 Gypsophila II. 78.

Harmala II. 101.
 Hedera II. 119.
 Hedyarum I. 112.
 Heliotropium I. 121.
 Helleborus II. 61.
 Hemerocallis II. 152.
 Herniaria II. 4.
 Herniaria II. 109.
 Hesperis I. 179.
 Hibiscus II. 40.
 Hieracium I. 111.
 Hippocrepis I. 117.
 Hippophae II. 126.
 Hoppus II. 192.
 Helios II. 161.
 Holosteum II. 120.
 Homalocenchrus II. 131.
 Hostium II. 119.
 Hottoria I. 91.
 Humulus II. 191.
 Myrsine II. 112.
 Hydnum II. 113.
 Hydrocharis I. 115.
 Hydrocotyle II. 1.
 Hyoscyamus I. 101.
 Hypericum II. 44.
 Hyptis II. 101.
 Hypochaeris I. 119.
 Hyssopus I. 121.

Iberis I. 150.
 Ilex I. 131.
 Illecebrum II. 110.
 Impatiens II. 100.
 Iris I. 81.
 Ixaris I. 158.
 Ixaria II. 111.

Jacione I. 116.
 Juncus II. 111.
 Juncus II. 114.
 Jungemanna II. 111.
 Juniperus II. 110.

Lactuca I. 113.
 Lagurus II. 119.
 Lamiaceae I. 121.
 Lappa I. 141.
 Lapsana I. 106.
 Lascipium II. 11.
 Lathraea I. 11.
 Lathyrus I. 119.
 Lavandula I. 141.
 Lavatera II. 11.
 Laurus II. 117.
 Lemna II. 120.
 Lenodion I. 108.
 Leonurus I. 12.
 Lepidium I. 113.
 Libanotis II. 10.
 Lichen II. 115.
 Ligustrum I. 113.
 Liquicium II. 12.
 Lilac I. 81.
 Lilium II. 159.

Lindernia I. 17.
 Linum II. 108.
 Lithospermum I. 11.
 Lolium II. 141.
 Lonicera I. 117.
 Lotus I. 109.
 Lonicera I. 145.
 Lonicera I. 131.
 Lycium I. 117.
 Lycium I. 117.
 Lycoperdon II. 118.
 Lycopodium II. 199.
 Lycopus I. 49.
 Lycopus I. 10.
 Lycimachia I. 94.
 Lythrum II. 167.

Melva II. 49.
 Marchantia II. 119.
 Matricaria I. 17.
 Matricaria II. 119.
 Matricaria I. 119.
 Matricaria I. 114.
 Melampyrum I. 18.
 Melia II. 111.
 Melica II. 114.
 Melilotus I. 108.
 Melissa I. 17.
 Melilotus I. 11.
 Mentha I. 17.
 Menyanthes I. 88.
 Menyanthes I. 118.
 Nephus II. 141.
 Microtus I. 170.
 Milium II. 113.
 Monardella I. 119.
 Mocheraga I. 141.
 Molucella I. 11.
 Monardella I. 113.
 Monarda I. 110.
 Monarda I. 110.
 Moschella I. 114.
 Mucor II. 160.
 Myagrum I. 117.
 Myosotis I. 14.
 Myrsine II. 112.
 Myrica II. 117.

Najas II. 111.
 Narcissus II. 114.
 Nardus II. 111.
 Narthecium II. 161.
 Nepeta I. 10.
 Nerium I. 101.
 Nigella II. 61.
 Nymphaea II. 171.

Oeonanthus II. 10.
 Olea I. 111.
 Onagra I. 117.
 Onobrychis I. 111.
 Ononis I. 116.
 Onopordum I. 144.
 Ononis I. 11.
 Ophioglossum II. 113.
 Orchis II. 145.
 Origanum I. 11.
 Ornithogalum II. 161.
 Ornithogalum II. 116.
 Otobanche I. 11.

Orobos L. 118.
 Ortega II. 210.
 Osmunda II. 281.
 Ostrya II. 225.
 Oxy II. 88.

P *aeonia* II. 107.
Papaver I. 191.
Pancratium II. 154.
Panicum II. 140.
Parietaria II. 100.
Pasir I. 186.
Parnassia II. 96.
Pastinaca II. 1.
Pedicularis I. 64.
Perlis II. 167.
Pervincia I. 101.
Pezomachus II. 1.
Pezia II. 118.
Phaca I. 117.
Phalaris II. 113.
Phallus II. 31.
Phaeum II. 191.
Phellandrium II. 19.
Philadelphus I. 174.
Phillyrea I. 111.
Phleum II. 132.
Phlomis I. 13.
Physalis I. 116.
Phytolacca I. 115.
Phytoneia II. 113.
Picris I. 189.
Pilularia II. 189.
Pimpinella II. 17.
Pinguicula I. 56.
Pinus II. 172.
Pistacia II. 119.
Pisum I. 191.
Plantago I. 60.
Plumbago I. 85.
Poa II. 144.
Polycaepus II. 100.
Polygencium II. 193.
Polygala I. 100.
Polygonum II. 110.
Polygonatum I. 115.
Polypodium II. 135.
Polytrichum II. 382.
Populus II. 169.
Porulacia II. 107.
Potamogeton I. 119.
Potentilla II. 14.
Poterium I. 136.
Prenanthes I. 115.
Primula I. 91.
Primula I. 14.
Prunus II. 114.
Prunella I. 113.
Pteris II. 181.
Palmonaria I. 9.
Panica II. 140.
Pyrola II. 101.
Pyrrus II. 147.

R
Ranunculus II. 188.
Rapistrum L. 357.
Retarda II. 91.
Rhagadiolus L. 136.
Rhamnus II. 119.
Rhodiola II. 181.

Rhododendrum L. 120.
Rhus II. 133.
Rubus II. 116.
Riccia II. 114.
Robinia L. 134.
Rorelia II. 28.
Rosa II. 118.
Rumex II. 11.
Rutabolla II. 139.
Rubia L. 10.
Rubus II. 131.
Rumex II. 108.
Ruppia II. 111.
Ruscus II. 114.
Ruta L. 130.

Sagina L. 137.
Sagittaria L. 331.
Salicornia II. 193.
Salix II. 183.
Salicola II. 222.
Salvia L. 22.
Salvinia II. 189.
Sambucus L. 129.
Sambucus L. 89.
Sanguinaria L. 80.
Sanguinaria L. 80.
Sanicula II. 1.
Santolina L. 164.
Saponaria II. 72.
Santonia L. 212.
Saxifraga II. 63.
Scabiosa L. 118.
Scheuchzeria L. 378.
Scilla II. 162.
Scirpus II. 175.
Scitanthus II. 193.
Scyolimus L. 207.
Scorpiurus L. 318.
Scorzonera L. 227.
Scrophularia L. 182.
Scutellaria L. 19.
Sedum II. 119.
Selinum II. 71.
Sempervivum II. 172.
Senecio L. 109.
Serolis L. 310.
Seseli II. 32.
Seseli II. 148.
Sherardia L. 11.
Sibbaldia II. 59.
Sila II. 49.
Sideritis L. 26.
Silene II. 79.
Siler II. 12.
Sinapis L. 262.
Sison II. 20.
Sisymbrium L. 174.
Sium II. 37.
Smilax II. 224.
Synonymum L. 21.
Solanum L. 135.
Soldanella L. 82.
Solidago L. 101.
Sonchus L. 222.
Sparanium II. 172.
Spartium L. 329.
Spergula II. 122.
Sphagnum II. 191.
Spiraea II. 92.
Splachnum II. 110.
Strachys L. 10.
Strachys L. 174.

Staphylaea II. 93.
 Stanice II. 89.
 Stellaria II. 119.
 Stellera II. 193.
 Siipi II. 119.
 Stramonium L. 101.
 Struthiopteris II. 183.
 Styrae L. 136.
 Severia L. 108.
 Symphytum L. 47.

Tamaricus **II.** 87.
Tamus **II.** 334.
Tanacetum **I.** 164.
Targionia **II.** 171.
Taxus **II.** 183.
Telephium **II.** 107.
Tecturum **I.** 41.
Thalictrum **I.** 395.
Thapsia **II.** 9.
Thelypodium **II.** 318.
Thesium **II.** 192.
Thiopia **I.** 248.
Thymasela **I.** 191.
Thymus **I.** 34.
Thymra **I.** 19.
Tilia **II.** 24.
Tordylium **II.** 1.
Tormentilla **I.** 195.
Tortia **I.** 57.
Tropaeogon **I.** 338.
Tragus **II.** 141.
Trapa **I.** 312.
Tromella **II.** 327.
Tribulus **II.** 91.
Trifolium **I.** 103.
Triglochin **I.** 335.
Tricoum **II.** 337.
Trollius **II.** 170.
Tulipa **I.** 166.
Turris **I.** 104.
Tussilago **I.** 176.
Typha **II.** 321.

Ulmus IL 112.
Ulmus IL 112.
Unifolium L 124.
Urtica IL 109.
Urticularia L 16.
Uvularia IL 100.
Vaccinium L 111.
Valeriana L 10.
Valeriana L 10.
Velezia IL 79.
Vernatium IL 166.
Verbascum L 104.
Verbena L 46.
Veronica L 21.
Viburnum L 130.
Vicia L 134.
Vicia IL 97.
Vincum IL 116.
Vitis L 124.
Vitis IL 114.

Xanthium L. 141.
Xeranthemum L. 128.
Zannichellia H. 111.
Zostera H. 112.

SYNONIMA BOTANICORUM

- Abies* Tom. II. Pag. 179. 180.
Abrotanum L. 164. ad 168.
Abrothium L. 167. ad 170. 187.
Abuilon II. 39.
Acacia L. 114. 119.
Acanos L. 144.
Acetosa II. 101. ad 105.
Achyrophorus L. 129. 130.
Acinaria II. 110.
Aconitum L. 105. 194. II. 49. 63. 65.
Acorus L. 85.
Acranicum II. 183. 185.
Adiantum II. 184. 185.
Adoxa L. 114.
Adysson L. 146. 147.
Aegilops II. 118. 114. 115. 160. 190.
Agaricus II. 117. 111. 117.
Ageratum L. 71. 180.
Aethyopsis L. 15.
Achusa II. 12.
Agrifolium L. 113.
Agronia II. 111. 115. 116. 118. 141.
 154. 157.
Aira II. 161. 162.
Ajuga L. 45.
Aizoon II. 68.
Alaternus II. 110.
Aicea II. 40. 41. 41.
Alchemilla II. 194.
Alcicorolophus L. 61. 63. 64.
Alga II. 111. ad 115.
Alisma L. 101.
Alkekengi L. 117.
Alliaria L. 174.
Alni effigie II. 141. 141.
Alnus II. 111. 117.
Aloe L. 118.
Alopecurus II. 141.
Alopecurus L. 113.
Alsinastrium L. 111.
Alsiniformis L. 79.
Alsine L. 78. 81. 90. 117. 111. II. 78.
 84. 90. 109. ad 111. 115. ad 118.
 111.
Alsines II. 118.
Alsinoides L. 17. 79.
Althaea II. 19. 43.
Alypum L. 141.
Alyssoides L. 141.
Alysson L. 141. 141. 144. 146.
Alyssum L. 141. 141. ad 147. 178.
Amanita II. 117. 118. 141. 141.
Amblatum L. 16.
Ambrosia L. 156.
Amelanchier II. 141.
Anacampteros II. 119. 111.
Anagallidantrum L. 83.
Anagallis L. 75. 76. 83. 89. 94. II. 115.
Anchusa L. 48. 11. 11. 14.
Androsace L. 91.
Androsacemum II. 44. 46.
Andryala L. 111. 115. 116. 111.
Anethum II. 15.
Angelica II. 7. 9. 11. 16.
Anonima L. 17.
Anonis L. 101. 116. ad 119.
Anonymos L. 101. II. 191.
Anthemis L. 184. ad 187.
Anthericum II. 111. 163. 165.
Anthora II. 63.
Anthyllis L. 8. II. 90. 111. 191. 198. 109.
Amirrhinum L. 17. 61.
Anithora II. 63.
Apargia L. 111.
Aparine L. 4. 2. 11. 11.
Aphaca L. 119.
Aphyllanthes L. 141.
Apium II. 8. 18. ad 10. 11. 11.
Apocynum L. 101.
Aquifolium L. 111.
Arabis L. 160. 161. 169. 177.
Aracus L. 117. 119.
Acarna L. 115. 116.
Arcium L. 144. 145. 148.
Arenaria II. 110. 111.
Arcia L. 90. 91.
Argemone L. 191.
Argentina II. 14. 60.
Aria II. 141.
Arisarum II. 119.
Armenius flos II. 77. 81.
Arundo II. 114. 114.
Asarum II. 114.
Aspalathus L. 119.
Aspergillus II. 160.
Asperula L. 10.
Aster L. 161. 180. 199. 104. 105.
Asteriscus L. 179.
Asterocephalus L. 141.
Asteroides L. 180.
Astragaloides L. 180. 118. 118.
Astragalus L. 111. 118. 119. 117. 118.
Astrantia II. 1.
Athamanta II. 8. 10. 11.
Atactylis L. 111.
Atriplex II. 196. 197. 111.

Avena II. 111, 116, 143, 144, 161, 163,
Auricula II. 11, 14, 82, 91, 94, 106,
111, 116,
Auricula ursi I. 91,
Azedarach II. 111.

B
Balsamina II. 100,
Balsamita I. 130,
Barba caprae II. 91,
Barba jovis I. 111,
Barbarea II. 171,
Behen II. 84,
Belladonna I. 124,
Bellidastrium I. 105,
Bellis I. 141, 187, 189, 190, 191, 105,
Berardia I. 144,
Betonica I. 16, 11, 69, 70, II. 75, 78,
Bidens I. 179,
Bifolium II. 151,
Bistorta II. 105, 106,
Blackstonia I. 100,
Blattaria I. 106,
Blitum II. 111, 196, 118,
Boleus II. 115,
Bonus Henricus, II. 196,
Borrage I. 47,
Botrys I. 41, II. 197,
Botrytis II. 160,
Brassica I. 116, 169,
Bromus II. 119, 151, 157,
Brunella I. 14,
Bryum II. 191, 194, 196, 110,
Buccaferrae II. 111,
Buglossum I. 48, ad 10, 11, 14, 111,
Bulbocastanum II. 16,
Bulbocodium II. 164,
Bulbonach I. 145,
Buphthalmum I. 165, 187,
Bursa pastoris I. 144, 149, 168,
Bysus II. 114, 160.

C
Calamintha I. 11, 15, 18,
Calceolus II. 151,
Calceitrapa I. 161, ad 161,
Calepina I. 116,
Calcha I. 188,
Camaelina I. 174,
Camepythis I. 88,
Campanula II. 109,
Camphorata II. 191, 110,
Cannabina I. 178,
Cannabis I. 10, II. 191,
Cantabrica I. 107,
Capraria I. 17,
Caprifolium I. 117, 118,
Caput gallinaceum I. 114,
Cardamine I. 111, 159, 168, ad 170, 176,
Cardiaca I. 10, 11.

C
Carduus I. 141, 144, 148, od 111, 151,
161, ad 161,
Carlina I. 150,
Carroba II. 119,
Carthamus I. 150, 154,
Carvi II. 11,
Carvisolia II. 9,
Cariophyllata II. 169,
Caryophyllus II. 14, ad 78, 85, 89, 111,
111, 115, od 118,
Casia II. 115,
Cassida I. 19,
Castanea II. 190,
Catanantra I. 119,
Cataria I. 16, 17,
Caucalis II. 1, 1, 11,
Ceanothus I. 111,
Cedrus II. 181,
Celsia I. 106,
Cenchrus II. 141,
Centaureum I. 144,
Centaureum I. 99, 100, 117, 161,
Centunculus I. 94, II. 116,
Cepa II. 158,
Cepaea II. 110, 111,
Cerasus II. 114,
Cerefolium II. 118, 11,
Cervaria II. 8,
Cervicaria I. 111,
Ceterach II. 184,
Chaerophyllum II. 118, 19, 191,
Chamaebalanus I. 111,
Chamaecerasus I. 118,
Chamaetuxus I. 101,
Chamaecissus I. 11,
Chamaecissus I. 117, II. 70, 101, ad 104,
Chamaeclema I. 11,
Chamaedaphne I. 111,
Chamaedrys I. 41, ad 41, 61, 76, 77, 86,
169,
Chamaegenista I. 111, 111,
Chamaejasme I. 91,
Chamaelea I. 111, 114,
Chamaeleon I. 147, 151,
Chamaelina I. 141,
Chamaelemum I. 165, 190, 191, 100, 101,
Chamaenerion I. 179, 180,
Chamaerorchis II. 149,
Chamaepitys I. 41, 41, 46, II. 198,
Chamaeripha II. 161,
Chamaerodendros I. 117, 110,
Chamaesice I. 181,
Chelidonia II. 48,
Chaenopodium II. 191,
Chlora I. 100,
Chondrilla I. 109, 119, 110, 111, ad 116,
119,
Christophoriona I. 194.

Chrysanthemum L. 163. 165. 179. 187.
193. 200. 201.
Chrysocoma L. 173.
Cicer L. 119. 140. 141.
Cichorium L. 220. 227.
Cicuto II. 15. 18. 26. 28.
Cicutaria II. 14. 17. 18. 28. 29.
Cirsium L. 145. 147.
Cladentio L. 55.
Clovario II. 154.
Clematis I. 101.
Clinopodium L. 20. 61.
Cymacnum L. 135.
Clypeolo L. 241. 243. 246. ad 248.
Cneorum L. 107.
Cnicus L. 149. 154.
Coccus II. 189.
Cochleario L. 141. 144. 156.
Colchicum II. 153.
Coluteo L. 134. 135.
Comaroides II. 18.
Condrylla L. 107. 157.
Conserva II. 111. 113.
Consolida L. 45. II. 61.
Convallario I. 124. 130. 131.
Convolvulus II. 109.
Conyza L. 174. 196. 198. 199. 202.
Corollino II. 111. 115.
Corallioides L. 159. II. 116. ad 125.
Corallo-fungus II. 158.
Coriondrum II. 15. 18. 27.
Coris L. 60. II. 46.
Coronopus L. 82.
Corrado II. 167.
Cotinus II. 131.
Cotoneaster II. 141.
Coula L. 165.
Cotyledon II. 68.
Cracca L. 124. 125. 127.
Cratogeomom L. 59.
Crataegus II. 141.
Crepis L. 208. 210. 211. 221.
Cristagalli L. 18.
Crithum II. 128.
Crucifera L. 8. 10. 11. 26.
Cucubatus II. 80. ad 81.
Cuculi flos II. 85.
Cucumis L. 122.
Cuminum II. 21.
Cunilo L. 11.
Cyonoides L. 160.
Cyanus L. 157. ad 159.
Cyathoides II. 158.
Cyclaminus L. 89.
Cymbalario L. 65.
Cyminum II. 26.
Cynocrobe II. 218. 219.
Cynoglossa L. 14.

Cynoglossum L. 14.
Cynourchis II. 148.
Cynosurus II. 246.
Cyperella II. 279.
Cyperoides II. 163. ad 173.
Cyperus II. 165. 277. 278.
Cytisus L. 119.

D
Dactylis II. 153.
Damosonium L. 214. II. 153.
Danilo II. 214.
Daphne L. 111. ad 133.
Datura L. 101.
Daucus II. 6. 8. 11. 12. 25. 30. 32.
Dens canis II. 161.
Dens leonis L. 208. 210. 212. 227.
Demoria L. 169.
Denellario L. 86.
Diapensio L. 91.
Digitalis L. 71.
Dipsacus L. 138.
Dorio L. 101.
Doranium L. 202. 204.
Dorycnium L. 114.
Droba L. 142. 151. 152. 155. 168. 277.
Dracontium II. 228.
Dracunculus L. 181. II. 228.
Drosero II. 88.
Dulcomoro L. 126.

E
Ebulus L. 129.
Echii facie L. 47.
Echinophora II. 13.
Echinus II. 153.
Echioides L. 49. 54.
Echium L. 54.
Elatine L. 65.
Elichryson L. 164.
Elichryso L. 175.
Elichrysium L. 171. ad 174. 176.
Elleborine II. 151.
Elymus II. 260.
Embolus II. 160.
Emerus L. 114.
Equisetum II. 193. 222. 222.
Erangelio II. 155.
Erica L. 136. II. 102. 131.
Ericoides L. 119.
Erigeron L. 199. 220.
Erinaceus II. 131.
Erinus L. 115.
Eruca L. 157. 167. 171. 175. 176. 278.
Eruca II. 92.
Eryngium L. 154. II. 28.
Erysimum L. 164. ad 167. 169. 171. 172.
276. 277.
Eupatorium L. 179. II. 74.
Euphrasio L. 57.

Foba L. 127. II. 119.
Fagopyrum II. 109.
Folcaria II. 28.
Ferrum equinum L. 135. 137.
Fessuco II. 261. 262. 219. 242. 249. od 251.
Ficaria II. 48.
Ficus II. 171.
Filago L. 174.
Filicentrum II. 183.
Filicula II. 285. 286. 288.
Filipendula II. 93. 93.
Filix II. 284. od 288.
Flammula L. 297.
Flos adonis II. 169.
Flos solis II. 101.
Fluvialis II. 221.
Foeniculum II. 18. 20.
Foenum groecum L. 111.
Foninalis L. 139. 140.
Fragaria II. 54. od 18. 60.
Fragaria L. 191.
Frangula II. 131.
Fraxinello II. 106.
Friillaria II. 164.
Fruex coronarius L. 294.
Fruices morini II. 112.
Fucoides II. 112.
Fucus II. 121. 126. 111. 114.
Fungoidaster II. 111.
Fungoides II. 111.
Fuligo II. 160.
Fungus II. 117. 118. 141. 142. 145. 313.

Golega L. 128.
Galeopsis L. 17. 30. 11.
Golium L. 10. ad 12.
Gallitricis L. 14.
Gallitrichum L. 14.
Geaster II. 359.
Genista L. 139.
Genistello L. 122.
Gentianella L. 97. 92.
Geum II. 60. 61. 62. 69. 169.
Glabrifolia L. 169.
Glastum L. 11.
Glaux L. 141.
Glycyrrhiza L. 141.
Glycypteros L. 126.
Gnaphalium L. 171.
Gnaphalodes L. 171.
Gromen L. 231. II. 96. 115. 216. 232. ad 272. 274. ad 278.
Graminifolia L. 189.
Grossularia II. 136. 137.

Guajacano L. 111.
Guesordio L. 54.
Gypsophylo II. 76. 115.

Hallimus II. 199.
Hedera L. 31.
Hedysorum L. 111. 131. 135.
Hedypnois L. 202. 211. 226.
Helenium L. 191. 196.
Helianthemum II. 102. od 105.
Helioerisos L. 174.
Helioctrysum L. 171.
Heliotropium II. 47.
Helleborus II. 152.
Helleborus II. 1. 166. 170.
Helix II. 109.
Heponica II. 170. 110.
Hepaticoides II. 112. ad 114.
Hepaphyllum II. 18.
Herba fumono II. 102.
Herba Paris L. 281.
Herba stella L. 82.
Herba turco II. 109.
Herbo S. Jacobi L. 101.
Herniaria L. 117.
Hesperis L. 262. 270. od 272. 274.
Hierocioides L. 119.
Hierocium L. 206. 208. 210. 212. 219. od 221. 226. 229. od 231.
Hippolapathum II. 101.
Hippomarathrum II. 20.
Hipposelinum II. 11.
Hippuris II. 111.
Holcus II. 161.
Holoneum L. 81.
Horminum L. 11. 15.
Hyacinthus II. 161.
Hydrocerotophyllum II. 122.
Hydrophorus II. 149.
Hyoseris L. 206. 208. 226. 237.
Hypericum II. 47.
Hypnum II. 191. 192. 100. 101. 109. 310.
Hypochaeris L. 112. 139. 110.
Hypoglossum II. 111.
Hypopitidis L. 180.
Hyppocistus II. 114.
Hydrophoe II. 120.
Hyssopifolio II. 162.
Hyssopus L. 24. 26.

Jocca II. 92. 100. 148. 157. ad 161. 163. 174. 178.
Jacobeo L. 100. ad 101.
Jasminoides L. 127.
Iberis L. 150. 152. 162.
Ilex II. 128. 189.

B b b b b

Imperatoria II. 7, 10.
Inula I. 195, ad 198.
Jonthlasi I. 246, 247.
Iris I. 276, 277.
Iva I. 282.
Juncago I. 235.
Juncellus II. 276.
Juncoides II. 215.
Juncus II. 167, 275, ad 278.
K
Kali II. 192, 198, 211.
Knavel II. 191.
Keimia II. 40.
L
Labrum veneris I. 117.
Laburnum I. 110, 119.
Lacryma jobi II. 163.
Lacuca I. 221, 225, 226.
Ladanum I. 29.
Lagopus I. 101, 105.
Lamium I. 16, 29, 10, 31.
Lantana I. 110.
Lapathum I. 219, II. 196, 201, ad 204.
Lappa I. 141.
Lappula II. 12.
Lapsana I. 227.
Larix II. 178.
Laserpitium II. 4, 9, 12, 17.
Lathyrus I. 284.
Lathyrus I. 225, 222.
Laureola I. 113.
Laurus I. 110, II. 225.
Ledon II. 102.
Ledum I. 120, II. 101.
Lemna II. 289.
Lens I. 227, II. 220, 289.
Lentibularia I. 16.
Lenicula I. 214, II. 88, 220, 289, 310.
Leniscus II. 191.
Leonodon I. 220, 215, 227.
Leonodanoides I. 206.
Leontopodium I. 171.
Lepidium I. 86, 249, ad 251, 255.
Leuchanthemum I. 192.
Leucojum I. 245, 247, 268, ad 274, II. 151.
Leucomyces II. 118.
Libanotis II. 1, 8, 11, 29.
Lichenastrum II. 111, ad 114.
Lichen II. 110, 114, 118, 117, 117.
Lichenoides II. 114, ad 118, 160.
Ligusticum II. 10, 17, 21, 25, 26, 10, 14.
Liliago II. 165.
Liliastrium II. 153.
Lilio narcissus II. 154.
Lilium I. 124, 131.
Limnopenae II. 192.
Limodorum II. 151.

Limonium II. 90.
Linaria I. 64, 66, ad 68, 174, II. 191, 198.
Lingua cervina II. 284.
Linkia II. 128.
Linophyllum II. 193.
Linocarpum II. 110.
Linum I. 94.
Lithospermum I. 54, 191, 263.
Litholasi I. 249, 251.
Lolium II. 246.
Lonchitis II. 281, 286, 288.
Lorus I. 133, 131, 132, 131, II. 226.
Lunaria I. 247, 282.
Lupulus II. 191.
Luteola II. 91.
Lychnis II. 77, ad 84, 86, 112, 119.
Lycogala II. 160.
Lysimachia I. 40, 279, 280, II. 167, 168.
M
Mahaleb II. 114.
Malus II. 140, 144.
Malva II. 42.
Mandragora I. 125.
Mariscus II. 278.
Marrabistrum I. 26, 31.
Marrubium I. 16, 11, 12.
Marum I. 21.
Matricaria I. 182, 184, 188, ad 191.
Medica I. 114, ad 116.
Melanium II. 100.
Melanthium II. 65, 107.
Melilotus I. 102, 106, 111, 114, 335.
Melissa I. 16.
Melissophyllum I. 16.
Meniantrum I. 17, 17.
Mentha I. 16, 17.
Merulius II. 143.
Meum II. 12.
Millefolium I. 56, 95, 182, ad 184, 282.
Mimulus I. 58.
Mnium II. 292, 114.
Mollugo I. 7.
Molucca I. 11.
Moly II. 159.
Monocarpus II. 221.
Monomyces II. 147.
Monochia II. 148.
Morus gallinae I. 29.
Muscari I. 122.
Musco-fungus II. 125, 128.
Muscooides II. 111, 124, 196.
Muscus II. 83, 292, ad 298, 301, ad 316.
Mutellina II. 13.
Myagrum I. 241, 243, 256, 257, 274.
Myosotis II. 115, ad 117.
Myriophyllum I. 243.
Myrrhis II. 11, 14.

Napellus ll. 61, 63.
Narcisso Leucojum ll. 155.
Narcissus ll. 152, 155, 164.
Nardus L. 1, ll. 218.
Nasturtium L. 241, 248, ad 250, 252,
253, 256, 260, ad 262, 269, 270,
275, 276.
Nerium L. 120.
Nidus avis ll. 151.
Nigella ll. 107.
Nigellastrum ll. 107.
Nissolia L. 129.
Noli me tangere ll. 100.
Nucula ll. 26.
Nummularia L. 95.
Nux vesicaria ll. 91.
Nymphaea L. 88, 235.

O
chrus L. 132.
Ocymastrum L. 212.
Ocymoides ll. 83.
Ocymoides ll. 78, 82, 85.
Odonites L. 60.
Oenanthe ll. 17.
Oenothera L. 279.
Olea ll. 226.
Oleander L. 102.
Omphalomices ll. 117.
Onobrychis L. 114, 122, 123, 118, 142.
Ophioglossum ll. 283.
Ophrys L. 124, ll. 148, 151, 152.
Opulus L. 110.
Opuntia ll. 173.
Orchiastrum ll. 152.
Orchis ll. 151.
Oreoselinum ll. 6, 18.
Ornithogalum ll. 153, 162, 163.
Ornithopus L. 116.
Orobancha L. 280.
Orobis L. 127.
Osmunda ll. 281, 284.
Osyris ll. 198, 226.
Othonna L. 203.
Oxalis ll. 88, 101, ad 105.
Oxyacantha ll. 141, 142.
Oxycedrus ll. 182.

P
adus ll. 114.
Paliurus ll. 131.
Palma christi ll. 150.
Palma humilis ll. 163.
Palmata ll. 150.
Panaces ll. 22.
Panax L. 202, ll. 1, 10, 11.
Panicum ll. 116, 118.
Papaver L. 290.
Parietaria L. 59.
Paronychia ll. 210.

Parthenium L. 182.
Passerina ll. 109, 191.
Pastinaca ll. 31.
Pedicularis L. 18, 60, 61.
Peganum ll. 103.
Pelecinus L. 144.
Peltaria L. 248.
Pentaphylloides ll. 14, 19.
Pentaphyllum ll. 194.
Pentapuris L. 182.
Pentapterophyllum L. 182.
Peplus L. 281.
Peplus L. 285.
Peplus L. 283.
Perfoliata ll. 22, 23.
Perfoliatum ll. 22, 23.
Periclymenum L. 127, 128.
Persicaria ll. 100, 206, 207.
Personata L. 145.
Pes anserinus ll. 106.
Pes leonis ll. 194.
Petasites L. 176, 177.
Petita ll. 155, 156.
Peucedanum ll. 14.
Phalangium ll. 153, 161, ad 165.
Phalaris ll. 212.
Pheledandrium ll. 13.
Phleum ll. 213, 241, 262.
Phoenix ll. 242, 260.
Phu L. 2.
Phyllis ll. 284.
Phyllon L. 243.
Phytheuma ll. 92.
Pieris L. 219.
Pilosella L. 172, 212, 213, 215.
Pimpinella L. 80, 136, ll. 20.
Pisum L. 114.
Pislyusa L. 284.
Plantago L. 214.
Pneumonanthe L. 97.
Poa ll. 116, 241, 252, ad 254.
Podagraria ll. 26.
Polium L. 44, 164.
Polygala L. 114.
Polygaloides L. 102.
Polygalon L. 121, 115.
Polygonatum ll. 110, 160.
Polygonifolia ll. 14.
Polygonum L. 217, ll. 177, 192, 193,
209, 220.
Polymixis ll. 144.
Polyporus ll. 151, 153.
Polytrichum ll. 295.
Populago ll. 67.
Porrum ll. 156, 159.
Potamogeton ll. 222, 223.
Potentilla L. 295, ll. 19.
Prunella L. 12.

x

Pseudoasphodelus II. 165.
Pseudo chamaphys L. 12.
Pseudonardus L. 24.
Pseudofumaria L. 299.
Pseudoligustrum II. 119.
Pseudomelanthium II. 86.
Pseudorchis II. 149. 152.
Pseudostachis L. 10.
Pseudocyperus II. 272. 278.
Ptyllium L. 82.
Psarmica L. 180. 181. 183.
Pteris II. 286.
Pulegium L. 19.
Pulsatilla II. 170. 171.
Pyracantha II. 142.
Pyrethrum L. 189.
Pyrus II. 143.

Q
Quamoclit L. 88.
Quercus II. 329.
Quinquefolium II. 15. ad 17. 60.

R
Radicle L. 278.
Raphanistrum L. 258.
Raphanus L. 255. 258. 262. ad 264. 267.
278.
Rapistrum L. 256. 258. 263.
Rapontium L. 115.
Rapum genistae L. 15.
Rapunculus L. 120. ad 122. 115. 116.
Ranunculus L. 234. 234. 235. II. 1. 169.
170. 172. 173.
Rhagadiolus L. 211.
Rhamnoides II. 226.
Rhamnus L. 127. II. 142. 126.
Rhaponicum L. 144. 160.
Rhaponium L. 126.
Rhinanthus L. 58. 61.
Rhododendrum L. 102.
Rhus II. 124.
Ritro L. 143.
Rorippa L. 278.
Ros solis II. 83.
Rubeola L. 6. 10. ad 12.
Rubia L. 7. 8. 12. 12.
Runa L. 70. II. 102.
Ruyechiana L. 32.

S
Sabina II. 180.
Sagitta L. 215.
Salicaria II. 167. 168.
Salsola II. 198.
Sanamunda L. 113.
Sanguicula L. 92.
Sanguisorba L. 136.
Sanicula L. 91. 106. II. 1. 69. 71.
Saponaria II. 28. 115.
Satyrium II. 146. 149. 150. 152. 161.

Saxifraga L. 260. II. 18. 20. 25. 81.
Scabiosa L. 116. 142. 160.
Scammonia L. 103.
Scandix II. 28. 29. 31.
Schoenoprasum II. 119.
Schoenus II. 217.
Scirpes II. 278.
Scirpoides II. 266.
Sclaginoides II. 290.
Sclarea L. 14.
Scordium L. 33. 43. 44.
Scordis L. 44.
Scorodo-Thlapa L. 248.
Scorpioides L. 116.
Scorpiurus L. 54.
Scrophularia II. 48.
Scorponera L. 211. 221.
Securidaca L. 335. 344. 441.
Sedum L. 20. ad 22. 243. II. 68. ad 71.
119. 123. 174. 175. 222.
Selago II. 290.
Selinum II. 4. 5. 14. 18.
Sempervivum II. 119. 121.
Senecio L. 157.
Serapias II. 148. 151. ad 153.
Seriphium L. 276.
Serpillum L. 19. 20.
Serratula L. 148. 153. 174.
Sesamoides II. 84. 92.
Seseli II. 12. ad 15. 18. 19. 25. ad 28.
Sherardia L. 9.
Sideritis L. 29. 31. 36. 183.
Siler II. 14.
Solidago L. 194.
Siliquea edulis L. 140. II. 119.
Siliquastrum L. 140.
Silybum L. 147.
Sinapi L. 257. 267. 275.
Sison II. 19.
Sisymbrium L. 262. 269. 273. 274. 278.
Sium II. 19. 26.
Smilax L. 106. 107. 124.
Soda II. 211.
Solanifolia L. 213.
Solanum L. 103. 124. 281.
Soldanella L. 108.
Solidago L. 198. 201. ad 203.
Sonchus L. 225. 229. 231.
Sorbus II. 141. ad 144.
Spergula II. 110. 114.
Sphagnum II. 292. 296. 310.
Spharia II. 228. 257. 319. 360.
Sphondylium II. 5.
Spina L. 144.
Squamaria L. 55.
Stachis L. 26.
Staphysagria II. 64.
Stellaria II. 112. ad 114. 118. 331.

Seachelina L. 19. 61.
Seorchas L. 15. 171. 176.
Seoebe L. 159. ad 161. 107.
Serapiotes L. 181.
Sivertia L. 100.
Suber II. 189.
Succisa L. 118. 140. 141.
Suillus II. 111.
Symphytum L. 10. 51. 119.
Syringa L. 83. 194.
Tamazix II. 87.
Tanacetum L. 182. 187. 191.
Taraxacanastrum L. 127.
Taraxacum L. 108. 119. 119. 117.
Tartoon-raire L. 111.
Telephium II. 119.
Testiculus II. 141.
Tetragoneolobus L. 109.
Tetrahis L. 16.
Terrae glandes L. 111.
Tertianaria L. 40.
Teucrium L. 40. 41. 46.
Therebinthus II. 191.
Thlapi L. 141. ad 143. 141. ad 148. 150.
 151. 156.
Thlaspidium L. 147.
Thora II. 49.
Thymbra L. 11.
Thymelaea L. 143. II. 191.
Thymum L. 10. 14.
Thymus L. 18.
Typha II. 117.
Tinus L. 110.
Tithymalus L. 181. ad 189.
Tordylium II. 11.
Tormentilla II. 194.
Trachelium L. 112.
Tragacantha L. 118.
Tragoselinum II. 17.
Tragum II. 177. 111.
Tremella II. 111. 114. 116.
Tribuloides L. 118.

Trichia II. 160.
Tribulus L. 118. 149.
Trichomanes II. 184. 181.
Trifolium L. 88. 108. ad 116. 111. 149.
Trifolium II. 18. 88. 89. 170.
Trigonella L. 111.
Triptolium L. 194.
Trixaga L. 11. 61.
Tuber II. 118.
Tuberaria II. 101.
Turrica II. 74. ad 77.
Turris L. 159. 161. 166. 168. 169. 171.

171.
Tussilago L. 177.

Vaccaria II. 77.
Valania I. 8.
Valsa II. 117.
Veratrum II. 67.
Verbascum L. 11. 11. 91.
Verbesina L. 178.
Vicia L. 117. 119.
Vinca L. 101.
Viala L. 16. 91. 111. 145. 171.
Virga aurea L. 101. 104.
Virga pastoris L. 117.
Vitaliana L. 91.
Vitis idaea L. 114. 111. II. 141.
Vitis nigra II. 114.
Viscaga II. 80. ad 82. 84.
Vulneraria L. 112.
Vulvaria II. 197.

Ulmaria II. 91. 91.
Urtica L. 19. 11.
Uva II. 177.
Uva crispa II. 117.
Uva ursi L. 111.
Usnea II. 116.

Xylosteum L. 118.

Zacintha L. 117.

NOMINA STIRPIUM MEDICINALIUM, ET IN OFFICINIS RECEPTA.

Abies mas 1946.
foemina 1947.
Abrotanum mas 605.
foemina 605.
campestre 606.
Abundium maritimum 613.
panicum 612.
alpinum 617.
vulgare 610.
romaeum 610.
arborescens 611.
Acanthium 525.
Acer 1618.
Acetosa 1041.
Acetosella 1601.
Achillea ligustica N. 660.
macrophylla Linn. 659.
moschata Jacq. 661.
magna L. 668.
Aconitum pardalianches 747.
bacciferum 1070.
lycoctonum 1498.
Acorus 1090.
palustris 111.
Adiantum rubrum 1195.
album 2408.
Agaricus muscarius 1078.
Agaricum 1748.
Agnus castus 458. & II. p. 161.
Agrimolium 456.
Agrimonia 1543.
Ailanthus L. 1763.
Alcea vulgaris 1418.
Alchemilla minima 1003.
Alchemilla 1000.
Aikekengi 463.
Alleluja 1602.
Alliaria 954.
Allium sectile L. 1884.
Allium media 1695.
Alliacea 1426.
Alypum 519.
Ambrosia campestris 934.
Ammi 1335.
Amygdalus 1785.
Anagallis mas 116.
foemina 117.
aquatica 273.
Androsaceum 1440.
Anethum 1258.
Angelica sylvestris 1300.
bohemica 1308.
Anonis 1161.
Anserina 1472.
Anthora 1501.
Antirrhinum 146.
Anthozoa 1501.
Aparine 38.
Apium 1334.
montanum nigrum 1302.
riva 1461.
Aquifolium 456.
Aquelegia 1507.
Aquilina 1509.
A. busus 494.
Archangelica 1308.

Argentina 1472.
Aristolochia rotunda 481. * II. p. 161.
clematitis L. 481. * II. p. 161.
longa 481. * II. p. 161.
fibacea 1083.
Arnica 743.
Artemisia 609.
labeii N. 607.
vallesiaca N. 614.
Artemisia 124.
Arum 1116.
Arundo sariva 1163.
montana 1163.
Asarum 1069.
Asclepias 171.
Asparagus 1909.
Asplenium 1394.
Atractylis lutea 564.
Asioplex foetida 1014.
Auricula urvi 116.
leporis 1348.

Ballota 127.
Barbarea 993.
Barbula hirci 841.
Bardana 528.
Beccabunga 171.
Belladonna 459.
Bellis major 683.
minor 698.
Berberis 1908.
Bera 2005.
Beronica 128.
Betula 1973.
Bidens 646. 648.
Bifolium 1850.
Bilingua 1118.
Bismalva 1436.
Bismorta major 1045.
Boletus ignarius L. 1747.
Bonus henticus 1006.
Borago 167.
Borrys vulgaris 1016.
vericillata 146.
Branca ursina germanica 1391.
Brassica marina 394.
Brunella 121.
Brusca 1117.
Bryonia 455.
Bajiosium sempervirens 166.
latifolium 166.
Bugula 158.
Bulbocastium 1361.
Bulbunc 898.
Buphthalmum 679.
salsifolium L. 653.
Bupleurum 1348.
falcatum L. 1349.
Bursa pastoreis 918.
Buxus 1097.
Calamantha montana 118.
arvensis 119.
Calamus aromaticus 1090.

Calceitrapa 195.
Calendula arvensis 683.
Caltha arvensis 683.
Campanula trachelium L. 410.
Camphorata 1062.
Capillus veneris 1417.
Capparis 1069.
Caprifolium germanicum 466. & II. p. 161.
italicum 465. II. p. 161.
Caput vituli 146.
Cardamome asiatica L. 948.
Cardua 118.
Carduus lacteus 535.
stellatus 535.
Carina 567.
acanthifolia N. 571. II. p. 161.
Carota 1380.
Carroba 1096.
Carrhamus 362.
Carvi 161.
Caryophyllata 1494.
Castula 108.
Castanea 1987.
Catanpucia 1016.
Catara tenuifolia 115.
Caula equina major 1383.
Caula equina 1385.
Celis australis 1112.
Cesaurum majus 574. II. p. 153.
minus 163.
Centimoebia 345.
Centinodia 1053.
Cepa secilis 1884.
Cerasus 1780.
racemosa 1778.
amara 1779.
nigra 1781.
Cervi spina 1764.
Ceterech 1104.
Chamaedrys 128.
major 150.
lacinata 146.
Chamaelina 892.
Chamaemelum vulgare 696.
nobile 673.
romanum 673.
Chamaepitys 150.
moschata 147.
Chamaecyparissus 603.
Chen 987.
Chelidonium minus 1446.
majus 1061.
Chelidonia major 1061.
minor 1446.
Chondrilla juncea 815.
Christophoriana 1070.
Chrysosplenium 1067.
Cicercala 1219.
Cicerbita aspera 814.
Cichorium 752.
Cicuta major 1325.
minor 111.
Cintium arvense N. 557.

Clematis 1079.
 daphnoides major 370.
 daphnoides minor 369.
 scandens 1080.
 Coccynia 1776.
 Corlearia 931.
 Cotula arborea 1234.
 Consolida major 161.
 media 156.
 minor 111.
 major tuberosa 163.
 aerea 734.
 Convolvulus major 389.
 Conyza major 636.
 Coriandrum sativum 1326. *B. p.*

364.
 Coriaria myrsifolia 1758.
 Coris monspeliaca 104.
 Cornu cervinum 101.
 Cornus sylvestris max 873.
 Cononopsis 101.
 Corylus 1979.
 Cotinus coriaria 1776.
 Crithmum 1366. *B. p.* 365.
 Crocus sativus 110.
 Cucumis asinus 454.
 Cucurbita 308.
 Cyanus 380.
 Cyclamen 124.
 Cynocrambe 1095.
 Cynoglossum 170.
 Cynorrhodon 1799.
 Cyperus longus 1353.

Daucus 1380.
 erectus 1779.
 Dens leonis 758.
 Dentellaria 115.
 Diapensia 1381.
 Dicamnus albus 1679.
 Digitalis grandiflora *N.* 218.
 Dipsacus 500.
 sylvestris 502.
 Doronicum 747.
 Dracunculus pratenis 657.
 Dulcamara 461.

Ebulus 473.
 Elatine max 114.
 Elaeium 454.
 Ellaphoboscum 1190.
 Enula campana 703.
 Erythimum 104.
 Equisetum 1385.
 minor 1381.
 major 1383.
 Erba rotta 656. & 663.
 Eruca sativa 970.
 renifolia 1000.
 Ervum 1211.
 Eryngium vulgare 1285.
 maximum 1283.
 Erycinum vulgare 1010.
 Eula major 1047.
 Evonimus 1634.
 Eupatorium veterum 1542.
 cannabinum 635.
 Ephrasia 113.

Fagus 1988.
 Fariola 640.

Ficus 1114.
 indica 1932.
 Ficaria 1446.
 Filago 610.
 Filipendula 1612.
 tenuifolia 1345.
 Flix mas 2404.
 foemina 1198. 1477.
 florida 1388.
 Flammula scandens 1080.
 Flox tinctoria 1182.
 Foeniculum 1366.
 aquaticum 1358.
 maritimum 1359.
 porcinum 1295.

Foenugraecum 1145.
 Fragaria 1491.
 fragaria 1490.
 Frangula 1769.
 Fraxinella 1679.
 Fraxinus 1614.
 Fumaria 1085.
 bulbosa 1083.
 tenuifolia 1086.
 Fumus terrae 1085.

Galega vulgaris 1235.
 Galium litoreum 15.
 Gallitricum sativum 60.
 Genepi 615. 616. 617.
 Genista tinctoria 1151.
 scoparia 1260.
 hispanica 1238.
 juncea 1258.
 Geranium robertianum 1404.
 molle 1406.
 barclachoides 1403.
 sanguineum 1411.

Glastum 943.
 Gramen dactylon 1170.
 officinale 1268.
 Granatum 1804.
 Gratia Dei 261.
 germanorum 1403.
 Gratiola 164.
 Grossularia 1790.
 oleas 1788.

Hedera terrestris 93.
 arborea 1760.
 Helenium 705.
 Helioscopium 187.
 tricoctum 1441.

Helleboraster 1514.
 Helleborus niger 1512.
 foetidus 1514.
 Helleborum album 1907.
 Helminthocorton 2611.
 Helione 2028.

Hepatica fontana 1515.
 nobilis 1920.
 trifolia 1920.
 alba 1615.

Herba britannica 2035.
 patri 1025.
 impia 630.
 trionitatis 1910.
 turca 2046.
 s. Roberti 1404.
 iudaea 114.
 siciliaria 1440.
 Herniaria 2056.

Hesperis 982.
 Hibiscus 1426.
 Hirsutidaria 1061.
 Hipidula 614.
 Himpiper 1050.
 Hyoscyamus niger 375.
 albus 376.
 Hypericum 1419.
 Hypocistis 2070.
 Hyssopus 81.

Jacea 577. 584.
 tricolor 1649.
 Iberis cardamantica 930.
 Ilex coelestis 1982.
 Imperatoria 1299.
 Inula 705.
 Irit nostras 112.
 Irit 1010.
 Iunil 543.
 Iva arctica 159.
 moschata 147. & 662.
 Jujubae 1766.
 Juniperus 1949.
 Jusquiamus niger 375.
 albus 376.

Kali 2065.

Labium veneris 500.
 Lamium 181.

album 101.
 purpureum 104.
 rubrum 104.
 maculatum 102.

Lappa major 511. 518.
 Lapathum sativum 1019.
 Laria 1944.

Laserpitium latifolium *L.* 1112.
 gallicum *L.* 1113.

Lathyrus 1036.
 Lathyrus 1219.
 Lavandula 91.

Laureola max 484.
 daphnoides 484.
 foemina 482.

Laurus 2114.
 alexandrina 2118.

Leander 368.
 Leoniscus 1891.

Lepidium vulgare 929.
 Leucanthemum vulgare 683.
 Levisticum 1309.

Lichen pyxidatus 1577.
 cinereus terrestris 1567.

Ligonicum 1309.
 Ligustrum 453.

Lilium convallium 418.
 Linaria 121.
 Lingua cervina 1191.

serpentina 1386.
 Linum catharticum 1693.
 Lithospermum 124.
 repens 186.

Lolium 1187.
 Lotus baemorrhoidalis 1112.

Lupula 1601.
 Lunaria 1387.
 graeca 898.

Lupulus 1989.
 Lupus sulcarius 1989.
 Luteola 1614.

Lycopus 63.
Lysimachia purpurea 1913.

M
Malvaceae 1426.
Malva 1420.
arborescens 1421.
vulgaris flore majore 1417.
vulgaris flore minore 1414.
Malus punica 1804.
cotonea 1819.

Mandragora 135.
Marrubium aquaticum 63.
album 98.
nigrum 137.

Matricaria 695.
Matthiola 50, 466.
Medica sylvestris 1147.
sativa 1146.

McLambion sylvestris 1510.
Melilotus 1111.

Melissa 136.
grandiflora L. 137.
sylvestris 64.

Melissophyllum 64, II, p. 361.
Mentha cataria 111.
romana 66.

perfoliata 70.
sylvestris 65.
alba 67.

Menthastrium 67.
Mercenalis mat. & foemina 1094.

montana 1095.
Mespilus vulgaris 1812.

Meum 1317, II, p. 164.
Mezerium 481.

Milium solis 184.
Millefolium 665.

nobile 667.
Mizanthra 101.

Morus diabolus 506.
galiniae 1695.

Moschatellina 493.
Moschatella 493.

Musca pulmonaria 1559.
cumanica, i. islandica 1557.

Mutellina 1318.
Myagrum 891.

Myrica odorata 1371.
Myrtillus grandis 490.

Myrtus 1791.
N

Napellus 1499, 1500.
Nasturtium aquaticum 598.

Nesophar album 1914.
luteum 1933.

Nepeta 111.
Nigella sylvestris 1510.

Nimulana 145.
Nux avellana 1579.

Nymphphaea alba 1914.
lutea 1933.

O
Oculus bovis 683.

Oenanthe 1345.
erocata L. 1344.

Olea 449.
Oleander 368.

Olivella 858, II, p. 363.
Onobrychia 1190.

Ononis 1161.
Onopordon 135.

Ophyoglossum 1386.

Ophrys 1850.
Opuntia 1931.

Orchis 1816.
Oreoselinum 1301.

Origanum 81.
Orobanch 1111.

Ornithoglossum regalis 1388.
Oxyris 245.

Oxyacantha 1908.
P

Paeonia 1580.
Paliurus 1761.

Panis porcinus 114.
culci 1601.

Papaver cornutum 1063.
corniculatum 1061.

erraticum 1068.
rubrum 1068.

rhoeas 1068.
Parietaria 1018.

Parnassia 1615.
Parthenium 695.

Pastinaca sativa 1190.
Pentaphyllum 1885.

Percepsier 1003.
Perfoliata 1348, 1349.

Perforata 1419.
Periscaria urens 1050.

miris 1048.
Pet columbinus 1406.

leonis 1000.
Petasites major 643.

Pevcedanum 1315.
Phellandrium 1318.

Philadelphus 1071.
Phylloea vulgaris 450.

angustifolia 451.
laetifolia 452.

Phyllitis 1303.
Phytolacca 1770.

Phytolacca 771.
Pimpinella 498.

taxifraga L. 1319.
magna L. 1330.

sanguisorba 191.
Pinguicula 199.

Pinus cembra L. 1945.
sativa 1943.

Pithusa 1941.
Plamago major 191.

seprinervia 191.
media 191.

quinoquervia 195.
aquatica 859.

minor 194.
trinervia 194.

angustifolia 194.
mas 194.

lanceolata 194.
Plumbago 115.

Polum 111.
montanum 114.

Polygala amara 1087.
vulgaris 1088.

Polyglossum 1053.
alpinum N. 1049.

amphibium L. 1047.
Polygonatum 480.

Polypodium 1398.
Polytrichum 1195.

Populus alba 1975.
nigra 1977.

Portulaca 1678.
Potentilla 1471.

Primula veris 113.
Prunella 123.

Prunus 1781.
sylvestris 1783.

Pseudopanax 1618.
Pseudo-acacia vulgaris 1336.

Pyllium 104.
Pieris 657, II, p. 363.

Pihora 1447.
Pulegium 71.

Pulmonaria maculata 174, 1559.
angustifolia 175.

gallorum 785.
Pulsatilla 1911.

Pyracantha 1813.
Pyrola 1610.

Q
Quercus coccolera L. 1981.

mas 1983.
Quinquefolium 1881.

R
Ranunculus glacialis L. 1451.

ruberosus 1457.
bulbosus 1457.

acris L. 1459.
palustris 1461.

Rapunculus arvensis 401.
esculentus 401.

spicans 419.
Rea bovis 1161.

Rhubarbarum monachorum 1039.
Rhamnus catharticus 1761.

solutivus 1761.
infectivus L. 1761.

Rhe dia radia 1257.
Rhododendron ferrugineum L. 445

Rhus 1771.
Ribes 1787.

nigrum 1788.
Robur 1983.

Rocella 1589.
Ros solis 1600, 1601.

Rosmarinus 61.
Rubia cynamochia 42.

tinctorum 41.
Rubus 1773.

idacus 1771.
saxatilis L. 1774.

Rumex horrensis 1010.
aquaticus 1011.

Ruscus 1117.
Ruta 1014.

caparia 1135.
S

Sabina 1948.
Sagittaria aquatica 863.

Salicaria 1913.
Salix alba 1948.

arborescens 1958.
Salsitrona 1600, 1601.

Salvia 71.
agrestis 152.

Sambucus 471.
Samolus 123.

Sanguinaria 1411.
Sancula 1381.

Sanguisorba major 103.
minor 458.

Santolina 603.
Saponaria 1555.

Satureja hortensis 88.

Satyrion 1826.

Saxifraga aurea 1067.

major 1129.

Scabiosa 508.

Scilla 1894.

Sclarea sativa 60.

Scelopendria 1393.

Scelopendria 1191.

Scordium 151.

Scorodoma 151.

Scorzonera germanica 837.

Scrophularia minor 1446.

odiosa 148.

foetida 148.

Scrofularia minor L. 144.

Scdm majus 1935.

vermiculare, am acre 1748.

ilicifera 1744.

Selinum cervaria L. 1301.

Sempervivum 1915.

Serpillum 76.

Serratula 538.

Sperisium hirsuta 114.

Sigillum salomonis 480.

Siler montanum 1316.

Silva edulis 1096.

Smilax aspera 1115.

Soda 1005.

Solanum vesicarium 463.

hortense 461.

racemosum 1770.

Soldanella 594.

Soschus asper 824.

laevis 815.

tenerimus L. 816.

picoides N. 819.

Sophia chirurgorum 1006.

Sorbus aucuparia 1810.

Sphondylium 1291.

Spica nardi 91.

celtica L.

Spina infectoria 1761.

Spina solstitialis 596.

Squilla 1894.

Straphysagria 1509.

Stellaria 1000.

Stoechas arabica 91.

Stramonium 374.

Stryax 497.

Suber 1931.

Succisa 506.

Summach 1775.

Symphitum 161.

medium 158.

minus 113.

tuberosum L. 161.

Syringa alba 1091.

Tamaricus germanica 1598.

Tanacetum 601.

Taraxacum 758.

Terebinthus 1990.

Terianaria 141.

Tetrait 114.

Teucrium lucidum L. 149.

frutescens 150.

montanum L.

Thalictrum 1076.

Thapsus barbarus 378.

Thlaspi 912.

arvense L. 909.

alliacum 910.

perfoliatum 914.

Thora 1447.

Thymalea 481.

Thymus 78.

piperella L. 84.

Tilia 1610.

Tithymalus platyphyllos 1051.

arvensis 1051.

Tormentilla 1071.

Tota bona 1006.

Tragopogon 841.

Tragoselinum 1319.

Tribulus aquaticus 871.

Trichomanes 1395.

Tritolium fibrinum 111.

acetorum 1601.

cervinum 615.

bituminosum 110.

Trinitas 1910.

Tuber 1788.

Tussilago 640.

Valeriana 1.

Veratrum 1909.

Verbascum 378.

max 378.

nigrum L. 381.

foemina 381.

Verbena 160.

Verbesina 646.

Vernicularia lutea 1744.

Veronica 264.

pyrenaica N. 165.

scutellum L. 276.

Verrucaria 187.

Vetonica 148.

Vicia 1100.

Vinca pervinca major 369.

pervinca minor 370.

Vincetoxicum 371.

Viola maritima 1639.

matronalis 981.

tricolor 1649.

Viona 1079.

Virga aurea 741.

saracenica 734.

pastoris 501.

Vitum quercinum 1111.

Vitis 1759.

alba 455.

idaea 491.

Vittraria 1016.

Vulvaria 1014.

Vulvaria 1139.

Ulmaria 1611.

Ulmus 1068.

Umbilicus veneris 446.

Unedo 494.

Urtica iners, s. mortua 101.

inens flore purpureo 101.

major 1017.

romana 1011.

pidifera 1015.

Uva ursi 496.

crispa 1790.

Uvularia 410.

Xanthium 511.

NOMINA MATTHIOLI

Abete n. 1946.
Abrotano maschio 625.
Abrotano femina 625.
Abutilo di Avicenna 1412.
Acacia I. 1263.
Acanio 525.
Aceosa 2641.
Achillea 667.
Aconiso pardalianche falso 1447.
Aconiso pardalianche minore 747.
Aconiso II. 1498.
Aconito IV. 1504.
Acoro 2292.
Acoro falso 112.
Adiantum 2417.
Adonide 19 7.
Ageraso 655.
Aglio orsino 1882.
Aglio serpentinio 1868.
Alcea 1418.
Alimo volgare 1022.
Alisma 743.
Alliaria 994.
Alno 1974.
Alone 1695.
Altea 1426.
Ambrosia 934.
Ambrosia alba 606.
Amello 722.
Ampelopraso 1877.
Anagallide maschio 116.
Anagallide femmina 117.
Anagiri maggiore, e minore 1174.
Anchusa 165.
Anchusa III. 179.
Androsamo 1432.
Aneto 1298.
Angelica domestica 1328.
Angelica selvanica 1322.
Anonide 1161. 1162.
Anemide 696.
Anurino I e II. 246.
Anurino III. 245.
Anurino IV. 244.
Anura 1501.
Aparine 18.
Apio palustre 1334.
Aquifolio 456.
Aquilegia 1507.
Arbutum 494.

Aristolochia }
rivonda } T. II. p. 162.
Aristolochia }
lunga }
Aro 2126.
Artemisia 629.
Asarina 632.
Asaro 2069.
Asciro 1431.
Asfodelo 1892.
Asplenio 2394.
Assenzo 610.
Assenzo pomico 612.
Assenzo marino 613.
Auere auico 722.
Auere attico II. 610.
Aurabile 564.
Auriplice selvatico 2224.
Auriplice marino 2223.
Avellana 1979.

B
Ballone 127.
Barba di becco 841.
Bellis maggiore 683.
Bellis minore 698.
Bnola 1973.
Beonica 128.
Biccola 2005.
Bistoria 2445.
Blastaria 385.
Bossa 2297.
Boiri 2016.
Brassica marina 194.
Brionia 455.
Buglossa vera 167.
Buphtalmo 679.
Bursa pastoris 218.

C
Calamintha aquatica 72.
Calamintha montana 138.
Calcatreppola 191.
Caltha 682.
Camamilla 696.
Canna 2262.
Cappari 1069.
Cardiaca 118.
Cardo volgare 570.
Cardo di s. Maria 131.
Caro 1361.
Carpino 1978.
Cece aricino 1232.
Cece selvatico 1266.
Cedra phenicio 1952.
Cedro licio 1951.

Centaurea maggiore 574.
Centaurea minore 161.
Cepae 1741.
Chamedaphne 484.
Chamedria I. 148.
Chamedria II. 146.
Chamelea 818.
Chameleone bianco 567.
Chameleone nero altro 567.
Chamepitiu I. 159.
Chamepitiu II. 157.
Chelidonia maggiore 1261.
Chelidonia minore 1446.
Chondrilla II. 824.
Chrisanthemo 664.
Ciano maggiore 578.
Ciano minore 582.
Ciclamino 124.
Cicorea selvatica 751.
Cicorea verrucaria 834.
Cicuta 1321.
Cimbalaria 232.
Cinocrambe 2029.
Cinoglossa volgare 172.
Cinquefoglio 1481.
Cipero 2331.
Cireggie racemose 1778.
Cireggie amarine 1782.
Ciao femina 1651.
Clematide I. 369.
Clematide III. 1079.
Clinopodio volgare 141.
Clinopodio altro 79.
Cneoro 487.
Cnicio 562.
Coclearia 931.
Cocomero selvatico 454.
Coda di cavallo I. 2383.
Coda di cavallo II. 2382.
Coda di cavallo III. 2381.
Colchica 433.
Colutea 1234.
Condrilla II. 824.
Coniza maggiore 636.
Coniza minore 711.
Coniza merzana 712.
Consolida regale 1522.
Consolida maggiore 161.
Consolida minore 123.
Consolida media 158.
Cori 224.
Coriandro 126.
Coridali 1084.
Corniole 871.

Coronopo 303.
 Cortusa 140.
 Cotino 1776.
 Corogno 1819.
 Couledone 446.
 Couledone altra 1516.
 Crespino 1908.
 Crihamo I. 1366.
 Crihamo II. 1287.
 Crihamo IV. 1370.

Daphnoide 482.
 Dauco L. 1379.
 Denaria 196.
 Denario aliro 947.
 Dente di leone 218.
 Diapensio 1282.
 Dipoco aliro 500.
 Dittamo bianco 1679.
 Droba 211.
 Dragonzio minore 1127.

Ebulo 473.
 Echio 181.
 Edero terrestre 91.
 Egilopo II. 1286.
 Elatine 133.
 Elice 1980.
 Elichriso 601.
 Elichriso di alora specie 664.
 Elleboro bianco 1907.
 Elleboro nero 1512.
 Elleboro nero II. 1513.
 Enanthe I. 1362.
 Enanthe II. 1345.
 Enanthe III. 1344.
 Enanthe IV. 1342.
 Epitimo 108.
 Equisetio I. 1383.
 Erba bello donna 459.
 Erba del laue 102.
 Erba gotorio 131.
 Erba pariz 1025.
 Ericeo I. 440.
 Erica bocchifera 866.
 Eriango montano 1285.
 Eriango marino 1283.
 Erisimo 1010.
 Eruca 970.
 Ervo 1212.
 Eufragia 117.
 Evonimo 1634.
 Eupatorio 1542.
 Eupatorio comune 637.

Faggio 1988.
 Farfaruggio 1515.
 Felce machio 1404.

Felce femina 1391.
 Fico 1114.
 Fico indiano 1932.
 Fien greco 1145.
 Filipendula 1622.
 Finocchio 1359.
 Flammola 1078.
 Fragaria 1491.
 Frangola 1769.
 Frozzino 1631.
 Fumoria 1085.
 Fumaria II. 1083.

Galega 1237.
 Golio 27.
 Geriofillata 1494.
 Geriofillato monzona 1496.
 Gelomino 448.
 Gentiana maggiore 165.
 Gentiano minore 162.
 Geranio II. 1407.
 Geranio III. 1121.
 Geranio IV. 1403.
 Geranio V. 1404.
 Geranio VI. 1396.
 Ginepro 1249.
 Giuggioleno 1766.
 Giunco florido 1212.
 Giunco 1072.
 Gnaffalio volgore 630.
 Grana 1282.
 Groziola 161.

Hedera helix } 1760.
 Hedera orboreo }
 Helenio 701.
 Heliotropio maggiore 187.
 Heliotropio minore 1441.
 Heline 1202.
 Heline cissampelos 188. 189.
 Hemerocalle I. 1885.
 Hermodauido folio 1890.
 Giacinta 438.
 Hidropepe 1050.
 Hieracio maggiore 811.
 Hiosciano bianco 376.
 Hiosciano nero 127.
 Hyperico 1432.
 Hippocisto 1070.
 Hippoglossio 1118.
 Hippolapato 1029.
 Hippolapato selvatico 1031.
 Hissopo 81.
 Holostio 1697.
 Hormino 52.
 Hormino selvatico 54.

Iacea 1649.
 Ieride 210.
 Imperatoria 1299.
 Irde selvatico minore 114.
 Irde selvatica 112.
 Irione 1010.
 Issuide selvatico 943.
 Isopiro 1509.
Koli 1065.

Labbro di venere aliro 500.
 Lagopo 1106.
 Lompiana 257.
 Lappo maggiore 518.
 Lappo minore 121.
 Larice 1944.
 Lathiri 1036.
 Lauca selvatico 820. 821.
 Lavanda 91.
 Lauro 1124.
 Lenuco 1222.
 Leontopodio vero 627.
 Leontopodio folio 629.
 Lepidio 210.
 Lepidio di Paolo, e Plinio 219.
 Leucojo giallo 987.
 Levinico volgare 1109.
 Lichene 1511.
 Lichide 1291.
 Ligustico 1316.
 Liguuro 451.
 Lilac 102.
 Lilium convallium 478.
 Limonia 1607.
 Linguo serpentina 1286.
 Lino selvatico 1692.
 Lisimachio 141.
 Lisimachio aliro 1211.
 Litospermo maggiore 184.
 Litospermo minore 185.
 Loglio 1185.
 Lonchite aspera maggiore 1392.
 Lonchite aspera falsa 1416.
 Loto 1112.
 Loto domestico 1112.
 Lunorio minore 1187.
 Lupulo 1282.

Mahaleb 1779.
 Malva 1414.
 Malva maggiore 1420.
 Malva III. 1421.
 Mandorle 1785.
 Mandrogoro machio 460.
 Marrobo 98.
 Mariagon 1886.

Matricaria 695.
Medio 416.
Melagrana 1804.
Melantio selvatico 1509.
Melantio selvatico II 1510.
Meliloto 1143.
Melissa 116.
Melo 1818.
Mensa L 66.
Menastro 65.
Meo 1112.
Mercorella maschio, e femina 1094.
Miagro falso 893.
Millefoglio maggiore 666.
Millefoglio minore 665.
Miriogillo altro 147.
Mirrhide 1374.
Mirrhe 1378.
Miraillo 490.
Miro 1794.
Morsus diaboli 506.
Mosso terrestre 1421.

N
Napello 1499.
Narciso VII 1865.
Nardo montano 10.
Nardo italiano 91.
Nardo celtico 8.
Nerio 368.
Nespolo II 1813.
Ninfea bianca 1934.
Ninfea lutea 1933.
Ninfea minore 862.
Nocciuole 1779.
Numolaria 145.

O
Ocinioide 1593.
Offi 1850.
Olio 449.
Olio di Boemia 3031.
Olmo 1068.
Ombilico di venere 446.
Ombilico di venere altro 1516.
Onobrichi 1190.
Orecchia d'orso 116.
Origano volgare 82.
Orobanchi 123.
Orabo 1211.
Ortica L 1025.
Ortica II 1027.
Ortica III 1026.
Ortica latte 102.
Osiide 143.
Oxalide 1041.
Oxalide minore 1043.
Oxiacantha 1807.
Oxilepatho 1031.

P
Palma christi minore 1845.
Panace chironio 1671.
Panico selvatico 1179.
Papavero selvatico 1068.
Papavero cornuto 1062.
Paronichia 1396.
Paronichia altra 1658.
Parthenio 695.
Pasinaca domestica 1290.
Pasinaca selvatica 1380.
Pelosella 772.
Peonia 1680.
Pentafillo bianco 1477.
Peplio 1031.
Peplio II 1031.
Perfoliata 1348.
Periclimeno 465.
Periscaria 1048.
Personata 518.
Pestine di venere 1376.
Peucedano 1295.
Pezzo 1947.
Phalangio 1858.
Phallaride 1139.
Phenice 1185.
Phillirea 450.
Philliride 1393.
Phisema 403.
Phu minore 5.
Phu minimo 4.
Piantaggine maggiore 195.
Piantaggine mezzana 193.
Piantaggine aquatica 859.
Piantaggine lunga 194.
Pimpinella maggiore 191.
Pimpinella minore 498.
Pimpinella sassifraga 1330.
Pino cembro 1945.
Pino selvatico 1943.
Pirola 1610.
Pitiusa 1041.
Polygonato 480.
Polygono maschio 1051.
Polygono minore 1056. 1057.
Polio L 155.
Polio II 153.
Polipodio 1398.
Polmonaria 1559.
Polmonaria altra 174.
Popolo nero 1977.
Popolo bianco 1975.
Popolo libico 1976.
Portulaca selvatica 1678.
Potamogeto 876.
Potentilla 1473.
Poterio 1257.
Primavera 113.
Pruna 1782.

Pruno selvatico 1781.
Pseudomelantio 1591.
Psillio 104.
Psillio altro 105.
Piarnica 612.
Pulegio 75.
Pulsatilla 1933.

Q
Quercia 1983.

R
Rafano volgare 932.
Ranoncolo I 1461.
Ranoncolo V 1457.
Raponcolo 403.
Rhamno II 1120.
Rhamno III 1265.
Rhodia radice 1757.
Rhu 1775.
Ribes volgare 1787.
Rosmarino coronario 62.
Rovo 1273.
Rovo ideo 1771.
Rubbia domestica 41.
Ruchetta domestica 970.
Ruchetta selvatica 1000.
Rusco 1117.
Ruta 1024.
Ruta capraria 1335.

S
Sabina 1948.
Saceta maggiore 863.
Saceta minore 863.
Salice 1258.
Salvia maggiore 51.
Sambuco montano 473.
Sanicola 1282.
Sanicola orsina 136.
Sassifragia L 84.
Sassifragia II 87.
Sassifragia IV 1331.
Sassifragia maggiore 1582.
Sassifragia di altra specie 88.
Scabiosa maggiore 583.
Scabiosa minore 510.
Scilla 1894.
Sclarea 60.
Scordio 154.
Scorpioide 1346.
Scorzonera 812.
Scropholaria 148.
Semprevivo maggiore 1935.
Semprevivo minore 1751.
Semprevivo minimo 1748.
Senape I 959.
Senape II 958.
Senecio 221.
Senecio maggiore 730.
Serpentina 103.

Serpillo 76.
Serratola 118.
Sesamoide minore 711.
Seseli etiopico 1112.
Seseli peloponense 1122.
Sferracavallo 1110.
Sfondilio 1191.
Sicomoro 1777.
Siderite I. 61.
Siliqua 1096.
Sinfio maggiore 161.
Sisembro aquatico 998.
Sisembro selvatico 70.
Smilace liscia 1189.
Smilace aspera 1111.
Smirnio 1146.
Solatro maggiore 459.
Solatro alicacabo 463.
Solatro degli orti 462.
Sonco aspro 814.
Sonco liscio altro 811.
Sorbo 1111.
Sorbo selvatico 1110.
Sorbo torminale 1106.
Sovero I. 1981.
Sparganio 1110.
Spartio 1111.
Spina bianca 1198.
Spina bianca d'alcuni 1121.
Spina infettoria 1791.
Staphilodendro 1121.
Staphisagria 111.
Stiecha 92.
Stellaria 1000.

Stirace 497.
Stivuo falso 1614.
Succisa 106.
T *amariggio* 1198.
Tanaceto 601.
Tasso 1191.
Terebinto 1990.
Tenicolo IV. 1121.
Tenicolo V. 1114.
Teucro I. 1190.
Teucro II. 1176.
Thalero 1076.
Thimo 78.
Thimela 488.
Thlaspi I. 912.
Thlaspi II. 909.
Tilia femina 1626.
Tipho 1148.
Titimalo ciparissio 1011.
Titimalo caraccia 1060.
Titimalo mirsinite 1016.
Titimalo paralo 1041.
Titimalo helioscopio 1047.
Titimola dendroide 1018.
Titimolo leptifillo 1011.
Tormenilla 1072.
Tossilagine maggiore 640.
Tossilagine minore 643.
Trago 1064.
Tragopogono 841.
Tribolo terrestre 1624.
Tribolo acquatico 872.
Trichomane 1191.

XIX

Trifoglio acetoso 1601.
Trifoglio acetoso giallo 1603.
Trifoglio de' prati 1100.
Trifoglio aspholue 1162.
Trinitas 1920.
Trisagine 148.

V *ecia* 1100.
Verbasco lichnide 181.
Verbasco I. 178.
Verbasco II. e III. 182.
Verbasco altro 183.
Verbena 160.
Verga di pastore 102.
Veronica maschio 164.
Veronica femina 114.
Viburno 471.
Vincetossico 171.
Viola porporea 1638.
Viola marina 416.
Viola arborea 1647.
Virga aurea 741.
Virga sanguinea 874.
Vischio 1111.
Vite bianca 451.
Vite nera 1116.
Vite selvatico 461.

U *va spino* 1790.

X *amio* 1121.

Z *izole* 1766.

NOMINA GALLICA.

A bsinthe	Absinthium		C aharet d'Europe	2069.	E benier des alpes	1174.
Ache	B. 1334.		Cailletan Galium		Eclair Chelidonium	
Agripaume	112.		Camacine noire	866.	Ecuelle d'eau	1186.
Aiguille	1326.		Camelée à trois coques	838.	Endormie	374.
Agrimone	Agrimonia		Camomille Chamamelum		Eparcette Onobrychia	
Ail	Allium		Camomille commune	696.	Epi d'eau Potamogeton	
Airelle	Vaccinium		Camomille puante	669.	Epine blanche	1807.
Aliboussier	Syrax		Camphre de Montpellier	1662.	Epine jaune Scolymus	
Aluier	Crotopus		Capillaire à feuilles de Coriandre	1417.	Epine vine Berberis	
Alcheunge	Physalis				Etable Acer	
Amandier	Amygdalus		Caprier Capparia	1417.	Esule grande	1037.
Amelanchier		1814.	Cardasse	1912.	Esule petite	1035.
Ancolie	Aquilegia		Cardère			
Arbousier	Arbutus		Caroubier		F enoil de porc	1195.
Argentine		1472.	Castelunette	580.	Fenoil Poniculum	
Armoise		609.	Casia	1728.	Fenoil marin	1336.
Arrête-beuf		1162.	Cendriette Cineraria		Fer de cheval Hippocrepis	
Arroche	Ariflex		Cerfeuil musqué	1371.	Figuier Ficus	
Atroche fetide	1014.		Chapeau d'Evêque	872.	Ficelle Sagittaria	
Aubepin	1807.		Charagne Chama		Follette	1024.
Aubois	508.		Chardon étroit	595.	Fougere Filix	
Aubours	1174.		Chardon à bonnetier		Franchet Fragaria	
Aule noir	1769.		Chardon-Roland		Frêne Fraxinus	
Aune	1974.		Charme Carpinus		Framboisier	1771.
Aunée	705.		Chastaine Castanea		Fumeterre Fumaria	
Aurone	Abrotanum		Châteigner	1987.	Fusain Evonymus	
Atalier	Asclea		Chaussette Calcitrapa		Fusset	1776.
Azaroier		1809.	Chêne Quercus	1980.		
			Chêne vert		G ainier Cercis	
B acille		1366.	Chenille Scorpionus		Gant de notre dame	410.
Bagnadier Colutea			Chevre-feuille Caprifolium		Garance	41.
Balaustier		1806.	Ciguë majeure	1125.	Garance petite	47.
Barbe de Chevre	1611.		Ciguë petite	1131.	Garderobe	603.
Barbe-Renaud	Tragacantha		Cocotte Alectrolophus		Garsa Thymisela	
Bardou	Andropogon		Cognassier	1810.	Gaude	1614.
Bea-de-grue	Geranium		Colcuivide	455.	Gendit Genista	
Bedeau		939.	Connuide	154.	Genêt commun	1260.
Behen rouge		1607.	Coquelicot	1068.	Genêt d'Espagne	1228.
Benoite	Caryophyllata		Coquelourde	1913.	Genevrier Juniperus	
Berce	Heracleum		Coralline de Corse	1611.	Germandrée	148.
Berle	Sam		Crâne de Cerf	101.	Germandrée grosse	150.
Besnoie	Betonica		Cornelle Lyimachia		Genet Lathyrus	
Blanchette		12.	Corn-fler Ceratophyllum		Girolier Cheiranthus	
Blatte	1092.		Coenouiller Cornus		Glaciel Glaciolus	
Bluet	580.		Cerroyère Coriaria		Glouaron	518.
Bois de s. Lucie	1778.		Cussonier Filago		Globet d'eau	1286.
Bois punais	874.		Coudrier noisetier	1979.	Grassette Fingicula	
Bois puant	1264.		Casson Cochlearia		Gratteron	38.
Bonne de prétre	1634.		Citragaudine	114.	Grieml Liebospersum	
Bouge	Pimpinella		Cresson	995.	Grenadier Punica	
Bouillon	Verbascum		Cresson des prés	213.	Grippe Lycopsis	
Bouleau	Betula		Criste marine	1366.	Griset Hypophae	
Boulette	Echinops		Croquette Crucianella		Grosseiller Rubus	
Bourdaine		1769.	Cupidone Catanance		Guede	943.
Bourache	Borrago		Curage	1050.	Gui Viicum	
Bourache petite		172.	D auphin Delphinium		Gulmauve	1416.
Boussie à berger		918.	Démelane	115.		
Bruyere	Erica		Dent de chien	1890.	H erbe à robert	1404.
Bugie	Bugula		Demie-veon	371.	Herbe à sterner	627.
Bugrande		1162.	Doradille	1324.	Herbe à coton Filago	
Bugrane	Ononis		Dorine Chrysosplenium		Herbe à l'equinancie	47.
Buis	Buxus				Herbe aux cancer	115.
Buis piquant		1117.			Herbe aux ecus	345.
Burison ardent		1813.			Herbe aux mamelles	748.
Buscrole		496.			Herbe aux zoes	1014.
					Herbe aux verroes	187.

* Nomina gallica, quae a latinis vix differunt, data opera omitta sunt.

Herbe aux chats 131.
 Herbe aux cailliers Cochlearia
 Herbe aux grus 1079.
 Herbe aux perles Lithospermum
 Herbe aux poux 1505.
 Herbe aux puces 104.
 Herbe aux teigneux 643.
 Herbe de s. Antoine 1015.
 Herniole Herniaria
 Hêtre 1988.
 Houblon Humulus
 Houx Aquifolium
 Houx frelon Ruscus

Immortelle Elichrysium
 Ivette

Joubarbe Sempervivum
 Joubarbe petite 1751.
 Joubarbe des vignes 1737.
 Julienne Heperis
 Jusquiame Hyoscyamus

Laitier Polygala
 Laiton Sonchus
 Lampette Lychnis
 Langue de Cerf 1393.
 Langue de Chien 170.
 Langue de serpent Ophioglossum
 Larme de Job 1189.
 Laurier Laurus
 Laurier-rose 368.
 Laurier-rose petit 1015.
 Laurier-rin 477.
 Lavandee commune 1135.
 Lège 1981.
 Lierre rampant 1760.

Liseron Convolvulus
 Livèche Ligusticum
 Lunetiere Biscutella
 Luserne Medicago

Maceron Smyrnium

Mache 11.
 Mache flottante 871.
 Marguerite 683.
 Maroute 669.
 Marroier 1987.
 Masse Thypha
 Mauve Malva
 Mauve rose 1410.
 Melese 1944.
 Melizet Cerinthe
 Menhastre } 62.
 Menhe sauvage }
 Merisier 1781.
 Micoeulier 1112.
 Millefeuille 665.
 Milleperuis Hypericum
 Millet Millium
 Morelle 461.
 Morelle grimpeante 461.
 Morelle genovillette 862.
 Morgeline 1695.
 Morille Phallus
 Moes du diable 506.
 Moutarde Sinapis
 Muffet Amirrhinum
 Nasse de Vcau Amirrhinum
 Muguet 478.

Neflier Metpilus

Nerprun Rhamnus
 Net-couper Staphylea
 Nid d'oiseau
 Nelle Nigella
 Non-feuillée
 Nummulaire

Olier
 Oeil de bœuf
 Oeil de Christ
 Oeillet Dianthus
 Olinet Elaeagnus
 Orcanette 161.
 Oreille de souris Cerastium
 Oreille de levze 1348.
 Oreille de rat 773.
 Orwin 11.
 Orpin Sedum
 Oris morte des bois 108.
 Orvale 60.
 Oseille Aceto.

Pain de pourreau 134.
 Palustre 1765.
 Panais Pastinaca
 Panicaut Eryngium
 Paris Panicum
 Paquerete 698.
 Parelle 1015.
 Pas d'ane 640.
 Passerage Lepidium
 Passerose
 Patel 1410.
 Patelle 943.
 Patience Rumex
 Patience des marais
 Paturin Poa
 Pate d'oye Chenopodium
 Pavot Papaver
 Peigne de Venus
 Pece-nege Galanthus
 Pece-mouise
 Pece-feuille
 Pece-pierre
 Pensil de montagne Oraselinum.
 Pensil des marais 1303.
 Pervenche Pervinca
 Petit Muguet 10.
 Petit Cyprès Santolina
 Peuplier Populus
 Pié de lion Alchemilla
 Pié de griffon 1514.
 Pié de lieure 1106.
 Pié de Veau Arum
 Pié de Char 614.
 Pié d'Oiseau Ornithopus
 Pié d'Alouette Delphinium
 Pignon Thalictrum
 Pimprenelle 498.
 Pisonit Leonodon
 Pistachier Pistacia
 Pivoine Paeonia
 Plantain Plantago
 Plaqueminier
 Plumeau Hottoria
 Poisee Beta
 Polier Pyrus
 Pous diche Cicer
 Poivre d'eau 1050.
 Pomme epineuse 374.
 Pomette Stramonium
 Porte feuille
 Porte chapeau 1765.

221
 Poule grasse 12.
 Poutier 25.
 Pourpier Portulaca
 Pîcle Equisetum
 1810.
 1906.
 141.
 476.
 679.
 701.
 Primever) Primula veris
 Primevere)
 Queue de porceau 1395.
 Queue de Cheval Equisetum
 Quinte-feuille 1483.

Racine vierge 1116.
 Radet Raphaen
 Raiponce Phytolyma
 Rasin de mer 1941.
 Rasin de Renard 1025.
 Rasin d'ours 106.
 Rapette Asperugo
 Raquette 1912.
 Renne des prea 1011.
 Remors 506.
 Remouée Polygonum
 Reprise 1737.
 Rieble 18.
 Robinier Robinia
 Ronce Rubus
 Ronce de Saint François 1773.
 Roquette Eruca
 Roquette des champs 919.
 Rosage Rhododendron
 Rosier Arundo
 Rosier Rosa
 Rouvet Oxyris
 Rubarier Sparganium

Sabot 1447.
 Safran Crocus
 Safran bléard 562.
 Sainfoin Onobrychis
 Salade de Chanoine 12.
 Saugum 874.
 Sarrise 118.
 Sarrise Satureja
 Satrion Cinosochis
 Saude ordinaire 1065.
 Saupie Salvia
 Saule Salix
 Savonaire Saponaria
 Seau de notre dame Tannus
 Seau de Salmon Poligonatum
 Senecon 723.
 Sercifix ou Salisil 842.
 Serpolet 76.
 Smiguet Smilax
 Souchet Cyperus
 Souci Calendula
 Souci des camps 682.
 Sode Salsola
 Sureau Sambucus
 Surelle Osis

Tabouret Thlapri
 Tanaiste Tanacetum
 Tete-noix 1361.
 Tillud 1616.
 Toque Scutellaria
 Torille Eryvum
 Tourcelle Turritia
 Tournesol 1441.
 Toute bonne 60.
 Tonne saine Androssemum
 Treble Trifolium

Tremble
Troque-madame
Troène Ligustrum
Troiscart Triglochin
Turquette Hieracium

V
aëcc Fucus
Vclair Erysimum

1976. Verge d'or Solidago
1711. Vergerette Esigeron
Verveine Verbena
Vesce Vicia
Veisse-loup Lycopodium
Vigne blanche
Vigne vierge
Vinetier
Viorne Viburnum

Viperine Echium
Vinet Vinex
Volant d'eau Mynophyllum
Uvete Ephedra

455.
461.
1908. Y
euse
Yi
Yeroiz
Taxus
Lilium
1980.

NOMINA VERNACULA

2111

A grimonio n. 1541.
Agnelli 1153.
Alia 1416.
Ameadiolo d'asse 1785.
Amora 1174.
Ambrani 490.
Ampole 1771.
Anet 1198.
Angubia 1308.
Arion 1975.
Arbia 1977.
Arclin 494.
Ar'missia 609.
Araga 370.
Aruga genil 1000.
Asiola) 1041.
Ativola)
Avisch 1416.

B arbore 841.
Barbana 160.
Baidonova 1163.
Baruti d' prive 1634.
Biconica 128.
Brota 1977.
Boras 167.
Bosom 15.
Botta 1809.
Bouadin Fructus 1807.
Bian d' Oasi 1431.
Brassabene 1760.
Bugne 1781.
Bugnan) 1783.
Bugnolo)
Bussa 1380.
Bra 440.

C alomandrina 148.
Canania 696.
Casa 1163.
Canal 1361.
Capel viceri 147.
Carina 1453.
Carvin 136.
Carroto 1096.
Castagni 1987.
Cetacea miao 161.
Cetrea 1780.
Cetrea nait 1781.
Cerpa 1978.
Cardone 567.
Cicna 1311.
Ciner 1311.
Cinca 1319.
Cocharia 911.
Cocharia d' montana 948.
Coccon arin 454.
Costa 1181.
Cajende 1113.
Colader 1116.
Coaforta cote 136.
Corala 388.
Corai 873.
Coradana 82.
Costa salvia 455.
Costa netta 998.
Cravai 453.
Crisco 918.

Cressa d' gal 1714.
Cucumelle 1697.
D ent d' veia 465.
Done 1068.
E rba brava 1050.
Eria scaria 665.
Eria camola 375.
Eria scaria 1114.
Eria parva 1419.
Eria d' la rocca) 656.
Eria d' la rocca) 663.
Eria bianca 605.
Eria d' i gar 111.
Eria Sinchena 1485.
Eria d' la rocca) 1440.
Eria d' l' fia)
Eria d' d' d' 1184.
Eria rablata 1053.
Eria mellea 471.
Eria scia casta 1186.
Eria parva 1048.
Eria carra 1132.
Eria tira 116.
Erlata 1005.

F amiale 1081.
Farfara 640.
Favari 174.
Fiat 463.
Fi) 1114.
Fi Fructus)
Filer 1191.
Fior d' e gran 580.
Fior d' lavion 378.
Fior d' mont 112.
Fasj 1159.
Fayaz 1315.
Fd 1588.
Fraudolina 413.
Fraudolac graue 1859.
Frasa 1631.
Fras 1191.
Frota 1491.
Frota d' marina FRUCTUS 494.
Fumarina 1081.

G allaria 871.
Gallitob 1674.
Gallenti 1684.
Garofolaria 1494.
Geniver 1949.
Genista) 118.
Genista) 1158.
Genip 617.
Genissosa 165.
Gita Fructus Lappae 518.
Gracaria 1456.
Giradol 758.
Giazmin 448.
Gramon 1168.
Gramon d' montana 1115.
Grassita 161.
Grassucij 1799.
Grinulle 1790.

I astas 610.
Insani genil 612.
Iperico 1419.
Isop 23.
L aca 1770.
Lavanda 91.
Lavatia 118.
Lavastot 640.
Leor 1114.
Latorala 1809.
Lebo 473.
Liander 368.
Leaghe 1751.
Lenga d' can 170.
Lisca 1147.
Linsgia 111.
Lavurin 1989.

M edone 1068.
Makia 1944.
Marconilla 1098.
Marconilla d' i bosc 1095.
Margarin genil 698.
Margarita gros 683.
Marrobi 95.
Marul 1097.
Melilot 1112.
Melissa 116.
Mentast o Mentras 67.
Millefijn 663.
Mingrena 1016.
Moro Fructus 1773.

N apel 1499.
Natta 1581.
Nispa 1812.
Niasia 1914.
Nissale 1979.
Nughe 478.

O rmin 60.
Orn o *Olm* 1068.

P an porcia 114.
Pea d' l' Coaro 1601.
Pon cast 1053.
Pon mol) 1018.
Panastaria)
Paradol 1711.
Pasconie 1695.
Pellegrin 603.
Pens 1649.
Peto d' masche 500.
Petra 1947.
Pianta 191.
Pimpinella 478.
Pia 1943.
Pioha 1975.
Pissaca 1704.
Pom 1818.
Pom gran 1804.
Pom codega 1819.
Pongola 1764.
Porlona 1678.
Purona 1695.
Primavera 1311.
Proni 1783.

FFFF

IMPRIMATUR
FR. VINCENTIUS MARIA CARRAS
ORD. PRÆD. S. TH. M.
VIC. GEN. S. OFFICII TAURINI
V. BELLARDI
MED. FAC. PRIOR ET PRAESES
V. SI PERMETTE LA STAMPA
GARRETTI DI FERRERE
PER LA GRANDE CANCELLERIA

۱۳

200-100
L

N.g. 13. -

S.N. IV 4

